

Π. ΤΟΓΚΑ — Θ. ΠΑΣΣΑ — Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

622  
6

# ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1963







Α Ρ Ι Θ Μ Η Τ Ι Κ Η



Π. ΤΟΓΚΑ — Θ. ΠΑΣΣΑ — Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

42280

# ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1963

# ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ  
ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄  
ΑΡΙΘΜΗΣΙΣ

1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

§ 1. Ἔννοια τοῦ ἀκεραίου ἀριθμοῦ. Ἐὰν ρίψωμεν ἓνα βλέμμα γύρω μας, θὰ διακρίνωμεν πλῆθος πραγμάτων. Μεταξὺ αὐτῶν ὑπάρχουν καὶ ὅμοια.

Ὅταν παρατηροῦμεν ὅμοια πράγματα, π.χ. μαθητὰς ἢ πρόβατα ἢ αὐτοκίνητα ἢ οἰκίας ἢ δένδρα κ.τ.λ., κάθε ἓνα ἀπ' αὐτὰ λαμβάνεται ὡς **ἀκεραία μονάς**.

Ὡστε ὁ μαθητῆς, τὸ πρόβατον, ἡ οἰκία, τὸ δένδρον κ.τ.λ. εἶναι μία ἀκεραία μονάς.

Εἶναι δυνατὸν ὅμως μὲ πολλοὺς μαθητὰς νὰ σχηματίσωμεν τάξεις, μὲ πολλὰ πρόβατα νὰ σχηματίσωμεν ποίμνια κ.τ.λ. Τότε μονάς εἶναι ἡ τάξις, τὸ ποίμνιον κ.τ.λ. Ὡστε:

**Μονάς λέγεται ἕκαστον ἀπὸ πολλὰ ὅμοια πράγματα ἢ καὶ πολλὰ ὅμοια πράγματα, τὰ ὁποῖα θεωροῦμεν ὡς ἓνα.**

Τὸ πλῆθος ὁμοίων πραγμάτων εἶναι ὠρισμένον, ὅταν γνωρίζωμεν ἀπὸ πόσας ἀκεραίας μονάδας ἀποτελεῖται αὐτό.

Π.χ. ὅταν λέγωμεν ὅτι τὰ θρανία τῆς τάξεως εἶναι **εἴκοσι**, ὀρίζομεν τὸ πλῆθος τῶν θρανίων, ἡ δὲ ἔννοια, μὲ τὴν ὁποῖαν ὀρίζομεν τὸ πλῆθος αὐτό, λέγεται **ἀκέραιος ἀριθμὸς**. Ὡστε:

**Ἀκέραιος ἀριθμὸς λέγεται ἡ ἔννοια, ἡ ὁποῖα ὀρίζει τὸ πλῆθος ὁμοίων πραγμάτων.**

Διὰ νὰ εὐρωμεν ὅμως τὸν ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος ὀρίζει ἓνα πλῆθος, εἶναι ἀνάγκη νὰ συγκρίνωμεν αὐτὸ πρὸς ὠρισμένην μονάδα.

Ἡ ἐργασία αὕτη, ἡ ὁποῖα γίνεται διὰ τὴν εὐρεσιν τοῦ ἀριθμοῦ, λέγεται **ἀρίθμησις** τοῦ πλῆθους αὐτοῦ.

**§ 2. Πότε δύο ἀριθμοὶ εἶναι ἴσοι.** Ἐστω ὅτι ἔχομεν ἕνα κυτίον μὲ πέννας καὶ δίδομεν εἰς ἕκαστον μαθητὴν μιᾶς τάξεως ἀπὸ μίαν πένναν.

\*Ἄν λάβουν ὅλοι οἱ μαθηταὶ ἀπὸ μίαν πένναν καὶ δὲν μείνη καμμία εἰς τὸ κυτίον, θὰ λέγωμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν πεννῶν.

Γενικῶς θὰ λέγωμεν ὅτι :

**Δύο ἀριθμοὶ εἶναι ἴσοι, ἂν εἰς κάθε μίαν μονάδα τοῦ καθενὸς ἀντιστοιχῇ μία μονάδα τοῦ ἄλλου.**

Διὰ νὰ δεῖξωμεν ὅτι δύο ἀριθμοὶ εἶναι ἴσοι, τοὺς χωρίζομεν μὲ τὸ σημεῖον =, τὸ ὁποῖον ἀπαγγέλλεται ἴσον.

Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ γράψωμεν : πέντε = πέντε καὶ νὰ ἀπαγγείλωμεν πέντε ἴσον πέντε.

Οἱ δύο ἴσοι ἀριθμοὶ καὶ τὸ μεταξύ αὐτῶν σημεῖον = ἐκφράζουν μίαν σχέσιν, ἣ ὁποία λέγεται **ισότης**.

Οἱ ἑκατέρωθεν τοῦ ἴσον ἀριθμοὶ καλοῦνται **μέλη τῆς ισότητος**. Καὶ ὁ μὲν πρὸς τὰ ἀριστερὰ λέγεται **πρῶτον μέλος τῆς ισότητος**, ὁ δὲ πρὸς τὰ δεξιὰ **δεύτερον μέλος αὐτῆς**.

Ἐκ τοῦ ὀρίσμου τῶν ἴσων ἀριθμῶν προκύπτει ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ θέτωμεν τὸ πρῶτον μέλος μιᾶς ισότητος ὡς δεύτερον καὶ τὸ δεύτερον μέλος ὡς πρῶτον.

**§ 3. Πότε δύο ἀριθμοὶ εἶναι ἄνισοι.** Ἄν κατὰ τὴν προηγουμένην διανομὴν περισσεύουν μερικαὶ πένναι εἰς τὸ κυτίον, θὰ λέγωμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν εἶναι **μικρότερος** τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πεννῶν.

\*Ἄν ὅμως δὲν ἐπερίσσειε καμμία πέννα, ἔμενον δὲ ἕνας ἢ καὶ περισσότεροι μαθηταὶ χωρὶς νὰ λάβουν πένναν, θὰ ἐλέγομεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν εἶναι **μεγαλύτερος** τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πεννῶν.

Γενικῶς θὰ λέγωμεν ὅτι :

**Δύο ἀριθμοὶ εἶναι ἄνισοι, ἂν μονάδες τινὲς τοῦ ἑνὸς δὲν ἔχουν ἀντιστοίχους μονάδας εἰς τὸν ἄλλον.**

Ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ἔχει τὰς περισσοτέρας μονάδας, λέγεται **μεγαλύτερος** τοῦ ἄλλου. Ὁ δὲ ἄλλος **μικρότερος** τοῦ πρώτου.

Διὰ νὰ δεῖξωμεν, ὅτι ἕνας ἀριθμὸς εἶναι μικρότερος ἑνὸς ἄλλου χρησιμοποιοῦμεν τὸ σημεῖον < ἢ >.

Π.χ. δυνάμεθα νὰ γράψωμεν : ἓνα < δύο· ἀπαγγέλλομεν δέ : ἓνα μικρότερον τοῦ δύο.

Διὰ νὰ δείξωμεν ὅτι ὁ τρία εἶναι μεγαλύτερος τοῦ δύο, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν : τρία > δύο· ἀπαγγέλλομεν δέ : τρία μεγαλύτερον τοῦ δύο.

Οἱ δύο ἄνισοι ἀριθμοὶ καὶ τὸ μεταξὺ αὐτῶν σημεῖον > ἢ < ἐκφράζουν μίαν σχέσιν, ἢ ὁποῖα λέγεται **ἀνισότης**.

Οἱ ἑκατέρωθεν τοῦ σημείου τῆς ἀνισότητος ἀριθμοὶ καλοῦνται **μέλη** τῆς ἀνισότητος. Καὶ ὁ μὲν πρὸς τὰ ἀριστερὰ λέγεται **πρῶτον** μέλος, ὁ δὲ πρὸς τὰ δεξιὰ **δεύτερον** μέλος.

**§ 4. Χρήσις τῶν γραμμάτων.** Ἐὰν δὲν θέλωμεν νὰ ὀρίσωμεν ἀπὸ πόσα ἀντικείμενα ἀποτελεῖται ἓνα πλῆθος καὶ θέλωμεν νὰ παραστήσωμεν αὐτὸ δι' ἀριθμοῦ, πρὶν ἢ ἀριθμησωμεν αὐτὰ, κάμνομεν χρῆσιν τῶν γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου :

Λέγομεν π.χ. ὅτι τὸ κυτίον ἔχει **α** πέννας, ἢ σάκκα ἔχει **β** τετράδια, ἢ τάξις ἔχει **δ** θρανία κ.τ.λ.

**§ 5. Συγκεκριμένοι καὶ ἀφηρημένοι ἀριθμοί.** Οἱ ἀριθμοὶ : εἴκοσι πρόβατα, δέκα βῶλοι, τριάκοντα δένδρα, λέγονται **συγκεκριμένοι** ἀριθμοί. Ὡστε :

**Ἐνας ἀριθμὸς λέγεται συγκεκριμένος, ἂν φανερώνη καὶ τὸ εἶδος τῶν μονάδων του.**

Ὅταν ἓνα παιδίον λέγη ἀπλῶς : ἓνα, δύο, τρία κ.τ.λ., ἐκφωνεῖ ἀφηρημένους ἀριθμούς. Ὡστε :

**Ἐνας ἀριθμὸς λέγεται ἀφηρημένος, ἂν δὲν φανερώνη τὸ εἶδος τῶν μονάδων του.**

**§ 6. Σχηματισμὸς τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν.** Ἐστω ὅτι ἔχομεν μίαν σάκκαν κενὴν καὶ βῶλους. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι ἡ σάκκα ἔχει **μηδὲν** βῶλους.

Θέτομεν ἔπειτα εἰς τὴν σάκκαν **ἓνα** βῶλον.

Ἐὰν εἰς τὴν σάκκαν θέσωμεν **ἓνα** βῶλον ἀκόμη, ὁ ἀριθμὸς τῶν βῶλων, ποὺ περιέχει ἡ σάκκα, εἶναι **ἓνας καὶ ἓνας** ἢ **δύο**.

Ἐὰν θέσωμεν εἰς τὴν σάκκαν ἓνα νέον βῶλον, ὁ ἀριθμὸς τῶν βῶλων ποὺ θὰ περιέχη ἡ σάκκα, θὰ εἶναι **ἓνας καὶ ἓνας καὶ ἓνας** ἢ **τρεῖς**.

Ὡστε κάθε φοράν, πού θέτομεν ἕνα νέον βῶλον εἰς τήν σάκκαν δηλ. κάθε φοράν, πού ἐνώνομεν **μίαν νέαν μονάδα** μέ τὰς ἄλλας, σχηματίζομεν ἕνα νέον ἀκέραιον ἀριθμόν.

Οὕτω σχηματίζεται ἡ **φυσική σειρά** τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν:

**Ἔνα, δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε, ἕξ, ἑπτὰ, ὀκτώ, ἑννέα** κ.τ.λ. ἡ ὁποία προφανῶς εἶναι ἄπειρος.

## 2. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΣ

† § 7. Σκοπὸς τῆς προφορικῆς ἀριθμῆσεως. Ἐὰν εἰς κάθε νέον ἀριθμόν, πού θὰ προέκυπτε κατὰ τὸν τρόπον, πού ἐδείξαμεν εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον, ἐδίδομεν ἰδιαίτερον ὄνομα, θὰ ἐχρειαζόμεθα ἄπειρα ὀνόματα, διὰ νὰ τοὺς ὀνομάσωμεν. Εὐκόλως ὁμως ἐνοοῦμεν ὅτι καὶ ἡ πλέον ἰσχυρὰ μνήμη δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ συγκρατήσῃ αὐτὰ τὰ ὀνόματα. Διὰ τοῦτο οἱ ἄνθρωποι ἠναγκάσθησαν νὰ ἐπινοήσουν μίαν ἀπλήν μέθοδον, διὰ νὰ ὀνομάζουν μέ ὀλίγας λέξεις τοὺς ἀριθμούς.

Τὸ σύνολον τῶν κανόνων, οἱ ὁποῖοι βοηθοῦν εἰς τοῦτο, λέγεται καὶ αὐτὸ **ἀρίθμησις**.

Ἡ ἀρίθμησις διακρίνεται εἰς **προφορικὴν** καὶ εἰς **γραφτὴν**.

Ἡ προφορικὴ ἀρίθμησις ἔχει ὡς σκοπὸν νὰ μᾶς διδάξῃ πῶς νὰ ὀνομάζωμεν τοὺς ἀριθμούς μέ ὀλίγας λέξεις.

§ 8. Οἱ δέκα πρῶτοι ἀριθμοί. Διὰ νὰ ὀνομάσουν τοὺς δέκα πρῶτους ἀριθμούς, ἔδωσαν τὰ ἐξῆς ὀνόματα κατὰ σειράν :

**Ἔνα, δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε, ἕξ, ἑπτὰ, ὀκτώ, ἑννέα, δέκα.**

§ 9. Μονάδες διαφόρων τάξεων. Διὰ νὰ ὀνομάσουν τοὺς ἄλλους ἀριθμούς, παρεδέχθησαν τὰ κάτωθι :

**Δέκα μονάδες** (ἀπλαῖ) σχηματίζουν **μίαν νέαν μονάδα**, ἡ ὁποία ὀνομάζεται **μονὰς δευτέρας τάξεως** ἢ **δεκάς**.

**Δέκα μονάδες** τῆς δευτέρας τάξεως ἢ **δεκάδες** σχηματίζουν **μίαν νέαν μονάδα**, ἡ ὁποία λέγεται **μονὰς τρίτης τάξεως** ἢ **ἐκατοντάς**.

**Δέκα μονάδες** τῆς τρίτης τάξεως ἢ **ἐκατοντάδες** σχηματίζουν **μίαν μονάδα** τῆς τετάρτης τάξεως ἢ **μίαν χιλιάδα**.

Καί γενικῶς. Δέκα μονάδες ἀπό κάθε τάξιν σχηματίζουν μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως.

§ 10. Βάσις τοῦ συστήματος ἀριθμῆσεως. Ὁ ἀριθμὸς δέκα, ὁ ὁποῖος φανερώνει πόσας μονάδας μιᾶς ὠρισμένης τάξεως πρέπει νὰ λάβωμεν, διὰ νὰ σχηματίσωμεν μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, λέγεται **βάσις τοῦ συστήματος ἀριθμῆσεως\***.

Τὸ δὲ σύστημα τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὁποῖοι σχηματίζονται μετὰ βᾶσιν τὸν δέκα, λέγεται **δεκαδικὸν σύστημα ἀριθμῆσεως**.

§ 11. Οἱ ἀριθμοὶ ἀπὸ δέκα ἕως χίλια. Ἐὰν λάβωμεν ὡς μονάδα μίαν **δεκάδα** καὶ ἐργασθῶμεν, ὅπως εἰργάσθημεν διὰ τὸν σχηματισμὸν τῶν δέκα πρώτων ἀριθμῶν, δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν τοὺς ἀριθμούς: **δύο δεκάδες** (ἢ εἴκοσι), **τρεῖς δεκάδες** (ἢ τριάκοντα),... **δέκα δεκάδες** (ἢ ἑκατόν).

Οἱ μεταξὺ δύο διαδοχικῶν δεκάδων περιεχόμενοι ἀριθμοὶ λαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν δεκάδων καὶ τῶν ἀπλῶν μονάδων, προτασσομένων τῶν ὀνομάτων τῶν δεκάδων. Οὕτω λέγομεν **ἑνδεκα** (ἀντὶ δέκα ἕν), **δώδεκα** (ἀντὶ δέκα δύο), **δέκα τρία**, **δέκα τέσσαρα**,... **εἴκοσι ὀκτώ**,... **ἐνενήκοντα ἑννέα**.

Ἐὰν λάβωμεν ὡς μονάδα μίαν ἑκατοντάδα, σχηματίζομεν, ὅπως εἰδείχθη ἀπὸ τὰς μονάδας καὶ δεκάδας, τοὺς ἀριθμούς: **δύο ἑκατοντάδες** (ἢ διακόσια), **τρεῖς ἑκατοντάδες** (ἢ τριακόσια), **τέσσαρες ἑκατοντάδες** (ἢ τετρακόσια),... **ἑννέα ἑκατοντάδες** (ἢ ἑνεακόσια), **δέκα ἑκατοντάδες** (ἢ χίλια).

Οἱ ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι περιέχονται μεταξὺ δύο διαδοχικῶν ἑκατοντάδων, λαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν ἑκατοντάδων καὶ τὰ ὀνόματα ἀπὸ τοῦ ἕνα μέχρις ἐνενήκοντα ἑννέα π.χ. **ἑπτακόσια εἴκοσι πέντε**.

\* Ἐὰν ἡδυνάμεθα ἀντὶ τοῦ ἀριθμοῦ δέκα νὰ ἐκλέξωμεν ἕνα ἄλλον ἀριθμὸν, διὰ νὰ τὸν χρησιμοποιήσωμεν ὡς βᾶσιν. Οὕτω θὰ ἡδυνάμεθα νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι ὀκτὼ μονάδες μιᾶς τάξεως σχηματίζουν μίαν μονάδα τῆς ἀκολουθοῦσας τάξεως. Τὸ σύστημα αὐτὸ θὰ ἦτο διάφορον τοῦ προηγουμένου. Ἡ ἐκλογή τοῦ ἀριθμοῦ δέκα, τὸν ὁποῖον παρεδέχθησαν ὅλοι οἱ λαοί, φαίνεται ὅτι προήλθεν ἐκ τοῦ ὅτι ἔχομεν δέκα δακτύλους καὶ ὅτι οἱ ἄνθρωποι κατ' ἀρχὰς ἐλογάριαζαν μετὰ τοὺς δακτύλους.

§ 12. Οί αριθμοί από τοῦ χίλια καί ἄνω. Ἐκ τοῦ χίλια καί πέραν, διὰ νὰ ἀποφύγωμεν νὰ χρησιμοποιοῦμεν ἕνα πλῆθος νέων λέξεων, παρεδέχθημεν νὰ σχηματίζωμεν τοὺς ἀριθμούς ἀνά χιλιάδας, ὅπως σχηματίζομεν αὐτοὺς ἀνά ἀπλᾶς μονάδας.

Οὕτω λέγομεν : δύο χιλιάδες, τρεῖς χιλιάδες, μέχρι τοῦ δέκα χιλιάδες, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μονὰς τῆς πέμπτης τάξεως.

Ἐπειτα : εἴκοσι χιλιάδες, τριάκοντα χιλιάδες, ... μέχρι τοῦ ἑκατὸν χιλιάδες, ἡ ὁποία εἶναι μονὰς τῆς ἕκτης τάξεως.

Ἐπειτα λέγομεν : διακόσιαι χιλιάδες, τριακόσιαι χιλιάδες, ... μέχρι τοῦ χίλια χιλιάδες, αἱ ὁποῖαι ὀνομάζονται μὲ ἕνα νέον ὄνομα : ἑκατομμύριον καὶ ἡ ὁποία εἶναι μονὰς τῆς ἑβδόμης τάξεως.

Ὅμοιως σκεπτόμενοι καὶ ἐπαναλαμβάνοντες κάθε νέαν μονάδα δέκα φορές, εὐρίσκομεν νέας μονάδας, αἱ ὁποῖαι ὀνομάζονται κατὰ σειράν : δεκάς ἑκατομμυρίων ἡ μονὰς ὀγδόης τάξεως, ἑκατοντάς ἑκατομμυρίων ἡ μονὰς ἐνάτης τάξεως, χιλιάς ἑκατομμυρίων ἡ μονὰς δεκάτης τάξεως.

Ἡ τελευταία αὐτῆ μονὰς ὀνομάζεται δισεκατομμύριον.

Ἐκ τοῦ δισεκατομμυρίου σχηματίζομεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τὴν δεκάδα δισεκατομμυρίων ἡ μονάδα ἑνδεκάτης τάξεως, τὴν ἑκατοντάδα δισεκατομμυρίων ἡ μονάδα δωδεκάτης τάξεως, τὴν χιλιάδα δισεκατομμυρίων ἡ τρισεκατομμύριον ἡ μονάδα δεκάτης τρίτης τάξεως κ.ο.κ.

§ 13. Πῶς γίνονται οἱ ἀριθμοί ἀπὸ τὰς μονάδας διαφόρων τάξεων. Ἐνα πλῆθος βῶλων χωρίζεται π.χ. εἰς τρεῖς σωροὺς ἀπὸ δέκα βῶλους ὁ καθένας, καὶ εἰς ἑπτὰ βῶλους. Λέγομεν λοιπὸν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν βῶλων ἔχει : τρεῖς δεκάδας καὶ ἑπτὰ μονάδας.

Ἐπίσης ἕνα πλῆθος φασολίων δύναται νὰ χωρισθῆ π.χ. εἰς δύο ἑκατοντάδας εἰς πέντε δεκάδας καὶ εἰς ἕξ ἀπλᾶς μονάδας. Ὡστε :

**Κάθε ἀριθμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ μονάδας διαφόρων τάξεων καὶ ἀπὸ κάθε τάξιν ἔχει ὀλιγωτέρας τῶν δέκα.**

Διὰ νὰ ὀνομάσωμεν δὲ ἕνα ἀριθμὸν, ἀρκεῖ νὰ δηλώσωμεν ποίας μονάδας ἔχει καὶ πόσας ἀπὸ κάθε τάξιν.

Π.χ. ἂν εἴπωμεν : δύο ἑκατοντάδας τρεῖς δεκάδας πέντε ἑπτάδες μονάδας, ὀνομάζομεν ἕνα ἀριθμὸν : μὲ τὰς γνωστὰς δὲ συντομίας αὐτὸς ὀνομάζεται **διακόσια τριάκοντα πέντε.**

Ὅμοιως ὁ ἀριθμὸς : πέντε δεκάδες χιλιάδων τρεῖς χιλιάδες ὀκτώ ἑκατοντάδες καὶ ἕξ ἀπλάι μονάδες, λέγεται συντόμως **πεντήκοντα τρεῖς χιλιάδες ὀκταχόσια ἕξ** κ.τ.λ.

§ 14. Κλάσεις μονάδων διαφόρων τάξεων. Ἡ ἑπλή μονάς, ἡ χιλιάς, τὸ ἑκατομμύριον, τὸ δισεκατομμύριον κ.τ.λ. λέγονται **πρωτεύουσαι μονάδες**. Ὡστε :

**Χίλια** πρωτεύουσαι μονάδες μιᾶς τάξεως ἀποτελοῦν μίαν πρωτεύουσαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως.

Κατὰ ταῦτα ἀπὸ μίαν πρωτεύουσαν μονάδα μέχρι τῆς ἐπομένης ὑπάρχουν τρεῖς μονάδες διαφόρων τάξεων. Αὐταὶ ἀποτελοῦν μίαν κλάσιν μονάδων.

Ἡ κλάσις αὐτὴ φέρει τὸ ὄνομα τῆς πρωτεύουσας μονάδος, τὴν ὁποίαν ἔχει.

Ὑπάρχει λοιπὸν κλάσις ἀπλῶν μονάδων, κλάσις χιλιάδων, κλάσις ἑκατομμυρίων κ.τ.λ.

Πίναξ τῶν κλάσεων καὶ τῶν τάξεων

Κλάσις	τῶν δισεκατομμυρίων			τῶν ἑκατομμυρίων			τῶν χιλιάδων			τῶν ἀπλῶν μονάδων		
	έκ.	δεκ.	μον.	έκ.	δεκ.	μον.	έκ.	5εκ.	μον.	έκ.	δεκ.	μον.
Τάξις	12η	11η	10η	9η	8η	7η	6η	5η	4η	3η	2α	1η

#### Ἀσκῆσεις

1) Μία ἀνδρική ἐνδυμασία κατὰ τὰ ἔτη 1946 - 1952 ἐκόστιζεν : ὀκτὼ ἑκατοντάδας χιλιάδων πέντε δεκάδας χιλιάδων ὀκτὼ χιλιάδες καὶ τρεῖς ἑκατοντάδας δραχμῶν. Νὰ ἀπαγγεῖλητε τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν.

2) Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ὁ Ἑλληνικὸς Ἐρυθρὸς Σταυρὸς διένειμεν εἰς ἀπόρους οἰκογενείας : μίαν χιλιάδα μίαν ἑκατοντάδα μίαν δεκάδα καὶ ἑννέα κυττῖα μὲ κόνιν αὐγῶν. Νὰ ἀπαγγεῖλητε τὸν ἀριθμὸν τῶν κυττῖων αὐτῶν.

3) Ὁ ἔρανος διὰ τὴν φανέλλαν τοῦ μαχομένου στρατιώτου ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Α.Μ. τῆς Βασιλίσσης ἀπέδωκεν εἰς μετρητὰ : ἕνα δισεκατομμύριον ἕξ ἑκατοντάδας ἑκατομμυρίων πέντε δεκάδας

ἐκατομμυρίων ἑπτὰ ἑκατοντάδας χιλιάδων δραχμῶν καὶ πέντε δραχμᾶς. Νὰ ἀπαγγεῖλητε αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν.

4) Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Δημοσίων Ἔργων ἐδάπάνησε κατὰ τὸ ἔτος 1948 μίαν ἑκατοντάδα καὶ τρεῖς δεκάδας ἑκατομμυρίων δραχμῶν διὰ τὴν συμπλήρωσιν καὶ ἐπισκευὴν τῆς ὁδοῦ Λαρίσσης - Ἁγυιάς. Νὰ ἀπαγγεῖλητε τὸν ἀριθμὸν αὐτόν.

5) Ὁ Σύνδεσμος τῶν Ἑλλήνων Βιομηχάνων ἀνεκοίνωσεν ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 1947 ἡ ἀξία τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἀνῆλθεν εἰς δύο μονάδας τρισεκατομμυρίων καὶ ἕξ δεκάδας δισεκατομμυρίων δραχμῶν. Νὰ ἀπαγγεῖλητε αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν.

### 3. ΓΡΑΠΤΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΣ

§ 15. Γραπτὴ ἀρίθμησις. Διὰ νὰ παραστήσωμεν τοὺς ἀριθμούς: μηδέν, ἕνα, δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε, ἕξ, ἑπτὰ, ὀκτώ, ἐννέα χρησιμοποιοῦμεν τὰ κάτωθι σύμβολα, τὰ ὁποῖα λέγονται **ψηφία\***.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Τὰ ψηφία αὐτά, ἐκτὸς τοῦ μηδενὸς, λέγονται **σημαντικὰ ψηφία**, διότι αὐτὰ παριστάνουν μονάδας διαφόρων τάξεων.

Ἡ γραπτὴ ἀρίθμησις ἔχει σκοπὸν νὰ μᾶς διδάξῃ πῶς νὰ γράψωμεν ὅλους τοὺς ἀριθμούς μὲ τὰ δέκα προηγούμενα ψηφία.

§ 16. Ἀνάλυσις ἐνὸς ἀριθμοῦ εἰς μονάδας διαφόρων τάξεων. Ἀνωτέρω εἶδομεν ὅτι κάθε ἀκέραιος ἀριθμὸς δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς σύνολον μονάδων διαφόρων τάξεων.

Οὕτω ὁ ἀριθμὸς

τριακόσια πεντήκοντα ἑπτὰ

ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑπτὰ ἀπλᾶς μονάδας πέντε δεκάδας καὶ τρεῖς ἑκατοντάδας.

Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ παραστήσωμεν ἕνα ἀριθμὸν, ἂν γράψωμεν τὰ **ψηφία** τῶν μονάδων τῶν διαφόρων τάξεων, τὰς ὁποίας περιέχει. Τοῦτο ἐπιτυγχάνομεν χάρις εἰς τὴν ἀκόλουθον συνθήκην :

\*Ἡ γραφὴ τῶν ἀριθμῶν μὲ τὰ ἀνωτέρω δέκα ψηφία λέγεται **Ἀραβικὴ**, τὰ δὲ ψηφία **Ἀραβικοὶ χαρακτήρες**. Διότι μετεδόθη ἡ γνώσις αὐτῶν εἰς ἡμᾶς ἐκ τῶν Ἀράβων (περὶ τὸν 12ον αἰῶνα μ.Χ.).

§ 17. Συνθήκη. Κάθε ψηφίον, τὸ ὁποῖον γράφεται ἀμέσως πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἄλλου, παριστάνει μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως.

Κατὰ τὴν συνθήκην αὐτὴν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν ὅλους τοὺς ἀκεραίους ἀριθμοὺς μὲ τὰ δέκα ψηφία.

Π.χ. ὁ ἀριθμὸς 3 χιλιάδες 5 ἑκατοντάδες 6 δεκάδες καὶ 4 μονάδες γράφεται : 3 564.

Ἐὰν μονάδες μιᾶς τάξεως δὲν ὑπάρχουν, γράφομεν εἰς τὴν θέσιν αὐτῶν τὸ 0.

Π.χ. ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ἔχει 7 χιλιάδας 3 δεκάδας καὶ 5 μονάδας γράφεται : 7 035.

§ 18. Γραφὴ ἀπαγγελλομένου ἀριθμοῦ. Διὰ νὰ γράψωμεν ἓνα ἀριθμὸν, διακρίνομεν δύο περιπτώσεις, καθ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς εἶναι μικρότερος ἢ μεγαλύτερος τοῦ χιλία.

*Περίπτωσης I.* Διὰ νὰ γράψωμεν ἓνα ἀριθμὸν μικρότερον τοῦ χιλία, γράφομεν διαδοχικῶς ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοντάδων, τῶν δεκάδων καὶ τῶν μονάδων.

Π.χ. ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ γράψωμεν τὸν ἀριθμὸν τριακόσια ἑβδομήκοντα πέντε. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ **τρεις** ἑκατοντάδας, **ἑπτὰ** δεκάδας καὶ **πέντε** μονάδας καὶ γράφεται 375.

Ὁμοίως ὁ ἀριθμὸς πεντακόσια ὀκτῶ ἀποτελεῖται ἀπὸ **πέντε** ἑκατοντάδας, **μηδὲν** δεκάδας καὶ **ὀκτῶ** μονάδας καὶ γράφεται 508.

*Περίπτωσης II.* Διὰ νὰ γράψωμεν ἓνα ἀριθμὸν μεγαλύτερον τοῦ χιλία, χωρίζομεν νοερῶς τὸν ἀριθμὸν εἰς κλάσεις καὶ γράφομεν διαδοχικῶς ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν διαφόρων κλάσεων κατὰ τὴν σειρὰν, καθ' ἣν ἀπαγγέλλονται, δηλ. ἀρχίζοντες ἀπὸ τὴν ἀνωτάτην κλάσιν.

Εἰς τὰς θέσεις τῶν μονάδων τῶν διαφόρων τάξεων, αἱ ὁποῖαι τυχὸν λείπουν, γράφομεν μηδενικά.

Π.χ. ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ γράψωμεν τὸν ἀριθμὸν πέντε ἑκατομμύρια τριακόσια εἴκοσι ὀκτῶ χιλιάδες πεντακόσια δύο.

Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ :  
5 ἑκατομμύρια, 328 χιλιάδας καὶ 502 μονάδας καὶ γράφεται 5 328 502.

Ὁμοίως ὁ ἀριθμὸς 24 δισεκατομμύρια τριακόσια ἐξήκοντα ὀκτῶ ἑκατομμύρια δέκα πέντε χιλιάδες γράφεται 24 368 015 000.

§ 19. **Απαγγελία ενός αριθμού.** Διά να απαγγείλωμεν ένα αριθμόν, ο οποίος έχει γραφή, διακρίνομεν δύο περιπτώσεις, καθ' ὅσον ο αριθμὸς ἔχει τὸ πολὺ τρία ἢ περισσότερα ἀπὸ τρία ψηφία.

*Περίπτωσης I.* Διά να απαγγείλωμεν ένα αριθμόν, ὁ ὁποῖος ἔχει τρία ψηφία ἢ ὀλιγώτερα τῶν τριῶν ψηφίων, ἀπαγγέλλομεν διαδοχικῶς τὰ ψηφία, ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ, δίδοντες εἰς κάθε ψηφίον τὸ ὄνομα τῆς μονάδος, τὴν ὁποίαν παριστάνει.

Π.χ. ὁ ἀριθμὸς 675 ἀπαγγέλλεται: ἑξακόσια ἑβδομήκοντα πέντε, ὁ ἀριθμὸς 304 ἀπαγγέλλεται: τριακόσια τέσσαρα.

*Περίπτωσης II.* Διά να απαγγείλωμεν ένα αριθμόν, ὁ ὁποῖος ἔχει περισσότερα ἀπὸ τρία ψηφία, χωρίζομεν τὸν ἀριθμὸν εἰς τριψήφια τμήματα, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ (τὸ τελευταῖον πρὸς τὰ ἀριστερὰ τμήμα δύναται νὰ ἔχη ἓνα ἢ δύο ψηφία). Κάθε τμήμα παριστάνει μίαν κλάσιν. Ἀπαγγέλλομεν διαδοχικῶς, ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ, ἕκαστον τμήμα μὲ τὸ ὄνομα τῆς κλάσεώς του.

Διά να εὐκολύνωμεν τὴν ἀπαγγελίαν ἑνὸς πολυψηφίου ἀριθμοῦ, διαχωρίζομεν τὰ τμήματά του. Πρέπει ὁμως νὰ προσέχωμεν νὰ μὴ θέτωμεν μεταξὺ τῶν χωρισμένων τμημάτων κανένα σημεῖον, οὔτε τελείαν οὔτε κόμμα, καὶ νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ὁ ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον σχηματίζουν τὰ ψηφία ἑνὸς τμήματος, παριστάνει χιλιάδας, ἂν δεξιὰ σπ' αὐτὸν ὑπάρχουν τρία ἄλλα ψηφία, παριστάνει δὲ ἑκατομμύρια, ἂν δεξιὰ του ὑπάρχουν ἕξ ἄλλα ψηφία καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς:

*Παράδειγμα.* Ὁ ἀριθμὸς 504 725 306 ἀπαγγέλλεται πεντακόσια τέσσαρα ἑκατομμύρια ἑπτακόσια εἴκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια ἕξ.

Ὁ ἀριθμὸς 5 000 230 007 ἀπαγγέλλεται 5 δισεκατομμύρια διακόσια τριακοντα χιλιάδες ἑπτὰ.

§ 20. **Σύνολον μονάδων μιᾶς τάξεως ἑνὸς ἀριθμοῦ.** Ἔστω ὁ ἀριθμὸς 150 637. Ἄν ἀποκόψωμεν τὸ ψηφίον 7, ὁ ἀριθμὸς 15 063 φανερώνει τὰς ἐν ὄλῳ δεκάδας αὐτοῦ.

Ἦτοι τὸ σύνολον τῶν δεκάδων τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι 15 063.

Ἄν ἀποκόψωμεν τὸν ἀριθμὸν 37, δηλαδὴ τὸν ἀριθμόν, τὸν ὁποῖον ἀποτελοῦν τὰ δύο τελευταῖα ψηφία, ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος μένει δηλ. ὁ 1 506 φανερώνει τὰς ἐν ὄλῳ ἑκατοντάδας αὐτοῦ.

Ἦτοι τὸ σύνολον τῶν ἑκατοντάδων τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι 1 506.

Όμοίως εργαζόμενοι εύρισκομεν ὅτι τὸ σύνολον τῶν χιλιάδων εἶναι 150, τὸ σύνολον τῶν δεκάδων χιλιάδων αὐτοῦ εἶναι 15 κ.ο.κ. Ὡστε:

Διὰ τὴν εὐρωμεν τὸ σύνολον τῶν μονάδων μιᾶς τάξεως δοθέντος ἀριθμοῦ, ἀποκόπτομεν ἀπὸ τὰ δεξιὰ του ὅλα τὰ ψηφία, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται μετὰ τὸ ψηφίον τῆς τάξεως ἐκείνης.

### Ἀσκήσεις

Α' Ὁμάς. 6) Ὁ νικηφόρος κατὰ τῆς Ἰταλίας πόλεμος τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἐκηρύχθη ὑπὸ τῆς Ἰταλίας τὸ ἔτος χίλια ἑνεακόσια σαράντα. Νὰ γράψητε τὸν ἀριθμὸν αὐτόν. 1940

7) Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ἠλευθέρωσε τὴν Θεσσαλονίκην τὸ ἔτος χίλια ἑνεακόσια δώδεκα. Νὰ γράψητε τὸν ἀριθμὸν αὐτόν. 1912

8) Ὁ μεγαλύτερος ποταμὸς τῆς Γῆς, ὁ Μισισσιππῆς τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, ἔχει μῆκος ἕξ ἑκατομμύρια ἑνεακοσίας ἑβδομήκοντα χιλιάδας μέτρα. Νὰ γράψητε τὸν ἀριθμὸν αὐτόν. 6940000

9) Κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ 1928, αἱ Ἀθῆναι εἶχον τετρακοσίας πενήκοντα δύο χιλιάδας ἑνεακοσίους δώδεκα κατοίκους. Νὰ γράψητε τὸν ἀριθμὸν αὐτόν.

10) Κατὰ τὴν ἰδίαν ἀπογραφὴν ὁ Πειραιεὺς εἶχε διακοσίας πενήκοντα μίαν χιλιάδας τριακοσίους ὀκτὼ κατοίκους. Νὰ γράψητε τὸν ἀριθμὸν αὐτόν.

Β' Ὁμάς. 11) Κατὰ τὸ ἔτος 1945 τὸ Κράτος ἐδαπάνησε 14 000 000 000 δραχμάς. Νὰ ἐκτιμήσητε τὴν δαπάνην ταύτην εἰς ἑκατομμύρια δραχμῶν.

12) Ἀπὸ 1ης Ἀπριλίου 1927 μέχρι τέλους Μαΐου 1948 τὰ ἔσοδα τοῦ Κράτους ἀνῆλθον εἰς 2 614 218 000 000 δραχμάς. Νὰ ἐκτιμήσητε τὰ ἔσοδα αὐτὰ εἰς ἑκατομμύρια δραχμῶν.

13) 1ον. Πόσας ἑκατοντάδας καὶ πόσας δεκάδας ἔχει μία ἑκατοντὰς χιλιάδων; 2ον. Πόσας τὸ ὅλον δεκάδας, μονάδας χιλιάδων, δεκάδας χιλιάδων ἔχει ἓνα ἑκατομμύριον; 3ον. Πόσας ἑκατοντάδας χιλιάδων, μονάδας χιλιάδων ἔχουν τὰ 35 ἑκατομμύρια;

Γ' Ὁμάς. 14) Μὲ τὰ ψηφία 7, 6, 3, 8, 2 νὰ σχηματίσητε τὸν μικρότερον καὶ τὸν μεγαλύτερον πενταψήφιον ἀριθμὸν.

15) Θέσατε κατὰ σειρὰν ὕψους τὰ κάτωθι ὄρη, ἀρχίζοντες ἀπὸ τοῦ χαμηλοτέρου: Αἰγάλεω 1 217 μ., Ἀραχναῖον 1 198 μ., Ἀρτεμί-

σιον 1 772 μ., Ἐρύμανθος 2 223 μ., Κυλλήνη 2 375 μ., Λύκαιον 1 333 μ., Μαίναλον 1 980 μ., Παναχαϊκὸν 1 925 μ., Πάρνων 1 935 μ., Ταθγετος 2 407 μ., Ἀροάνια 2 555 μ.

16) Θέσατε κατὰ σειράν ὕψους τὰ κάτωθι ὄρη τῆς Σπερεῆς Ἑλλάδος, ἀρχίζοντες ἀπὸ τοῦ ὑψηλοτέρου: Γκιώνα 2 512 μ., Ἐλικῶν 1 748 μ., Καλλίδρομον 1 371 μ., Κιθαιρῶν 1 408 μ., Οἶτη 2 483 μ., Παλαιτωλικὸν 1 924 μ., Παρνασσὸς 2 459 μ., Πάρνης 1 412 μ.

§ 21. Ἑλληνικὴ γραφὴ ἀριθμῶν Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, διὰ νὰ γράφουν τοὺς ἀριθμοὺς, ἐχρησιμοποιοῦν τὰ 24 γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου καὶ τὰ σημεῖα ς (στίγμα), ὄχι στ ὅπως τὸ γράφουν συνήθως ἐσφαλμένως, ς (κόππα) καὶ ϝ (σαμπι). Δεξιὰ καὶ ὀλίγον ἄνω αὐτῶν ἔθετον ἓνα τόνον.

Ὁ κατωτέρω πίναξ δεικνύει τὴν ἀντιστοιχίαν μεταξὺ τῆς Ἀραβικῆς καὶ τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς τῶν ἀριθμῶν:

Μονάδες	Δεκάδες	Ἑκατοντάδες
1 ..... α'	10 ..... ι'	100 ..... ρ'
2 ..... β'	20 ..... κ'	200 ..... σ'
3 ..... γ'	30 ..... λ'	300 ..... τ'
4 ..... δ'	40 ..... μ'	400 ..... υ'
5 ..... ε'	50 ..... ν'	500 ..... φ'
6 ..... ς'	60 ..... ξ'	600 ..... χ'
7 ..... ζ'	70 ..... ο'	700 ..... ψ'
8 ..... η'	80 ..... π'	800 ..... ω'
9 ..... θ'	90 ..... ς'	900 ..... ϝ'

Μὲ τὰ ἀνωτέρω γράμματα παρίστανον ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ 999.

Οὕτως οἱ ἀριθμοὶ	11	12	13	14	15	.....	19
γράφονται	ια'	ιβ'	ιγ'	ιδ'	ιε'	.....	ιθ'
Ἐπίσης οἱ ἀριθμοὶ	31	32	33	34	35	.....	39
γράφονται	λα'	λβ'	λγ'	λδ'	λε'	.....	λθ'
Ὁμοίως οἱ ἀριθμοὶ	152	236	362	479	892	.....	908
γράφονται	ρνβ'	σλς'	τξβ'	υοθ'	ωζβ'	.....	ϝη'

Προκειμένου νὰ γράφουν μονάδας, δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας χιλιάδων, μετεχειρίζοντο τὰ ἴδια γράμματα, ἔθετον ὁμως τὸν τόνον ἀριστερὰ καὶ ὀλίγον ὑποκάτω τοῦ γράμματος.

Π.χ. οί αριθμοί	1 000	2 000	3 000	90 000
γράφονται	,α	,β	,γ	,δ
Κατά ταῦτα οί αριθμοί		1 745	46 798	998 672
γράφονται		,αψμε'	,μ,σψζη'	,ζ,η,ηχοβ'

**Σημείωσις.** Ἡ Ἑλληνική γραφή χρησιμοποιεῖται σήμερον εἰς ὠρισμένας περιπτώσεις ἀριθμήσεως. Οὕτω προκειμένου νὰ ἀριθμήσωμεν τὰς σελίδας τοῦ προλόγου ἑνὸς βιβλίου γράφομεν : σελὶς α', σελὶς β',...

Ὅμοίως διὰ νὰ ἀριθμήσωμεν τὰ κεφάλαια ἑνὸς βιβλίου, γράφομεν : Κεφάλαιον Α' (πρῶτον), Κεφάλαιον Β' (δεύτερον) κ.ο.κ.

Ἐπίσης διὰ νὰ ὀνομάσωμεν τὰ Γυμνάσια μιᾶς πόλεως, τὰς τάξεις ἑνὸς σχολείου, τὰ σώματα στρατοῦ κ.τ.λ. χρησιμοποιοῦμεν τὰ κεφαλαῖα γράμματα : Α', Β', Γ',...

**§ 22. Ρωμαϊκή γραφή.** Οἱ Ρωμαῖοι μετεχειρίζοντο γραφὴν τῶν ἀριθμῶν διάφορον ἀπὸ τὴν γραφὴν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἐπειδὴ δὲ καὶ σήμερον χρησιμοποιεῖται εἰς μερικὰς περιπτώσεις (π.χ. εἰς τὰς πλάκας τῶν ὥρολογίων κ.λ.π.) καλὸν εἶναι νὰ γνωρίζωμεν αὐτήν.

Οἱ Ρωμαῖοι μετεχειρίζοντο ἑπτὰ ἀπὸ τὰ γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου διὰ τὴν γραφὴν τῶν ἀριθμῶν. Ἦσαν δὲ τὰ κάτωθι, μὲ τὰς ἀντιστοιχοῦσας τιμὰς των :

I	V	X	L	C	D	M
ἕνα	πέντε	δέκα	πεντήκοντα	ἑκατὸν	πεντακόσια	χίλια.

Διὰ νὰ γράψουν τοὺς ἀριθμοὺς μὲ τὰ Ρωμαϊκὰ αὐτὰ γράμματα παρεδέχοντο ὅτι :

**1ον.** Πολλὰ ὅμοια ψηφία, τὰ ὅποια ἔχουν γραφῇ τὸ ἕνα πλησίον τοῦ ἄλλου, θεωροῦνται ὅτι προστίθενται. Π. χ.

II	παριστάνει	ἕνα καὶ ἕνα, δηλ. 2
III	»	ἕνα καὶ ἕνα καὶ ἕνα, δηλ. 3
XX	»	δέκα καὶ δέκα, δηλ. 20
CCC	»	ἑκατὸν καὶ ἑκατὸν καὶ ἑκατὸν, δηλ. 300.

**2ον.** Κάθε ψηφίον, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται πρὸς τὰ δεξιὰ ἑνὸς ψηφίου μεγαλυτέρου του, θεωρεῖται ὅτι προστίθεται μὲ ἐκεῖνο. Π.χ.

VI	παριστάνει	πέντε και ένα, δηλ. 6
XV	»	δέκα και πέντε, δηλ. 15
CLX	»	έκατον και πενήτηντα και δέκα, δηλ. 160.

3ον. Κάθε ψηφίον, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἐνὸς μεγαλυτέρου ψηφίου, θεωρεῖται ὅτι ἀφαιρεῖται ἀπὸ ἐκείνου. Π. χ.

IV	παριστάνει	τὸν 4
XL	»	» 40
XC	»	» 90

4ον. Κάθε ἀριθμὸς, ἄνωθεν τοῦ ὁποῖου γράφεται μία (εὐθεῖα) γραμμὴ, παριστάνει χιλιάδας, δύο γραμμαὶ παριστάνει ἑκατομμύρια και τρεῖς γραμμαὶ δισεκατομμύρια. Π. χ.

ὁ ἀριθμὸς	<u>VIII</u>	παριστάνει	8 χιλιάδας
»	<u>XIX</u>	»	19 ἑκατομμύρια
»	<u>CX</u>	»	110 δισεκατομμύρια.

#### Ἄσκησεις

17) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς 36, 79, 289, 307, 5 994 μὲ Ἑλληνικοὺς και Ρωμαϊκοὺς χαρακτήρας.

18) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς 4θ', σοά', 34θ', „βω4ά' μὲ Ἀραβικὰ ψηφία.

† 19) Νὰ γράψετε τοὺς κατωτέρω ἀριθμοὺς μὲ Ἀραβικὰ ψηφία :

1. CC, DCLV, DCCXL, CMXII, MCXXXV.
2. MM, MCD, VDCCV, XCM LXI, LLXXXIII.
3. MMMCCCLXXX, XXII DCCXIV, VIIICM, LI.

→ 20) Νὰ γράψετε τοὺς κατωτέρω ἀριθμοὺς μὲ Ρωμαϊκὰ ψηφία:  
274, 749, 1 658, 4 375, 22 714, 1 890.

#### 4. ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΠΟΣΩΝ

† § 23. Ποσόν. Ἐνα πλήθος μῆλων δύναται νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰ ἢ ὀλίγα μῆλα. Ἐνα μῆκος, π.χ. τὸ μῆκος ἐνὸς ὑφάσματος, δύναται νὰ εἶναι μεγαλύτερον ἢ μικρότερον. Τὰ ἔξοδα τῆς ἡμέρας δύναται νὰ τὰ αὐξήσω ἢ νὰ τὰ ἐλαττώσω.

Κάθε πράγμα, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ αὐξηθῇ ἢ νὰ ἐλαττωθῇ, λέγεται ποσὸν ἢ μέγεθος.

Ἔστω τὰ μήλα, τὸ μήκος ἑνὸς ὑφάσματος, ἑνὸς δρόμου κ.λ.π. εἶναι ποσά. Διὰ τοῦτο ἐπεκράτησε νὰ λέγωμεν ὅτι ἔχομεν ἕνα ποσὸν χρημάτων, μίαν ποσότητα ἐλαίου κ.τ.λ.

+ § 24. Ὁμοειδῆ καὶ ἑτεροειδῆ ποσά. Δύο σωροὶ μῆλων εἶναι ποσὰ τοῦ αὐτοῦ εἴδους. Δι' αὐτὸ λέγονται ὁμοειδῆ ποσά.

Ἐνας σωρὸς μῆλων καὶ ἕνας σωρὸς βώλων εἶναι ποσὰ διαφόρου εἴδους. Δι' αὐτὸ λέγονται ἑτεροειδῆ ποσά. Ἔστω:

Δύο ποσὰ λέγονται ὁμοειδῆ, ἂν ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος πραγμάτων.

Δύο δὲ ποσὰ λέγονται ἑτεροειδῆ, ἂν ἀποτελοῦνται ἀπὸ διαφορα πρᾶγματα.

Οἱ συγκεκριμένοι ἀριθμοὶ, οἱ ὅποιοι παριστάνουν ὁμοειδῆ ποσά, λέγονται ὁμοειδεῖς ἀριθμοί.

Ἄλλοι δὲ παριστάνουν ἑτεροειδῆ ποσὰ λέγονται ἑτεροειδεῖς ἀριθμοί.

+ § 25. Συνεχῆ καὶ ἀσυνεχῆ ποσά. Ἐστω ὅτι ἔχομεν ἕνα τεμάχιον ὑφάσματος καὶ ἕνα σωρὸν μῆλων. Δυνάμεθα νὰ φαντασθῶμεν ὅτι τὸ ὑφάσμα ἀποτελεῖται ἀπὸ μέρη, τὰ ὁποῖα συνέχονται μεταξύ των καὶ ἀποτελοῦν ἓν σύνολον. Ἐνῶ τὰ μέρη τοῦ δευτέρου ποσοῦ, δηλαδὴ τὰ μήλα, εἶναι ἀνεξάρτητα τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Διὰ τοῦτο τὸ πρῶτον ποσὸν λέγεται συνεχές, τὸ δὲ δεύτερον λέγεται πλῆθος ἢ ἀσυνεχές ποσόν.

Ἐνας σωρὸς βώλων, ἕνα πλῆθος μαθητῶν κ.τ.λ. εἶναι ἀσυνεχῆ ποσά.

Τὰ μήκη, αἱ ἐπιφάνειαι, τὰ βάρη, ὁ χρόνος κ.τ.λ. εἶναι συνεχῆ ποσά. Ἔστω:

Ἄσυνεχῆ ποσὰ λέγονται ἐκεῖνα, τῶν ὁποίων τὰ μέρη εἶναι χωρισμένα· συνεχῆ δὲ ἐκεῖνα, τῶν ὁποίων τὰ μέρη συνέχονται καὶ ἀποτελοῦν ἓν ὅλον.

+ § 26. Μέτρησις ποσῶν. Εἰς τὴν § 1 εἶδομεν ὅτι, διὰ νὰ ὀρίσωμεν ἀπὸ πόσα μέρη ἀποτελεῖται ἕνα πλῆθος ὁμοίων πραγμάτων,

ἐκάμαμεν σύγκρισιν αὐτοῦ πρὸς ἓνα ἀπὸ τὰ πράγματα, τὰ ὅποια τὸ ἀποτελοῦν. Ἐκαλέσαμεν δὲ τοῦτο **μονάδα** καὶ τὸ ἐκ τῆς συγκρίσεως ἐξαγόμενον **ἀριθμὸν**.

Ἡ τοιαύτη σύγκρισις ἐνὸς ποσοῦ πρὸς ἓνα ἄλλο ὁμοειδὲς ποσόν, τὸ ὅποιον λαμβάνεται ὡς μονάς, λέγεται **μέτρησις** τοῦ ποσοῦ. †

Ἵστε διὰ νὰ γίνῃ μέτρησις ἐνὸς ποσοῦ, πρέπει νὰ ὑπάρχη ἡ ἀντίστοιχος **μονάς του**.

Εἶναι φανερόν ὅτι διὰ τὰ ἀσυνεχῆ ποσὰ ὑπάρχουσι τόσαι μονάδες, ὅσα εἶναι καὶ τὰ εἶδη τῶν ποσῶν αὐτῶν.

Διὰ νὰ μετρήσωμεν ὁμῶς ἓνα συνεχὲς ποσόν, π.χ. νὰ εὕρωμεν τὸ μῆκος ἐνὸς θρανίου, τὸ ὕψος μιᾶς αἰθούσης, τὸ βάρος ἐνὸς λίθου κ.τ.λ., πρέπει νὰ ὀρίσωμεν τὴν κατάλληλον μονάδα μετρήσεως τῶν ποσῶν αὐτῶν.

Περὶ τῶν μονάδων μετρήσεως τῶν ποσῶν αὐτῶν θὰ γίνῃ λεπτομερὴς ἐξέτασις εἰς ἰδιαιτερον κεφάλαιον.

Αἱ συνήθεις μονάδες μετρήσεως, τὰς ὁποίας χρησιμοποιοῦμεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἶναι :

1ον. Διὰ τὴν εὕρεσιν ἐνὸς μήκους χρησιμοποιοῦμεν, ὡς μονάδας: τὸ μέτρον, τὸ χιλιόμετρον ( 1 000 μέτρα ) κ.τ.λ.

2ον. Διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἐπιφανειῶν χρησιμοποιοῦμεν ὡς μονάδας: τὸ τετραγωνικὸν μέτρον, τὸ βασιλικὸν στρέμμα ( 1 000 τετραγωνικὰ μέτρα ).

3ον. Διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ βάρους τῶν διαφόρων σωμάτων χρησιμοποιοῦμεν ὡς μονάδας: τὸ χιλιόγραμμα, τὸν τόννον ( 1 000 χιλιόγραμμα ), κ.τ.λ.


4ον. Διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ χρόνου χρησιμοποιοῦμεν ὡς μονάδας: τὴν ὥραν, τὴν ἡμέραν, τὸ ἔτος κ.τ.λ. †

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'

### ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

#### 1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

§ 27. **Όρισμοί.** *Παράδειγμα 1ον.* "Εστω ότι ἔχομεν 25 μήλα εἰς ἓνα καλάθι καὶ ἄλλα 14 μήλα εἰς ἓνα δεύτερον καλάθι.



Σχ. 1.


ἔδωσαν ἔπειτα 8 βώλους καὶ τέ-  
λος 3 βώλους (σχ. 2).

"Εάν θέσωμεν ὅλα τὰ μήλα εἰς ἓνα τρίτον καλάθι, θὰ λέγωμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν μήλων, ποὺ εὐρίσκονται εἰς τὸ τρίτον καλάθι, εἶναι τὸ **ἄθροισμα** αὐτῶν.

"Αν ἀριθμήσωμεν ἓνα πρὸς ἓνα τὰ μήλα ποὺ περιέχει τὸ τρίτον καλάθι, θὰ εὐρωμεν 39 μήλα.

"Ο ἀριθμὸς 39 εἶναι τὸ **ἄθροισμα** τῶν ἀριθμῶν 25 καὶ 14.

*Παράδειγμα 2ον.* "Ο Παῦλος εἶχε κατ' ἀρχὰς 5 βώλους· τοῦ



Σχ. 2.

"Εάν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν πόσους βώλους ἔχει τὸ ὅλον, δηλαδὴ ἂν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὸ **ἄθροισμα τῶν βώλων**, τοὺς ὁποίους

έχει, πρέπει να ενώσωμεν με τους βώλους, τους όποιους είχε, τους βώλους, τους όποιους τοῦ ἔδωσαν τὴν πρώτην καὶ τὴν δευτέραν φοράν.

Ἡ πράξις αὐτή, διὰ τῆς όποιίας εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν, λέγεται **πρόσθεσις**. Ὡστε :

† Πρόσθεσις δοθέντων ἀριθμῶν εἶναι μία πράξις, διὰ τῆς όποιίας εὐρίσκομεν ἓνα νέον ἀριθμόν, ὁ όποιος περιέχει ὅλας τὰς μονάδας αὐτῶν καὶ μόνον αὐτάς. †

Οἱ διάφοροι ἀριθμοί, ποῦ προστίθενται, λέγονται **προσθετέοι ἢ ὄροι τοῦ ἄθροίσματος**.

Εἶναι φανερόν ὅτι, ὅταν οἱ προσθετέοι εἶναι συγκεκριμένοι, πρέπει νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς. Τὸ δὲ ἄθροισμα αὐτῶν θὰ εἶναι ὁμοειδὲς πρὸς αὐτούς.

† § 28. Σημεῖον προσθέσεως. Μεταξύ τῶν ἀριθμῶν, τοὺς όποιους πρόκειται νὰ προσθέσωμεν, θέτομεν τὸ σημεῖον +, τὸ όποιόν ἀπαγγέλλεται **σὺν ἢ καὶ ἢ πλέον**.

Οὕτω, διὰ νὰ δείξωμεν ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 5, γράφομεν :  $2+3+5$ .

Τὸ ἄθροισμα τῶν τριῶν αὐτῶν ἀριθμῶν εἶναι 10. Ἥτοι :

$$2+3+5 = 10.$$

Ἡ ἰσότης αὐτὴ ἀπαγγέλλεται :

**Δύο σὺν τρία σὺν πέντε ἴσον δέκα.**

Ἄν θέλωμεν νὰ νοοῦμεν ἓνα ἄθροισμα ὡς εὐρεθὲν, τὸ θέτομεν ἐντὸς παρενθέσεως. Οὕτω :

$$(5+3+2).$$

Ἄν δὲ θέλωμεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι εἰς αὐτὸ τὸ ἄθροισμα πρέπει νὰ προσθέσωμεν, π.χ. τὸν 8, γράφομεν :  $(5+3+2)+8$ .

Εἶναι δηλ. τὸ ἄθροισμα αὐτὸ ἴδιον μὲ τὸ ἄθροισμα  $10+8$ .

† § 29. Αἱ πρώται ιδιότητες τῶν ἴσων καὶ ἀνίσων ἀριθμῶν.

1. Ἐστω ἡ ἰσότης  $\alpha = 8$ .

Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὅσας μονάδας ἔχει ὁ 8, τόσας ἔχει καὶ ὁ  $\alpha$ . Εὐκόλως δὲ ἐννοοῦμεν ὅτι ὅσας μονάδας ἔχει ὁ  $8+3$ , τόσας θὰ ἔχη καὶ ὁ  $\alpha+3$ · θὰ εἶναι λοιπὸν

$$\alpha+3 = 8+3.$$

Ὅμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι καὶ  $\alpha+10 = 8+10$ . Ὡστε :

† "Αν εις ἴσους ἀριθμούς προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, εὐρίσκομεν ἴσα ἀθροίσματα.

Καὶ γενικῶς :

"Αν εἶναι  $\alpha = \beta$ , θὰ εἶναι καὶ  $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$

II. "Εστω ἡ ἀνισότης  $\alpha > \beta$ .

Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ  $\alpha$  ἔχει περισσοτέρας μονάδας ἀπὸ τὸν  $\beta$ . "Αλλὰ τότε καὶ ὁ  $\alpha + 4$  θὰ ἔχη περισσοτέρας μονάδας ἀπὸ τὸν  $\beta + 4$  δηλ. θὰ εἶναι :  $\alpha + 4 > \beta + 4$ . "Ωστε :

† "Αν εις δύο ἀνίσους ἀριθμούς προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, εὐρίσκομεν ὁμοίως ἄνισα ἀθροίσματα.

Καὶ γενικῶς :

"Αν εἶναι  $\alpha > \beta$ , θὰ εἶναι καὶ  $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$  ↓


## 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

† § 30. Ἰδιότης I. Παράδειγμα. "Εχομεν τρία καλάθια μὲ μῆλα (σχ. 3). Τὸ πρῶτον καλάθι περιέχει 25 μῆλα, τὸ δεύτερον 18 καὶ τὸ τρίτον 42.

"Εὰν ἀδειάσωμεν εἰς ἓνα κενὸν κιβώτιον τὰ μῆλα, τὰ ὁποῖα περιέχουν τὰ καλάθια, κατὰ τὴν σειρὰν : 25 μῆλα, 18 μῆλα, 42 μῆλα, τότε ἐντὸς τοῦ κιβωτίου θὰ ὑπάρχουν :

25 μῆλα + 18 μῆλα + 42 μῆλα = 85 μῆλα.

Εἶναι ὁμῶς φανερὸν ὅτι ἐντὸς τοῦ κιβωτίου θὰ εὐρίσκωνται πάλιν 85 μῆλα, ἂν ἀδειάσωμεν αὐτὰ κατὰ τὴν σειρὰν 18 μῆλα, 42 μῆλα, 25 μῆλα. Εἶναι δηλ. πάλι :



Σχ. 3.

$$18 \text{ μήλα} + 42 \text{ μήλα} + 25 \text{ μήλα} = 85 \text{ μήλα}$$

Θά είναι λοιπόν:  $25 + 18 + 42 = 18 + 42 + 25$ .

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

**Τὸ ἄθροισμα δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, καθ' οἷανδήποτε τάξιν καὶ ἂν προσθέσωμεν αὐτούς.**

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θά εἶναι γενικῶς:

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = \gamma + \alpha + \delta + \beta = \gamma + \delta + \beta + \alpha$$

Ἡ ιδιότης αὐτὴ λέγεται **ιδιότης τῆς ἀντιμεταθέσεως**.

**§ 31. Ἰδιότης II.** Ἄν εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα θέσωμεν κατ' ἀρχῆς τὰ 18 μήλα τοῦ 2ου καλαθίου εἰς τὸ τρίτον, τότε τὸ τρίτον θά ἔχη (18+42) μήλα. Ἐὰν τώρα ἀδειάσωμεν τὰ μήλα τοῦ καλαθίου αὐτοῦ καὶ τοῦ πρώτου εἰς τὸ κιβώτιον, τὸ κιβώτιον θά ἔχη πάλιν 85 μήλα. Ἦτοι:

$$25 \text{ μήλα} + (18 + 42) \text{ μήλα} = 85 \text{ μήλα.}$$

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ

$$25 \text{ μήλα} + 18 \text{ μήλα} + 42 \text{ μήλα} = 85 \text{ μήλα.}$$

θά εἶναι:  $25 + 18 + 42 = 25 + (18 + 42)$ .

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

**Τὸ ἄθροισμα δοθέντων ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἂν μερικοὶ προσθετοὶ τοῦ ἀντικατασταθοῦν μὲ τὸ ἄθροισμὰ των.**

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θά εἶναι γενικῶς:

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + (\beta + \gamma) + \delta$$

Ἡ ιδιότης αὐτὴ λέγεται **συνθετικὴ**.

**§ 32. Ἰδιότης III.** Ἐμάθομεν προηγουμένως ὅτι:

$$25 + 18 + 42 = 25 + (18 + 42).$$

Ἄν γράψωμεν τὸ δεύτερον μέλος τῆς ἰσότητος αὐτῆς πρώτον καὶ τὸ πρῶτον δεύτερον, θά εἶναι:

$$25 + (18 + 42) = 25 + 18 + 42.$$

Ἐξ αὐτῶν συνάγομεν ὅτι:

Ἄν εἰς ἓνα ἄθροισμα ἀντικαταστήσωμεν προσθετόν τινὰ μὲ ἄλλους, οἱ ὅποιοι ἔχουν αὐτὸν ἄθροισμα, τὸ ἀρχικὸν ἄθροισμα δὲν μεταβάλλεται.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$\alpha + (\beta + \gamma) + \delta = \alpha + \beta + \gamma + \delta$$

Ἡ ιδιότης αὕτῃ λέγεται ἀναλυτικὴ.

§ 33. Πῶς προσθέτομεν ἀριθμὸν εἰς ἄθροισμα. *Πρόβλημα.* Ἡ πρώτη τάξις ἐνὸς σχολείου εἶχεν 65 μαθητὰς, ἡ δευτέρα 52 καὶ ἡ τρίτη 48. Εἰς τὴν δευτέραν τάξιν ἐνεγράφησαν 10 μαθηταί. Νὰ εὔρεθῇ τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν τῶν τριῶν αὐτῶν τάξεων.

*Λύσις.* Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ πλῆθος αὐτό, πρέπει εἰς τὸ ἄθροισμα  $65 + 52 + 48$  τῶν πρώτων μαθητῶν νὰ προσθέσωμεν τοὺς 10 νέους μαθητὰς. Εἶναι λοιπὸν οἱ μαθηταί :

$$(65 + 52 + 48) + 10 \text{ ἢ } 165 + 10 \text{ ἢ } 175.$$

*Ἄλλη λύσις.* Ἐπειδὴ οἱ νέοι 10 μαθηταί ἐνεγράφησαν εἰς τὴν β' τάξιν, αὕτη θὰ ἔχη

$$(52 + 10) \text{ μαθητὰς ἢ } 62 \text{ μαθητὰς.}$$

Αἱ δὲ τρεῖς τάξεις θὰ ἔχουν

$$65 + (52 + 10) + 48 \text{ ἢ } 65 + 62 + 48 \text{ ἢ } 175 \text{ μαθητὰς.}$$

Ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν

$$(65 + 52 + 48) + 10 = 65 + 62 + 48$$

$$\text{ἢ } (65 + 52 + 48) + 10 = 65 + (52 + 10) + 48.$$

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν τελευταίαν ἰσότητα συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα :

IV. Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἓνα ἀριθμὸν εἰς ἄθροισμα ἀριθμῶν, προσθέτομεν τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν εἰς ἓνα ἀπὸ τοὺς προσθετέους τοῦ ἄθροίσματος, τοὺς δὲ ἄλλους ἀφήνομεν ὅπως εἶναι.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$(\alpha + \beta + \gamma) + \delta = \alpha + (\beta + \delta) + \gamma$$

§ 34. Πῶς προσθέτομεν ἄθροισματα. *Πρόβλημα.* Ὁ Γεώργιος ἐξώδευσε τὴν Δευτέραν 8 δρχ. διὰ τετράδια, 4 δρχ. διὰ μολύβια καὶ 25 δρχ. διὰ βιβλία. Τὴν Τρίτην 6 δρχ. διὰ μελάνην καὶ 3 δρχ. διὰ πέννας. Πόσα χρήματα ἐξώδευσε τὸ ὅλον κατὰ τὰς δύο αὐτὰς ἡμέρας;

Λύσις. Τὴν Δευτέραν ἐξώδευσεν :

$$8 \text{ δρχ.} + 4 \text{ δρχ.} + 25 \text{ δρχ.} = 37 \text{ δρχ.}$$

Τὴν Τρίτην ἐξώδευσε  $6 + 3 = 9$  δρχ. Ἐπομένως κατὰ τὰς δύο ἡμέρας ἐξώδευσε τὸ ὄλον :

$$(8 + 4 + 25) \text{ δρχ.} + (6 + 3) \text{ δρχ.}$$

$$\text{ἢ} \quad 37 \text{ δρχ.} + 9 \text{ δρχ.} \text{ ἢ } 46 \text{ δρχ.}$$

\*Ἄλλη λύσις. Ἀντὶ νὰ ὑπολογίσωμεν τὰ ἔξοδα χωριστὰ τὴν Δευτέραν καὶ χωριστὰ τὴν Τρίτην, δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν αὐτὰ συνολικῶς κατὰ τὰς δύο ἡμέρας.

Ἐξώδευσε λοιπόν :

$$8 \text{ δρχ.} + 4 \text{ δρχ.} + 25 \text{ δρχ.} + 6 \text{ δρχ.} + 3 \text{ δρχ.} \text{ ἢ } 46 \text{ δρχ.}$$

Ἐπειδὴ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον 46, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν :

$$(8 + 4 + 25) + (6 + 3) = 8 + 4 + 25 + 6 + 3.$$

Συμπέρασμα. Ἀπὸ τὴν ἰσότητα αὐτὴν συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα :

V. Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἄθροισματα, σχηματίζομεν ἓνα ἄθροισμα, τὸ ὁποῖον νὰ περιέχῃ ὅλους τοὺς προσθετέους τῶν δοθέντων ἄθροισμάτων καὶ μόνον αὐτούς.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$(\alpha + \beta + \gamma) + (\delta + \epsilon) = \alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon$$

Περίληψις τῶν ἰδιοτήτων τῆς προσθέσεως

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | $\alpha + \beta + \gamma + \delta$                | $= \beta + \alpha + \delta + \gamma$            |
| 2. | $\alpha + \beta + \gamma + \delta$                | $= \alpha + (\beta + \delta) + \gamma$          |
| 3. | $\alpha + (\beta + \gamma) + \delta$              | $= \alpha + \beta + \gamma + \delta$            |
| 4. | $(\alpha + \beta + \gamma) + \delta$              | $= \alpha + (\beta + \delta) + \gamma$          |
| 5. | $(\alpha + \beta + \gamma) + (\delta + \epsilon)$ | $= \alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon$ |

### 3. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

§ 35. Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τῆς προσθέσεως δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα πολλῶν ἀριθμῶν, ἂν προσθέσωμεν διαδοχικῶς εἰς τὸν ἓνα ἐξ αὐτῶν τὰς μονάδας, τὰς ὁποίας ἔχουν οἱ ἄλλοι ἀριθμοί.

Τοῦτο εἶναι πρακτικῶς εὐκόλον, ὅταν οἱ προστιθέμενοι ἀριθμοὶ εἶναι μικροί· ἀλλ' ὅταν οἱ προστιθέμενοι ἀριθμοὶ εἶναι μεγάλοι, ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς εὐρέσεως τοῦ ἀθροίσματός των κατανατᾶ ἀνιαρὸς καὶ κοπιώδης. Διὰ τοῦτο χρησιμοποιοῦμεν μίαν σύντομον μέθοδον, τὴν ὁποίαν θὰ ἀναφέρωμεν κατωτέρω.

**§ 36.** \***Ἀθροισμα δύο μονοψηφίων ἀριθμῶν.** Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἀθροισμα  $5+3$ .

Προσθέτομεν εἰς τὸν 5 διαδοχικῶς τὰς τρεῖς μονάδας τοῦ ἄλλου καὶ λέγομεν 5 καὶ 1 6· 6 καὶ 1 7· 7 καὶ 1 εἶναι 8. Ὁ 8 εἶναι τὸ ζητούμενον ἀθροισμα.

Εἰς τὴν πράξιν ὁμοῦ λέγομεν ἀμέσως : 5 καὶ 3 8.

Εἶναι ἀνάγκη λοιπὸν νὰ γνωρίζωμεν ἀπὸ μνήμης τὸ ἀθροισμα ὄλων τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν ἀνὰ δύο.

Τὰ ἀθροίσματα δύο οἰωνδῆποτε μονοψηφίων ἀριθμῶν περιέχονται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα :

Πίναξ προσθέσεως δύο μονοψηφίων ἀριθμῶν

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Τὸν πίνακα αὐτὸν σχηματίζομεν ὡς ἑξῆς :

Εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν γράφομεν κατὰ σειράν τοὺς ἀριθμοὺς 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ὑποκάτω ἐκάστου γράφομεν τὸ ἄθροισμα αὐτοῦ καὶ τοῦ 1. Ὑποκάτω ἐκάστου ἀριθμοῦ τῆς δευτέρας σειράς γράφομεν τὸ ἄθροισμα αὐτοῦ καὶ τοῦ 1. Ὑποκάτω ἐκάστου ἀριθμοῦ τῆς τρίτης σειράς γράφομεν τὸ ἄθροισμα αὐτοῦ καὶ τοῦ 1 κ.ο.κ., μέχρις ὅτου γράψωμεν 10 σειρὰς.

Τὸ ἄθροισμα δύο μονοψηφίων ἀριθμῶν, π.χ.  $8 + 9$  εὐρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν δύο γραμμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ἀρχίζει ἀπὸ τὸν 8 καὶ ἡ ἄλλη ἀπὸ τὸν 9.

§ 37. Ἄθροισμα ἑνὸς πολυψηφίου ἀριθμοῦ καὶ ἑνὸς μονοψηφίου. 1ον. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα  $863 + 5$ . Ἐπειδὴ ὁ  $863 = 860 + 3$  δυνάμεθα (§ 33) νὰ προσθίσωμεν τὸν 5 εἰς τὸν 3. Προσθέτομεν λοιπὸν τὸν 5 εἰς τὸν 3 καὶ λέγομεν 5 καὶ 3 8. Ἄρα θὰ εἶναι 863 καὶ 5 ἴσον μὲ 868.

2ον. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα  $487 + 6$ .

Διατάσσομεν τὴν πράξιν ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{r} 487 \\ \quad 6 \\ \hline 493 \end{array}$$

καὶ λέγομεν 6 καὶ 7 13. Ἐπειδὴ τὸ ἄθροισμα 13 ὑπερβαίνει τὸ 9 γράφομεν 3 καὶ κρατοῦμεν 1 (μῖαν δεκάδα)· 1 τὸ κρατούμενον καὶ 8 9. Ἐπειτα καταβιβάζομεν τὸ ψηφίον 4 τῶν ἑκατοντάδων. Ἦτοι τὸ ζητούμενον ἄθροισμα  $487 + 6$  εἶναι 493.

Σημείωσις. Πρακτικῶς πρέπει νὰ συνθησίωμεν νὰ κάμνωμεν τὴν πρόσθεσιν ἀπὸ μνήμης καὶ νὰ εὕρισκωμεν ἀμέσως τὸ ἐξαγόμενον. Δηλαδὴ νὰ λέγωμεν 863 καὶ 5 868, 487 καὶ 6 493.

§ 38. Ἄθροισμα πολλῶν οἰωνδήποτε ἀριθμῶν. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα  $2568 + 323 + 54$ .

Διατάσσομεν τὴν πράξιν, ὡς γνωρίζομεν, οὕτως :

$$\begin{array}{r} 2568 \\ \quad 323 \\ \quad \quad 54 \\ \hline 2945 \end{array}$$

Εὕρισκομεν πρῶτον τὸ ἄθροισμα τῶν μονάδων λέγομεν 4

καὶ 3 7 καὶ 8 15· γράφομεν 5 καὶ κρατοῦμεν 1 (μὴν δεκάδα). Ἐπειτα λέγομεν 1 τὸ κρατούμενον καὶ 5 6 καὶ 2 8 καὶ 6 14· γράφομεν 4 καὶ κρατοῦμεν 1 (ἐκατοντάδα). Ἐπειτα λέγομεν 1 τὸ κρατούμενον καὶ 3 4 καὶ 5 9· γράφομεν τὸ 9 εἰς τὴν στήλην τῶν ἐκατοντάδων καὶ τέλος καταβιβάζομεν τὸ ψηφίον 2 τῶν χιλιάδων. Τὸ ζητούμενον λοιπὸν ἄθροισμα εἶναι 2 945.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν γνωστὸν κανόνα τῆς προσθέσεως.

**§ 39. Ἐξήγησις τοῦ κανόνος προσθέσεως.** Κατὰ τὴν ἀναλυτικὴν ιδιότητα (§ 32) δυνάμεθα νὰ ἀναλύσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς 2 568, 323, 54 εἰς τὰς μονάδας τῶν διαφόρων τάξεων καὶ ἔπειτα, κατὰ τὴν συνθετικὴν ιδιότητα, νὰ προσθέσωμεν μεταξύ των τὰς ἐπλάς μονάδας, τὰς δεκάδας, κ.ο.κ. καὶ τέλος νὰ ἐνώσωμεν τὰ προκύπτοντα μερικὰ ἄθροισματα.

Οὕτω, διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα  $2\ 568 + 323 + 54$ , γράφομεν :

$2\ 568 = 2$  χιλ. +  $5$  ἑκατοντ. +  $6$  δεκάδ. +  $8$  μονάδ.

$323 = 0$  χιλ. +  $3$  ἑκατοντ. +  $2$  δεκάδ. +  $3$  μονάδ.

$54 = 0$  χιλ. +  $0$  ἑκατοντ. +  $5$  δεκάδ. +  $4$  μονάδ.

Προσθέτομεν ἔπειτα τὰς μονάδας ἐκάστης τάξεως καὶ εὐρίσκομεν:

$2$  χιλ. +  $8$  ἑκατοντ. +  $13$  δεκάδ. +  $15$  μονάδ.

ἢ  $2$  χιλ. +  $8$  ἑκατοντ. +  $14$  δεκάδ. +  $5$  μονάδ.

ἢ  $2$  χιλ. +  $9$  ἑκατοντ. +  $4$  δεκάδ. +  $5$  μονάδ.

Τὸ ζητούμενον ἄθροισμα εἶναι ὁ ἀριθμὸς 2 945.

**§ 40. Δοκιμὴ τῆς προσθέσεως.** Ὅταν λέγωμεν ὅτι θὰ κάμωμεν δοκιμὴν μιᾶς πράξεως, σημαίνει ὅτι θὰ κάμωμεν μίαν ἄλλην πρᾶξιν, διὰ νὰ ἴδωμεν, ἂν τὸ ἐξαγόμενον τῆς πρώτης εἶναι ἀκριβές.

Διὰ νὰ κάμωμεν τὴν δοκιμὴν μιᾶς προσθέσεως, στηριζόμεθα εἰς τὴν ιδιότητα τῆς ἀντιμεταθέσεως (§ 30) καὶ ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς:

Ἐπαναλαμβάνομεν τὴν πρόσθεσιν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω, ἐὰν προηγουμένως ἢ πρόσθεσις ἐγένεν ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω ἢ ἀλλάσσομεν τὴν θέσιν τῶν προσθετέων μεταξύ των καὶ ἐπαναλαμβάνομεν τὴν πρόσθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ δύο προσθέσεις γίνων χωρὶς λάθος, πρέπει νὰ εὐρωμεν τὸ αὐτὸ ἄθροισμα.

Ἡ δοκιμὴ τῆς προσθέσεως, ὅταν οἱ προσθετέοι εἶναι πολλοί, δύναται νὰ γίνῃ καὶ ὡς ἑξῆς:

Χωρίζομεν τοὺς προσθε-	2 348		
τέους εἰς ομάδας καὶ εὐρίσκο-	7 753		
μεν τὸ ἄθροισμα τῶν προσ-	1 261		
θετέων ἐκάστης ομάδος.	57		
	2 475		13 894
Προσθέτομεν ἔπειτα τὰ με-	1 749		
ρικὰ αὐτὰ ἄθροίσματα καί,	105		
ἂν αἱ πράξεις αὐταὶ γίνουν	3 078		
χωρὶς λάθος, πρέπει νὰ εὐ-	415		
ρωμεν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον.	19 241		5 347
	19 241		19 241

### Ἀσκήσεις

21) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ κάτωθι ἄθροίσματα κατὰ δύο τρόπους (§34).

1.  $(5+7+8)+(9+15)$     3.  $(3+19)+(5+7+21)$

2.  $(12+9+6)+(24+32)$     4.  $(12+8)+(15+4+9)$

22) Νὰ ἐκτελεσθοῦν γραπτῶς αἱ κάτωθι προσθέσεις, χωρὶς νὰ θεθοῦν οἱ ἀριθμοὶ ὁ ἓνας κάτωθι τοῦ ἄλλου:

1.  $4\ 534 + 45\ 678 + 753 + 9\ 578 + 87 + 15\ 623$

2.  $75\ 428 + 227\ 654 + 39\ 642 + 847 + 17\ 049$

23) Νὰ συμπληρωθῇ ὁ κάτωθι πίναξ :

Εἰσπράξεις πραγματοποιηθεῖσαι κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς ἑβδομάδος ὑπὸ τῶν 3 ταμείων ἐνὸς καταστήματος

	1ον ταμείον	2ον ταμείον	3ον ταμείον	Σύνολον
Δευτέρα.....	953 200	1 645 000	3 084 700	.....
Τρίτη.....	875 640	2 972 700	2 854 740	.....
Τετάρτη.....	785 945	1 248 500	2 593 780	.....
Πέμπτη.....	693 200	2 449 675	3 000 900	.....
Παρασκευή....	800 575	1 875 635	2 358 480	.....
Σάββατον.....	987 300	2 148 750	1 975 000	.....
Σύνολον.....				

#### 4. ΣΥΝΤΟΜΙΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ

§ 41. Συντομιαί εις τὴν ἐκτέλεσιν τῆς προσθέσεως. Στηριζόμενοι εἰς τὰς ιδιότητας τῆς προσθέσεως δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν ἀπὸ μνήμης τὸ ἄθροισμα δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν.

Ἡ ἀπὸ μνήμης εὐρεσις τοῦ ἄθροίσματος δοθέντων ἀριθμῶν συντομεύει κατὰ πολὺ τὰς πράξεις. Διὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐξασηθῶμεν πολὺ εἰς τὸν ἀπὸ μνήμης λογισμόν.

Διὰ νὰ ἐκτελοῦμεν συντόμως καὶ ἀπὸ μνήμης τὴν πρόσθεσιν ἀριθμῶν πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν τὰ κάτωθι :

**I. Πρόσθεσις δύο διψηφίων ἀριθμῶν.** 1ον. Ὄταν οἱ δύο ἀριθμοὶ λήγουν εἰς 0, προσθέτομεν τὰς δεκάδας των καὶ εἰς τὸ ἐξαγόμενον παραθέτομεν ἓνα 0.

Π.χ. διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα  $50 + 40$ , λέγομεν : 5 καὶ 4 9· 90. Ὁμοίως ἐὰν ἔχωμεν  $60 + 90$ , λέγομεν : 6 καὶ 9 15· 150.

2ον. Ὄταν ὁ ἓνας μόνον ἐκ τῶν ἀριθμῶν λήγη εἰς 0, προσθέτομεν τὰς δεκάδας του εἰς τὰς δεκάδας τοῦ ἄλλου καὶ παραθέτομεν εἰς τὸ ἐξαγόμενον τὰς μονάδας.

Π.χ. ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα  $65 + 50$ , λέγομεν : 6 καὶ 5 11 δεκάδες καὶ 5 ἀπλάϊ μονάδες, 115. Συνήθως δὲ λέγομεν : 6 καὶ 5 11· 115.

3ον. Ὄταν οἱ δύο ἀριθμοὶ δὲν λήγουν εἰς 0, προσθέτομεν εἰς τὸν πρῶτον ἀριθμὸν κατ' ἀρχὰς τὰς δεκάδας καὶ ἔπειτα τὰς μονάδας τοῦ ἄλλου.

Π.χ. διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα  $48 + 36$ , λέγομεν : 48 καὶ 30 78 καὶ 6 84. Ὁμοίως διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα  $57 + 68$ , λέγομεν : 57 καὶ 60 117 καὶ 8 125.

**Παρατήρησις.** Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων ἀπὸ μνήμης πρέπει νὰ συνηθίσωμεν νὰ λέγωμεν ὅσον τὸ δυνατὸν ὀλιγωτέρας λέξεις. Οὕτως εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα ἀρκούμεθα εἰς τὸ νὰ ἀπαγγέλλωμεν νοερῶς τὰ διαδοχικὰ ἐξαγόμενα 57, 117, 125.

**II. Πρόσθεσις δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν.** Προσθέτομεν εἰς τὸν πρῶτον ἀριθμὸν τὰς μονάδας τῶν διαφόρων τάξεων τοῦ δευτέρου ἀριθμοῦ, ἀρχόμενοι ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς ἀνωτέρας τάξεως.

Π.χ. ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα  $240 + 54$ , λέγομεν :

240 και 50 290 και 4· 294. Ὁμοίως, ἐὰν ἔχωμεν  $2\ 374 + 568$ , λέγομεν :  $2\ 374$  και  $500 \cdot 2\ 874$  και  $60 \cdot 2\ 934$  και  $8 \cdot 2\ 942$ .

**III. Πρόσθεσις ὁσωνδήποτε ἀριθμῶν.** Προσθέτομεν τοὺς δύο πρῶτους ἀριθμοὺς εἰς τὸ ἐξαγόμενον προσθέτομεν τὸν τρίτον εἰς τὸ νέον ἐξαγόμενον προσθέτομεν τὸν τέταρτον κ.ο.κ., ἐφαρμόζοντες τὰς προηγουμένης μεθόδους συντομίας.

Π.χ. ἐὰν θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα  $156 + 45 + 30$ , λέγομεν :  $156$  και  $40 \cdot 196$  και  $5 \cdot 201$  και  $30 \cdot 231$ .

### Ἀσκήσεις

24) Νὰ εὐρεθοῦν ἀπὸ μνήμης τὰ κάτωθι ἄθροίσματα :

1.	$60 + 30$	$80 + 50$	$70 + 60$
2.	$59 + 70$	$40 + 74$	$90 + 73$
3.	$63 + 45$	$78 + 94$	$85 + 36$
4.	$645 + 93$	$368 + 94$	$543 + 96$
5.	$252 + 159$	$272 + 189$	$139 + 142$
6.	$4\ 652 + 325$	$3\ 893 + 247$	$5\ 654 + 947$

### Προβλήματα προσθέσεως

Α' Ὁμάς. 25) Οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες ἤρχισαν τὸ ἔτος 77 π.Χ. Πόσα ἔτη ἐπέρασαν μέχρι σήμερον ;

26) Ἡ ἐν Μαραθῶνι μάχη ἐγινε τὸ ἔτος 490 π.Χ. Νὰ εὕρητε πόσα ἔτη ἐπέρασαν μέχρι σήμερον.

27) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασεν ὕφασμα ἀντὶ  $8\ 365$  δραχμῶν. Πόσον πρέπει νὰ τὸ πωλήσῃ, ἂν θέλῃ νὰ κερδίσῃ  $2\ 675$  δραχμὰς ;

28) Μία κόρη ἠγόρασε δύο τεμάχια κορδέλλας. Διὰ τὸ πρῶτον ἐπλήρωσεν  $276$  δραχ. και διὰ τὸ δεῦτερον  $153$  δραχ. Πόσα ἐπλήρωσεν ἐν ὅλῳ ;

29) Ὄταν ἐγεννήθη ἓνα παιδίον, ἡ μήτηρ του ἦτο  $27$  ἐτῶν, ὁ δὲ πατήρ του ἦτο  $9$  ἔτη μεγαλύτερος τῆς μητρός του. Τώρα τὸ παιδίον εἶναι  $17$  ἐτῶν. Πόσων ἐτῶν εἶναι καθένας ἀπὸ τοὺς γονεῖς του ;

Β' Ὁμάς. 30) Παντοπώλης τις ἠγόρασε δύο κιβώτια σάπωνος· τὸ πρῶτον περιεῖχε  $36$  κιλά σάπωνος και ἐκόστιζε  $261$  δραχμ. τὸ δὲ δεῦτερον περιεῖχε  $49$  κιλά και ἐκόστιζε  $407$  δρχ. Πόσα κιλά σάπωνος ἠγόρασε και πόσον ἐπλήρωσεν ;

31 ) 'Υπάλληλος παντοπωλείου ἠγόρασε μὲ τὰς οἰκονομίας του μίαν ἐνδυμασίαν ἀντὶ 1 790 δρχ., ἕνα ζεῦγος ὑποδημάτων ἀντὶ 225 δρχ. καὶ ἕνα ζεῦγος καλτσῶν ἀντὶ 25 δρχ. \*Εμειναν δὲ εἰς αὐτὸν 463 δρχ. Πόσας δραχμὰς εἶχεν ἐξοικονομήσει ἐν ὄλῳ ;

Γ' Ὁ μ ἄ ς. 32 ) Χωρικός τις ἠγόρασε δύο χωράφια· διὰ τὸ ἕνα ἔδωσεν 6 738 δρχ. καὶ διὰ τὸ ἄλλο 2 376 δρχ. περισσοτέρας τοῦ πρώτου. Πόσας δραχμὰς ἔδωσε καὶ διὰ τὰ δύο χωράφια ;

33 ) \*Ἐνα ποσὸν ἀλεύρου ἐμοιράσθη μεταξὺ τῶν κατοίκων τριῶν χωρίων ὡς ἐξῆς : Τὸ α' ἔλαβε 3 725 κιλά, τὸ β' 387 κιλά ἐπὶ πλεόν τοῦ α' καὶ τὸ γ' 564 κιλά ἐπὶ πλεόν τοῦ β'. Πόσον ἦτο τὸ μοιρασθὲν ποσὸν ἀλεύρου ;

34 ) \*Ἐνα χρηματικὸν ποσὸν ἐμοιράσθη μεταξὺ τριῶν προσώπων. Τὸ πρῶτον ἔλαβε 427 650 δραχμὰς, τὸ δεύτερον 36 750 δραχμὰς περισσοτέρας τοῦ πρώτου καὶ τὸ τρίτον 52 480 δραχμὰς περισσοτέρας τοῦ δευτέρου. Πόσον ἦτο τὸ ποσόν ;

35 ) Τέσσαρες ἀριθμοὶ ἔχουν γραφῆ εἰς σειρὰν. Ὁ πρῶτος ἐξ αὐτῶν, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ 3 059, εἶναι μικρότερος ἀπὸ τὸν δεύτερον κατὰ 908, ὁ δεύτερος εἶναι μικρότερος ἀπὸ τὸν τρίτον πάλιν κατὰ 908 κ.ο.κ. Δηλαδή καθένας ἀπ' αὐτοὺς εἶναι μικρότερος ἀπὸ τὸν ἐπόμενόν του κατὰ 908. Πόσον εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν τεσσάρων αὐτῶν ἀριθμῶν ;

Δ' Ὁ μ ἄ ς. 36 ) Νὰ εὔρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $42\,729 + \alpha$ , ὅταν εἶναι : 1ον  $\alpha = 9\,073$ , 2ον  $\alpha = 38\,009$ .

37 ) Νὰ εὔρεθῆ τὸ ἄθροισμα  $\alpha + \beta + \gamma$ , ὅταν εἶναι  $\alpha = 3\,078$ ,  $\beta = 4\,069$  καὶ  $\gamma = 39\,017$ .

+ 38 ) Τὸ Α' Γυμνάσιον μιᾶς πόλεως εἶχε τὸ παρελθὸν σχολικὸν ἔτος 760 μαθητάς, τὸ δὲ Β' εἶχε  $\chi$  περισσοτέρους μαθητάς. Νὰ παραστήσητε τὸν ἀριθμὸν τῶν μαθητῶν τοῦ Β' Γυμνασίου. \*Ἐπειτα δὲ νὰ εὔρητε τὸν ἀριθμὸν τοῦτον, ἂν  $\chi = 25$ .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

### ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

#### 1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 42. Όρισμοί. Παράδειγμα. 'Ο Θεόδωρος είχε 15 βώλους και έδωσεν εις ένα συμμαθητήν του 4 βώλους. Θέλομεν νά μάθωμεν πόσοι βώλοι τοῦ ἔμειναν.

Πρὸς τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς : Ἐάν ὁ Θεόδωρος ἔδιδεν ἀπὸ ἑνα βῶλον, θὰ ἔμενον εἰς αὐτὸν κατὰ σειρὰν πρῶτον 14 βῶλοι, ἔπειτα 13, ἔπειτα 12 καὶ τέλος 11 βῶλοι.

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ Θεόδωρος ἔδωσε τόσας φορὰς ἀπὸ ἑνα βῶλον, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ 4, δηλ. ἠλάττωσε τὸν 15 κατὰ 4 μονάδας.

Ἡ πράξις αὕτη λέγεται ἀφαίρεσις. Ὡστε :

Ἐφαίρεσις εἶναι ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας ἐλαττώνομεν δοθέντα ἀριθμὸν κατὰ τόσας μονάδας, ὅσας ἔχει ἄλλος δοθεὶς ἀριθμὸς.

Ὁ ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον ἐλαττώνομεν, λέγεται μειωτέος, ὁ δὲ ἀριθμὸς, ποῦ δεικνύει κατὰ πόσας μονάδας πρέπει νὰ ἐλαττωθῆ ὁ μειωτέος, λέγεται ἀφαιρετέος.

Τὸ ἐξαγόμενον τῆς ἀφαιρέσεως λέγεται ὑπόλοιπον ἢ διαφορά.

Εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα μειωτέος εἶναι ὁ 15, ἀφαιρετέος ὁ 4 καὶ ὑπόλοιπον ὁ 11.

Ὁ μειωτέος καὶ ἀφαιρετέος λέγονται μαζὶ ὄροι τῆς διαφορᾶς.

§ 43. Γενικὸς ὀρισμὸς τῆς ἀφαιρέσεως. Ἐάν ὁ συμμαθητὴς τοῦ Θεοδώρου ἐπιστρέψῃ εἰς αὐτὸν τοὺς 4 βώλους, ποῦ ἔλαβε, τότε ὁ Θεόδωρος θὰ ἔχη πάλιν 15 βώλους· ἦτοι :  $11 + 4 = 15$ .

Ἐκ τούτου παρατηροῦμεν ὅτι ὁ μειωτέος 15 εἶναι ἄθροισμα τοῦ ἀφαιρετέου 4 καὶ τῆς διαφορᾶς 11.

Ἐπομένως δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν τὴν ἀφαίρεσιν καὶ ὡς ἑξῆς :

Ἐφαίρεσις εἶναι ἡ πράξις, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς δίδονται δύο

ἀριθμοί, ἤτοι ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος, καὶ εὐρίσκεται τρίτος, ὁ ὁποῖος προστιθέμενος εἰς τὸν ἀφαιρετέον δίδει τὸν μειωτέον.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι ἡ ἀφαίρεσις εἶναι πρᾶξις ἀντίστροφος τῆς προσθέσεως.

§ 44. Σημεῖον ἀφαιρέσεως. Διὰ νὰ σημειώσωμεν τὴν διαφορὰν δύο ἀριθμῶν, θέτομεν μεταξὺ τοῦ μειωτέου καὶ τοῦ ἀφαιρετέου τὸ σημεῖον  $-$ , τὸ ὁποῖον ἀπαγγέλλεται **πλὴν ἢ μείον ἢ ἀπό**.

Οὕτω  $15 - 4$  σημαίνει νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν 4 ἀπὸ τὸν 15 καὶ ἀπαγγέλλεται: 15 πλὴν 4 ἢ 15 μείον 4 ἢ 4 ἀπὸ 15.

Διὰ νὰ δηλώσωμεν ὅτι ἡ διαφορὰ  $15 - 4$  εἶναι 11, γράφομεν  
 $15 - 4 = 11$ .

καὶ ἀπαγγέλλομεν: 15 πλὴν 4 ἴσον 11.

Ὅταν ὁ ἓνας ἢ καὶ οἱ δύο ὅροι μιᾶς διαφορᾶς παρίστανται διὰ γραμμάτων, δὲν δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν πρᾶξιν, διότι δὲν γνωρίζομεν ποίους ἀριθμοὺς παριστάνουν τὰ γράμματα αὐτά. Δυνάμεθα ὅμως νὰ σημειώσωμεν τὴν πρᾶξιν.

Οὕτως  $\alpha - \beta$  **παριστάνει** τὴν διαφορὰν τοῦ  $\beta$  ἀπὸ τοῦ  $\alpha$ . Ἐπίσης  $\chi - 8$  **σημαίνει** ὅτι πρέπει ἀπὸ τὸν  $\chi$  νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν 8.

Εἰς τὰ παραδείγματα αὐτὰ παραδεχόμεθα ὅτι ὁ μειωτέος εἶναι μεγαλύτερος τοῦ ἀφαιρετέου ἢ ἴσος πρὸς αὐτόν· διότι, ἐὰν ὁ μειωτέος εἶναι μικρότερος τοῦ ἀφαιρετέου, ὅπως π.χ.  $5 - 8$ , ἡ ἀφαίρεσις εἶναι ἀδύνατος.

Ἄν ὑποθέσωμεν ὅτι ἡ διαφορὰ τοῦ  $\beta$  ἀπὸ τοῦ  $\alpha$  εἶναι  $\delta$ , κατὰ τὸν γενικὸν ὀρισμὸν τῆς ἀφαιρέσεως θὰ εἶναι  $\alpha = \beta + \delta$ . Ὡστε:

Ἄν εἶναι  $\alpha - \beta = \delta$ , θὰ εἶναι  $\alpha = \beta + \delta$

§ 45. Παρατηρήσεις. 1η. Ὅπως εἰς τὴν πρόσθεσιν, οὕτω καὶ εἰς τὴν ἀφαίρεσιν συγκεκριμένων ἀριθμῶν, ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος πρέπει νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ διαφορὰ των θὰ εἶναι ὁμοειδῆς πρὸς αὐτούς.

2α. Ὅπως τὸ ἄθροισμα, οὕτω καὶ τὴν διαφορὰν τὴν κλείομεν ἐντὸς παρενθέσεως, ἐὰν θέλωμεν νὰ φανερώσωμεν ὅτι αὐτὴ εὐρέθη.

Π.χ. γράφομεν  $(15 - 4)$ .

3η. Ἡ διαφορὰ δύο ἴσων ἀριθμῶν εἶναι μηδέν. Ἦτοι εἶναι :  
 $8 - 8 = 0$ · ἐπίσης εἶναι  $\alpha - \alpha = 0$ .

4η. Εἶναι φανερόν ὅτι  $5 - 0 = 5$ , καὶ  $\beta - 0 = \beta$ .

Διατυπώσατε τὸν σχετικὸν κανόνα.

#### † § 46. Ἄλλη ιδιότης τῶν ἴσων καὶ ἀνίσων ἀριθμῶν.

I. Ἐστω ἡ ἰσότης  $8 = \alpha$ . *καὶ εἰς ἀμφότερα ἀφαιρέσωμεν*

Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ  $\alpha$  ἔχει τόσας μονάδας, ὅσας ἔχει ὁ 8. Εὐκόλως δὲ ἐννοοῦμεν ὅτι καὶ οἱ ἀριθμοὶ  $8 - 3$  καὶ  $\alpha - 3$  ἔχουν τὸ αὐτὸ πλῆθος μονάδων.

Θὰ εἶναι λοιπὸν  $8 - 3 = \alpha - 3$ . Καὶ γενικῶς :

$$\text{Ἐάν εἶναι } \boxed{\alpha = \beta}, \text{ θὰ εἶναι καὶ } \boxed{\alpha - \mu = \beta - \mu},$$

ἂν βέβαια ἡ ἀφαίρεσις τοῦ  $\mu$  ἀπὸ τοῦ  $\beta$  εἶναι δυνατὴ.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Ἐάν ἀπὸ ἴσους ἀριθμοὺς ἀφαιρέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, εὐρίσκομεν πάλιν ἴσους ἀριθμοὺς.

II. Ἐστω ἡ ἀνισότης  $\alpha > \beta$ . τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ  $\alpha$  ἔχει περισσοτέρας μονάδας ἀπὸ τὸν  $\beta$ . Εὐκόλως δὲ ἐννοοῦμεν ὅτι, ἐὰν ἀφαιρέσωμεν καὶ ἀπὸ τὸν  $\alpha$  καὶ ἀπὸ τὸν  $\beta$  3 μονάδας, θὰ μείνουν περισσότερα μονάδες εἰς τὸν  $\alpha$ . Θὰ εἶναι λοιπὸν  $\alpha - 3 > \beta - 3$ . Καὶ γενικῶς :

$$\text{Ἐάν εἶναι : } \boxed{\alpha > \beta}, \text{ θὰ εἶναι καὶ } \boxed{\alpha - \mu > \beta - \mu},$$

ἂν ἡ ἀφαίρεσις τοῦ  $\mu$  ἀπὸ τοῦ  $\beta$  εἶναι δυνατὴ.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Ἐάν ἀπὸ δύο ἀνίσους ἀριθμοὺς ἀφαιρέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, εὐρίσκομεν ὁμοίως ἀνίσους ἀριθμοὺς. † †

## 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 47. Ἰδιότης I. Πρόβλημα. Ὁ Γεώργιος ἔχει 8 βώλους, ὁ δὲ Παῦλος 5 βώλους. Πόση εἶναι ἡ διαφορὰ τῶν ἀριθμῶν τῶν βώλων αὐτῶν καὶ πόση θὰ εἶναι : 1ον. Ἐάν δώσωμεν

εις τὸν καθένα ἀπὸ 4 βῶλους ἀκόμη; 2ον. Ἄν πάρωμεν ἀπὸ τὸν καθένα 2 βῶλους;

Λύσις. 1ον. Ὁ Γεώργιος ἔχει  $\circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ$  8 βῶλους

Ὁ Παῦλος ἔχει  $\circ \circ \circ \circ \circ$  5 βῶλους

Ἡ διαφορὰ τῶν βῶλων τῶν εἶναι 3 βῶλοι, ἦτοι:

$$8 \text{ βῶλοι} - 5 \text{ βῶλοι} = 3 \text{ βῶλοι}$$

Ἄν δώσωμεν ἀπὸ 4 βῶλους καὶ εἰς τοὺς δύο, τότε ὁ Γεώργιος θὰ ἔχη  $\circ \circ \circ \circ$  |  $\circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ$  (8 + 4) βῶλους

ὁ Παῦλος θὰ ἔχη  $\circ \circ \circ \circ$  |  $\circ \circ \circ \circ \circ$  (5 + 4) βῶλους

Ἡ διαφορὰ τῶν βῶλων θὰ εἶναι πάλιν 3 βῶλοι, ἦτοι εἶναι:

$$(8 + 4) - (5 + 4) = 3.$$

2ον. Ἄν πάρωμεν ἀπὸ δύο βῶλους καὶ ἀπὸ τοὺς δύο, τότε ὁ Γεώργιος θὰ ἔχη  $\circ \circ$  |  $\circ \circ \circ \circ \circ \circ$  (8 - 2) βῶλους

ὁ Παῦλος θὰ ἔχη  $\circ \circ$  |  $\circ \circ \circ$  (5 - 2) βῶλους

καὶ ἡ διαφορὰ τῶν βῶλων θὰ εἶναι πάλιν 3 βῶλοι, ἦτοι εἶναι:

$$(8 - 2) - (5 - 2) = 3.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι:

$$8 - 5 = (8 + 4) - (5 + 4) \text{ καὶ } 8 - 5 = (8 - 2) - (5 - 2).$$

**Συμπέρασμα.** Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

**1ον.** Ἄν προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν καὶ εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον μιᾶς διαφορᾶς, ἡ διαφορὰ δὲν μεταβάλλεται.

**2ον.** Ἄν ἀφαιρέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν καὶ ἀπὸ τὸν μειωτέον καὶ ἀπὸ τὸν ἀφαιρετέον μιᾶς διαφορᾶς, ἡ διαφορὰ δὲν μεταβάλλεται.

Γενικῶς κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι:

$$\boxed{\alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma)}, \quad \boxed{\alpha - \beta = (\alpha - \gamma) - (\beta - \gamma)}$$

Ἡ ιδιότης αὕτη εἶναι θεμελιώδης. ++γ

§ 48. Πῶς ἀφαιροῦμεν ἀριθμὸν ἀπὸ ἄθροισμα. *Πρόβλημα.* Ἡ Ἑλένη εἶχε 15 καρύδια. Ὁ πατὴρ τῆς τῆς ἔδωκεν ἀκόμη 25 καρύδια καὶ ἡ μήτηρ τῆς 10 καρύδια. Ἐδωκεν ἔπειτα εἰς τὴν ἀδελφὴν τῆς 8 καρύδια. Πόσα καρύδια τῆς ἔμειναν;

Λύσις. Ἡ Ἑλένη, πρὶν δώσῃ εἰς τὴν ἀδελφὴν τῆς καρύδια, εἶχε (15 + 25 + 10) καρύδια ἢ 50 καρύδια.

Ἐπειδὴ δὲ ἔδωσεν 8 καρύδια, τῆς ἔμειναν :

(15 + 25 + 10) καρ. - 8 καρ. ἢ 50 καρ. - 8 καρ. ἢ 42 καρ.

*Ἄλλη λύσις.* Ἄν ἔβλεπε τὰ 8 καρύδια εἰς τὴν ἀδελφήν τῆς ἀπὸ τὰ 25 καρύδια, ποῦ τῆς ἔδωσεν ὁ πατὴρ τῆς, θὰ τῆς ἔμειναν

25 - 8 καρύδια ἢ 17 καρύδια καὶ ἐπομένως θὰ εἶχε συνολικῶς :  
15 + (25 - 8) + 10 καρύδια ἢ 15 + 17 + 10 καρύδια ἢ 42 καρύδια.

Ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον, ἐννοοῦμεν ὅτι : (15 + 25 + 10) - 8 = 15 + (25 - 8) + 10.

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν ἰσότητα αὐτὴν συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα.

II. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀριθμὸν ἀπὸ ἄθροισμα, δυνάμεθα νὰ ἀφαιρέσωμεν αὐτὸν ἀπὸ ἓνα μόνον προσθετέον τοῦ ἄθροισματος, τοὺς δὲ ἄλλους νὰ ἀφήσωμεν, ὅπως ἔχουν.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$(α + β + γ) - δ = α + (β - δ) + γ$$

§ 49. Πῶς ἀφαιροῦμεν ἄθροισμα ἀπὸ ἀριθμὸν. *Πρόβλημα.* Ὁ Πέτρος εἶχε 50 δραχμὰς καὶ ἔδωσεν 28 δραχμὰς διὰ νὰ ἀγοράσῃ ἓνα βιβλίον καὶ 12 δραχμὰς διὰ τετράδια. Πόσαι δραχμαὶ τοῦ ἔμειναν ;

*Λύσις.* Διὰ τὸ βιβλίον καὶ διὰ τὰ τετράδια ἔδωσεν (28 + 12) δρχ. ἢ 40 δρχ. ἐπομένως τοῦ ἔμειναν

50 δρχ. - (28 + 12) δρχ. ἢ 50 δρχ. - 40 δρχ. ἢ 10 δρχ.

*Ἄλλη λύσις.* Ὅταν ἐπλήρωσε τὸ βιβλίον, τοῦ ἔμειναν

50 δρχ. - 28 δρχ. ἢ (50 - 28) δρχ. ἢ 22 δρχ.

Ὅταν δὲ ἐπλήρωσε καὶ τὰ τετράδια τοῦ ἔμειναν

(50 - 28) δρχ. - 12 δρχ. ἢ 22 δρχ. - 12 δρχ. ἢ 10 δρχ.

Ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον 10, ἐννοοῦμεν ὅτι : 50 - (28 + 12) = (50 - 28) - 12.

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν ἰσότητα αὐτὴν συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα :

III. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἄθροισμα ἀπὸ ἀριθμὸν, δυνάμεθα νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τὸν πρῶτον προσθετέον τοῦ

ἀθροίσματος, ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον τὸν δεύτερον, ἀπὸ τὸ νέον ὑπόλοιπον τὸν τρίτον καὶ οὕτω καθεξῆς, μέχρις ὅτου τελειώσῃ οἱ ὅλοι οἱ προσθετοί.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$$

Περίληψις τῶν ἰδιοτήτων τῆς ἀφαιρέσεως

- |    |   |
|----|---|
| 1. | $\alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma)$                   |
| 2. | $\alpha - \beta = (\alpha - \gamma) - (\beta - \gamma)$                   |
| 3. | $(\alpha + \beta + \gamma) - \delta = \alpha + (\beta - \delta) + \gamma$ |
| 4. | $\alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma$                   |

### 3. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 50. Κατὰ τὸν γενικὸν ὀρισμὸν τῆς ἀφαιρέσεως (§ 43), διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν δύο ἀριθμῶν, δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν διαδοχικῶς 1 εἰς τὸν μικρότερον ἀριθμὸν (ἀφαιρετέον), μέχρις ὅτου εὐρωμεν τὸν μεγαλύτερον (μειωτέον). Ὁ ἀριθμὸς τῶν προστιθεμένων μονάδων θὰ εἶναι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς.

Ὁ τρόπος αὐτός, ὁ ὁποῖος εἶναι εὐκόλος, ὅταν ἡ ζητούμενη διαφορὰ εἶναι μικρά, θὰ ᾔτο γενικῶς πολὺ κοπιώδης, ὅταν ἡ διαφορὰ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν ᾔτο πολὺ μεγάλη. Διὰ τοῦτο χρησιμοποιούμεν συνήθως μίαν σύντομον μέθοδον, τὴν ὁποῖαν θὰ ἀναφέρωμεν κατωτέρω :

**I.** Ὅταν ὁ ἀφαιρετέος καὶ ἡ διαφορὰ εἶναι μονοψήφιοι ἀριθμοί.

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν  $12 - 3$ .

Ἀντὶ νὰ ἀφαιρέσωμεν μίαν πρὸς μίαν τὰς μονάδας τοῦ ἀφαιρετέου 3 ἀπὸ τὸν 12, φθάνομεν ταχύτερον εἰς τὸ ἐξαγόμενον, ἂν ζητήσωμεν νὰ εὐρωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐκείνιον, ὁ ὁποῖος προστιθέμενος εἰς τὸν 3 δίδει τὸν 12. Πρέπει λοιπὸν νὰ εἴπωμεν 12 πλὴν 3 ἴσον 9, διότι 9 καὶ 3 κάνουν 12. Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι  $15 - 8 = 7$ .

Τὰ ἐξαγόμενα αὐτὰ εὐρίσκομεν καὶ ἀπὸ τὸν πίνακα τῆς προσθέσεως δύο ἀριθμῶν (§ 36).

## II. Ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος εἶναι τυχόντες ἀριθμοί.

*Παράδειγμα 1ον.* Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὴν διαφορὰν 784 — 253.

Ὁ ἀριθμὸς 784 ἀποτελεῖται ἀπὸ 7 ἑκατοντάδας, 8 δεκάδας καὶ 4 μονάδας. Ἐπίσης ὁ ἀριθμὸς 253 ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 ἑκατοντάδας, 5 δεκάδας καὶ 3 μονάδας.

Ἡ ζητούμενη διαφορὰ θὰ περιλαμβάνῃ 7 — 2 ἢ 5 ἑκατοντάδας, 8 — 5 ἢ 3 δεκάδας καὶ 4 — 3 ἢ 1 μονάδα.

Ἡ ζητούμενη λοιπὸν διαφορὰ θὰ εἶναι 531.

Εἰς τὴν πρᾶξιν θέτομεν τὸν ἀφαιρετέον κάτωθι τοῦ μειωτέου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην. Ἐπειτα, λέγομεν, ἀρ-  

784
253
—
531

χίζοντες ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερά, 3 ἀπὸ 4 μένουν 1 καὶ γράφομεν τὸ 1 κάτωθι καὶ εἰς τὴν στήλην τῶν μονάδων· 5 ἀπὸ 8 μένουν 3 καὶ γράφομεν τὸ 3 κάτωθι καὶ εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων· 2 ἀπὸ 7 μένουν 5 καὶ γράφομεν τὸ 5 κάτωθι καὶ εἰς τὴν στήλην τῶν ἑκατοντάδων.

*Παρατήρησις.* Εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα ὁ μειωτέος ἐλήφθη οὕτως, ὥστε τὸ ψηφίον τῶν μονάδων μιᾶς οἰασθήποτε τάξεώς του νὰ εἶναι μεγαλύτερον (ἢ τὸ ὀλιγώτερον ἴσον) μὲ τὸ ἀντίστοιχον ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου καὶ οὕτως αἱ μερικαὶ ἀφαιρέσεις ἦσαν δυναταί. Δύνатаι ὁμως νὰ μὴ συμβαίνει τὸ αὐτὸ εἰς ἄλλας ἀφαιρέσεις, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ κάτωθι παράδειγμα.

*Παράδειγμα 2ον.* Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὴν διαφορὰν 3 425 — 1 863.

Θέτομεν τὸν μικρότερον ἀριθμὸν κάτωθι τοῦ μεγαλυτέρου, ὅπως εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα· ἔπειτα λέγομεν :

3 425
1 863
—
1 562

3 ἀπὸ 5 μένουν 2· γράφομεν 2 εἰς τὴν στήλην τῶν μονάδων. Ἀφαιροῦμεν τώρα τὰς δεκάδας· λέγομεν 6 ἀπὸ 2 δὲν ἀφαιρεῖται· διὰ τοῦτο προσθέτομεν 10 εἰς τὸ 2 καὶ γίνεται 12· ἔπειτα λέγομεν 6 ἀπὸ 12 μένουν 6· γράφομεν τὸ 6 εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων. Ἐπειδὴ ἐπροσθέσαμεν 10 δεκάδας εἰς τὸν μειωτέον, διὰ νὰ μὴ μεταβληθῇ ἡ διαφορὰ, πρέπει νὰ προσθέσωμεν καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον 10 δεκ. ἢ 1 ἑκατοντάδα (ιδιότης 1) καὶ λέγομεν 1 καὶ 8 κάνουν 9· 9 ἀπὸ 4 δὲν ἀφαιρεῖται. Προσθέτομεν πάλιν 10 εἰς τὸν 4 τοῦ μειωτέου καὶ γίνεται 14. Ἐπειτα λέγομεν 9 ἀπὸ 14

μένουν 5. Γράφομεν τὸ 5 εἰς τὴν στήλην τῶν ἑκατοντάδων. Σκεπτόμενοι, ὅπως καὶ εἰς τὴν προηγουμένην μερικὴν ἀφαίρεσιν προσθέτομεν 10 ἑκατοντάδας ἢ 1 χιλιάδα εἰς τὸν 1 τοῦ ἀφαιρετέου καὶ λέγομεν 1 καὶ 1 2 ἀπὸ 3 μένει 1. Γράφομεν τὸν 1 εἰς τὴν στήλην τῶν χιλιάδων. Ἡ διαφορὰ λοιπὸν τῶν δοθέντων ἀριθμῶν εἶναι 1562.

*Σημείωσις.* Εἰς τὴν πρᾶξιν λέγομεν οὕτω: 3 ἀπὸ 5 2· 6 ἀπὸ 12 6· γράφομεν 6· καὶ κρατοῦμεν 1· 1 καὶ 8 9 ἀπὸ 14 5· γράφομεν 5 καὶ κρατοῦμεν 1· 1 καὶ 1 2 ἀπὸ 3 1. γράφομεν 1.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν γνωστὸν κανόνα τῆς ἀφαιρέσεως.

**§ 51. Ἐξήγησις τοῦ γνωστοῦ κανόνος τῆς ἀφαιρέσεως.** Ὁ κανὼν τῆς ἀφαιρέσεως δύο ἀριθμῶν στηρίζεται ἐπὶ τῶν ιδιοτήτων I, II καὶ III ( § 47, 48, 49 ). Οὕτω διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 784 τὸν ἀριθμὸν 253, δηλαδὴ τὸ ἄθροισμα 2 ἑκατοντάδων + 5 δεκάδων + 3 μονάδων, ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸν 784 διαδοχικῶς κάθε προσθετέον τοῦ ἄθροίσματος (ιδιότης III).

Εἰς τὸ παράδειγμα 3 425 — 1 863, ὅπου ἐπρόκειτο νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ ἄθροισμα:

$$3 \text{ χιλ.} + 4 \text{ ἐκ.} + 2 \text{ δεκ.} + 5 \text{ μον.}$$

τὸ ἄθροισμα 1 χιλ. + 8 ἐκ. + 6 δεκ. + 3 μον.,

ἐφηρμόσαμεν τὴν ιδιότητα I καὶ ἐπροσθέσαμεν 1 χιλιάδα καὶ 1 ἑκατοντάδα εἰς τὸν ἀφαιρετέον καὶ 10 ἑκατοντάδας καὶ 10 δεκάδας εἰς τὸν μειωτέον. Ἀλλὰ τότε οἱ ἀριθμοὶ γίνονται:

$$3 \text{ χιλ.} + 14 \text{ ἐκ.} + 12 \text{ δεκ.} + 5 \text{ μον.}$$

$$2 \text{ χιλ.} + 9 \text{ ἐκ.} + 6 \text{ δεκ.} + 3 \text{ μον.}$$

Καὶ ἐκτελοῦντες τὴν ἀφαίρεσιν τῶν διαφορῶν μονάδων εὐρίσκομεν:

$$1 \text{ χιλ.} + 5 \text{ ἐκ.} + 6 \text{ δεκ.} + 2 \text{ μον.} \quad \text{ἢ} \quad 1562.$$

**§ 52. Δοκιμὴ τῆς ἀφαιρέσεως.** Ἡ δοκιμὴ τῆς ἀφαιρέσεως δύναται νὰ γίνη κατὰ δύο τρόπους:

**1ον. Διὰ προσθέσεως.** Προσθέτομεν εἰς τὸ ὑπόλοιπον τὸν ἀφαιρετέον, ὅποτε κατὰ τὸν γενικὸν ὄρισμὸν τῆς ἀφαιρέσεως πρέπει νὰ εὐρωμεν τὸν μειωτέον.

**2ον. Δι' ἀφαιρέσεως.** Ἀφαιροῦμεν τὸ ὑπόλοιπον ἀπὸ τὸν μειωτέον, ὅποτε πρέπει νὰ εὐρωμεν τὸν ἀφαιρετέον (Διατί;).

### Ἀσκήσεις

39 ) Νὰ ἐκτελέσητε τὰς κάτωθι ἀφαιρέσεις μὲ τὰς δοκιμάς των :

1. $4\ 567 - 3\ 289$	3. $13\ 578 - 6\ 596$
2. $20\ 004 - 7\ 895$	4. $80\ 304 - 25\ 607$

40 ) Νὰ ἐκτελέσητε τὰς κατωτέρω ἀφαιρέσεις, χωρὶς νὰ θέσητε τὸν ἀφαιρετέον κάτωθι τοῦ μειωτέου.

1. $5\ 702 - 3\ 843$	3. $13\ 004 - 7\ 349$
2. $47\ 932 - 8\ 647$	4. $147\ 285 - 59\ 697$

41 ) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ ἐξαγόμενα τῶν κάτωθι πράξεων κατὰ δύο τρόπους (§ 48, 49).

1. $150 - (40 + 25)$	2. $120 - (64 + 23 + 8)$
3. $(56 + 28 + 74) - 30$	4. $(67 + 32) - 24$

#### 4. ΣΥΝΤΟΜΙΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ

§ 53. Ὅπως εἰς τὴν πρόσθεσιν ἀριθμῶν, οὕτω καὶ εἰς τὴν ἀφαίρεσιν ἀριθμῶν, στηριζόμενοι εἰς τὰς ιδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως, δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν συντόμως ἢ καὶ ἀπὸ μνήμης τὴν διαφορὰν δύο ἀριθμῶν :

1. Ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸν μεγαλύτερον διαδοχικῶς τὰς μονάδας τῶν διαφόρων τάξεων τοῦ μικροτέρου, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς ἀνωτέρας τάξεως.

Π.χ. ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν  $57 - 34$ , λέγομεν  $57$  πλὴν  $30$  27. Ἐπειτα  $27$  πλὴν  $4$  23.

Ἐπίσης, ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν  $478 - 345$  λέγομεν  $478$  πλὴν  $300$  178· ἔπειτα  $178$  πλὴν  $40$  138· τέλος  $138$  πλὴν  $5$  133. Συντομώτερον λέγομεν  $478$ ,  $178$ ,  $138$ ,  $133$ .

2. Ἐὰν ὁ ἀφαιρετέος λήγη εἰς 9 ἢ 8, προσθέτομεν καὶ εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον ἀντιστοίχως 1 ἢ 2 καὶ ἐκτελοῦμεν ἔπειτα τὴν ἀφαίρεσιν (θεμελιώδης ιδιότης).

Π.χ. ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν  $73 - 49$ , λέγομεν  $74 - 50 = 24$ .

Ἐπίσης, ἂν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν  $357 - 99$ , λέγομεν  $358 - 100 = 258$ .

Ὁμοίως, ἂν θέλωμεν νὰ εὐρώμεν τὴν διαφορὰν  $345 - 28$ , λέγομεν  $347 - 30 = 317$ .

3. Ἐὰν ὁ ἀφαιρετέος εἶναι ὁ 11, 101, 1 001 κ.λ.π., ἀφαιρούμεν καὶ ἀπὸ τὸν μειωτέον καὶ ἀπὸ τὸν ἀφαιρετέον 1 καὶ ἐκτελοῦμεν ἔπειτα τὴν ἀφαίρεσιν.

Π.χ. ἂν θέλωμεν νὰ εὐρώμεν τὴν διαφορὰν  $374 - 11$ , λέγομεν  $373 - 10 = 363$ .

Ὁμοίως  $879 - 101 = 878 - 100 = 778$ .

4. Προσθέτομεν ἢ ἀφαιρούμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν καὶ εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς οὕτως, ὥστε ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν νὰ λήγῃ εἰς 0.

Π.χ. ἔὰν θέλωμεν νὰ εὐρώμεν τὴν διαφορὰν  $1\ 805 - 1\ 593$ , προσθέτομεν 7 καὶ εἰς τοὺς δύο αὐτοὺς ἀριθμοὺς καὶ εὐρίσκομεν :

$$1\ 812 - 1\ 600 = 212.$$

### Ἀσκήσεις

42 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν ἀπὸ μνήμης αἱ κατωτέρω ἀφαιρέσεις :

1.	$120 - 70$	$360 - 90$	$4\ 700 - 800$
2.	$548 - 35$	$679 - 84$	$986 - 635$
3.	$78 - 29$	$85 - 69$	$354 - 99$
4.	$84 - 11$	$728 - 11$	$349 - 11$
	$632 - 101$	$539 - 101$	$2\ 567 - 101$
5.	$275 - 92$	$394 - 41$	$845 - 102$
	$847 - 104$	$964 - 96$	$759 - 48$
6.	$734 - 539$	$964 - 278$	$365 - 275$
7.	$1\ 379 - 279$	$964 - 264$	$7\ 379 - 879$

### Προβλήματα ἀφαιρέσεως

Α' Ὁμάς. 43 ) Παραπλεύρως τοῦ ὀνόματος τῶν κάτωθι διασήμων ἀνδρῶν ὑπάρχουν δύο ἀριθμοί, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος φανερώνει τὸ ἔτος τῆς γεννήσεως, ὁ δὲ δεῦτερος τὸ ἔτος τοῦ θανάτου ἐκάστου. Νὰ εὐρεθῇ πόσα ἔτη ἔζησεν ἕκαστος :

1. Πυθαγόρας .....  $580 - 500$  π.Χ.
2. Περικλῆς .....  $490 - 429$  »

3. Σωκράτης ..... 470 — 399 π.Χ.
4. Πλάτων ..... 428 — 347 »
5. Ξενοφών ..... 430 — 354 »
6. Ἀριστοτέλης ..... 384 — 323 »
7. Δημοσθένης ὁ ῥήτωρ 384 — 322 »
8. Μέγας Ἀλέξανδρος.. 356 — 323 »
9. Ἀρχιμήδης ..... 287 — 212 »

44 ) Πόσα ἔτη παρήλθον μέχρι τοῦ τρέχοντος ἔτους :

1. Ἀπὸ τῆς ἐφευρέσεως τῆς πυρίτιδος ( 1 346 μ.Χ. )
2. » » » τῆς τυπογραφίας ( 1 436 μ.Χ. )
3. » » ἀνακαλύψεως τῆς Ἀμερικῆς ( 1 492 μ.Χ. )
4. » » ἐφευρέσεως τοῦ ἀεροστάτου ( 1 783 μ.Χ. )
5. » » » τῆς ἀτμομηχανῆς ( 1 799 μ.Χ. )
6. » » » τοῦ σιδηροδρόμου ( 1 831 μ.Χ. )
7. » » » τοῦ ἠλεκτρ. τηλεγ. ( 1 832 μ.Χ. )
8. » » » τῆς φωτογραφίας ( 1 839 μ.Χ. )
9. » » » τοῦ φωνογράφου ( 1 878 μ.Χ. )

45 ) Ἡ ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων ἔγινε τὸ ἔτος 1453 μ.Χ. Πόσα ἔτη ἐπέρασαν ἀπὸ τότε μέχρι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασεως ;

46 ) Ἡ ὑψηλότερα κορυφή τοῦ Ὀλύμπου ἔχει ὕψος 2 918 μέτρα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης. Ἡ δὲ ὑψηλότερα κορυφή τοῦ ὑψηλότερου ὄρους τῆς Γῆς, Ἐβερεστ τῆς Ἀσίας, ἔχει ὕψος 8 840 μέτρα. Πόσον ὑψηλότερον ἀπὸ τὸν Ὀλυμπον εἶναι τὸ Ἐβερεστ ;

47 ) Ἐμπορος ἐπώλησεν ἐμπορεύματα ἀντὶ 7 535 δραχμῶν καὶ ἐκέρδισε 1 645 δραχμάς. Πόση ἦτο ἡ ἀξία των ;

48 ) Γεωργὸς ἐπρομηθεύθη λίπασμα διὰ τοὺς ἀγρούς του βάρους 1 378 κιλῶν. Ἐξ αὐτοῦ ἐχρησιμοποίησεν 842 κιλά. Πόσον τοῦ μείνει ἀκόμη ;

Β' Ὁ μ ἄ σ τ 49 ) Γεωργὸς ἠγόρασε μίαν οἰκίαν καὶ ἓνα κῆπον ἀντὶ 27 545 δραχμῶν. Ὁ κῆπος ἐτιμᾶτο 3 865 δραχμάς. Πόσον ἠγόρασε τὴν οἰκίαν καὶ πόσον ὀλιγώτερον τῆς οἰκίας ἐπλήρωσε διὰ τὸν κῆπον ;

50 ) Γεωργὸς εἰσέπραξεν 8 474 δρχ. ἀπὸ σῖτον καὶ 5 654 δρχ. ἀπὸ γεώμηλα. Ἐκ τῶν χρημάτων αὐτῶν ἠγόρασεν ἓναν ἵππον ἀντὶ 8 652 δρχ. Πόσα χρήματα τοῦ ἔμειναν ;

51) Ἐργάτρια κερδίζει ἐκ τῆς ἐργασίας της 1 850 δραχμὰς κατὰ μῆνα, ἡ δὲ θυγάτηρ της 765 δρχ. ὀλιγώτερον. Πόσα κερδίζουν καὶ αἱ δύο μαζί κατὰ μῆνα;

Γ' Ὁ μ ἄ ς. 52) Ἄν μοῦ ἔδιδε κάποιος 17 540 δρχ. θὰ ἠδυνάμην νὰ πληρώσω 27 650 δρχ., τὰς ὁποίας ὤφειλον καὶ θὰ μοῦ ἔμενον καὶ 3 450 δρχ. Πόσας δραχμὰς εἶχον ἐξ ἀρχῆς;

53) Ἄν μοῦ ἔδιδε κάποιος 12 600 δρχ. θὰ μοῦ ἔλειπον 3 250 δρχ. ἀκόμη διὰ νὰ πληρώσω ἓνα χρέος μου 37 450 δρχ. Πόσα χρήματα εἶχον;

Δ' Ὁ μ ἄ ς. 54) Τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν εἶναι 3 748. Ὁ μικρότερος αὐτῶν εἶναι 1 859. Ποῖος εἶναι ὁ μεγαλύτερος;

55) Ἡ διαφορά δύο ἀριθμῶν εἶναι 5 839. Ὁ μεγαλύτερος αὐτῶν εἶναι 14 875. Ποῖος εἶναι ὁ μικρότερος;

56) Τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν εἶναι 2 763 καὶ ὁ μικρότερος αὐτῶν 857. Ποία εἶναι ἡ διαφορά τῶν ἀριθμῶν;

57) Νὰ εὐρεθῆ ὁ ἀριθμὸς  $\alpha$ :

1ον. Ὄταν  $\alpha + 53\,068 = 101\,001$ .

2ον. Ὄταν  $17\,023 - \alpha = 10\,909$ .

58) Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἐξαγόμενον τῶν κάτωθι πράξεων:

$\alpha + \beta - \gamma$ , ὅταν  $\alpha = 3\,029$ ,  $\beta = 9\,072$  καὶ  $\gamma = 5\,948$

59) Νὰ ἀντικαταστήσετε τὰ γράμματα μὲ τοὺς καταλλήλους ἀριθμοὺς εἰς τὰς κατωτέρω ἰσότητας:

1.  $\alpha + 4\,506 = 53\,608$  3.  $37\,153 + \gamma = 43\,628$

2.  $84\,302 + \beta = 102\,032$  4.  $\delta + 537\,609 = 735\,200$

60) Νὰ ἀντικαταστήσετε τὰ ἐρωτηματικά μὲ τὰ κατάλληλα ψηφία εἰς τὰς κατωτέρω ἀφαιρέσεις:

1. 7 632	2. ; ; ; ;	3. ; 7 ;	4. 4 ; 91
; ; ;	7 689	4 ; 6	2 5 ; 0
5 269	2 037	212	; 67 ;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

### ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

#### 1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

§ 54. Όροιμοί. Πρόβλημα. Μία εργάτρια ύφαινει 8 πήχεις ύφάσματος κάθε ημέραν. Πόσους πήχεις θά ύφάνη εις 3 ημέρας ;

Λύσις. Τήν πρώτην ημέραν ύφαινει 8 πήχεις

» δευτέραν » » 8 »

» τρίτην » » 8 »

Έπομένως εις τὰς 3 ημέρας θά ύφάνη :

$$8 \text{ πήχ.} + 8 \text{ πήχ.} + 8 \text{ πήχ.} = 24 \text{ πήχ.}$$

Εις τὸ πρόβλημα αὐτό, διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ζητούμενον, ἐπροσθέσαμεν ἴσους ἀριθμούς, δηλαδὴ ἐπανελάβομεν τὸν ἴδιον ἀριθμὸν 8 τόσας φορές, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ 3.

Ἡ ἰδιαιτέρα αὐτὴ περίπτωσις τῆς προσθέσεως λέγεται **πολλαπλασιασμός**. Ὡστε :

Πολλαπλασιασμός εἶναι ἡ πρᾶξις, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς δίδονται δύο ἀριθμοὶ καὶ ἐπαναλαμβάνομεν τὸν ἓνα ἐξ αὐτῶν τόσας φορές, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ ἄλλος.

Ὁ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος ἐπαναλαμβάνεται, λέγεται **πολλαπλασιαστέος**. Ὁ δὲ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος δεικνύει πόσας φορές θά ἐπαναληφθῇ ὁ πολλαπλασιαστέος, λέγεται **πολλαπλασιαστής**.

Τὸ ἐξαγόμενον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ λέγεται **γινόμενον**.

Ὁ πολλαπλασιαστέος καὶ ὁ πολλαπλασιαστής μαζί λέγονται **παράγοντες**.

Εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα πολλαπλασιαστέος εἶναι οἱ 8 πήχεις, πολλαπλασιαστής ὁ 3 καὶ γινόμενον οἱ 24 πήχεις.

§ 55. Σημεῖον πολλαπλασιασμοῦ. Διὰ νὰ σημειώσωμεν τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν, θέτομεν μεταξὺ αὐτῶν τὸ σημεῖον  $\times$  ἢ μίαν τελείαν. Τὸ σημεῖον τοῦτο ἀπαγγέλλεται **ἐπί**.

Ούτω τὸ γινόμενον τοῦ ἀριθμοῦ 8 ἐπὶ 3 γράφεται  $8 \times 3$  ἢ  $8 \cdot 3$  καὶ ἀπαγγέλλεται 8 ἐπὶ 3.

Διὰ τὴν δηλώσωμεν ὅτι τὸ γινόμενον  $8 \times 3$  εἶναι 24, γράφομεν  $8 \times 3 = 24$  καὶ ἀπαγγέλλομεν : 8 ἐπὶ 3 ἴσον 24.

**§ 56. Παρατηρήσεις.** 1η. Ἐάν ὁ πολλαπλασιαστέος καὶ ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι ἀφηρημένοι ἀριθμοί, τὸ γινόμενον θὰ εἶναι ἀφηρημένον. Ἐάν ὁ πολλαπλασιαστέος εἶναι συγκεκριμένος, ὁ πολλαπλασιαστής πρέπει νὰ λαμβάνηται ὡς ἀφηρημένος, διότι ὁ πολλαπλασιαστής φανερώσει ἀπλῶς πόσας φορές θὰ ἐπαναλάβωμεν τὸν πολλαπλασιαστέον. Π.χ. πρέπει νὰ γράφωμεν ἀπλῶς :

$$8 \text{ πήχεις} \times 3 = 24 \text{ πήχεις. Ὡστε :}$$

**Τὸ γινόμενον εἶναι πάντοτε ὁμοειδὲς μὲ τὸν πολλαπλασιαστέον.**

2α. Τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ ἐπὶ 2, 3, 4 κ.τ.λ. λέγεται ἀντιστοίχως **διπλάσιον, τριπλάσιον, τετραπλάσιον** κ.τ.λ. τοῦ ἀριθμοῦ.

Τὸ διπλάσιον, τριπλάσιον, τετραπλάσιον κ.τ.λ. ἐνὸς ἀριθμοῦ λέγονται **πολλαπλάσια** αὐτοῦ.

**§ 57. Ἄλλη ιδιότης τῆς ισότητος.** Ἐστω ἡ ισότης  $\alpha = 5$ . Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ  $\alpha$  ἔχει τόσας μονάδας, ὅσας ἔχει ὁ 5. Τὸ γινόμενον  $\alpha \times 3$  καθὼς καὶ τὸ γινόμενον  $5 \times 3$  ἔχει 3 φορές τὰς μονάδας τοῦ 5. Θὰ εἶναι λοιπὸν  $\alpha \times 3 = 5 \times 3$ . Καὶ γενικῶς :

$$\text{Ἐάν εἶναι } \boxed{\alpha = \beta}, \text{ θὰ εἶναι καὶ } \boxed{\alpha \times \mu = \beta \times \mu}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα :

**Ἐάν ἴσοι ἀριθμοὶ πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, προκύπτουν πάλιν ἴσοι ἀριθμοί.**

## 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

**§ 58. Θεμελιώδης ιδιότης. Πρόβλημα.** Πόσα γραμματόσημα ὑπάρχουν εἰς τὴν ὀπισθεν εἰκόνα; (σχ. 4).

Ἐάντὶ νὰ ἀριθμῶμεν τὰ γραμματόσημα ἐν πρὸς ἐν, διὰ τὴν εὐρωμεν πόσα εἶναι, δυνάμεθα νὰ ἐργασθῶμεν ὡς ἑξῆς: Παρατη-

ροῦμεν ὅτι εἰς ἐκάστην σειρὰν ὑπάρχουν 4 γραμματόσημα, ἐπομένως εἰς τὰς 3 σειρὰς θὰ ὑπάρχουν :

$$4 \text{ γραμματόσημα} \times 3 = 12 \text{ γραμματόσημα.}$$

Ὅμοίως παρατηροῦμεν ὅτι εἰς ἐκάστην κατακόρυφον στήλην ὑπάρχουν 3 γραμματόσημα καὶ ἐπομένως εἰς τὰς 4 στήλας θὰ ὑπάρχουν

$$3 \text{ γραμματόσημα} \times 4 = 12 \text{ γραμματόσημα.}$$


Σχ. 4

Θὰ εἶναι λοιπόν :

$$4 \times 3 \text{ γραμματόσημα} = 3 \times 4 \text{ γραμματόσημα} \quad \eta \quad 4 \times 3 = 3 \times 4.$$

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω ἰσότητα συνάγομεν τὴν κάτωθι θεμελιώδη ἰδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ :

I. Τὸ γινόμενον δύο παραγόντων δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀλλάξωμεν τὴν τάξιν των.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$\alpha \times \beta = \beta \times \alpha$$

§ 59. Παρατήρησις. Ἐὰν παραδεχθῶμεν ὅτι ἡ ἰδιότης αὐτὴ ὑφίσταται καὶ ὅταν ἓνας ἐκ τῶν παραγόντων εἶναι 1 ἢ 0, τότε θὰ εἶναι :

$3 \times 1 = 1 \times 3 = 1 + 1 + 1 = 3$ , ήτοι  $3 \times 1 = 3$   
 και  $6 \times 0 = 0 \times 6 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$ , ήτοι  $6 \times 0 = 0$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Τὸ γινόμενον ἑνὸς ἀριθμοῦ ἐπὶ τὴν μονάδα ἰσοῦται μὲ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν.

Τὸ γινόμενον δύο παραγόντων εἶναι μηδέν, ὅταν ἓνας τουλάχιστον ἐκ τῶν παραγόντων εἶναι ἴσος μὲ μηδέν.

§ 60. Πῶς πολλαπλασιάζομεν ἄθροισμα ἐπὶ ἀριθμὸν.  
*Πρόβλημα.* Εἰς ἓνα ἐργοστάσιον εἰργάσθη ἕκαστος τῶν ἐργατῶν του τὴν Δευτέραν ἐπὶ 5 ὥρας, τὴν Τρίτην ἐπὶ 6 ὥρας καὶ τὴν Τετάρτην ἐπὶ 8 ὥρας. Ἐπὶ πόσας ὥρας εἰργάσθησαν, κατὰ τὰς τρεῖς αὐτὰς ἡμέρας, 4 ἐργάται αὐτοῦ τοῦ ἐργοστασίου;

*Λύσις.* Εἶναι φανερόν ὅτι κάθε ἐργάτης εἰργάσθη  $(5 + 6 + 8)$  ὥρας ἢ 19 ὥρας καὶ ἐπομένως οἱ 4 εἰργάσθησαν:  $(5 + 6 + 8)$  ὥρας  $\times$  4 ἢ 19 ὥρας  $\times$  4 ἢ 76 ὥρας.

\*Ἄλλη λύσις. Ἐπειδὴ τὴν Δευτέραν κάθε ἐργάτης εἰργάσθη ἐπὶ 5 ὥρας, συνάγομεν ὅτι καὶ οἱ 4 εἰργάσθησαν :

5 ὥρας  $\times$  4 ἢ 20 ὥρας, τὴν Τρίτην εἰργάσθησαν ἐπὶ 6 ὥρ.  $\times$  4 ἢ 24 ὥρας καὶ τὴν Τετάρτην εἰργάσθησαν ἐπὶ 8 ὥρ.  $\times$  4 ἢ 32 ὥρας.

Ἐπομένως εἰργάσθησαν ἐν ὅλῳ :

$$(5 \times 4) \text{ ὥρ.} + (6 \times 4) \text{ ὥρ.} + (8 \times 4) \text{ ὥρ.} \\ \text{ἢ } 20 \text{ ὥρ.} + 24 \text{ ὥρ.} + 32 \text{ ὥρ. ἢ } 76 \text{ ὥρ.}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον.

\*Ἄρα θὰ εἶναι :

$$(5 + 6 + 8) \times 4 = (5 \times 4) + (6 \times 4) + (8 \times 4).$$

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα :

II. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἄθροισμα ἐπὶ ἀριθμὸν, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν καθένα προσθετέον τοῦ ἀθροίσματος ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ γινόμενα.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$(a + b + c) \times d = (a \times d) + (b \times d) + (c \times d)$$

Ἡ ἰδιότης αὕτη λέγεται ἐπιμεριστικὴ ἰδιότης.

§ 61. Πώς πολλαπλασιάζομεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄθροισμα.

*Πρόβλημα.* Μία μητέρα ἡγόρασε 5 πήχεις ὕφασμα διὰ νὰ κάμη φόρεμα τῆς μεγαλύτερας κόρης της καὶ 3 πήχεις ἀπὸ τὸ αὐτὸ ὕφασμα, διὰ νὰ κάμη φόρεμα τῆς μικροτέρας. Ἐὰν ὁ πῆχυς τοῦ ὕφασματος ἀξίζη 25 δραχμάς, πόσον θὰ πληρώσῃ δι' ὄλον τὸ ὕφασμα, τὸ ὁποῖον ἡγόρασεν;

*Λύσις.* Τὸ ὕφασμα εἶναι  $(5 + 3)$  πήχεις. Ἐπειδὴ διὰ κάθε πῆχυν πληρώνει 25 δρχ., διὰ τοὺς  $(5 + 3)$  πήχεις θὰ πληρώσῃ :

$$25 \text{ δρχ.} \times (5 + 3) \text{ ἢ } 25 \text{ δρχ.} \times 8 \text{ ἢ } 200 \text{ δρχ.}$$

*Ἄλλη λύσις.* Διὰ τὸ φόρεμα τῆς μεγαλύτερας κόρης θὰ πληρώσῃ 25 δρχ.  $\times$  5 ἢ 125 δρχ. Διὰ τὸ φόρεμα τῆς μικροτέρας θὰ πληρώσῃ 25 δρχ.  $\times$  3 ἢ 75 δρχ.

Ἐπομένως δι' ὄλον τὸ ὕφασμα θὰ πληρώσῃ :

$$(25 \times 5) \text{ δρχ.} + (25 \times 3) \text{ δρχ.}$$

$$\text{ἢ } 125 \text{ δρχ.} + 75 \text{ δρχ. ἢ } 200 \text{ δρχ.}$$

Ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον, ἔπεται ὅτι εἶναι :

$$25 \times (5 + 3) = (25 \times 5) + (25 \times 3).$$

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα:

III. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄθροισμα, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ ἕκαστον τῶν προσθετέων τοῦ ἀθροίσματος καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ γινόμενα.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$\alpha \times (\beta + \gamma + \delta) = (\alpha \times \beta) + (\alpha \times \gamma) + (\alpha \times \delta)$$

§ 62. Πώς πολλαπλασιάζομεν διαφορὰν ἐπὶ ἀριθμὸν.

*Πρόβλημα.* Ἐνας ἐργάτης λαμβάνει ἡμερομίσθιον 90 δρχ. καὶ ἐξοδεύει 60 δρχ. Πόσα χρήματα θὰ ἐξοικονομήσῃ εἰς 5 ἡμέρας;

*Λύσις.* Ὁ ἐργάτης ἐξοικονομεῖ καθ' ἡμέραν  $(90 - 60)$  δρχ. ἢ 30 δρχ. Ἐπομένως εἰς τὰς 5 ἡμέρας θὰ ἐξοικονομήσῃ :

$$(90 - 60) \text{ δρχ.} \times 5 \text{ ἢ } 30 \text{ δρχ.} \times 5 \text{ ἢ } 150 \text{ δρχ.}$$

*Ἄλλη λύσις.* Ὁ ἐργάτης κατὰ τὰς 5 ἡμέρας λαμβάνει

$$90 \text{ δρχ.} \times 5 \text{ ἢ } 450 \text{ δρχ.}$$

καὶ ἐξοδεύει 60 δρχ.  $\times$  5 ἢ 300 δρχ.

Καὶ ἐπομένως ἐξοικονομεῖ :

$$(90 \times 5) \text{ δρχ.} - (60 \times 5) \text{ δρχ.}$$

$$\text{ἢ } 450 \text{ δρχ.} - 300 \text{ δρχ. ἢ } 150 \text{ δρχ.}$$

Ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον, ἔπεται ὅτι θὰ εἶναι :

$$(90 - 60) \times 5 = (90 \times 5) - (60 \times 5).$$

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

**IV.** Διὰ τὸ νὰ πολλαπλασιάσωμεν διαφοράν ἐπὶ ἀριθμὸν, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν καὶ τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν καὶ ἀπὸ τὸ πρῶτον γινόμενον νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ δευτέρον.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$(a - b) \times \gamma = (a \times \gamma) - (b \times \gamma)$$

§ 63. Πῶς πολλαπλασιάζομεν ἄθροισμα ἐπὶ ἄθροισμα.  
*Πρόβλημα.* Πατὴρ ἔχει 3 υἱοὺς καὶ 2 θυγατέρας καὶ ἔδωκεν εἰς ἕκαστον τέκνον του 5 δρχ. τὸ Σάββατον καὶ 10 δρχ. τὴν Κυριακὴν. Πόσα χρήματα ἔδωκε τὸ ὅλον εἰς τὰ τέκνα του κατὰ τὰς δύο αὐτὰς ἡμέρας;

*Λύσις.* Εἰς κάθε τέκνον ἔδωκε τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν  
(5 + 10) δρχ. ἢ 15 δρχ.

ἐπομένως διὰ τὰ (3 + 2) ἢ 5 τέκνα του ἔδωκε :

$$(5 + 10) \text{ δρχ.} \times (3 + 2) \text{ ἢ } 15 \text{ δρχ.} \times 5 = 75 \text{ δρχ.}$$

*Ἄλλη λύσις.* Ὁ πατὴρ ἔδωκε τὸ μὲν Σάββατον εἰς τοὺς υἱοὺς (5  $\times$  3) δρχ. καὶ εἰς τὰς θυγατέρας (5  $\times$  2) δρχ., τὴν δὲ Κυριακὴν ἔδωκεν εἰς τοὺς υἱοὺς (10  $\times$  3) δρχ. καὶ εἰς τὰς θυγατέρας (10  $\times$  2) δρχ.

Ἐπομένως ἔδωκε τὸ ὅλον :

$$(5 \times 3) + (10 \times 3) + (5 \times 2) + (10 \times 2)$$

$$\text{ἢ } 15 + 30 + 10 + 20 \text{ ἢ } 75 \text{ δρχ.}$$

Ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν ἐξαγόμενα ἴσα, θὰ εἶναι :

$$(5 + 10) \times (3 + 2) = (5 \times 3) + (10 \times 3) + (5 \times 2) + (10 \times 2).$$

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

V. Διὰ τὰ πολλαπλασιάσωμεν ἄθροισμα ἐπὶ ἄθροισμα, δυνάμεθα τὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον προσθετόν τοῦ πρώτου ἄθροίσματος ἐπὶ ἕκαστον προσθετόν τοῦ δευτέρου ἄθροίσματος καὶ τὰ προσθέσωμεν τὰ γινόμενα.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$(\alpha + \beta) \times (\gamma + \delta) = (\alpha \times \gamma) + (\beta \times \gamma) + (\alpha \times \delta) + (\beta \times \delta)$$

Περίληψις τῶν ιδιοτήτων τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

1.  $\alpha \times \beta = \beta \times \alpha$
2.  $(\alpha + \beta + \gamma) \times \delta = (\alpha \times \delta) + (\beta \times \delta) + (\gamma \times \delta)$
3.  $\alpha \times (\beta + \gamma + \delta) = (\alpha \times \beta) + (\alpha \times \gamma) + (\alpha \times \delta)$
4.  $(\alpha - \beta) \times \gamma = (\alpha \times \gamma) - (\beta \times \gamma)$
5.  $(\alpha + \beta) \times (\gamma + \delta) = (\alpha \times \gamma) + (\beta \times \gamma) + (\alpha \times \delta) + (\beta \times \delta)$

### 3. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ δύο ἀκεραίων ἀριθμῶν διακρίνομεν τὰς ἑξῆς περιπτώσεις :

§ 64. Περίπτωσης 1η. Ὅταν πολλαπλασιαστὴς εἶναι 10, 100, 1000 κ.τ.λ.

*Κανὼν.* Διὰ τὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1000 κ.τ.λ., ἀρκεῖ τὰ γράψωμεν δεξιὰ τοῦ ἀριθμοῦ ἓνα, δύο, τρία κ.τ.λ. μηδενικά (§ 17).

$$\begin{aligned} \text{Οὕτω θὰ εἶναι :} \quad & 543 \times 10 = 5\,430 \\ & 75 \times 100 = 7\,500 \\ & 48 \times 1\,000 = 48\,000 \end{aligned}$$

§ 65. Περίπτωσης 2α. Οἱ δύο παράγοντες εἶναι μονοψηφιοί. *Παράδειγμα.* Νὰ εὑρεθῇ τὸ γινόμενον  $6 \times 4$ .

Ἡ εὑρεσις τοῦ γινομένου  $6 \times 4$  ἀνάγεται, κατὰ τὸν ὄρισμόν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, εἰς τὴν εὑρεσιν τοῦ ἄθροίσματος  $6+6+6+6$ . Διὰ τὰ μὴ καταφεύγωμεν εἰς τὴν πρόσθεσιν ἴσων ἀριθμῶν, διὰ τὴν εὑρεσιν τοῦ γινομένου δύο μονοψηφίων ἀριθμῶν, πρέπει νὰ γνωρί-



### ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Ὁ Πυθαγόρας ἐγεννήθη ἐν Σάμῳ ( 580 π.Χ. ). Ἰδρυσε δὲ εἰς τὴν Νότιον Ἰταλίαν τὴν περίφημον Πυθαγόρειον Φιλοσοφικὴν Σχολήν. Οὗτος καὶ οἱ μαθηταὶ του ἔδωσαν σπουδαίαν ὥθησιν εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς Θεωρητικῆς Γεωμετρίας.



ζωμεν ἀπὸ μνήμης τὰ τοιαῦτα γινόμενα. Τὰ γινόμενα δύο μονοψηφίων ἀριθμῶν περιέχονται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα :

Πυθαγόρειος πίναξ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

Τὸν πίνακα αὐτὸν σχηματίζομεν ὡς ἑξῆς :

Εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν γράφομεν κατὰ σειρὰν τοὺς ἀριθμοὺς 1, 2, 3, ... 9.

Ὑποκάτω ἐκάστου γράφομεν τὸ ἄθροισμα αὐτοῦ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὑποκάτω ἐκάστου ἀριθμοῦ τῆς δευτέρας σειρᾶς γράφομεν τὸ ἄθροισμα αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀντιστοίχου τῆς α' σειρᾶς. Ὑποκάτω ἐκάστου ἀριθμοῦ τῆς γ' σειρᾶς γράφομεν τὸ ἄθροισμα αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀντιστοίχου τῆς α' σειρᾶς. Ἐξακολουθοῦμεν δὲ κατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν, ἕως ὅτου γράψωμεν 9 σειρᾶς.

Τὸ γινόμενον δὲ π.χ.  $7 \times 4$  εὐρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν δύο γραμμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ἀρχίζει ἀπὸ τὸν 7 καὶ ἡ ἄλλη ἀπὸ τὸν 4.

§ 66. Περίπτωσης 3η. Ὅταν ὁ πολλαπλασιαστέος εἶναι πολυψήφιος καὶ ὁ πολλαπλασιαστής μονοψήφιος. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον  $256 \times 4$ .

Κατὰ τὸν ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τὸ γινόμενον  $256 \times 4$  εἶναι ἴσον μὲ  $256 + 256 + 256 + 256 = 1024$ .

Τὸ γινόμενον ὁμῶς  $256 \times 4$  εὐρίσκεται εὐκολώτερον, ἂν παρατηρήσωμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 256 ἀποτελεῖται

ἀπὸ 2 ἑκατοντάδας + 5 δεκάδας + 6 μονάδας.

Διὰ τὰ πολλαπλασιάσωμεν λοιπὸν τὸ 256 ἐπὶ 4, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν διαδοχικῶς ἕκαστον τῶν μερῶν τοῦ ἐπὶ 4 (ιδιότης II) καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ προκύπτοντα γινόμενα.

Πρακτικῶς διατάσσομεν τὴν πρᾶξιν ὡς ἑναντι καὶ

	256	
λέγομεν: 4 ἐπὶ 6	24·	γράφομεν 4 καὶ κρατοῦμεν 2·
4 ἐπὶ 5	20 καὶ 2	τὰ κρατούμενα 22·
γράφομεν 2 καὶ κρα-		
τοῦμεν 2·	4 ἐπὶ 2	8 καὶ 2 τὰ κρατούμενα 10·
γράφομεν 10.		

Ὡστε τὸ γινόμενον τοῦ  $256 \times 4$  εἶναι 1024.

#### Ἀσκήσεις

61) Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ κάτωθι πολλαπλασιασμοί :

- |                    |                   |                      |                    |
|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. $945 \times 10$ | 204 $\times$ 100  | 7 653 $\times$ 1 000 |                    |
| 2. $10 \times 348$ | $100 \times 764$  | $1\ 000 \times 945$  |                    |
| 3. $456 \times 8$  | $7\ 602 \times 7$ | $5\ 904 \times 9$    | $48\ 745 \times 6$ |
| 4. $9 \times 657$  | $8 \times 4\ 532$ | $7 \times 2\ 069$    | $6 \times 2\ 394$  |

§ 67. Περίπτωσης 4η. Ὄταν ὁ πολλαπλασιαστὴς εἶναι ἓνα σημαντικὸν ψηφίον ἀκολουθούμενον ὑπὸ μηδενικῶν.

Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρώμεν τὸ γινόμενον  $574 \times 300$ .

Κατὰ τὸν ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τὸ γινόμενον  $574 \times 300$  σημαίνει νὰ σχηματίσωμεν ἓνα ἄθροισμα 300 προσθετέων ἴσων μὲ 574.

Ἄλλὰ ἡ πρόσθεσις αὐτὴ τῶν 300 προσθετέων δύναται νὰ ἀποτελεσθῇ ἀπὸ 100 μερικὰς προσθέσεις, ἑκάστη τῶν ὁποίων θὰ περιλαμβάνη τρεῖς ἀριθμοὺς ἴσους μὲ 574. Ἐκάστη μερικὴ πρόσθεσις δίδει ἐξαγόμενον

$574 + 574 + 574 = 574 \times 3 = 1\ 722$  (3η περίπτωσης).

Τὸ τελικὸν ἐξαγόμενον θὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν μερικῶν ἐξαγομένων, δηλ. θὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα 100 ἀριθμῶν ἴσων μὲ 1 722, ἤτοι  $1\ 722 \times 100$ , τὸ ὁποῖον ἰσοῦται μὲ 172 200 (1η περίπτωσης). Ὡστε :

574	}
574	}
574	}
574	}
574	}
574	}
574	}

Διὰ τὴν ἀποπλασιαστικὴν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄλλον, τοῦ ὁποίου τὸ πρῶτον ψηφίον εἶναι σημαντικόν, τὰ δὲ ἄλλα μηδενικά, ἀποπλασιαζόμενον τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ σημαντικὸν ψηφίον καὶ δεξιὰ τοῦ γινομένου γράφομεν τόσα μηδενικά, ὅσα ἔχει ὁ ἀποπλασιαστής.

### Ἀσκήσεις

62 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ κάτωθι ἀποπλασιασμοί :

$$1. \quad 78 \times 600 \quad 493 \times 7\,000 \quad 2\,965 \times 8\,000$$

$$2. \quad 5\,000 \times 345 \quad 300 \times 1\,956 \quad 9\,000 \times 106$$

§ 68. Περίπτωσης 5η. (Γενικὴ περίπτωση). Ὅταν καὶ οἱ δύο παράγοντες εἶναι πολυψήφιοι. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρωμεν τὸ γινόμενον  $6\,763 \times 248$ .

Ἐπειδὴ  $248 = 200 + 40 + 8$ , θὰ εἶναι :

$$6\,763 \times 248 = 6\,763 \times (200 + 40 + 8) \quad (\S 61)$$

$$= 6\,763 \times 200 + 6\,763 \times 40 + 6\,763 \times 8.$$

Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀποπλασιασῶμεν τὸν  $6\,763$  διαδοχικῶς ἐπὶ  $200$ , ἐπὶ  $40$  καὶ ἐπὶ  $8$  καὶ νὰ προσθῶμεν τὰ μερικὰ γινόμενα.

Θὰ ἔχωμεν λοιπὸν :

$$6\,763 \times 8 = 54\,104 \text{ μονάδας (3η περίπτωση)}$$

$$6\,763 \times 40 = 270\,520 \quad \gg \quad (4η περίπτωση)$$

$$6\,763 \times 200 = 1\,352\,600 \quad \gg \quad (4η περίπτωση)$$

$$\text{Σύνολον} = 1\,677\,224 \text{ μονάδας.}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὁ γνωστὸς κανὼν τοῦ ἀποπλασιασμοῦ πολυψηφίου ἀριθμοῦ ἐπὶ πολυψήφιο.

### Διάταξις τῆς πράξεως

	$6\,763$	πολλαπλασιαστέος
	$248$	πολλαπλασιαστής
$6\,763 \times 8 = 54\,104$	$54\,104$	α' μερικὸν γινόμενον
$6\,763 \times 40 = 270\,520$	$270\,52$	β' » »
$6\,763 \times 200 = 1\,352\,600$	$1\,352\,6$	γ' » »
	$1\,677\,224$	ὄλικὸν γινόμενον

§ 69. **Ίδιαίτεροι περιπτώσεις.** 1η. "Όταν ὁ πολλαπλασιαστής περιέχει ἓνα ἢ περισσότερα ἐνδιάμεσα μηδενικά ( καθὼς ὁ 3007 ), παραλείπομεν τὰ μερικὰ γινόμενα, τὰ ὁποῖα ἀντιστοιχοῦν εἰς αὐτά. Πρέπει ὅμως νὰ προσέχωμεν νὰ γράφωμεν τὸ ἐπόμενο μερικὸν γινόμενον εἰς τὴν κατάλληλον θέσιν.

2α. "Όταν ὁ ἓνας ἢ καὶ οἱ δύο παράγοντες λήγουν εἰς μηδενικά, πολλαπλασιάζομεν αὐτοὺς χωρὶς νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὰ μηδενικά. Δεξιὰ ὅμως τοῦ τελικοῦ γινομένου πρέπει νὰ γράφωμεν τὰ παραλειφθέντα μηδενικά.

### Ἀσκήσεις

63 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ κάτωθι πολλαπλασιασμοί :

- |    |                          |                      |                         |
|----|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | $3\ 764 \times 75$       | $4\ 793 \times 236$  | $128 \times 7\ 432$     |
| 2. | $704 \times 398$         | $2\ 006 \times 847$  | $8\ 007 \times 309$     |
| 3. | $245\ 000 \times 3\ 500$ | $270 \times 18\ 000$ | $84\ 006 \times 9\ 300$ |

64 ) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα κατὰ δύο τρόπους :

- |    |                        |                          |
|----|------------------------|--------------------------|
| 1. | $(5 + 7 + 8) \times 3$ | $(10 + 5 + 11) \times 6$ |
| 2. | $4 \times (8 + 9 + 6)$ | $7 \times (25 + 13 + 9)$ |

§ 70. **Δοκιμὴ πολλαπλασιασμοῦ.** Διὰ νὰ κάμωμεν τὴν δοκιμὴν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, θέτομεν τὸν πολλαπλασιαστήν εἰς τὴν θέσιν τοῦ πολλαπλασιαστέου καὶ τὰνάπαλιν καί, ἂν εὕρωμεν τὸ αὐτὸ γινόμενον, τὸ ὁποῖον εὐρήκαμεν προηγουμένως κατὰ τὸν πρῶτον πολλαπλασιασμόν, ἡ πρᾶξις ἐγίνε πιθανὸν χωρὶς λάθος (§ 58).

### 4. ΣΥΝΤΟΜΙΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 71. **Συντομία πράξεως.** "Όταν ὁ πολλαπλασιαστέος ἔχη ὀλιγώτερα σημαντικὰ ψηφία ἀπὸ τὸν πολλαπλασιαστήν εἶναι προτιμότερον νὰ ἀλλάσωμεν τὴν τάξιν των, διότι τότε κάμνομεν ὀλιγώτερας πράξεις. Οὕτως εἰς τὰ παραδείγματα :

$$35 \times 4\ 769$$

$$3\ 040 \times 275$$

$$444 \times 68$$

είναι προτιμότερον νὰ ἀλλάξωμεν τὴν τάξιν τῶν παραγόντων, διὰ νὰ εὐρώμεν συντόμως τὸ γινόμενόν των.

**§ 72. Εὐρεσις τοῦ γινομένου δύο ἀριθμῶν.** Διὰ νὰ εὐρώμεν ἀπὸ μνήμης τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἓνας εἶναι μονοψήφιος, πολλαπλασιάζομεν τὰς μονάδας τῶν διαφόρων τάξεων τοῦ πολυψηφίου ἀριθμοῦ ἐπὶ τὸν ἄλλον ἀριθμὸν, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς ἀνωτάτης τάξεως καὶ προσθέτομεν τὰ μερικὰ γινόμενα.

Π.χ. Διὰ νὰ εὐρώμεν τὸ γινόμενον  $64 \times 3$ , λέγομεν :

$3 \times 6$  18  $3 \times 4$  12· 180 καὶ 12 192.

Ἐπίσης διὰ νὰ εὐρώμεν τὸ γινόμενον  $254 \times 7$ , λέγομεν :  $7 \times 2$  14  
 $7 \times 5$  35  $7 \times 4$  28 καὶ 1 400 1 750· 7  $\times$  4 28 καὶ 1 750 1 778.

**§ 73.** Ἐκτὸς τῆς προηγουμένης περιπτώσεως, ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι περιπτώσεις, κατὰ τὰς ὁποίας τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν δύναται νὰ εὐρεθῆ νοερώς χάρις εἰς μερικὰ τεχνάσματα, τὰ ὁποία εἶναι καλὸν νὰ γνωρίζωμεν, διὰ νὰ τὰ ἐφαρμόζωμεν, ὅταν εἶναι ἀνάγκη.

1ον. *Πολλαπλασιασμός ἐπὶ δύο.* Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ 2, προσθέτομεν τὸν ἀριθμὸν εἰς τὸν ἑαυτὸν του. Π.χ.  $256 \times 2 = 256 + 200 + 50 + 6$ . Λέγομεν : 256 456 506 512.

Ὅταν ὁ ἀριθμὸς εἶναι πολυψήφιος τὸν χωρίζομεν συνήθως εἰς τμήματα τοιαῦτα, ὥστε νὰ ἀποφεύγωμεν, ὅσον τὸ δυνατόν, τὰ κρατούμενα, καὶ κατόπιν διπλασιάζομεν ἕκαστον τμήμα.

Οὕτω διὰ νὰ διπλασιάσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς:

734                      263                      2328                      4153                      35 417

τοὺς χωρίζομεν εἰς τὰ κάτωθι τμήματα, τὰ ὁποία διπλασιάζομεν :

7 34                      26 3                      23 28                      4 15 3                      35 4 17

14 68                      52 6                      46 56                      8 30 6                      70 8 34

2ον. *Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 4.* Διπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν καὶ ἔπειτα διπλασιάζομεν τὸ ἔξαγόμενον. Π.χ.  $435 \times 4$ . Λέγομεν : 870 1740

3ον. *Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 9, 99, 999 κ.τ.λ.* Πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1000 κ.τ.λ. καὶ ἀπὸ τοῦ ἔξαγομένου ἀφαιροῦμεν τὸν ἀριθμὸν αὐτόν. Π.χ.

$34 \times 99 = 34 \times (100 - 1)$ . Λέγομεν: 3 400 πλὴν 34 ἴσον 3 366.

4ον. *Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 11, 101, 1001....* Πολλαπλασιάζο-

ζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1000... καὶ προσθέτομεν εἰς τὸ ἐξα-  
γόμενον τὸν ἀριθμὸν αὐτόν. Π.χ.

$$64 \times 101. \text{ Λέγομεν : } 6\ 400 \text{ καὶ } 64 \text{ ἴσον } 6\ 464.$$

*Σημείωσις.* Τὸ γινόμενον ἐνὸς διψηφίου ἀριθμοῦ ἐπὶ 11 εὐρίσκε-  
ται ἀμέσως ὡς ἐξῆς :

Προσθέτομεν τὰ δύο ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ καὶ ἐὰν τὸ ἄθροισμα  
αὐτῶν δὲν ὑπερβαίνει τὸ 9, τὸ θέτομεν μεταξύ τῶν δύο ψηφίων.

Οὕτως εἰς τὸ γινόμενον  $53 \times 11$  λέγομεν 5 καὶ 3 8· θέτομεν τὸ  
8 μεταξύ τῶν ψηφίων 5 καὶ 3 καὶ εὐρίσκομεν τὸν ἀριθμὸν 583. Τὸ  
γινόμενον εἶναι 583.

Ἐὰν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων τοῦ ὑπερβαίνει τὸ 9, θέτομεν  
μεταξύ αὐτῶν τὸ ψηφίον τῶν μονάδων τοῦ ἄθροίσματος καὶ αὐξά-  
νομεν κατὰ μονάδα τὸ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ.

Οὕτω  $57 \times 11 = 627$ , διότι τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων  
εἶναι 12. Ἐπομένως τὸ γινόμενον εἶναι 627.

Τὸ γινόμενον ἐνὸς πολυψηφίου ἐπὶ 11 π.χ. τοῦ  
 $5\ 638 \times 11$  εὐρίσκεται ὡς φαίνεται παραπλευρῶς.

Ἀπὸ τὴν διάταξιν αὐτὴν βλέπομεν, ὅτι εὐρίσκομεν  
συντομώτερον τὸ ἐξαγόμενον ὡς ἐξῆς :

$$\begin{array}{r} 5\ 638 \\ \phantom{5\ 638} 11 \\ \hline 5\ 638 \\ \phantom{5\ 638} 56\ 38 \\ \hline 62\ 018 \end{array}$$

Γράφομεν τὸ ψηφίον τῶν ἀπλῶν μονάδων τοῦ πολλαπλασια-  
στέου. Ἀριστερὰ αὐτοῦ γράφομεν τὸ ἄθροισμα κάθε ψηφίου τοῦ πολ-  
λαπλασιαστέου μὲ τὸ προηγούμενόν του, ἀρχόμενοι ἀπὸ τὰς ἀπλᾶς  
μονάδας καὶ λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν τὰ κρατούμενα. Τέλος γράφομεν  
τὸ πρῶτον ψηφίον τοῦ πολλαπλασιαστέου ἢ τὸ ἄθροισμα αὐτοῦ  
καὶ τοῦ κρατουμένου, ἂν ὑπάρχη.

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

65) Νὰ εὐρεθοῦν ἀπὸ μνήμης τὰ γινόμενα :

- |    |                 |                 |                    |                   |
|----|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1. | $78 \times 5$   | $127 \times 3$  | $329 \times 5$     | $495 \times 9$    |
| 2. | $745 \times 2$  | $623 \times 2$  | $8\ 354 \times 2$  | $5\ 795 \times 2$ |
| 3. | $128 \times 4$  | $375 \times 4$  | $1\ 567 \times 4$  |                   |
| 4. | $74 \times 9$   | $325 \times 9$  | $957 \times 9$     |                   |
| 5. | $27 \times 99$  | $47 \times 999$ | $75 \times 999$    |                   |
| 6. | $27 \times 11$  | $48 \times 11$  | $4\ 238 \times 11$ |                   |
| 7. | $24 \times 101$ | $64 \times 101$ | $94 \times 1\ 001$ |                   |

## 5. ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

§ 74. *Πρόβλημα 1ον.* Ένας έργατης λαμβάνει ήμερομίσθιον 125 δρχ. Πόσον θά λάβη εις 4 ήμέρας;

*Λύσις.* Είναι προφανές ότι εις 4 ήμέρας θά λάβη 4 φορές τὰς 125 δρχ., ήτοι:  $125 \text{ δρχ.} \times 4 = 500 \text{ δρχ.}$

*Πρόβλημα 2ον.* Τò μέτρον ένός ύφάσματος κοστίζει 64 δρχ. Πόσον κοστίζουν τὰ 15 μέτρα του αὐτοῦ ύφάσματος;

*Λύσις.* Είναι προφανές ότι τὰ 15 μέτρα θά κοστίσουν 15 φορές τὰς 64 δρχ., δηλ.  $64 \text{ δρχ.} \times 15 = 960 \text{ δρχ.}$

§ 75. Εις τὰ δύο άνωτέρω προβλήματα παρατηρούμεν ότι μάς δίδεται ή τιμή τής μιᾶς μονάδος (δηλ. τò κέρδος του έργατου εις 1 ήμέραν ή ή άξία του 1 μέτρου) και μάς ζητεΐται ή τιμή τών πολλών μονάδων (δηλ. τò κέρδος εις 4 ήμέρας ή ή άξία τών 15 μέτρων), και ότι δια νά εύρωμεν τὰ ζητούμενα έπολλαπλασιάσαμεν τήν τιμήν τής μιᾶς μονάδος επί τόν άριθμόν τών πολλών μονάδων.

Έκ τών άνωτέρω συνάγομεν ότι :

*Κανών.* "Όταν μάς δίδεται ή τιμή τής μιᾶς μονάδος και θέλωμεν νά εύρωμεν τήν τιμήν πολλών μονάδων, όμοειδών προς αὐτήν, πολλαπλασιάζομεν τήν τιμήν τής μιᾶς μονάδος επί τόν άριθμόν τών πολλών μονάδων.

Κατὰ τὰ άνωτέρω, αν ή τιμή τής μιᾶς μονάδος είναι  $\alpha$  δραχμαί, ή τιμή  $\beta$  όμοειδών μονάδων είναι :  $\alpha \times \beta$  ή  $\alpha \cdot \beta$  δραχμαί.

*Παρατήρησις.* "Όταν λέγωμεν ότι ένας άριθμός είναι τιμή άλλου, δέν έπεται ότι πρέπει νά παριστάνη αὐτός ό άριθμός πάντοτε χρήματα. Π.χ. εάν δώσωμεν 2 χλγ. βουτύρου και λάβωμεν 5 χλγ. έλαιού, τὰ 2 χλγ. βουτύρου είναι ή τιμή τών 5 χλγ. έλαιού και άντιστρόφως τὰ 5 χλγ. έλαιού είναι ή τιμή 2 χλγ. βουτύρου.

### Προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ

Α'. (Ό μ ά ς. 66) Πόσον τιμῶνται 12 μέτρα ένός ύφάσματος προς 145 δρχ. τò μέτρον ;

67) Θέλουμεν νὰ προσθέσωμεν 350 προσθετέους ἴσους ἕκαστον μὲ 2 600. Ποῖον θὰ εἶναι τὸ ἄθροισμὰ των ;

68) Τροχὸς ἐμάξης κάμνει 45 στροφὰς κατὰ λεπτὸν τῆς ὥρας. Πόσας στροφὰς θὰ κάμει εἰς 1 ὥραν ;

69) Ἡ Φυσικὴ διδάσκει ὅτι ὁ ἦχος διατρέχει εἰς τὸν ἀέρα 340 μέτρα εἰς ἓνα δευτερόλεπτον. Εἰς μίαν Ἐθνικὴν ἑορτὴν ἕνας παρατηρητὴς ἔβλεπε τὴν λάμπιν τῶν ἐκπυρσοκροτούντων πυροβόλων τοῦ Λυκαβηττοῦ καὶ ἤκουε τὸν κρότον των μετὰ 15 δευτερόλεπτα. Νὰ εὕρητε πόσον μακρὰν ἀπὸ τὸ πυροβολεῖον τοῦ Λυκαβηττοῦ ἦτο ὁ παρατηρητὴς ἐκεῖνος.

Β' Ὁμάς. 70) Ἡγόρασέ τις 125 χιλιογρ. ἐλαίου πρὸς 22 δρχ. τὸ χιλιογρ. καὶ 245 χιλιογρ. ζυμαρικῶν πρὸς 12 δρχ. τὸ χιλιογρ. Πόσον ἐπλήρωσεν ἐν ὄλῳ;

71) Γεωργὸς ἠγόρασεν 145 χλγ. λίπασμα πρὸς 7 δρχ. τὸ χλγ. Ἀπέναντι τῆς ἀξίας τοῦ λιπάσματος ἔδωσεν 79 χιλγ. σίτου πρὸς 3 δρχ. τὸ χλγ. καὶ 467 δρχ. Πόσα ὀφείλει ἀκόμη;

72) Ἐργολάβος χρησιμοποιεῖ 3 ἐργάτας, τοὺς ὁποίους πληρώνει μὲ ἡμερομίσθιον 83 δρχ., 85 δρχ., καὶ 90 δρχ. ἀντιστοίχως. Πόσον πληρώνει καθ' ἑβδομάδα (6 ἡμερῶν ἐργασίας);

73) Ἐνα ἐργοστάσιον χρησιμοποιεῖ 28 ἐργάτιδας. Αἱ 4 λαμβάνουν ἀπὸ 68 δρχ. ἡμερησίως, αἱ 12 λαμβάνουν ἀπὸ 63 δρχ. καὶ αἱ ὑπόλοιποι ἀπὸ 62 δρχ. Πόσα ἐξοδεύει ἡμερησίως τὸ ἐργοστάσιον δι' ἡμερομίσθια;

Γ' Ὁμάς. 74) Ἀτμόπλοιον ἐχρειάσθη διὰ νὰ φθάσῃ ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν 42 ὥρας. Τὰς πρῶτας 27 ὥρας ἔτρεχε 13 μίλια τὴν ὥραν, τὰς δὲ ἄλλας ὥρας ἔτρεχε 15 μίλια τὴν ὥραν. Πόσα μίλια ἀπέχει ἡ Ἀλεξάνδρεια ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ;

75) Δύο ποδηλάται ἀναχωροῦν ταυτοχρόνως ἐκ δύο πόλεων, αἱ ὁποῖαι ἀπέχουν 235 χλμ καὶ διευθύνονται πρὸς συνάντησίν των. Πόσον θὰ ἀπέχουν μεταξύ των μετὰ 4 ὥρας, ἐὰν ὁ πρῶτος διανύῃ 16 χλμ. τὴν ὥραν καὶ ὁ δεύτερος 12 χλμ. τὴν ὥραν;

76) Ἐνας χωρικός ἔχει 2 ἀγελάδες καὶ κάθε μία δίδει ἐπὶ ἓνα μῆνα 8 χλγ. γάλα τὴν ἡμέραν, τὸ ὅποιον πωλεῖ πρὸς 3 δρχ. τὸ χλγ. Ἐχει ὁμως ἐξοδα τὴν ἡμέραν, διὰ τὴν διατροφήν των, 8 δρχ. διὰ κάθε ἀγελάδα. Πόσας δραχμὰς ἐκέρδισε τὸν μῆνα ἐκεῖνον (30 ἡμ) ἀπὸ τὸ γάλα;

Δ' 'Ο μ ά ς . 77) 'Ο π ή χ υ ς ἑνὸς ὑφάσματος ἀξίζει α δραχμὰς. Ἐὰν ἀγοράσωμεν τὴν μίαν ἡμέραν β π ή χ υ ς καὶ τὴν ἄλλην γ π ή χ υ ς, πόσας δραχμὰς θὰ δώσωμεν ;

78) Νὰ εὕρητε τὰ ἐξαγόμενα τῶν πράξεων :

$$1. \quad (3 \times 15) + (19 \times 27) + (12 \times 4)$$

$$2. \quad (143 \times 14) + (18 \times 20 \times 2) + (12 \times 5 \times 13)$$

## 6. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

§ 76. *Πρόβλημα.* 12 ἐργάται ἐργάζονται 5 ἡμέρας τὴν ἐβδομάδα. Πόσας δραχμὰς θὰ λάβουν, ἐὰν ἐργασθῶν ἐπὶ 8 ἐβδομάδας μὲ ἡμερομίσθιον 60 δραχμῶν ;

*Λύσις.* Οἱ 12 ἐργάται λαμβάνουν :

εἰς 1 ἡμέραν 60 δραχ.  $\times$  12 ἢ 720 δραχ.

εἰς 1 ἐβδομάδα τῶν 5 ἐργασίμων ἡμερῶν.

$$720 \text{ δραχ.} \times 5 \text{ ἢ } 3\,600 \text{ δραχ.}$$

εἰς 8 ἐβδομάδας

$$3\,600 \text{ δραχ.} \times 8 \text{ ἢ } 28\,800 \text{ δραχ.}$$

*Ἐπισημῶς.* Παρατηροῦμεν ὅτι, διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ζητούμενον, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸν 60 ἐπὶ 12, τὸ γινόμενον αὐτῶν 720 ἐπὶ 5, τὸ νέον γινόμενον 3 600 ἐπὶ 8. Τὸ τελικὸν ἐξαγόμενον 28 800 λέγεται **γινόμενον πολλῶν παραγόντων** καὶ παρίσταται ὡς ἐξῆς :  $60 \times 12 \times 5 \times 8$ . Ὡστε :

**Γινόμενον πολλῶν παραγόντων** λέγεται τὸ ἐξαγόμενον, τὸ ὁποῖον εὕρισκομεν, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν πρῶτον παράγοντα ἐπὶ τὸν δεύτερον, τὸ γινόμενον αὐτῶν ἐπὶ τὸν τρίτον, τὸ νέον γινόμενον ἐπὶ τὸν τέταρτον καὶ οὕτω καθ' ἐξῆς, μέχρις ὅτου λάβωμεν ὅλους τοὺς παράγοντας.

*Παρατήρησις.* Ὅπως τὸ γινόμενον δύο ἀφηρημένων παραγόντων εἶναι ἀφηρημένον, οὕτω καὶ τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων εἶναι ἀφηρημένον, ὅταν ὅλοι οἱ παράγοντες αὐτοῦ εἶναι ἀφηρημένοι. Ὅταν ὁμως ὅλοι οἱ ἀριθμοὶ ἑνὸς προβλήματος εἶναι συγκεκριμένοι, μόνον ὁ ὁμοειδῆς μὲ τὸ ζητούμενον μένει συγκεκριμένος.

§ 77. *Ἰδιότης I (τῆς ἀντιμεταθέσεως).* Εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα εὕρομεν ὅτι οἱ 12 ἐργάται θὰ λάβουν :

$$60 \text{ δραχ.} \times 12 \times 5 \times 8 = 28\,800 \text{ δραχ.}$$

Το πρόβλημα όμως αυτό δυνάμεθα νὰ λύσωμεν καὶ ὡς ἑξῆς :

Ὁ ἕνας ἐργάτης λαμβάνει :

εἰς 1 ἑβδομάδα τῶν 5 ἡμερῶν 60 δρχ.  $\times$  5 ἢ 300 δρ.

καὶ εἰς 8 ἑβδομάδας 300 »  $\times$  8 ἢ 2 400 »

οἱ 12 ἐργάται θὰ λάβουν 2 400 »  $\times$  12 ἢ 28 800 »

Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον 28 800 δρχ. ἄρα θὰ εἶναι  $60 \times 12 \times 5 \times 8 = 60 \times 5 \times 8 \times 12$ .

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

**I. Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀλλάξωμεν τὴν τάξιν τῶν παραγόντων του.**

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$\alpha \times \beta \times \gamma \times \delta = \beta \times \delta \times \gamma \times \alpha = \delta \times \gamma \times \alpha \times \beta$$

Ἡ ιδιότης αὕτη λέγεται **ιδιότης τῆς ἀντιμεταθέσεως**.

*Ἐφαρμογή.* Ἀλλάσσοντες τὴν θέσιν τῶν παραγόντων, δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν πολλακίς νοερῶς μερικὰ γινόμενα.

Οὕτω, διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ γινόμενον  $4 \times 17 \times 25$ , ἀντὶ νὰ εἴπωμεν  $4 \times 17 = 68$ ,  $68 \times 25 = 1 700$ , δυνάμεθα, ἐφαρμόζοντας τὴν προηγουμένην ιδιότητα, νὰ γράψωμεν  $4 \times 25 \times 17$  καὶ νὰ εἴπωμεν  $4 \times 25 = 100$ ,  $100 \times 17 = 1 700$ .

#### Ἄσκησεις

79 ) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα :

1.  $3 \times 2 \times 5$ ,  $8 \times 4 \times 25$

2.  $8 \times 9 \times 6 \times 4$ ,  $15 \times 7 \times 4 \times 9$ ,  $8 \times 9 \times 5 \times 10$

3.  $35 \times 403 \times 1 604$ ,  $8 \times 12 \times 809 \times 10$ ,  $125 \times 4 \times 70 \times 41$

80 ) Νὰ ὑπολογισθῆ τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$ , ἔαν

1ον  $\alpha = 8$   $\beta = 4$   $\gamma = 5$   $\delta = 12$

2ον  $\alpha = 25$   $\beta = 9$   $\gamma = 4$   $\delta = 9$

**§ 78. Ἰδιότης II.** Τὸ πρόβλημα τῆς § 76 λύομεν καὶ ὡς ἑξῆς :  
*3η Λύσις.* Οἱ 12 ἐργάται λαμβάνουν καθ' ἡμέραν :

$$60 \text{ δρχ.} \times 12$$

καὶ ἐπειδὴ εἰργάσθησαν  $5 \times 8 = 40$  ἡμέρας θὰ λάβουν ἐν ὅλῳ  
 $60 \text{ δρχ.} \times 12 \times 40 = 28 800 \text{ δρχ.}$

Συγκρίνοντας τὴν λύσιν αὐτὴν μετὴν α' λύσιν (§ 76) συνάγομεν ὅτι:  $60 \times 12 \times 5 \times 8 = 60 \times 12 \times 40$ . Ὡστε:

**II. Εἰς γινόμενον πολλῶν παραγόντων δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν δύο ἢ περισσοτέρους παράγοντας μετὸ γινόμενόν των.**

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$\alpha \times \beta \times \gamma \times \delta = \alpha \times (\beta \times \gamma) \times \delta$$

*Ἐφαρμογή.* Ἐφαρμόζοντες τὴν ιδιότητα αὐτὴν δυνάμεθα νὰ εὐρώμεν, νοερῶς τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων. Οὕτω, διὰ νὰ εὐρώμεν τὸ γινόμενον:  $2 \times 7 \times 4 \times 5 \times 25$ , ἀντὶ νὰ πολλαπλασιάσωμεν κατὰ σειρὰν τοὺς παράγοντας, δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν τοὺς παράγοντας 2 καὶ 5, καθὼς καὶ τοὺς 4 καὶ 25, διὰ τοῦ γινομένου των, καὶ εὐρίσκομεν τὸ γινόμενον  $7 \times 10 \times 100 = 7\,000$ .

§ 79. Ἰδιότης III. Εἶδομεν προηγουμένως ὅτι:

$$60 \times 12 \times 5 \times 8 = 60 \times 12 \times 40.$$

\*Ἄρα θὰ εἶναι καί:  $60 \times 12 \times 40 = 60 \times 12 \times 5 \times 8$ . Ὡστε:

**III. Εἰς γινόμενον παραγόντων δυνάμεθα νὰ ἀντικαταστήσωμεν παράγοντά τινα δι' ἄλλων, οἱ ὅποιοι νὰ ἔχουν αὐτὸν ὡς γινόμενον.**

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$\alpha \times (\beta \times \gamma) \times \delta = \alpha \times \beta \times \gamma \times \delta$$

*Ἐφαρμογή.* Ἀντικαθιστῶντες παράγοντά τινα γινομένου δι' ἄλλων, οἱ ὅποιοι ἔχουν αὐτὸν ὡς γινόμενον, δυνάμεθα νὰ εὐρώμεν νοερῶς μερικὰ γινόμενα. Οὕτω θὰ ἔχωμεν:

$$125 \times 16 = 125 \times 8 \times 2 = 1\,000 \times 2 = 2\,000$$

\*Ὁμοίως  $45 \times 18 = 45 \times 2 \times 9 = 90 \times 9 = 810$

§ 80. Πῶς πολλαπλασιάζομεν γινόμενον παραγόντων ἐπὶ ἀριθμόν. *Πρόβλημα.* Ἐνας γεωργὸς ἐκαλλιέργησε 3 ἀγρούς ἀπὸ 8 στρέμματα τὸν καθένα. Κάθε στρέμμα ἀπέδωκε 200 χγρ. σίτου· ἐπώλησε δὲ τὸν σῖτον πρὸς 28 δεκάλεπτα τὸ χλγ. Πόσα χρήματα ἔλαβε;

*Λύσις.* Οί τρεῖς ἀγροὶ εἶχον 8 στρέμματα  $\times$  3 ἢ 24 στρέμματα. Ἐπειδὴ ἀπὸ κάθε στρέμμα παρήχθησαν 200 χλγ. σίτου, ἀπὸ τὰ 24 στρέμματα παρήχθησαν  $200 \times 24$  χλγ.

Ἀπὸ αὐτὰ ἔλαβε 28 δεκάλεπτα  $\times$  200  $\times$  24 ἢ 134 400 δεκάλ.

*Ἄλλη λύσις.* Ὁ ἕνας ἀγρὸς ἀπέδωσε 200 χλγ.  $\times$  8. Ἀπὸ αὐτὰ ἔλαβε 28 δκλ  $\times$  (200  $\times$  8) ἢ 28  $\times$  200  $\times$  8 δκλ.

Ἀφοῦ ἀπὸ τὸν ἕνα ἀγρὸν ἔλαβε (28  $\times$  200  $\times$  8) δκλ, ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἀγροὺς ἔλαβε:

$$(28 \times 200 \times 8) \times 3 \text{ ἢ } 44\,800 \times 3 \text{ ἢ } 134\,400 \text{ δκλ.}$$

Ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὰ αὐτὰ ἐξαγόμενα, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν:  $(28 \times 200 \times 8) \times 3 = 28 \times 200 \times 24$ .

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

IV. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν γινόμενον πολλῶν παραγόντων ἐπὶ ἀριθμὸν, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕνα μόνον ἐκ τῶν παραγόντων τοῦ γινομένου ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν, τοὺς δὲ ἄλλους νὰ ἀφήσωμεν ὅπως ἔχουν.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$(a \times b \times c) \times d = a \times (b \times d) \times c$$

§ 81. Πῶς πολλαπλασιάζομεν γινόμενα. *Πρόβλημα.* Γεωργὸς ἔχει τρεῖς ἀγροὺς, ἕκαστος τῶν ὁποίων εἶναι 8 στρέμματα. Διὰ τὴν λίπανσιν αὐτῶν χρειάζεται 2 σάκκους λιπάσματος κατὰ στρέμμα. Ἐὰν ὁ σάκκος τοῦ λιπάσματος τιμᾶται 50 δρχ., νὰ εὐρεθῇ πόσα χρήματα πρέπει νὰ δαπανήσῃ διὰ τὴν λίπανσιν.

*Λύσις.* Τὰ στρέμματα ἦσαν τὸ ὅλον (8  $\times$  3). Διὰ τὴν λίπανσιν ἐνὸς στρέμματος πρέπει νὰ δαπανήσῃ (50  $\times$  2) δρχ. Ἐπομένως διὰ τὰ (8  $\times$  3) στρέμματα θὰ δαπανήσῃ:

$$(50 \times 2) \text{ δρχ. } \times (8 \times 3) \text{ ἢ } 100 \text{ δρχ. } \times 24 \text{ ἢ } 2\,400 \text{ δρχ.}$$

*Ἄλλη λύσις.* Διὰ τὰ (8  $\times$  3) στρέμματα χρειάζεται:

$$2 \text{ σάκ. } \times (8 \times 3) \text{ ἢ } 2 \times 8 \times 3 \text{ σάκκους λιπάσματος.}$$

Διὰ τοὺς σάκκους αὐτοὺς πρέπει νὰ πληρώσῃ:

$$50 \text{ δρχ. } \times (2 \times 8 \times 3) \text{ ἢ } 50 \times 2 \times 8 \times 3 \text{ δρχ. ἢ } 2\,400 \text{ δρχ.}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὰ αὐτὰ ἐξαγόμενα. Θὰ εἶναι λοιπόν:  $(50 \times 2) \times (8 \times 3) = 50 \times 2 \times 8 \times 3$ .

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

V. Διὰ τὸ νὰ πολλαπλασιάσωμεν γινόμενα, σχηματίζομεν ἕνα νέον γινόμενον, τὸ ὁποῖον περιέχει τοὺς παράγοντας τῶν γινόμενων καὶ μόνον αὐτοὺς.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$(\alpha \times \beta \times \gamma) \times (\delta \times \epsilon) = \alpha \times \beta \times \gamma \times \delta \times \epsilon$$

Περίληψις τῶν ιδιοτήτων τοῦ γινομένου πολλῶν παραγόντων

1.	$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$	$= \gamma \cdot \alpha \cdot \delta \cdot \beta$
2.	$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$	$= \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma$
3.	$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot \delta$	$= \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma$
4.	$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\delta \cdot \epsilon)$	$= \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$

### Ἀσκήσεις καὶ προβλήματα

81) Νὰ εὑρητε νοερῶς τὰ κάτωθι γινόμενα:

$$\begin{array}{ccc} 50 \times 16 & 25 \times 12 & 125 \times 32 \\ 150 \times 12 & 35 \times 18 & 120 \times 35 \end{array}$$

82) Ἐνα κιβώτιον ἔχει 6 στρώματα σάπωνος. Κάθε στρώμα ἔχει 4 σειρὰς· κάθε σειρὰ ἔχει 5 πλάκας σάπωνος καὶ κάθε πλάξ ἀξίζει 2 δρχ. Νὰ εὑρητε τὴν ἀξίαν τοῦ σάπωνος τοῦ κιβωτίου αὐτοῦ.

83) Μία κοινότης ἔχει 80 οἰκογενεῖας. Κάθε οἰκογενειάρχης ὑπεχρεώθη νὰ ἐργασθῆ 8 ἡμέρας διὰ τὴν κατασκευὴν μιᾶς ὁδοῦ. Τὸ ἡμερομίσθιον ἦτο 62 δραχμ. Νὰ εὑρητε πόσα χρήματα ἐξοικονόμησε τὸ ταμεῖον τῆς κοινότητος μετὰ αὐτὴν τὴν προσωπικὴν ἐργασίαν.

84) 15 πυροβολαρχίαι βάλλουν ἐπὶ 5 λεπτὰ τῆς ὥρας μίαν βολὴν καταγιγισμού. Ἐκαστον πυροβόλον ρίπτει 12 ὀβίδας κατὰ λεπτόν. Νὰ εὑρεθῆ πόσας ὀβίδας ἔρριψαν αἱ πυροβολαρχίαι, ἐὰν ἐκάστη αὐτῶν ἔχη 4 πυροβόλα.



δτε μένουν 12 βῶλοι. Τέλος λαμβάνομεν καὶ τὴν δωδεκάδα, ἢ ὅποια ἔμεινε καὶ τὴν θέτομεν ὑποκάτω τῆς δευτέρας.

Ὁ Παῦλος ἔχει λοιπὸν 3 δωδεκάδας βῶλων, δηλ. τόσας δωδεκάδας, ὅσας φορὰς ἀφηρέσαμεν τοὺς 12 ἀπὸ τοὺς 36 βῶλους.

Ἡ πράξις αὕτη λέγεται πάλιν **διαίσεις**.

Διαφέρει ὁμως ἀπὸ τὴν προηγουμένην κατὰ τὸ ὅτι ἐδῶ δὲν μοιράζομεν, ὅπως εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα, ἓνα ἀριθμὸν εἰς ἴσα μέρη, ἀλλὰ **μετροῦμεν**, διὰ διαδοχικῶν ἀφαιρέσεων, πόσας φορὰς χωρεῖ ἓνας ἀριθμὸς (12 βῶλοι) εἰς ἄλλον δοθέντα ἀριθμὸν (36 βῶλους). Διὰ τοῦτο ἡ διαίσεις αὕτη λέγεται ἰδιαιτέρως **μέτρησις**. Ὡστε:

**Διαίσεις (μέτρησις) εἶναι ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν πόσας φορὰς χωρεῖ ἓνας ἀριθμὸς εἰς ἄλλον.**

Ἐδῶ **διαιρέτεός** εἶναι ὁ 36, **διαιρέτης** ὁ 12, καὶ τὸ **πηλίκον** 3.

§ 84. Γενικὸς ὀρισμὸς τῆς διαίσεως. *Παράδειγμα.* Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι ἔχομεν τώρα νὰ μοιράσωμεν ἐξ ἴσου 38 μῆλα εἰς 7 μαθητάς.

Ἐὰν ἐργασθῶμεν ὅπως εἰς τὸ παράδειγμα τῆς § 82, εὐρίσκομεν ὅτι δυνάμεθα νὰ δώσωμεν ἀπὸ 5 μῆλα εἰς κάθε μαθητὴν, διότι  $5 \text{ μῆλα} \times 7 = 35 \text{ μῆλα}$ , ἀλλὰ δὲν δυνάμεθα νὰ δώσωμεν ἀπὸ 6 μῆλα, διότι  $6 \text{ μῆλα} \times 7 = 42 \text{ μῆλα}$ .

Ἡ διανομὴ τῶν μῆλων δὲν γίνεται ἐδῶ ἀκριβῶς, ὅπως εἰς τὸ παράδειγμα τῆς § 82, διότι μένουν  $38 \text{ μῆλα} - 35 \text{ μῆλα} = 3 \text{ μῆλα}$ , τὰ ὅποια εἶναι ὀλιγώτερα τῶν 7 μαθητῶν καὶ δὲν φθάνουν νὰ πάρη κάθε μαθητῆς ἀπὸ ἓνα.

Τὸ ὑπόλοιπον 3 τῆς προηγουμένης ἀφαιρέσεως λέγεται καὶ **ὑπόλοιπον** τῆς διαίσεως 38 διὰ 7.

Εἰς τὸ παράδειγμα αὐτὸ εἶχομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 38 διὰ τοῦ 7. Εὐρόμεν δὲ ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἀκέραιος ἀριθμὸς, ὁ ὅποιος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 7 δίδει γινόμενον, τὸ ὅποιον περιέχεται εἰς τὸν 38, εἶναι ὁ 5. Πράγματι ὁ 38 περιέχει τὸ γινόμενον  $7 \times 5$ , ἀλλ' ὄχι καὶ τὸ  $7 \times 6$ .

Ὁμοίως ἐργαζόμεθα καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ διαίσεις εἶναι μέτρησις. Ἐπομένως δυνάμεθα νὰ δώσωμεν τὸν ἐξῆς γενικὸν ὀρισμὸν τῆς διαίσεως:

**Διαίσεις εἶναι ἡ πράξις, εἰς τὴν ὁποίαν δίδονται δύο ἀριθμοὶ ἡ-**

τοι ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης, καὶ ζητοῦμεν νὰ εὕρωμεν τὸν μεγαλύτερον ἀκέραιον ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει γινόμενον ἴσον ἢ μικρότερον τοῦ διαιρετέου.

Εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα διαιρετέος εἶναι ὁ 38, διαιρέτης ὁ 7, πηλίκον ὁ 5 καὶ ὑπόλοιπον ὁ 3.

§ 85. Τελεία καὶ ἀτελῆς διαίρεσις. Ἡ διαίρεσις λέγεται **τελεία**, ἐὰν δίδῃ ὑπόλοιπον 0, **ἀτελῆς** δέ, ἐὰν τὸ ὑπόλοιπον εἶναι διάφορον τοῦ μηδενός. Εἰς τὴν ἀτελῆ διαίρεσιν τὸ ὑπόλοιπον πρέπει νὰ εἶναι μικρότερον τοῦ διαιρέτου.

Ἐὰν εἰς τὰ μῆλα, πού ελαβον οἱ 7 μαθηταί, δηλ. εἰς τὰ  $5 \times 7$ , προσθέσωμεν καὶ τὰ 3 μῆλα, τὰ ὅποια ἔμειναν ὡς ὑπόλοιπον, εὐρίσκομεν τὸν ἀρχικὸν ἀριθμὸν τῶν μῆλων, πού ἐπρόκειτο νὰ μοιράσωμεν ἤτοι εἶναι:  $38 = 7 \times 5 + 3$ . Δηλαδή:

$$\text{Διαιρετέος} = \text{διαιρέτης} \times \text{πηλίκον} + \text{ὑπολοίπων}$$

Ἵσως:

Εἰς κάθε ἀτελῆ διαίρεσιν ὁ διαιρετέος ἰσοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον σὺν τῷ ὑπολοίπῳ.

Εἶναι δὲ φανερὸν ὅτι:

Εἰς κάθε τελείαν διαίρεσιν ὁ διαιρετέος ἰσοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον.

§ 86. Σημεῖον διαίρεσεως. Διὰ νὰ σημειώσωμεν τὴν διαίρεσιν δύο ἀριθμῶν, θέτομεν μεταξὺ τοῦ διαιρετέου καὶ τοῦ διαιρέτου τὸ σημεῖον (:) τὸ ὁποῖον ἐκφωνεῖται **διά**.

Τὸ ἐξαγόμενον ὁμως τῆς διαίρεσεως δὲν δυνάμεθα νὰ σημειώσωμεν διὰ μιᾶς ἰσότητος, παρὰ μόνον εἰς τὴν περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποῖαν ἡ διαίρεσις εἶναι τελεία. Π.χ. δυνάμεθα νὰ γράψωμεν:

$$12 : 4 = 3, \quad \text{ὄχι ὁμως καὶ } 38 : 7 = 5$$

$$\eta \quad 38 : 7 = 5 + 3, \quad \text{ἀλλὰ } 38 = 5 \times 7 + 3 \quad (\text{§ 85}).$$

Καὶ ἀντιστρόφως, ἐὰν ἔχωμεν τὴν ἰσότητα  $39 = 8 \times 4 + 7$ , δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ 4 εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαίρεσεως τοῦ 39 διὰ 8 καὶ ὅτι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαίρεσεως εἶναι ὁ 7· διότι τὸ ὑπόλοιπον 7 εἶναι μικρότερον τοῦ διαιρέτου 8. Δὲν δυνάμεθα ὁμως νὰ θεωρήσωμεν τὸ 8 ὡς πηλίκον τῆς διαίρεσεως τοῦ 39 διὰ 4· διότι τὸ ὑπόλοιπον 7 εἶναι μεγαλύτερον τοῦ διαιρέτου 4.

Ἐὰν ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης παρίστανται διὰ γραμμάτων, δὲν δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν αὐτῶν, διότι δὲν γνωρίζομεν τοὺς ἀριθμούς, ποὺ παριστάνουν τὰ γράμματα αὐτά. Θὰ σημειώσωμεν ἄπλῶς τὴν διαίρεσιν αὐτῶν, ὅπως καὶ ὅταν αὐτοὶ εἶναι ὠρισμένοι ἀριθμοί.

Π.χ.  $\alpha : \beta$  σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὸν  $\alpha$  διὰ τοῦ  $\beta$ . Ἄν δὲ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως αὐτῆς εἶναι  $\gamma$ , θὰ εἶναι:

$$\boxed{\alpha : \beta = \gamma} \quad \text{καὶ ἔπομένως} \quad \boxed{\alpha = \beta \times \gamma}$$

Ἐὰν ἡ διαίρεσις ἑνὸς ἀριθμοῦ  $\Delta$  διὰ  $\delta$  εἶναι ἀτελής καὶ δίδῃ πηλίκον  $\pi$  καὶ ὑπόλοιπον  $\nu$ , τότε θὰ εἶναι:

$$\boxed{\Delta = (\delta \times \pi) + \nu} \quad \text{ὅπου } \nu < \delta.$$

**§ 87. Παρατηρήσεις.** 1η. Εἰς τὰς διαιρέσεις ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι παρίστανται μὲ γράμματα, ὑποτίθεται ὅτι ὁ διαιρετέος εἶναι μεγαλύτερος ἢ ἴσος πρὸς τὸν διαιρέτην.

2α. Κατὰ τὴν διαίρεσιν (μερισμὸν) ἑνὸς συγκεκριμένου ἀριθμοῦ δι' ἄλλου συγκεκριμένου, ὁ διαιρέτης πρέπει νὰ λαμβάνηται ὡς ἀφηρημένος ἀριθμός. Π.χ. πρέπει νὰ γράφωμεν:

$$12 \text{ μῆλα} : 4 = 3 \text{ μῆλα.}$$

Τὸ πηλίκον τότε, τὸ ὁποῖον λέγεται καὶ **μερίδιον**, εἶναι ὁμοειδὲς μὲ τὸν διαιρετέον, διότι εἶναι μέρος αὐτοῦ.

3η. Ἐὰν ὁ διαιρέτης εἶναι ἡ μονάς, τὸ πηλίκον ἴσοῦται μὲ τὸν διαιρετέον. Π.χ. θὰ εἶναι:

$$6 : 1 = 6 \text{ (διατί;)}$$

4η. Ἐὰν ὁ διαιρετέος εἶναι 0, ὁ δὲ διαιρέτης διάφορος τοῦ μηδενός, τότε τὸ πηλίκον εἶναι ἴσον μὲ τὸ μηδέν. Π.χ.

$$0 : 3 = 0, \quad \text{διότι } 0 \times 3 = 0.$$

5η. Ἡ διαίρεσις ἀριθμοῦ οἰουδήποτε διὰ 0, π.χ.  $8 : 0$ , εἶναι ἀδύνατος· διότι δὲν ὑπάρχει ἀριθμός, ὁ ὅποιος, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν διαιρέτην 0, νὰ δίδῃ γινόμενον 8, δηλ. διάφορον τοῦ μηδενός.

6η. Ὄταν ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης εἶναι 0, τὸ πηλίκον δύναται νὰ εἶναι οἰοσδήποτε ἀριθμός· διότι κάθε ἀριθμός, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν διαιρέτην 0, δίδει γινόμενον τὸν διαιρετέον 0.

§ 88. \*Άλλη ιδιότητα της ισότητας. \*Έστω ή ισότης  $12 = \alpha$ . Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὅσας μονάδας ἔχει ὁ 12, τόσας μονάδας ἔχει καὶ ὁ  $\alpha$ . \*Ἐὰν διαιρέσωμεν διὰ 2 τὰς μονάδας τοῦ 12 ἢ τὰς ἴσας πρὸς αὐτὰς μονάδας τοῦ  $\alpha$ , θὰ εὐρωμεν τὸ αὐτὸ πηλίκον 6· ἄρα θὰ εἶναι:

$$12 : 2 = \alpha : 2.$$

\*Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι  $12 : 3 = \alpha : 3$ .

\*Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

\*Ἐὰν διαιρέσωμεν δύο ἴσους ἀριθμοὺς διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, εὐρίσκομεν πάλιν ἴσους ἀριθμοὺς.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν, γενικῶς:

\*Ἄν εἶναι  $\alpha = \beta$ , θὰ εἶναι καὶ  $\alpha : \mu = \beta : \mu$

## 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 89. Πῶς διαιρεῖται ἄθροισμα δι' ἀριθμοῦ. *Πρόβλημα.* Πατὴρ τις ἔδωκε μίαν ἡμέραν εἰς τοὺς τρεῖς υἱοὺς τοῦ 900 δραχμᾶς, τὴν ἄλλην ἡμέραν ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς 600 δρχ. καὶ τὴν ἐπομένην ἡμέραν 450 δρχ. Πόσα χρήματα ἔδωκεν εἰς καθένα κατὰ τὰς τρεῖς αὐτὰς ἡμέρας;

*Λύσις.* Εἰς τοὺς τρεῖς υἱοὺς ἔδωκε τὸ ὅλον:

$$(900 + 600 + 450) \text{ δρχ. ἢ } 1950 \text{ δρχ.}$$

Εἰς τὸν καθένα λοιπὸν ἔδωκεν:

$$(900 + 600 + 450) : 3 \text{ ἢ } 1950 \text{ δρχ.} : 3 \text{ ἢ } 650 \text{ δρχ.}$$

\**Ἄλλη λύσις.* Τὴν πρώτην ἡμέραν ἔδωκεν εἰς καθένα

$$900 \text{ δρχ.} : 3 \text{ ἢ } 300 \text{ δρχ.}$$

τὴν δευτέραν ἡμέραν ἔδωκεν 600 δρχ. : 3 ἢ 200 δρχ.

τὴν τρίτην ἡμέραν ἔδωκε 450 δρχ. : 3 ἢ 150 δρχ.

κατὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας ἔδωκεν εἰς καθένα

$$300 \text{ δρχ.} + 200 \text{ δρχ.} + 150 \text{ δρχ. ἢ } 650 \text{ δρχ.}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον· ἄρα εἶναι:

$$(900 + 600 + 450) : 3 = (900 : 3) + (600 : 3) + (450 : 3).$$

*Συμπέρασμα.* \*Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

**I.** Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἄθροισμα δι' ἀριθμοῦ, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν ὅλους τοὺς προσθετέους τοῦ ἄθροίσματος διὰ τοῦ

ἀριθμοῦ τούτου καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ προκύπτοντα πηλίκα.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$(α + β + γ) : δ = (α : δ) + (β : δ) + (γ : δ)$$

*Σημείωσις.* Ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα, πρέπει αἱ διαιρέσεις αὐταὶ νὰ εἶναι ὅλαι τέλειαι.

§ 90. Πῶς διαιροῦμεν διαφορὰν δι' ἀριθμοῦ. *Πρόβλημα.* Τρία δοχεῖα ὅμοια εἶναι πλήρη ἐλαίου καὶ ἔχουν βάρος καὶ τὰ τρία μαζὺ 450 χλγ., κενὰ δὲ τὰ δοχεῖα ἔχουν βάρος 36 χλγ. Πόσα χλγ. ἐλαίου περιέχει ἕκαστον;

*Λύσις.* Τὰ τρία δοχεῖα περιέχουν ἔλαιον  $(450 - 36)$  χλγ. ὥστε τὸ ἓνα θὰ περιέχη:  $(450 - 36)$  χλγ. : 3 ἢ 414 χλγ. : 3 ἢ 138 χλγ.

*Ἄλλη λύσις.* Κάθε δοχεῖον πλήρες ἔχει βάρος  $(450 : 3)$  χλγ. ἢ 150 χλγ., κενὸν δὲ  $(36 : 3)$  χλγ. ἢ 12 χλγ. Περιέχει λοιπὸν ἔλαιον  $(450 : 3)$  χλγ. -  $(36 : 3)$  χλγ. ἢ 150 χλγ. - 12 χλγ. ἢ 138 χλγ.

Παρατηροῦμεν ὅτι καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον ἄρα εἶναι:

$$(450 - 36) : 3 = (450 : 3) - (36 : 3).$$

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

II. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν διαφορὰν δι' ἀριθμοῦ, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς καὶ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ πρῶτον πηλίκον τὸ δεῦτερον.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$(α - β) : γ = (α : γ) - (β : γ)$$

§ 91. Πῶς διαιροῦμεν ἀριθμὸν διὰ γινομένου πολλῶν παραγόντων. *Πρόβλημα.* Φιλάνθρωπος διέθεσεν 6 000 δρχ. διὰ νὰ διανεμηθοῦν ἐξ ἴσου μεταξὺ τῶν 6 τάξεων δύο ἐξαταξίων σχολείων τῆς πατρίδος του πρὸς πλουτισμὸν τῶν βιβλιοθηκῶν των. Νὰ εὐρεθῇ πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἕκαστη τάξις.

*Λύσις.* Τὰ δύο σχολεῖα ἔχουν  $6 \times 2$  ἢ  $2 \times 6$  ἢ 12 τάξεις καὶ ἐπομένως ἕκαστη τάξις θὰ λάβῃ:

$$6\ 000\ \delta\rho\chi. : (2 \times 6) \ \text{ἢ} \ 6\ 000\ \delta\rho\chi. : 12 \ \text{ἢ} \ 500\ \delta\rho\chi.$$

\**Άλλη λύσις.* Ἐπειδὴ τὰ σχολεῖα εἶναι 2, ἕκαστον σχολεῖον θὰ λάβῃ 6 000 δρχ. : 2 ἢ 3 000 δρχ.

\*Ἄν ἕκαστον σχολεῖον μοιράσῃ τὰς ( 6 000 : 2 ) δρχ. ἢ 3 000 δρχ. εἰς τὰς 6 τάξεις του, εὐρίσκομεν ὅτι ἑκάστη τάξις θὰ λάβῃ :  
( 6 000 : 2 ) δρχ. : 6 ἢ 3 000 δρχ. : 6 ἢ 500 δρχ.

\*Ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν:

$$6\ 000 : (2 \times 6) = (6\ 000 : 2) : 6.$$

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν ἰσότητα αὐτὴν συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα:

III. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ γινομένου ὁσωνδῆποτε παραγόντων, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν διὰ τοῦ πρώτου παράγοντος, τὸ εὐρεθὲν πηλίκον διὰ τοῦ δευτέρου παράγοντος καὶ οὕτω καθεξῆς, μέχρις ὅτου τελειώσουν ὅλοι οἱ παράγοντες τοῦ γινομένου.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$\alpha : (\beta \times \gamma) = (\alpha : \beta) : \gamma$$

§ 92. Ἰδιότης IV. *Πρόβλημα.* Ὁ Γεώργιος ἔχει 27 δρχ. Πόσα βιβλία δύναται νὰ ἀγοράσῃ μὲ τὰ χρήματα αὐτά, ἂν ἕκαστον βιβλίον ἀξίζῃ 4 δρχ. καὶ πόσαι δραχμαὶ θὰ τοῦ μείνουν;

\*Ἐπίσης ὁ Παῦλος ἔχει 270 δρχ. Πόσα βιβλία δύναται νὰ ἀγοράσῃ μὲ αὐτάς, ἂν ἕκαστον βιβλίον ἀξίζῃ 40 δρχ. καὶ πόσαι δραχμαὶ θὰ τοῦ μείνουν;

*Λύσις.* Ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὰς διαιρέσεις, εὐρίσκομεν ὅτι ὁ Γεώργιος καὶ ὁ Παῦλος δύνανται νὰ ἀγοράσουν ἕκαστος ἀπὸ 6 βιβλία καὶ ὅτι εἰς μὲν τὸν Γεώργιον θὰ μείνουν 3 δρχ. εἰς δὲ τὸν Παῦλον 30 δρχ.

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης τῆς δευτέρας διαιρέσεως εἶναι ἀντιστοίχως δεκαπλάσιος τοῦ διαιρετέου καὶ διαιρέτου τῆς πρώτης διαιρέσεως καὶ ὅτι τὸ πηλίκον καὶ τῶν δύο διαιρέσεων εἶναι τὸ αὐτὸ 6, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς δευτέρας διαιρέσεως εἶναι 30, ἦτοι δεκαπλάσιον τοῦ ὑπολοίπου 3 τῆς πρώτης διαιρέσεως.

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα:

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην μιᾶς ἀτελοῦς διαιρέσεως ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

§ 93. Ἰδιότης V. Ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συνάγομεν καὶ τὴν κάτωθι ἰδιότητα:

Ἐὰν διαιρέσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἀτελοῦς διαιρέσεως διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ( ἂν διαιροῦνται ) τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

§ 94. Πῶς διαιρεῖται γινόμενον δι' ἀριθμοῦ. *Πρόβλημα.* Κατὰ τὰς ἐορτὰς τῶν Χριστουγέννων οἱ μαθηταὶ τριῶν τάξεων ἐνὸς σχολείου προσέφερον ἀπὸ 60 δραχμ. διὰ νὰ μοιρασθοῦν εἰς 4 πτωχὰς οἰκογενείας. Εἶχε δὲ κάθε τάξις ἀπὸ 40 μαθητὰς. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον ἔλαβε κάθε οἰκογένεια.

*Λύσις.* Οἱ μαθηταὶ τῶν τριῶν τάξεων ἦσαν:

$$40 \text{ μαθ.} \times 3 \text{ ἢ } 120 \text{ μαθηταί.}$$

Οἱ μαθηταὶ αὐτοὶ προσέφερον:

$$60 \text{ δραχ.} \times 40 \times 3 \text{ ἢ } 60 \text{ δραχ.} \times 120 \text{ ἢ } 7200 \text{ δραχ.}$$

Ἐπομένως κάθε οἰκογένεια ἔλαβεν:

$$(60 \times 40 \times 3) \text{ δραχ.} : 4 \text{ ἢ } 7200 \text{ δραχ.} : 4 \text{ ἢ } 1800 \text{ δραχ.}$$

*Ἄλλη λύσις.* Κάθε οἰκογένεια ἔλαβεν 60 δραχ. : 4 ἢ 15 δραχ. ἀπὸ κάθε μαθητῆν. Ἀπὸ δὲ τοὺς 40 μαθητὰς μιᾶς τάξεως ἔλαβεν:

$$(60 : 4) \text{ δραχ.} \times 40 \text{ ἢ } 15 \text{ δραχ.} \times 40 \text{ ἢ } 600 \text{ δραχ.}$$

Καὶ ἀπὸ τὰς τρεῖς τάξεις ἔλαβεν:

$$(60 : 4) \times 40 \times 3 \text{ δραχ.} \text{ ἢ } 600 \times 3 \text{ δραχ.} \text{ ἢ } 1800 \text{ δραχ.}$$

Ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο λύσεις δίδουν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον θὰ εἶναι:

$$(60 \times 40 \times 3) : 4 = (60 : 4) \times 40 \times 3.$$

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν ἰσότητα αὐτὴν συνάγομεν ὅτι:

VI. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἓνα γινόμενον δι' ἀριθμοῦ, δυναμέθα νὰ διαιρέσωμεν ἓνα μόνον παράγοντα διὰ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ, τοὺς δὲ ἄλλους νὰ ἀφήσωμεν ὅπως ἔχουν.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$(α \cdot β \cdot γ) : δ = α \cdot (β : δ) \cdot γ$$

§ 95. **Ίδιαιτέρα περίπτωσης.** Ἐστω ὅτι ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸ γινόμενον  $(9 \times 4 \times 16)$  διὰ τοῦ 4.

Κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα θὰ ἔχωμεν :

$$(9 \times 4 \times 16) : 4 = 9 \times 1 \times 16 = 9 \times 16. \text{ Ὡστε:}$$

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν γινόμενον πολλῶν παραγόντων διὰ τινος ἐκ τῶν παραγόντων του, ἄρκει νὰ ἐξαλείψωμεν τὸν παράγοντα αὐτόν.

**Σημείωσις.** Ἄν περισσότεροι παράγοντες τοῦ γινομένου εἶναι ἴσοι πρὸς τὸν διαιρέτην, ἓνα μόνον ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἐξαλείψωμεν.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$(\alpha \times \beta \times \gamma) : \beta = \alpha \times \gamma$$

$$(\alpha \times \beta \times \beta \times \gamma) : \beta = \alpha \times \beta \times \gamma$$

Περίληψις τῶν ιδιοτήτων τῆς διαιρέσεως

$$1. (\alpha + \beta + \gamma) : \delta = (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta)$$

$$2. (\alpha - \beta) : \delta = (\alpha : \delta) - (\beta : \delta)$$

$$3. \alpha : (\beta \times \gamma) = (\alpha : \beta) : \gamma$$

$$4. (\alpha \times \beta \times \gamma) : \delta = \alpha \times (\beta : \delta) \times \gamma$$

### 3. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ

Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς διαιρέσεως ἑνὸς ἀριθμοῦ δι' ἄλλου διακρίνομεν τὰς ἐξῆς περιπτώσεις:

§ 96. **Περίπτωσης I.** Ἄν ὁ διαιρέτης καὶ τὸ πηλίκον εἶναι μονοψήφιοι. Ἐστω ἡ διαίρεσις  $27 : 4$ .

Τὸ πηλίκον θὰ εἶναι μονοψήφιον, διότι, ἂν θέσωμεν δεξιὰ τοῦ διαιρέτου 4 ἓνα 0, προκύπτει ἀριθμὸς 40, ὁ ὅποιος εἶναι μεγαλύτερος τοῦ διαιρέτου 27. Τὸ πηλίκον λοιπὸν εἶναι μικρότερον τοῦ 10, ἦτοι εἶναι μονοψήφιον.

Διὰ νὰ εὔρωμεν ἐπομένως τὸ μονοψήφιον πηλίκον, ἄρκει νὰ εὔρωμεν τὸν μεγαλύτερον μονοψήφιον ἀριθμὸν, ὁ ὅποιος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 4 νὰ δίδῃ γινόμενον μικρότερον ἢ ἴσον μὲ τὸν διαιρέτην 27. Εἰς τὸ παράδειγμα αὐτὸ παρατηροῦμεν ὅτι :

$$4 \times 6 = 24, \text{ τὸ ὅποιον εἶναι μικρότερον τοῦ 27, ἐνῶ:}$$

$4 \times 7 = 28$ , τὸ ὁποῖον εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 27.

Τὸ πηλίκον λοιπὸν εἶναι 6 καὶ τὸ ὑπόλοιπον  $27 - 24 = 3$ .

§ 97. Περίπτωσης II. Ἄν ὁ διαιρέτης εἶναι πολυψήφιος καὶ τὸ πηλίκον μονοψήφιον. Ἔστω ἡ διαίρεσις  $863 : 275$ .

Τὸ πηλίκον εἶναι μικρότερον τοῦ 10, ἤτοι μονοψήφιον· διότι  $275 \times 10$  ἢ 2 750 εἶναι μεγαλύτερον τοῦ διαιρετέου 863.

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ μονοψήφιον τοῦτο πηλίκον, ἐργαζόμεθα ὅπως εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν.

Πράγματι ἀρκεῖ νὰ ζητήσωμεν νὰ εὐρωμεν ποῖος ἀριθμὸς μονοψήφιος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει τὸ μεγαλύτερον γινόμενον, τὸ ὁποῖον νὰ δύναται νὰ ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τὸν διαιρετέον.

Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι :

$$\begin{array}{ll} 275 \times 1 = 275, & 275 \times 3 = 825 \\ 275 \times 2 = 550, & 275 \times 4 = 1\,100 \end{array}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι ὁ 3 εἶναι τὸ ζητούμενον πηλίκον. Τὸ δὲ ὑπόλοιπον εἶναι  $863 - 825 = 38$ .

Ἡ μέθοδος αὕτη πρὸς εὐρεσιν τοῦ πηλίκου εἶναι ἀσφαλῆς, ἀλλὰ ἐπίπνοος. Διὰ τοῦτο πρακτικῶς ἀκολουθοῦμεν ἄλλην πορείαν, τὴν ὁποίαν γνωρίζομεν καὶ διὰ τῆς ὁποίας ἐλαττοῦμεν κατὰ πολὺ τὸν ἀριθμὸν τῶν δοκιμῶν, δηλ. τῶν πολλαπλασιασμῶν.

Πρὸς τοῦτο ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Λαμβάνομεν τὸ πρῶτον πρὸς τὰ ἀριστερὰ ψηφίον τοῦ διαιρετέου (ἐδῶ τὸ 2). Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ 2 ἑκατοντάδες τοῦ διαιρετέου χωροῦν εἰς τὰς 8 ἑκατοντάδας τοῦ διαιρετέου 4 φορές. Δοκιμάζομεν ἔπειτα, ἂν ὁ 4 εἶναι τὸ ζητούμενον πηλίκον. Πρὸς τοῦτο πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρέτην 275 ἐπὶ 4 καὶ εὐρίσκομεν γινόμενον 1 100, τὸ ὁποῖον εἶναι μεγαλύτερον τοῦ διαιρετέου. Τὸ πηλίκον λοιπὸν δὲν εἶναι ὁ 4, ἀλλὰ μικρότερον τοῦ 4, ἴσως ὁ 3. Πολλαπλασιάζοντες τὸν διαιρέτην ἐπὶ 3 εὐρίσκομεν γινόμενον 825, τὸ ὁποῖον εἶναι μικρότερον τοῦ διαιρετέου. Τὸ πηλίκον λοιπὸν εἶναι ὁ 3.

Ἀφαιροῦμεν τῶρα τὸ γινόμενον τοῦ διαιρετέου 275 ἐπὶ τὸ πηλίκον 3, δηλ. τὸν 825, ἀπὸ τοῦ διαιρετέου καὶ εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον 38.

Τὸ πηλίκον τοῦ 863 διὰ 275 εἶναι 3 καὶ τὸ ὑπόλοιπον 38.

Διαιρετέος	863	275	διαιρέτης
	825	3	πηλίκον
Υπόλοιπον	38		

*Παρατήρησις.* Εἰς τὴν πρᾶξιν, ἀντὶ νὰ γράψωμεν κάτωθι τοῦ διαιρετέου τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸ πηλίκον, ἀφαιρούμεν, ἀπὸ τὸν διαιρετέον ἕκαστον τῶν ψηφίων τοῦ γινομένου τούτου.

Λέγομεν 3 ἐπὶ 5 15 ἀπὸ 23 8· γράφομεν 8 καὶ κρατούμεν 2· 3 ἐπὶ 7 21 καὶ 2 κρατούμενα 23 ἀπὸ 26 3· γράφομεν 863 | 275  
 3 ἐπὶ 2 6 καὶ 2 κρατούμενα 38 | 3  
 8 ἀπὸ 8 μηδέν.

### § 98. Περίπτωσις III. Ἐὰν τὸ πηλίκον εἶναι πολυψήφιον.

\*Ἐστω ἡ διαίρεσις 583 : 32

Τὸ πηλίκον εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 10, διότι  $583 \begin{array}{r} 32 \\ 32 \times 10 \end{array}$  ἢ 320 εἶναι μικρότερον τοῦ 583, ἀλλὰ μικρότερον τοῦ 100, διότι  $32 \times 100$  ἢ 3200 εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 583. Τὸ πηλίκον λοιπὸν περιλαμβάνεται μεταξύ τοῦ 10 καὶ 100, ἤτοι εἶναι διψήφιον.

Πρὸς εὔρεσιν τούτου ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Χωρίζομεν ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ τοῦ διαιρετέου τόσα ψηφία, ὅσα χρειάζονται διὰ νὰ ἀποτελεσθῇ ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος νὰ περιέχῃ τουλάχιστον 1 φοράν τὸν διαιρέτην, ἀλλὰ ὀλιγώτερον ἀπὸ 10 φορές. Ἐδῶ ἀρκοῦν αἱ 58 δεκάδες, διὰ νὰ διαιρεθοῦν διὰ τοῦ 32. Τὸ πηλίκον τοῦ 58 διὰ 32 εἶναι 1 δεκάς καὶ τὸ ὑπόλοιπον 26 δεκάδες.

Καταβιβάζομεν ἔπειτα τὸ ἀκόλουθον ψηφίον 3 τοῦ διαιρετέου, ὅπότε ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν 263 μονάδας διὰ 32 (ὁ 263 λέγεται μερικὸς διαιρετέος). Τὸ πηλίκον εἶναι 8 μονάδες καὶ τὸ ὑπόλοιπον 7. Τὸ πηλίκον λοιπὸν τοῦ 583 διὰ 32 εἶναι 18 καὶ τὸ ὑπόλοιπον 7.

Ἐκ τῆς διαίρεσεως αὐτῆς ἔπεται ὅτι :

$$583 = 32 \times 18 + 7 \quad (\S 85).$$

Διατυπώσατε τὸν γενικὸν κανόνα τῆς διαίρεσεως δύο ἀριθμῶν.

*Σημείωσις.* Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν κάθε μερικῆς διαίρεσεως πρέπει νὰ παρατηρῶμεν, ἂν τὸ ἀντίστοιχον ὑπόλοιπον εἶναι μικρότερον τοῦ διαιρέτου. Ἄν τὸ ὑπόλοιπον εἶναι μεγαλύτερον τοῦ διαιρέτου, τὸ ἀντίστοιχον ψηφίον τοῦ πηλίκου πρέπει νὰ αὐξηθῇ.

*Παρατήρησις.* Κατὰ τὴν πορείαν τῆς διαίρεσεως εἶναι δυνα-

τὸν νὰ συμβῆ, ὥστε ἓνας μερικὸς διαιρητέος νὰ εἶναι 22645 | 74  
 μικρότερος τοῦ διαιρέτου ( ὅπως 44 : 74). Λέγομεν τό- 0445 | 306  
 τε ὅτι ὁ διαιρέτης χωρεῖ 0 φορές εἰς τὸν διαιρητέον καὶ 01  
 γράφομεν ἓνα 0 εἰς τὸ πηλίκον καὶ ἔπειτα καταβιβάζομεν τὸ ἀκόλουθον ψηφίον τοῦ διαιρητέου.

Τοῦτο φαίνεται εἰς τὸ παραπλεύρωσ παραδείγμα.

§ 99. Δοκιμὴ τῆς διαιρέσεως. Γνωρίζομεν ὅτι (§ 85)

**Διαιρητέος = διαιρέτης × πηλίκον + ὑπόλοιπῳ.**

Ἐκ τῆς ἰσότητος αὐτῆς συμπεραίνομεν τὰ ἑξῆς :

Διὰ νὰ δοκιμάσωμεν, ἂν μία διαίρεσις ἔγινε χωρὶς λάθος, πρέπει, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον καὶ εἰς τὸ γινόμενον προσθέσωμεν τὸ ὑπόλοιπον, νὰ εὕρωμεν τὸν διαιρητέον. Δὲν πρέπει νὰ λησμονῶμεν ὅτι πρέπει πάντοτε τὸ ὑπόλοιπον νὰ εἶναι μικρότερον τοῦ διαιρέτου.

### Ἀσκήσεις

A' Ὁ μ ἄ ς. Ἀπὸ μνήμης. 85) Μὲ ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 13, διὰ νὰ εὕρωμεν γινόμενον 52, 104, 130 ;

86) Νὰ εὕρητε τὰ πηλικά καὶ τὰ ὑπόλοιπα, ἂν ὑπάρχουν, τῶν ἑξῆς διαιρέσεων :

1. 48 : 12	4. 93 : 18	7. 548 : 10
2. 65 : 13	5. 50 : 15	8. 8 700 : 100
3. 58 : 11	6. 72 : 18	9. 8 932 : 1 000

87) Εἰς τὰς κατωτέρω ἰσότητας νὰ ἀντικαταστήσετε τὰ ἐρωτηματικά μὲ τοὺς καταλλήλους ἀριθμούς :

$$19 \times ; = 57 \quad 23 \times ; = 92 \quad ; \times 8 = 88$$

B' Ὁ μ ἄ ς. Γραπτῶς. 88) Νὰ συμπληρώσετε τὸν κάτωθι πίνακα

	Διαιρητέος	Διαιρέτης	Πηλίκον	Ἐπόλοιπον
1.	;	43	15	42
2.	;	57	143	6
3.	;	103	103	19

89) Ποῖοι εἶναι οἱ διαιρέται τῶν κατωτέρω διαιρέσεων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν :

	Διαιρητέον	Διαιρέτην	Πηλίκον	Ἐπόλοιπον
1.	738	;	16	18
2.	1 047	;	12	27

- 90) Νά εύρεθοῦν τὰ έξαγόμενα τῶν κατωτέρω πράξεων :
1.  $(60 : 2) : 3$     2.  $(80 : 4) : 10$     3.  $(36 : 9) : 2$
- 91) Νά εύρεθοῦν τὰ κάτωθι πηλίκα κατὰ δύο τρόπους (§ 89) :
1.  $(24 + 36 + 60) : 3$     3.  $(75 + 50 + 100) : 25$   
 2.  $(45 + 35 + 25) : 5$     4.  $(20 + 28 + 44) : 4$
- 92) Νά γίνουν αἱ κάτωθι διαιρέσεις κατὰ δύο τρόπους :
1.  $(18 - 12) : 3$     3.  $(32 - 24) : 8$   
 2.  $(64 - 36) : 4$     4.  $(324 - 180) : 9$
- 93) Νά εύρεθῆ τὸ πηλίκον τῶν κάτωθι διαιρέσεων (§ 94) :
1.  $(25 \times 36) : 9$     3.  $(21 \times 14 \times 20) : 7$   
 2.  $(35 \times 8 \times 7) : 8$     4.  $(42 \times 12 \times 7) : 42$
- 94) Νά ἐκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι διαιρέσεις καὶ νά γραφῆ ἡ σχέσις, ἢ ὁποία συνδέει διαιρετέον, διαιρέτην, πηλίκον καὶ ὑπόλοιπον ἐκάστης διαιρέσεως :
1.            3 564 : 15            2.            57 865 : 67  
 3.            10 056 : 204            4.            47 329 : 508

#### 4. ΣΥΝΤΟΜΙΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΚΟΥ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ

§ 100. Συντομία πράξεως. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν  $578\ 942 : 2\ 500$ .

Εἰς τὸ παράδειγμα αὐτὸ κυρίως πρόκειται νὰ εὐρωμεν πόσας φορές χωροῦν αἱ 25 ἑκατοντάδες εἰς τὰς 5789

ἑκατοντάδας τοῦ διαιρετέου	5789(42	25(00
Ἐκτελοῦντες αὐτὴν τὴν διαίρεσιν εὐρίσκομεν	78	231
πηλίκον 231 καὶ ὑπόλοιπον 14 ἑκατοντάδες. Αὐταὶ	39	
αἱ 14 ἑκατοντάδες καὶ αἱ 42 μονάδες τοῦ διαιρετέου ἀποτελοῦν τὸ ὑπόλοιπον 1442. Ὡστε :	1442	

Ὅταν ὁ διαιρέτης ἔχη εἰς τὸ τέλος μηδενικά, τὰ παραλείπομεν, πρὶν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν· παραλείπομεν ὁμως καὶ ἴσον ἀριθμὸν ψηφίων ἀπὸ τὰ δεξιὰ τοῦ διαιρετέου. Ἐκτελοῦμεν ἔπειτα τὴν διαίρεσιν τοῦ ἀπομένοντος εἰς τὸν διαιρετέον ἀριθμοῦ διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ὁποῖος μένει εἰς τὸν διαιρέτην· ἀλλὰ εἰς τὸ ὑπόλοιπον, τὸ ὁποῖον θὰ προκύψῃ, γράφομεν δεξιὰ του τὰ παραλειφθέντα ψηφία τοῦ διαιρετέου.

<i>Παραδείγματα:</i>	746(200	5(000	549(000	43(000
	24	149	119	12
	46		33 000	
	1 200			

§ 101. Διαιρέσεις διὰ 10, 100, 1000 κ.τ.λ. Ἐπειδὴ :

$$325 = 320 + 5 \quad \eta \quad 325 = 32 \times 10 + 5$$

ἔπεται ὅτι ὁ 32 εἶναι πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ 325 διὰ τοῦ 10 καὶ ὁ 5 εἶναι τὸ ὑπόλοιπον.

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι τῆς διαιρέσεως 1 478 : 100 πηλίκον εἶναι 14 καὶ ὑπόλοιπον 78. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι :

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ 10, 100, 1000 κ.τ.λ., χωρίζομεν ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερά του ἓνα, δύο, τρία κ.τ.λ. ψηφία· καὶ ὁ μὲν ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον ἀποτελοῦν τὰ πρὸς τὰ ἀριστερά ψηφία, εἶναι τὸ πηλίκον, ὁ δὲ ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον ἀποτελοῦν τὰ ἄλλα πρὸς τὰ δεξιὰ ψηφία, εἶναι τὸ ὑπόλοιπον.

§ 102. Διαιρέσεις διὰ 2. Διὰ νὰ εὐρίσκωμεν ἀπὸ μνήμης τὰ πηλικά τῶν διψηφίων ἀριθμῶν διὰ 2, εἶναι καλὸν νὰ ἐνθυμούμεθα τὰ διπλάσια τῶν 50 πρώτων ἀριθμῶν.

Τὸ ἀκριβὲς πηλίκον ἑνὸς ἀριθμοῦ διὰ 2 λέγεται ἡμισυ αὐτοῦ. Π.χ. ἐπειδὴ  $34 \times 2 = 68$ , τὸ ἡμισυ τοῦ 68 εἶναι 34.

Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ εὐρωμεν τὸ ἡμισυ ἑνὸς οἰουδήποτε ἀριθμοῦ, ἂν ἐργασθῶμεν ὡς εἰς τὰ κάτωθι παραδείγματα :

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἡμισυ τοῦ 748, λέγομεν : Τὸ ἡμισυ τοῦ 740 εἶναι 370· τὸ ἡμισυ τοῦ 8 εἶναι 4· ἄρα τὸ ἡμισυ τοῦ 748 εἶναι 374.

Ἐπίσης, διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἡμισυ τοῦ 374 λέγομεν : Τὸ ἡμισυ τοῦ 360 εἶναι 180. Τὸ ἡμισυ τοῦ 14 εἶναι 7· ἄρα τὸ ἡμισυ τοῦ 374 εἶναι 187.

Ὅμοίως διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἡμισυ τοῦ 3 286, λέγομεν : τὸ ἡμισυ τοῦ 3 200 εἶναι 1 600· τὸ ἡμισυ τοῦ 86 εἶναι 43· ἄρα τὸ ἡμισυ τοῦ 3 286 εἶναι 1 643.

**Διαιρέσεις διὰ 4.** Διαιροῦμεν τὸν ἀριθμὸν διὰ 2 καὶ τὸ ἐξαγόμενον διαιροῦμεν πάλιν διὰ 2.

Οὕτω, διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ πηλίκον  $72 : 4$  λέγομεν  $72 : 2 = 36$ .  $36 : 2 = 18$  ἔπομένως  $72 : 4 = 18$ .

Ὅμοιως διὰ τὸ  $3\ 656 : 4$  λέγομεν  $3\ 656 : 2 = 1\ 828$ .  $1\ 828 : 2 = 914$  ἄρα  $3\ 656 : 4 = 914$ .

§ 103. Διαίρεσις ἀριθμοῦ διὰ 9, 99, 999 κ.τ.λ. *Πρόβλημα.* Κατὰ τὰς ἐορτὰς τῶν Χριστουγέννων μία ἐνορία τῶν Ἀθηνῶν συνέλεξε 2 565 875 δραχμὰς μὲ ἔρανον τῶν εὐπόρων ἐνοριτῶν της. Τὸ ποσὸν αὐτὸ ἐπρόκειτο νὰ μοιράσῃ ἐξ ἴσου εἰς 100 πτωχοὺς τῆς ἐνορίας της. Ἐπειδὴ ὅμως ἓνας ἀπὸ αὐτοὺς ἀνεχώρησε διὰ τὴν ἰδιαιτέραν του ἐπαρχίαν, τὰ χρήματα διενεμήθησαν εἰς τοὺς ἄλλους 99 πτωχοὺς. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον ἔλαβεν ὁ κάθε πτωχός.

*Λύσις.* Εἶναι φανερὸν ὅτι κάθε πτωχὸς ἔλαβε :  $2\ 565\ 875$  δρχ. : 99

Τὸ πηλίκον αὐτὸ δυνάμεθα νὰ τὸ εὐρωμεν ὡς ἑξῆς : Ἄν οἱ πτωχοὶ ἦσαν 100, θὰ ἐλάμβανεν ἕκαστος ἀπὸ 25 658 δραχ. καὶ θὰ ἐπερίσσειον 75 δρχ. Ἐπειδὴ δὲ ἔμεινε τὸ μερίδιον τοῦ ἑκατοστοῦ πτωχοῦ, ὑπάρχει ὀλίκον ὑπόλοιπον  $25\ 658 + 75 = 25\ 733$  δραχμαί.

Ἀπὸ αὐτάς, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, λαμβάνει ἕκαστος 257 δραχ. καὶ μένουσι 33 δρχ. Διάταξις τῆς πράξεως

25658(75)	99
75	25658
257(33)	257
33	2
2(90)	25917
90	
92	

Ἀπὸ αὐτάς, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, λαμβάνει ἕκαστος 2 δραχ. καὶ μένουσι 90 δραχ. Αὐταὶ δὲ μὲ τὸ μερίδιον τοῦ ἑκατοστοῦ πτωχοῦ ἀποτελοῦν τελικὸν ὑπόλοιπον

92 δραχ.

Ἐλαβε λοιπὸν κάθε πτωχὸς  $25\ 658 + 257 + 2 = 25\ 917$  δραχ. καὶ ἐπερίσσεισαν 92 δραχ.

Κάθε φορὰν λοιπὸν τὸ μεριστέον ποσὸν διαιροῦμεν διὰ 100, τὸ δὲ μερίδιον τοῦ ἑκατοστοῦ φέρομεν ὡς ὑπόλοιπον καὶ δι' αὐτὸ τὸ προσθέτομεν μὲ τὸ ἄλλο ὑπόλοιπον. Τελειώνει δὲ ἡ πράξις, ὅταν καταλήξωμεν εἰς ὑπόλοιπον μικρότερον ἀπὸ τὸν διαιρέτην.

Ἄν ὁ διαιρέτης εἶναι 9, κάθε φορὰν διαιροῦμεν διὰ 10. Ἄν δὲ εἶναι 999, διαιροῦμεν κάθε φορὰν διὰ 1 000 κ.τ.λ.

## 5. ΣΥΝΤΟΜΙΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

**§ 104. Πολλαπλασιασμός αριθμού επί 5, 50, 500.**

Πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1000 καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 2.

Π.χ.  $385 \times 5$   
 Ἐπειδὴ  $385 \times 10 = 3\ 850$   
 καὶ  $3\ 850 : 2 = 1\ 925$   
 ἔπεται ὅτι  $385 \times 5 = 1\ 925$ .  
 $85 \times 50$   
 Ἐπειδὴ  $85 \times 100 = 8\ 500$   
 καὶ  $8\ 500 : 2 = 4\ 250$   
 ἔπεται ὅτι  $85 \times 50 = 4\ 250$ .

**Διαιρέσεις ἀριθμοῦ διὰ 5, 50, 500.**

Διπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν καὶ διαιροῦμεν τὸ ἐξαγόμενον διὰ 10, 100, 1 000.

Π.χ.  $370 : 5$   
 Ἐπειδὴ  $370 \times 2 = 740$   
 καὶ  $740 : 10 = 74$   
 ἔπεται ὅτι  $370 : 5 = 74$ .  
 $1\ 450 : 50$ .  
 Ἐπειδὴ  $1\ 450 \times 2 = 2\ 900$   
 καὶ  $2\ 900 : 100 = 29$   
 ἔπεται ὅτι  $1\ 450 : 50 = 29$ .

**§ 105. Πολλαπλασιασμός αριθμοῦ ἐπὶ 25, 250.**

Πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 100, 1 000 καὶ διαιροῦμεν τὸ ἐξαγόμενον διὰ 4.

$56 \times 25$ .  $56 \times 100 = 5\ 600$   
 $5\ 600 : 4 = 1\ 400$   
 $56 \times 250$ .  $56 \times 1\ 000 = 56\ 000$   
 $56\ 000 : 4 = 14\ 000$

**Διαιρέσεις ἀριθμοῦ διὰ 25, 250.**

Πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 4 καὶ διαιροῦμεν τὸ γινόμενον διὰ 100, 1 000.

$375 : 25$ . 4 φορές  $375 = 1500$   
 $1\ 500 : 100 = 15$

### Ἀσκήσεις

95 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν ἀπὸ μνήμης αἱ κάτωθι διαιρέσεις :

1.  $564 : 10$        $3\ 745 : 100$        $84\ 965 : 1\ 000$   
 2.  $648 : 2$        $746 : 2$        $5\ 636 : 2$   
 3.  $524 : 4$        $840 : 4$        $5\ 760 : 4$

96 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν ἀπὸ μνήμης αἱ κάτωθι πράξεις :

1.  $34 \times 5$      $536 \times 5$        $64 \times 50$        $72 \times 500$   
 2.  $635 : 5$      $840 : 5$        $2\ 350 : 50$      $69\ 500 : 500$   
 3.  $35 \times 25$      $42 \times 25$        $68 \times 25$        $72 \times 25$   
 4.  $725 : 25$      $750 : 25$        $32\ 750 : 250$      $96\ 000 : 250$

97) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι διαιρέσεις (γραπτῶς) :

1. 37 542 : 4 200    2. 80 645 : 9 000    3. 38 500 : 600

#### 6. ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

§ 106. *Πρόβλημα 1<sup>ον</sup>*. Τὰ 4 μέτρα ἐνὸς ὑφάσματος τιμῶνται 96 δρχ. Πόσον τιμᾶται τὸ μέτρον τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ;

*Λύσις*. Ἀφοῦ τὰ 4 μέτρα τιμῶνται 96 δρχ. τὸ 1 μ. θὰ τιμᾶται 4 φοράς ὀλιγώτερον τῶν 96 δρχ. ἦτοι :

$$96 \text{ δρχ.} : 4 = 24 \text{ δρχ.}$$

*Πρόβλημα 2<sup>ον</sup>*. Ἐργάτης ἔλαβεν 125 δρχ. δι' ἐργασίαν 5 ἡμερῶν. Πόσον ἦτο τὸ ἡμερομίσθιον του ;

*Λύσις*. Ἀφοῦ εἰς 5 ἡμέρας λαμβάνει 125 δρχ., εἰς 1 ἡμέραν θὰ λάβῃ 5 φοράς ὀλιγώτερον τῶν 125 δρχ., ἦτοι :

$$125 \text{ δρχ.} : 5 = 25 \text{ δρχ.}$$

§ 107. Εἰς τὰ ἀνωτέρω δύο προβλήματα δίδεται ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος ὁμοειδοῦς πρὸς ἐκείνας. Ἀπὸ τὸν τρόπον δὲ τῆς λύσεως αὐτῶν συνάγομεν ὅτι :

Ἔστιν ὅταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων καὶ θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος, ὁμοειδοῦς πρὸς ἐκείνας, διαιροῦμεν (μερίζομεν) τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μονάδων τούτων.

Κάθε μία ἀπὸ τὰς προηγουμένας διαιρέσεις εἶναι μερισμός.

Εἰς αὐτὰς ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης εἶναι ἑτεροειδεῖς· τὸ δὲ πηλίκον εἶναι πάντοτε ὁμοειδὲς μὲ τὸν διαιρετέον.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐὰν α μονάδες τιμῶνται β δραχμάς, ἡ 1 μονὰς ἀπὸ αὐτὰς τιμᾶται β : α δραχμάς.

§ 108. *Πρόβλημα 1<sup>ον</sup>*. Τὸ μέτρον ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 18 δραχμάς. Πόσα μέτρα τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος θὰ ἀγοράσωμεν μὲ 126 δραχμάς ;

*Λύσις*. Εἶναι φανερόν ὅτι θὰ ἀγοράσωμεν τόσα μέτρα, ὅσας φοράς χωροῦν αἱ 18 δρχ. εἰς τὰς 126 δρχ. Διὰ νὰ εὐρωμεν δὲ αὐτό, πρέπει νὰ κάμωμεν διαίρεσιν (μέτρησιν).

Διαιροῦντες τὸν 126 διὰ 18 εὐρίσκομεν πηλίκον 7 καὶ ὑπόλοι-

πον μηδέν. Ὡστε μὲ 126 δρχ. θὰ ἀγοράσωμεν 7 μ. ὑφάσματος.

*Πρόβλημα 2ον.* Πόσας ἑβδομάδας κάμνουν 105 ἡμέραι;

*Λύσις.* Ἐπειδὴ 1 ἑβδομὰς ἔχει 7 ἡμέρας, εἶναι φανερόν ὅτι πρέπει νὰ ζητήσωμεν νὰ εὐρωμεν πόσας φορές ὁ 7 χωρεῖ εἰς τὸν 105, δηλ. νὰ εὐρωμεν τὸ πηλίκον τοῦ 105 διὰ 7.

Διαιροῦντες τὸ 105 διὰ 7 εὐρίσκομεν πηλίκον 15. Ὡστε αἱ 105 ἡμέραι κάμνουν 15 ἑβδομάδας.

§ 109. Εἰς τὰ ἀνωτέρω προβλήματα δίδεται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων ὁμοειδῶν πρὸς αὐτὴν καὶ ζητεῖται τὸ πλῆθος τῶν πολλῶν μονάδων.

Διὰ νὰ εὐρωμεν δὲ τὸ ζητούμενον, διηρέσαμεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων διὰ τῆς τιμῆς τῆς μιᾶς μονάδος. Ἀπὸ τὸν τρόπον δὲ τῆς λύσεως αὐτῶν συνάγομεν ὅτι :

Ὅταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος καὶ τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων, ὁμοειδῶν πρὸς αὐτὴν, καὶ θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὸ πλῆθος τῶν πολλῶν αὐτῶν μονάδων, διαιροῦμεν τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων διὰ τῆς τιμῆς τῆς μιᾶς μονάδος.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐὰν τὸ ἐν χλγ. ἐνὸς πράγματος τιμᾶται α δραχμᾶς, μὲ β δραχμᾶς θὰ ἀγοράσωμεν β : α χιλιόγρ.

Εἰς τὴν μέτρησιν τὸ πηλίκον πρέπει νὰ λαμβάνη τὴν ὀνομασίαν, τὴν ὁποίαν ὀρίζει τὸ πρόβλημα.

§ 110. *Πρόβλημα.* Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν εἶναι 600 καὶ ὁ ἓνας ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ 12. Ποῖος εἶναι ὁ ἄλλος;

*Λύσις.* Ἐπειδὴ  $600 : 12 = 50$ , θὰ εἶναι  $600 = 12 \times 50$ . Ὁ ἄλλος λοιπὸν παράγων εἶναι ὁ 50. Ἀπὸ τὸν τρόπον δὲ τῆς λύσεως αὐτοῦ συνάγομεν ὅτι :

Ἐὰν γνωρίζωμεν τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν καὶ τὸν ἓνα ἐξ αὐτῶν καὶ θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὸν ἄλλον, διαιροῦμεν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ γνωστοῦ παράγοντος.

#### Προβλήματα διαιρέσεως

Α' Ὁ μ α ς. 98 ) Μία οἰκογένεια ἐξοδεύει 8 550 δρχ. κατὰ μῆνα (30 ἡμέραι). Πόσας δραχμᾶς ἐξοδεύει τὴν ἡμέραν;

99 ) Οικογενειάρχης εξοικονομεί 2370 δρχ. κατ' έτος. Μετά πόσα έτη θά δυνηθῆ νά αγοράσῃ ένα κτῆμα, τὸ ὁποῖον τιμᾶται 7 110 δραχμᾶς ;

100 ) Εἰς τὸ ὕδωρ ὁ ἤχος διανύει 21 525 μ. εἰς 15 δευτερόλεπτα. Πόση εἶναι ἡ ταχύτης τοῦ ἤχου εἰς τὸ ὕδωρ κατὰ δευτερόλεπτον ;

101 ) Εἰς τὸν ἀέρα ὁ ἤχος διανύει 8 500 μ. εἰς 25 δευτερόλεπτα. Πόση εἶναι ἡ ταχύτης τοῦ ἤχου εἰς τὸν ἀέρα κατὰ δευτερόλεπτον ;

102 ) Ὁ ἥλιος ἀπέχει ἀπὸ τὴν Γῆν 150 000 000 χιλιόμετρα. Τὸ δὲ φῶς διατρέχει 300 000 χιλιόμετρα εἰς ένα δευτερόλεπτον. Νὰ εὑρητε πόσον χρόνον χρειάζεται τὸ φῶς, διὰ νὰ φθάσῃ ἀπὸ τὸν ἥλιον εἰς τὴν Γῆν.

Β' Ὁ μ ἄ ς. 103 ) Μὲ 32 δεκάλεπτα ἀγοράζομεν 8 λεμόνια. Πόσον ἀξίζει τὸ καθένα ; Καὶ πόσα λεμόνια ἀγοράζομεν μὲ 12 δρχ. ;

104 ) Ὁ οἶνος ἐνὸς βαρέλιου ἀξίζει 1 096 δρχ. Ἐξάγομεν 85 χλγ. ἐκ τοῦ οἴνου καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἀξίζει 416 δρχ. Πόσα χλγ. οἴνου χωρεῖ τὸ βαρέλιον ;

105 ) Ἠγόρασέ τις τεμάχιον ὑφάσματος πρὸς 190 δρχ. τὰ 5 μέτρα καὶ τὸ ἐπώλησε πρὸς 495 δρχ. τὰ 11 μέτρα. Ἐκ τῆς πωλήσεως ἐκέρδισε 224 δρχ. Πόσα μέτρα ὑφάσματος εἶχεν ἀγοράσει ;

106 ) Ἠγόρασέ τις ὑφασμα ἀντὶ 1 260 δρχ. Νὰ εὑρεθῆ πόσα μέτρα ἠγόρασεν, ἐὰν γνωρίζωμεν ὅτι, ἐὰν ἠγόραζε 5 μέτρα ἐπὶ πλέον, θά ἐπλήρωνε 525 δρχ. περισσότερο.

107 ) Δύο ἔμποροι ἐπλήρωσαν εἰς τὸ τελωνεῖον 4 500 δρχ. ὡς φόρον εἰσαγωγῆς 250 μέτρων ὑφάσματος. Νὰ εὑρεθῆ πόσα μέτρα εἰσήγαγεν ἕκαστος, ἐὰν γνωρίζωμεν ὅτι ὁ πρῶτος ἐπλήρωσε 3 150 δρχ. καὶ ὁ δεύτερος τὸ ὑπόλοιπον.

108 ) Γεωργὸς ἐπώλησε 560 χλγ. σίτου ἀντὶ 1 736 δρχ. καὶ κριθὴν ἀντὶ 440 δρχ. Νὰ εὑρεθῆ πόσα χλγ. κριθῆς ἐπώλησεν, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι τὸ χλγ. τοῦ σίτου ἐπωλήθη κατὰ 60 λεπτά ἀκριβώτερον τῆς κριθῆς.

109 ) Κτηνοτρόφος ἐπώλησε 19 πρόβατα καὶ 37 ἀρνιά ἀντὶ 9 280 δρχ. Τὰ πρόβατα ἐπώλησε πρὸς 245 δρχ. τὸ ένα. Πόσον ἐπώλησε κάθε ἀρνίον ;

110 ) Ἐνα ὑφαντουργεῖον ἔχει 10 ἀργαλιούς καὶ κάθε ἕνας ὑφαίνει 208 μέτρα ὑφάσματος τὴν ἡμέραν. Νὰ εὑρητε εἰς πόσας ἡμέρας παράγει 52 000 μέτρα τὸ ὑφαντουργεῖον τοῦτο.

Γ' Ό μ ά ς. 111) Ἐπί ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 97 διὰ νὰ λάβωμεν ἀριθμὸν κατὰ 71 μεγαλύτερον τοῦ 13 800 ;

112) Πόσας φορὰς πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸν 309, διὰ νὰ εὗρωμεν τὸν ἀριθμὸν 18 231 ;

113) Ἐὰν γνωρίζῃς ὅτι τὸ πηλίκον τῆς τελείας διαιρέσεως  $\alpha : \beta$  εἶναι  $\pi$ , ἡμπορεῖς νὰ εἴπῃς πόσον θὰ εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $(\alpha \times \gamma) : (\beta \times \gamma)$ ; Καὶ διατί ;

114) Νὰ ὑπολογίσῃτε τὸ  $(\alpha \times \beta + \gamma) : \gamma$ , ἐὰν  $\alpha = 15$ ,  $\beta = 32$ ,  $\gamma = 8$ .

#### Προβλήματα ἐπὶ τῶν 4 πράξεων τῶν ἀκεραίων

Α' Ό μ ά ς. 115) Ἐμπορος ἠγόρασε 260 χλγ. σίτου ἀντὶ 754 δρχ. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸν σῖτον διὰ νὰ κερδίσῃ 30 λεπτά κατὰ χλγ. ;

116) Ἐμπορος ἠγόρασεν 135 πήχεις ὑφάσματος πρὸς 28 δρχ. τὸν πήχυν. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸν πήχυν τοῦ ὑφάσματος, διὰ νὰ κερδίσῃ ἐν ὄλῳ 405 δρχ. καὶ πόσον θὰ εἰσπράξῃ ἐκ τῆς πωλήσεως ;

117) Ἐμπορος ἠγόρασε 15 τόπια ὑφάσματος τῶν 40 μ. πρὸς 22 δρχ. τὸ μέτρον. Ἐπώλησε κατ' ἀρχὰς 250 μ. πρὸς 28 δρχ. τὸ μέτρον, ἔπειτα 260 μ. πρὸς 31 δρχ. τὸ μέτρον καὶ τέλος τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 26 δρχ. τὸ μέτρον. Πόσα ἐκέρδισεν ἐν ὄλῳ καὶ πόσον κατὰ μέτρον ;

Β' Ό μ ά ς. 118) Μία μοδίστα εἰσπράττει 380 δρχ. καθ' ἑβδομάδα καὶ ἐξοδεύει 25 δρχ. τὴν ἡμέραν. Μετὰ πόσον χρόνον θὰ ἐξοικονομήσῃ 1 845 δρχ. διὰ νὰ ἀγοράσῃ μίαν ραπτομηχανήν ;

119) Μία ὑπηρέτρια λαμβάνει 1 200 δρχ. τὸν μῆνα. Ἀπὸ αὐτὰς δαπανᾷ 200 δρχ. τὸν μῆνα καὶ στέλλει εἰς τοὺς γέροντας γονεῖς τῆς 400 δρχ. τὸν μῆνα. Πόσον χρόνον πρέπει νὰ ἐργασθῇ διὰ νὰ οἰκονομήσῃ 4 800 δραχμάς ;

120) Μία χωρική ἔφερεν εἰς μίαν ἐπαρχιακὴν πόλιν 100 αὐγά καὶ ἐπώλησεν αὐτὰ πρὸς 32 δεκάλεπτα τὸ ζεῦγος. Ἐπειτα δὲ ἠγόρασε 2 χλγ. σαποῦνι πρὸς 8 δρχ. τὸ χλγ. καὶ 2 χλγ. ρύζι πρὸς 14 δρχ. τὸ χλγ. Νὰ εὗρῃτε πόσα χρήματα ἐπερίσσευσαν εἰς αὐτήν.

121) Ἐνας γεωργὸς ἐπώλησε 2 000 χιλιόγρ. σίτου πρὸς 3

δραχ. τὸ χλγ. Ἀπὸ τὰ χρήματα δέ, τὰ ὅποια ἔλαβεν, ἐπλήρωσεν 650 δρχ., τὰς ὁποίας ἐχρεώσται εἰς τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν, καὶ ἐκράτησε 2 600 δραχ. διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς οἰκογενείας του. Μὲ τὰ ἄλλα δὲ ἠγόρασε πρόβατα πρὸς 250 δρχ. τὸ ἕνα. Νὰ εὐρητε πόσα πρόβατα ἠγόρασε.

122 ) Ἐνας φιλόνητος κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν γενεθλίων τοῦ υἱοῦ του ἐμοίρασε 5 000 δρχ. Ἀπὸ αὐτὰς ἔδωκεν ἀπὸ 500 δρχ. εἰς κάθε μίαν ἀπὸ τὰς 4 ἀπόρους οἰκογενείας τῆς συνοικίας του, τὰς δὲ ἄλλας ἐμοίρασεν ἐξ ἴσου εἰς 10 ἀπόρους συμμαθητὰς τοῦ υἱοῦ του. Νὰ εὐρητε πόσα χρήματα ἔλαβε κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοῦς.

Γ' Ὁ μ ἄ ς. 123 ) Κτηνοτρόφος ἠγόρασε 575 χλγ. χόρτου ξηροῦ πρὸς 80 λεπτὰ τὸ χλγ. καὶ 185 χλγ. κριθῆς πρὸς 240 λεπτὰ τὸ χλγ. Ἀπέναντι τῆς τιμῆς αὐτῆς ἔδωσε 3 χλγ. βουτύρου πρὸς 46 δρχ. τὸ χλγ., 25 χλγ. τυροῦ πρὸς 23 δρχ. τὸ χλγ. καὶ τὸ ὑπόλοιπον εἰς μετρητὰ. Πόσα μετρητὰ ἔδωκεν ;

124 ) Κτηνοτρόφος ἠγόρασεν 125 ἄρνια πρὸς 148 δρχ. τὸ ἕνα. Πωλεῖ τὰ 18 πρὸς 162 δρχ. τὸ ἕνα, ἔπειτα 45 πρὸς 163 δρχ. τὸ ἕνα. Ἀπέθανον ἐξ ἀσθενείας 5 ἄρνια καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐπώλησε πρὸς 167 δρχ. τὸ ἕνα. Πόσον ἐκέρδισεν, ἂν τὰ ἔξοδα τῆς συντηρήσεώς των ἦσαν 310 δραχμαί ;

Δ' Ὁ μ ἄ ς. 125 ) 20 ἐργάται καὶ 12 ἐργάτριαι ἔλαβον δι' ἐργασίαν 6 ἡμερῶν 15 288 δρχ. Νὰ εὐρεθῆ τὸ ἡμερομίσθιον ἐκάστου ἐργάτου καὶ ἐκάστης ἐργατρίας, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι τὸ ἡμερομίσθιον τοῦ ἐργάτου ἦτο κατὰ 41 δρχ. μεγαλύτερον τοῦ ἡμερομισθίου τῆς ἐργατρίας ;

126 ) Οἰκογενειάρχης τις ἠγόρασε ζάκχαριν πρὸς 11 δρχ. τὸ χλγ. καὶ ἴσην ποσότητα καφέ πρὸς 80 δρχ. τὸ χιλιόγρ. καὶ ἐπλήρωσε διὰ τὸν καφέ 276 δρχ. περισσότερον παρ' ὅ,τι ἐπλήρωσε διὰ τὴν ζάκχαριν. Νὰ εὐρεθῆ πόσα χιλιόγρ. ἠγόρασεν ἐξ ἐκάστου εἶδους καὶ πόσον ἐπλήρωσε δι' ἕκαστον εἶδος.

127 ) Οἰκογενειάρχης ἔδωκεν 276 δρχ. καὶ ἠγόρασεν ἔλαιον καὶ ζυμαρικά, ἴσον ἀριθμὸν χιλιόγρ. ἐξ ἐκάστου εἶδους. Τὸ ἔλαιον ἐτιμᾶτο 14 δρχ. τὸ χλγ. καὶ τὰ ζυμαρικά 9 δρχ. τὸ χλγ. Πόσα χλγ. ἠγόρασεν ἐξ ἐκάστου εἶδους ;

128 ) Τρεῖς ἀδελφοὶ ἐπλήρωσαν ἕνα χρέος τοῦ πατρός των ἀνερχόμενον εἰς 9 250 δρχ. Οἱ δύο μεγαλύτεροι ἐπλήρωσαν 575 δρχ.

ἕκαστος περισσότερον τοῦ νεωτέρου. Πόσον ἐπλήρωσεν ἕκαστος ;

129 ) Μία ἀγέλας μὲ τὸν μόσχον τῆς ἐπωλήθησαν ἀντὶ 2 845 δρχ. Ἡ ἀξία τῆς ἀγέλαδος ἦτο 7πλασία τῆς ἀξίας τοῦ μόσχου σὺν 45 δρχ. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ἀξία ἑκάστου ζώου.

130 ) Θεῖος μοιράζει χρηματικὸν ποσὸν μεταξύ ἐνὸς ἀνεψιοῦ καὶ μιᾶς ἀνεψιάς του. Τὸ μερίδιον τῆς ἀνεψιάς εἶναι κατὰ 255 500 δρχ. μεγαλύτερον τοῦ μεριδίου τοῦ ἀνεψιοῦ. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ δύο μερίδια, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι τὸ μερίδιον τῆς ἀνεψιάς ἦτο 8πλασίον τοῦ μεριδίου τοῦ ἀνεψιοῦ.

131 ) 30 μαθηταὶ ἕκαμαν μίαν ἐκδρομὴν μὲ κοινὰ ἔξοδα. Τὰ ἔξοδα ἀνῆλθον εἰς 780 δρχ. Μερικοὶ ὁμως ἀπὸ τοὺς μαθητὰς δὲν ἠδυνήθησαν νὰ πληρώσουν τὸ ἀναλογοῦν μερίδιον τῶν ἐξόδων. Κατὰ συνέπειαν οἱ ὑπόλοιποι ἐπλήρωσαν 4 δρχ. ἐπὶ πλεον ἕκαστος. Πόσοι ἦσαν οἱ μαθηταὶ οἱ μὴ δυνηθέντες νὰ πληρώσουν ;

132 ) Ἐμπορος ἐχώρισεν ὕφασμα εἰς δύο τεμάχια, τὰ ὁποῖα διέφερον κατὰ 42 μέτρα. Νὰ εὑρεθοῦν τὰ μήκη τῶν τεμαχίων, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι τὸ πρῶτον ἦτο 4πλασίον κατὰ μήκος ἀπὸ τὸ δεύτερον.

133 ) Δύο τεμάχια ὑφάσματος ἔχουν τὸ αὐτὸ μήκος. Τὸ μέτρον τοῦ α' τεμαχίου τιμᾶται 85 δρχ., τοῦ δὲ β' 56 δρχ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μήκος των, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι τὸ α' τιμᾶται 928 δρχ. περισσότερον τοῦ β'.

134 ) Ἐσκέφθην ἀριθμὸν τὸν διπλασιάζω καὶ εἰς τὸ ἐξαγόμενον προσθέτω 20 καὶ εὐρίσκω ἄθροισμα 90. Ποῖον ἀριθμὸν ἐσκέφθην ;

Ε' Ὁ μ ἄ ς. 135 ) Ποδηλάτης καὶ πεζοπόρος ἀναχωροῦν τὴν 8ην πρωϊνὴν, ὁ μὲν ἐκ τῆς πόλεως Α, ὁ δὲ ἐκ τῆς πόλεως Β καὶ διευθύνονται πρὸς συνάντησίν των. Ὁ ποδηλάτης διανύει 16 χιλιόμε. τὴν ὥραν καὶ ὁ πεζοπόρος 5. Πότε καὶ εἰς ποῖαν ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς πόλεως Α θὰ συναντηθοῦν, ἂν ἡ ἀπόστασις ΑΒ εἶναι 105 χλμ. ;

136 ) Ποδηλάτης, ὁ ὁποῖος ἀνεχώρησε τὴν 7ην πρωϊνὴν ἐκ τῆς πόλεως Α μὲ ταχύτητα 16 χιλμ. τὴν ὥραν, θέλει νὰ φθάσῃ πεζόν, ὁ ὁποῖος προηγεῖται αὐτοῦ κατὰ 55 χιλμ. Κατὰ ποῖαν ὥραν καὶ εἰς ποῖαν ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς πόλεως Α ὁ ποδηλάτης θὰ φθάσῃ τὸν πεζόν, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι ὁ πεζὸς κινεῖται μὲ ταχύτητα 5 χλμ. τὴν ὥραν ;

137 ) Ἐνα ἀτμόπλοιοι τρέχει 12 μίλια τὴν ὥραν. Πόσας ὥρας θὰ κάμῃ ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν Βόλον, ὁ ὁποῖος ἀπέχει 192 μίλια ; Καὶ ἂν ἀναχωρήσῃ τὴν 8ην πρὸ μεσημβρίας, ποῖαν ὥραν θὰ φθάσῃ ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

§ 111. *Πρόβλημα 1ον.* Μία έξοχική οικία έχει 3 δωμάτια. Κάθε δωμάτιον έχει 3 παράθυρα. Πόσα παράθυρα έχει ή οικία αυτή;

*Λύσις.* Ἀφοῦ τὸ ἓνα δωμάτιον ἔχει 3 παράθυρα, τὰ 3 δωμάτια θὰ ἔχουν τρεῖς φορές περισσότερα παράθυρα, ἤτοι :

$$3 \times 3 = 9 \text{ παράθυρα}$$

§ 112. *Πρόβλημα 2ον.* Ἐνα κιβώτιον ἔχει 4 στρώματα σάπωνος. Κάθε στρώμα ἔχει 4 σειρὰς καὶ κάθε σειρὰ ἔχει 4 πλάκας σάπωνος. Πόσας πλάκας ἔχει τὸ κιβώτιον αὐτό;

*Λύσις.* Ἀφοῦ ἡ μία σειρὰ ἔχει 4 πλάκας, αἱ 4 σειραὶ κάθε στρώματος ἔχουν  $4 \times 4$  πλάκας. Τὰ δὲ 4 στρώματα ἔχουν :

$$4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ πλάκας.}$$

§ 113. Τί εἶναι δύναμις ἀριθμοῦ. Ἀπὸ τὴν λύσιν τῶν προηγουμένων προβλημάτων εὔρομεν τὰ γινόμενα :

$$3 \times 3 \text{ καὶ } 4 \times 4 \times 4$$

Παρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι εἶναι δυνατὸν οἱ παράγοντες ἑνὸς γινομένου νὰ εἶναι ὅλοι ἴσοι πρὸς ἓνα ἀριθμὸν.

Τὸ γινόμενον  $3 \times 3$  λέγεται **δύναμις** τοῦ 3, τὸ δὲ  $4 \times 4 \times 4$  λέγεται δύναμις τοῦ 4. Γενικῶς :

**Δύναμις** ἑνὸς ἀριθμοῦ λέγεται κάθε γινόμενον, τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ παράγοντες εἶναι ἴσοι πρὸς τὸν ἀριθμὸν αὐτόν.

**Βάσις.** Ἐκαστος τῶν ἴσων παραγόντων μιᾶς δυνάμεως λέγεται **βάσις** αὐτῆς.

**Βαθμός.** Ὡς βαθμὸν μιᾶς δυνάμεως θεωροῦμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἴσων παραγόντων αὐτῆς.

Π.χ. ἡ δύναμις  $5 \times 5$  εἶναι 2ου βαθμοῦ.

ἡ δύναμις  $5 \times 5 \times 5 \times 5$  εἶναι 4ου βαθμοῦ.

**\*Εκθέτης.** Ὁ βαθμὸς τῆς δυνάμεως ἑνὸς ἀριθμοῦ δηλοῦται δι' ἑνὸς ἀριθμοῦ, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται **ἐκθέτης** καὶ ὁ ὁποῖος γράφεται δεξιά καὶ ὀλίγον ἄνω τῆς βάσεως.

Οὕτως ἡ πέμπτη δύναμις τοῦ 4 γράφεται  $4^5$  καὶ ἀπαγγέλλεται 4 εἰς τὴν πέμπτην.

Ἡ **δευτέρα δύναμις** ἑνὸς ἀριθμοῦ λέγεται καὶ **τετράγωνον** τοῦ ἀριθμοῦ, ἡ δὲ **τρίτη δύναμις** λέγεται καὶ **κύβος** τοῦ ἀριθμοῦ.

Οὕτω τὸ  $7 \times 7$  γράφεται  $7^2$  καὶ ἀπαγγέλλεται 7 εἰς τὴν δευτέραν ἢ 7 εἰς τὸ τετράγωνον.

Τὸ  $5 \times 5 \times 5$  γράφεται  $5^3$  καὶ ἀπαγγέλλεται 5 εἰς τὴν τρίτην ἢ 5 εἰς τὸν κύβον.

Ἡ εὔρεσις μιᾶς δυνάμεως ἀριθμοῦ λέγεται **ὑψωσις** αὐτοῦ εἰς τὴν δύναμιν ταύτην.

**§ 114. Παρατηρήσεις.** 1η. Ἐπειδὴ  $0^3 = 0 \times 0 \times 0 = 0$ , ἔπεται ὅτι:

**Κάθε δύναμις τοῦ μηδενὸς εἶναι ἴση μὲ μηδέν.**

2α. Ἐπειδὴ  $1^3 = 1 \times 1 \times 1 = 1$

$1^5 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$ , ἔπεται ὅτι:

**Κάθε δύναμις τοῦ 1 εἶναι ἴση μὲ 1.**

3η. Ἐπειδὴ  $10^2 = 10 \times 10 = 100$

$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000$ , ἔπεται ὅτι:

**Κάθε δύναμις τοῦ 10 ἰσοῦται μὲ τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ τόσα μηδενικά, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ ἐκθέτης.**

4η. Δὲν πρέπει νὰ συγχέωμεν τὴν **δύναμιν** ἑνὸς ἀριθμοῦ μὲ τὸ **γινόμενον** αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ ἕνα παράγοντα ἴσον μὲ τὸν βαθμὸν τῆς δυνάμεως. Π.χ.  $3^4$  καὶ  $3 \times 4$ . Διότι  $3^4$  σημαίνει:

$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ , ἐνῶ  $3 \times 4$  σημαίνει  $3 + 3 + 3 + 3 = 12$ .

#### \* Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

Α' Ὁ μ ἄ ς. 138 ) Γράψατε συμβολικῶς τὰς κάτωθι δυνάμεις:

- |                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. $5 \times 5 \times 5$          | 3. $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$ | 5. $\alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha$ |
| 2. $2 \times 2 \times 2 \times 2$ | 4. $3 \times 3 \times 3$                   | 6. $\beta \times \beta \times \beta \times \beta$     |

139) Να εύρητε :

1. Τα τετράγωνα τῶν ἀριθμῶν 11, 12, 13, 14, 15.
2. Τοὺς κύβους τῶν ἀριθμῶν 10, 20, 30, 40, 50.
3. Τὴν 4ην δύναμιν τοῦ 3 καὶ τὴν 5ην δύναμιν τοῦ 2.

140) Να ὑπολογισθοῦν αἱ κάτωθι δυνάμεις :

$$2^4, 3^3, 3^5, 1^8, 5^2, 8^3, 12^3, 24^2.$$

141) Να ἐκτελεστοῦν αἱ κάτωθι πράξεις :

$$\begin{array}{ll} 1. 2^3 + 3^2 + 4^2 + 1^5 & 3. 8^2 \times 10^2 \times 1^5 \\ 2. 8^2 + 2^4 + 5^2 + 1^4 & 4. 5^2 \times 10^3 \times 2^4. \end{array}$$

Β' Ὁμάς. 142) Ἐνα κιβώτιον ἔχει 6 στρώματα σάπωνος. Κάθε στρώμα ἔχει 6 σειρὰς καὶ κάθε σειρὰ 6 πλάκας σάπωνος. Να εύρητε πόσας πλάκας ἔχουν 6 τοιαῦτα κιβώτια.

143) Ἐνας παντοπώλης ἔχει 5 κιβώτια μὲ κυττῖα γάλακτος. Κάθε κιβώτιον ἔχει 5 στρώματα· κάθε στρώμα ἔχει 5 σειρὰς καὶ κάθε σειρὰ ἔχει 5 κυττῖα. Να εύρητε πόσα κυττῖα ἔχει ὁ παντοπώλης οὗτος.

## 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

§ 115. Ἰδιότης I. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εύρωμεν τὸ γινόμενον  $3^2 \times 3^3$ .

Ἐπειδὴ  $3^2 = 3 \times 3$  καὶ  $3^3 = 3 \times 3 \times 3$ , ἔπεται ὅτι :

$$3^2 \times 3^3 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$$

Ἐπίσης εύρίσκομεν ὅτι  $3^2 \times 3^3 \times 3^4 = 3^5 \times 3^4 = 3^9$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Τὸ γινόμενον δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μὲ ἐκθέτην τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκθετῶν αὐτῶν.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$\boxed{\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} \cdot \alpha^{\rho} = \alpha^{\mu + \nu + \rho}}$$

§ 116. Ἰδιότης II. Ἀπὸ τὴν προηγουμένην ἰσότητα  $3^2 \times 3^3 = 3^5$  δυνάμεθα νὰ εύρωμεν τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ  $3^5$  διὰ  $3^2$  ἢ τοῦ  $3^5$  διὰ  $3^2$ . Βλέπομεν δηλαδὴ ὅτι :

$$3^5 : 3^2 = 3^3 \text{ καὶ } 3^5 : 3^3 = 3^2.$$

Ἀπὸ τὰς ἰσότητας αὐτὰς συνάγομεν ὅτι :

Τὸ πηλίκον μιᾶς δυνάμεως δι' ἄλλης δυνάμεως τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἰσοῦται πρὸς δύναμιν τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μὲ ἐκθέτην

τὴν διαφοράν τοῦ ἐκθέτου τοῦ διαιρέτου ἀπὸ τὸν ἐκθέτην τοῦ διαιρετέου.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$\boxed{\alpha^\mu : \alpha^\nu = \alpha^{\mu-\nu}, \text{ ἂν } \mu > \nu}$$

§ 117. Παρατηρήσεις. 1η. Κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα πρέπει νὰ εἶναι  $2^4 : 2^3 = 2^1$  (1)

Ἐπειδὴ δὲ  $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$  ἢ  $2^4 = (2 \times 2 \times 2) \times 2$  ἢ  $2^4 = 2^3 \times 2$ , βλέπομεν ὅτι  $2^4 : 2^3 = 2$  (2)

Ἀπὸ τὰς ἰσότητας (1) καὶ (2) βλέπομεν ὅτι πρέπει νὰ δεχθῶμεν ὅτι:  $2^1 = 2$ .

Ὅμοίως βεβαιούμεθα ὅτι πρέπει νὰ δεχθῶμεν  $3^1 = 3$ ,  $4^1 = 4$  κ.τ.λ. Λέγομεν λοιπὸν ὅτι:

**Πρώτη δύναμις ἐνὸς ἀριθμοῦ ( $\neq 0$ ) εἶναι ὁ ἴδιος ἀριθμός.**

2α. Ἄν θέλωμεν νὰ ἀληθεύῃ ἡ προηγουμένη ιδιότης καὶ ὅταν οἱ ἐκθέται εἶναι ἴσοι, θὰ εἶναι π.χ.  $3^2 : 3^2 = 3^0$ . Ἐπειδὴ δὲ προφανῶς  $3^2 : 3^2 = 1$ , πρέπει νὰ δεχθῶμεν ὅτι  $3^0 = 1$ . Ὅμοίως βεβαιούμεθα ὅτι πρέπει νὰ δεχθῶμεν ὅτι  $2^0 = 1$ ,  $4^0 = 1$  κ.τ.λ.

Λέγομεν λοιπὸν ὅτι:

**Μηδενικὴ δύναμις παντὸς ἀριθμοῦ ( $\neq 0$ ) εἶναι ἡ 1.**

§ 118. Ἰδιότης III. Πῶς ὑψώνομεν γινόμενον εἰς μίαν δύναμιν. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὗρωμεν τὴν δευτέραν δύναμιν τοῦ  $3 \times 5$ , δηλαδὴ τὴν δύναμιν  $(3 \times 5)^2$ .

Ἐπειδὴ  $3 \times 5 = 15$ , θὰ εἶναι:  
 $(3 \times 5)^2 = 15^2 = 15 \times 15 = 225$ .

Ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ  $3^2 = 9$ ,  $5^2 = 25$ , ἔπεται ὅτι θὰ εἶναι:  
 $3^2 \times 5^2 = 9 \times 25 = 225$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω βλέπομεν ὅτι:  
 $(3 \times 5)^2 = 3^2 \times 5^2$ .

Ὅμοίως εὕρισκομεν ὅτι:  
 $(2 \times 3 \times 5)^3 = 2^3 \times 3^3 \times 5^3$  καὶ  $(4 \times 5)^4 = 4^4 \times 5^4$ .

Ἀπὸ αὐτὰς τὰς ἰσότητας συνάγομεν τὴν κάτωθι ιδιότητα:

**Ἐνα γινόμενον ὑψοῦται εἰς δύναμιν, ἂν ὑψωθοῦν ὅλοι οἱ παράγοντές του εἰς τὴν δύναμιν αὐτήν.**

Είναι λοιπόν γενικῶς:

$$(\alpha \times \beta \times \gamma)^{\nu} = \alpha^{\nu} \times \beta^{\nu} \times \gamma^{\nu}$$

§ 119. Ἰδιότης IV. Πῶς ὑψώνομεν μίαν δύναμιν εἰς ἄλλην δύναμιν. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ ὑψώσωμεν τὴν δύναμιν  $5^3$  εἰς τὸ τετράγωνον, δηλαδὴ νὰ εὔρωμεν τὴν δύναμιν  $(5^3)^2$ .

Κατὰ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα θὰ εἶναι:

$$(5^3)^2 = (5 \times 5 \times 5)^2 = 5^2 \times 5^2 \times 5^2 \quad \eta \quad (5^3)^2 = 5^{2+2+2} \quad \eta \quad (5^3)^2 = 5^{2 \cdot 3}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα:

Διὰ νὰ ὑψώσωμεν δύναμιν ἀριθμοῦ εἰς ἄλλην δύναμιν, ἀρκεῖ νὰ σχηματίσωμεν δύναμιν τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ μετ' ἐκθέτην τὸ γινόμενον τῶν δύο ἐκθετῶν.

Κατὰ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν θὰ εἶναι γενικῶς:

$$(\alpha^{\mu})^{\nu} = \alpha^{\mu \cdot \nu}$$

#### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

144) Νὰ γίνῃ μία δύναμις καθένα ἀπὸ τὰ κάτωθι γινόμενα:

1.  $4^3 \times 4^2$                       3.  $3^2 \times 3 \times 3^5$   
2.  $2^2 \times 2^3 \times 2^4$               4.  $5^3 \times 5^6 \times 5^1 \times 5^2$

145) 1. Νὰ ὑψωθοῦν εἰς τὸ τετράγωνον τὰ γινόμενα:

1.  $2 \times 3$     2.  $3 \times 4$     3.  $2 \times 3 \times 5$

2. Νὰ ὑψωθοῦν εἰς τὸν κύβον τὰ κάτωθι γινόμενα:

1.  $2 \times 3 \times 1$     2.  $2 \times 5 \times 10$     3.  $5 \times 2 \times 1$

146) Νὰ τρέψητε: 1ον. Τὴν δύναμιν  $4^2$  εἰς δύναμιν τοῦ 2

2ον. Τὴν δύναμιν  $9^2$  εἰς δύναμιν τοῦ 3

147) Νὰ τρέψητε τὰ κάτωθι γινόμενα εἰς μίαν δύναμιν:

1.  $9 \times 3^2$     2.  $2 \times 5 \times 10^2$     3.  $2^3 \times 5^3$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'  
ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

§ 120. Ἄριθμὸς διαιρετὸς δι' ἄλλου. Ὁ ἀριθμὸς 3 διαιρεῖ ἀκριβῶς τὸν 24. Διὰ τοῦτο ὁ 3 λέγεται **διαιρετὸς** τοῦ 24. Ὁ δὲ 24 **διαιρετὸς** διὰ τοῦ 3. Διὰ τὸν ἴδιον λόγον ὁ 3 λέγεται διαιρετὸς τοῦ 27 καὶ ὁ 27 διαιρετὸς διὰ τοῦ 3. Ὡστε:

Ἄριθμὸς τις λέγεται **διαιρετὸς δι' ἄλλου**, ἂν διαιρῆται ἀκριβῶς δι' αὐτοῦ.

Ἐνας ἀριθμὸς λέγεται **διαιρετὸς ἄλλου**, ἂν διαιρῆ αὐτὸν ἀκριβῶς.

§ 121. Πολλαπλάσιον ἑνὸς ἀριθμοῦ. Ἐπειδὴ  $24 : 3 = 8$ , ἔπεται ὅτι  $24 = 3 \times 8$ . Ὁ 24 λοιπὸν εἶναι καὶ **πολλαπλάσιον** τοῦ 3, διότι γίνεται ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον 8. Ὁ δὲ 3 εἶναι **παράγων** ἢ ἕνα **ὑποπολλαπλάσιον** τοῦ 24. Ὡστε:

**Πολλαπλάσιον ἑνὸς ἀριθμοῦ** λέγεται τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ τυχόντα ἀκέραιον ἀριθμὸν.

Ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ του παράγει ἄλλον ἀριθμὸν, λέγεται **παράγων** αὐτοῦ.

§ 122. Χαρακτῆρες διαιρετότητος. Εἶναι φανερὸν ὅτι, ἂν διαιρέσωμεν ἕνα ἀριθμὸν δι' ἄλλου, ἂν ἀγνωρίζομεν, ἂν ὁ πρῶτος διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ τοῦ δευτέρου ἢ ὄχι.

Ἐνίστε ὁμως, χωρὶς νὰ κάμωμεν τὴν διαίρεσιν, διακρίνομεν τοῦτο βοηθούμενοι ἀπὸ μερικὰ ἰδιαίτερα γνωρίσματα. Αὐτὰ τὰ γνωρίσματα λέγονται **χαρακτῆρες διαιρετότητος**. Περιέχονται δὲ εἰς τὸ περὶ διαιρετότητος κεφάλαιον αὐτὸ τῆς Ἀριθμητικῆς καὶ στηρίζονται εἰς τὰς ἀκολουθοῦσας ιδιότητες.

8      4  
 24  
 36  
 68  
 125

§ 123. **Ίδιότης I.** Ἐπειδὴ  $24 : 3 = 8$ , θὰ εἶναι  $24 = 3 \times 8$ .  
 Δηλαδή ὁ 24, ὁ ὁποῖος εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 3, εἶναι καὶ πολλαπλάσιον αὐτοῦ.

*Ἀντιστρόφως.* Εἶναι φανερὸν ὅτι τυχὸν πολλαπλάσιον τοῦ 3, π.χ. τὸ  $3 \times 5$ , δηλαδή ὁ 15, διαιρεῖται διὰ τοῦ 3. Ὡστε κάθε πολλαπλάσιον τοῦ 3 εἶναι διαιρετὸν δι' αὐτοῦ.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι:

**Κάθε ἀριθμὸς διαιρεῖ ἀκριβῶς τὰ πολλαπλάσιά του καὶ μόνον αὐτά.**

§ 124. **Ίδιότης II.** Ὁ 5 διαιρεῖ τοὺς ἀριθμοὺς 20 καὶ 35, διότι εἶναι πολλαπλάσια αὐτοῦ.

Ἐπειδὴ δὲ ὁ 20 ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα 5 καὶ ὁ 35 ἀπὸ ἑπτὰ 5 τὸ ἄθροισμα  $20 + 35$  ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνδεκα 5, ἦτοι εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5. Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα  $20 + 35 + 15$  εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 5.

Ἀπὸ τὰ παραδείγματα αὐτὰ συνάγομεν ὅτι:

**Ἄν ἓνας ἀριθμὸς διαιρῆ δύο ἢ περισσοτέρους ἀριθμούς, θὰ διαιρῆ καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.**

*Σημείωσις.* Κατὰ τὰς ιδιότητας αὐτὰς ὁ 2, ὡς διαιρῶν τὰ μέρη τοῦ ἀριθμοῦ 48, δηλαδή τὰς 4 δεκάδας καὶ τὰς 8 μονάδας, θὰ διαιρῆ καὶ ὅλον τὸν ἀριθμὸν 48, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄθροισμα αὐτῶν.

§ 125. **Ίδιότης III.** Ἐὰν τώρα ἀπὸ τὰ 7 πέντε τοῦ 35 ἀφαιρέσωμεν τὰ 4 πέντε τοῦ 20, θὰ μείνουν 3 πέντε.

Παρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι ἡ διαφορὰ  $35 - 20 = 5 + 5 + 5$ , διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ 5. Ὡστε :

**Ἄν ἀριθμὸς διαιρῆ δύο ἄλλους, θὰ διαιρῆ καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν.**

§ 126. **Ίδιότης IV.** Ὁ 6 διαιρεῖ τὸν 12, διαιρεῖ ὁμως καὶ τὸν 24, ἦτοι  $12 + 12$  ἢ  $12 \times 2$ , καὶ τὸν 36, ἦτοι  $12 + 12 + 12$  ἢ  $12 \times 3$  κ.τ.λ. Ὡστε:

**Ἄν ἓνας ἀριθμὸς διαιρῆ ἄλλον, θὰ διαιρῆ καὶ τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ.**

Π.χ. ὁ 4 διαιρεῖ τὴν 1 ἑκατοντάδα, ἄρα θὰ διαιρῆ καὶ τὰς 7 ἑκατοντάδας ἢ τὰς 15 ἑκατοντάδας ἢ ὅσασδήποτε ἑκατοντάδας.

### Ἄσκησεις

- 148 ) Εὑρετε : 1ον. Τὰ 5 πρῶτα πολλαπλάσια τοῦ 3.  
2ον. » 5 » » » 9.
- 149 ) Εὑρετε : 1ον. Τρεῖς διαιρέτας τοῦ 24. 2ον. Τέσσαρα ὑποπολλαπλάσια τοῦ 36. 3ον. Δύο παράγοντας τοῦ 15.

### 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΟΣ

§ 127. Ποῖοι ἀριθμοὶ εἶναι διαιρετοὶ διὰ 10, 100 κ.τ.λ. Τὰ πολλαπλάσια τοῦ 10 εἶναι 10, 20, 30, ... εἶναι δηλ. ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι λήγουν εἰς μηδέν. Τὰ πολλαπλάσια τοῦ 100 εἶναι ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι λήγουν εἰς δύο μηδενικά κ.ο.κ.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι:

Διὰ τοῦ 10, 100, 1000 κ.τ.λ. εἶναι διαιρετοὶ οἱ ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι λήγουν ἀντιστοίχως εἰς 1, 2, 3 κ.τ.λ. τουλάχιστον μηδενικά.

§ 128. Ποῖοι ἀριθμοὶ εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2 ἢ 5. *Πρόβλημα.* Οἰνοπώλης ἔχει 386 χιλιάγραμ. οἴνου. Ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ, ἂν δύναται νὰ θέσῃ ὅλον τὸν οἶνον αὐτὸν εἰς φιάλας τῶν 2 χλγ. ἢ τῶν 5 χλγ.

Εἶναι φανερόν ὅτι τὸ ζητούμενον θὰ γίνῃ, ἂν ὁ ἀριθμὸς 386 διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ 2 ἢ 5. Διὰ νὰ ἴδωμεν δέ, ἂν ὁ 386 διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ 2 ἢ 5, χωρὶς νὰ κάμωμεν τὴν διαίρεσιν, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς:

Τὰ 10 χλγ. οἴνου εἶναι δυνατόν νὰ τεθοῦν εἰς φιάλας τῶν 2 ἢ 5 χλγ. διότι  $2 \times 5 = 10$ . Ἐπειδὴ δὲ ὁ 2 καὶ 5 διαιροῦν τὸν 10 ἢ τὴν μίαν δεκάδα, ἔπεται ὅτι θὰ διαιροῦν καὶ τὰς 38 δεκάδας.

Πρέπει λοιπὸν νὰ παρατηρήσωμεν μόνον, ἂν καὶ αἱ 6 ἄπλαϊ μονάδες διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ 2 ἢ 5. Ἐπειδὴ ὁ 6 διαιρεῖται διὰ 2 ὄχι ὁμως καὶ διὰ 5, ἐννοοῦμεν ὅτι τὰ 386 χλγ. οἴνου μόνον εἰς φιάλας τῶν 2 χλγ. εἶναι δυνατόν νὰ τεθοῦν. Ἄν δὲ τεθοῦν εἰς φιάλας τῶν 5 χλγ., θὰ περισσεύσῃ 1 χλγ. οἴνου ἀπὸ τὰ 6 χλγ. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι:

Ἄριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 2 ἢ διὰ 5, ἂν τὸ τελευταῖον ψηφίον τοῦ διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ 2 ἢ 5.

Ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ τοὺς μονοψηφίους ἀριθμοὺς μόνον ὁ 0 καὶ ὁ 5 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 5, συντομώτερον λέγομεν:

Διὰ τοῦ 5 διαιροῦνται, ὅσοι ἀριθμοὶ τελειώνουν εἰς 0 ἢ εἰς 5.  
Οἱ ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ 2, λέγονται ἄρτιοι ἢ ζυγοί. Ὅσοι δὲν διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ 2 λέγονται περιττοὶ ἢ καὶ μονοὶ ἀριθμοί.

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

150) Ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 28, 254, 761, 245, 1 600 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2, ποῖοι διὰ 5 καὶ διατί;

151) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων τῶν ἀριθμῶν 375, 248, 3 727, 4 560, 3 968 διὰ 2 ἢ διὰ 5, χωρὶς νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ διαιρέσεις.

152) Ποῖος εἶναι ὁ μικρότερος ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς ἓνα ἄρτιον ἀριθμὸν ἢ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπ' αὐτὸν διὰ νὰ γίνῃ περιττός;

153) Ποῖα εἶναι τὰ ψηφία, τὰ ὁποῖα δυνάμεθα νὰ θέσωμεν δεξιὰ τοῦ 94, διὰ νὰ σχηματίσωμεν ἓνα τριψήφιον ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ 2;

154) Νὰ διακρίνητε ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 200, 3 000, 12 000, 560 000, 17 304, 2 620 000 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2, ποῖοι διὰ 5, ποῖοι διὰ 10, ποῖοι διὰ 100 καὶ ποῖοι διὰ 1 000.

155) Ἐὰν προσθέσωμεν 1ον δύο ἀρτίους ἢ 2ον δύο περιττοὺς ἀριθμοὺς, θὰ προκύψῃ ἄρτιος ἢ περιττός ἀριθμὸς; Δείξατε αὐτὸ διὰ παραδειγμάτων, καὶ διατυπώσατε τὸν σχετικὸν κανόνα.

§ 129. Ποῖοι ἀριθμοὶ εἶναι διαιρετοὶ διὰ 4 ἢ 25. *Πρόβλημα.* Ἐνας ἔμπορος ἔχει 6 528 χλγ. ἐλαίου. Νὰ εὑρεθῇ, ἂν ἡμπορῇ νὰ θέσῃ ὅλον τὸ ἔλαιον εἰς δοχεῖα τῶν 4 χλγ. ἢ τῶν 25 χλγ.

Εἶναι φανερόν ὅτι τοῦτο θὰ γίνῃ, ἂν ὁ ἀριθμὸς 6 528 διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ 4 ἢ 25. Διὰ νὰ ἴδωμεν δὲ αὐτό, χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, σκεπτόμεθα ὅπως καὶ εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα:

Δηλαδή τὰ 100 χλγ. ἐλαίου δύνανται νὰ θεθοῦν ὄλα εἰς δοχεῖα τῶν 4 χλγ. ἢ 25 χλγ. διότι  $100 = 4 \times 25$ . Ἐπειδὴ δὲ ὁ 4 καὶ 25 διαιροῦν τὸν 100 ἢ τὴν μίαν ἑκατοντάδα, ἔπεται ὅτι θὰ διαιροῦν καὶ τὰς 65 ἑκατοντάδας.

Πρέπει λοιπὸν νὰ παρατηρήσωμεν μόνον, ἔαν καὶ αἱ 28 μονάδες, δηλαδή ὁ ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον σχηματίζουν τὰ δύο τελευταῖα ψηφία τοῦ 6 528, διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ 4 ἢ 25. Ἐπειδὴ δὲ ὁ 28

διαιρείται διὰ 4, ὄχι ὁμως καὶ διὰ 25, ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ 6 528 διαιρείται ἀκριβῶς διὰ 4 καὶ ὄχι διὰ 25.

Ὡστε τὰ 6 528 χλγ. ἐλαίου μόνον εἰς δοχεῖα τῶν 4 χλγ. εἶναι δυνατὸν νὰ τεθοῦν.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι:

**Ἄριθμός τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 4 ἢ 25, ἐὰν τὰ δύο τελευταῖα ψηφία του, ὡς ἔχουν γραφῆ, σχηματίζουν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ 4 ἢ 25.**

Ἄν δὲ παρατηρήσωμεν ὅτι ἀπὸ τοὺς διψηφίους ἀριθμοὺς μόνον οἱ ἀριθμοὶ 25, 50 καὶ 75 διαιροῦνται διὰ 25, ἐννοοῦμεν ὅτι:

**Διὰ τοῦ 25 διαιροῦνται οἱ ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι τελειώνουν εἰς 2 μηδενικά, εἰς 25, εἰς 50 ἢ εἰς 75.**

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

156 ) Ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 764, 3 782, 5 834, 3 750, 2 700 7 625 διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ 4 καὶ ποῖοι διὰ 25;

157 ) Ποῖον ψηφίον πρέπει νὰ θέσωμεν δεξιὰ ἐκάστου τῶν ἀριθμῶν 32, 43, 65, 76, 57, διὰ νὰ σχηματισθῆ ἀριθμὸς τριψήφιος διαιρετὸς διὰ 4;

158 ) Ὅλα τὰ ψηφία ἑνὸς ἀριθμοῦ εἶναι 2· εἶναι διαιρετὸς ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς διὰ 4;

159 ) Δεξιὰ ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 58, 963, 3 404 νὰ γράψετε δύο ψηφία, διὰ νὰ γίνῃ καθένας διαιρετὸς διὰ τοῦ 25.

160 ) Ποῖος εἶναι ὁ μικρότερος ἀριθμὸς, τὸν ὅποιον πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν 326, διὰ νὰ σχηματισθῆ ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 4;

161 ) Ἐνα σχολεῖον ἔχει 415 μαθητὰς. Ἄν ὁ γυμναστής παρατάξῃ αὐτοὺς κατὰ τετράδας, νὰ ἐξετάσῃτε, ἂν θὰ περισσεύσουν καὶ πόσοι μαθηταί.

**§ 130. Ποῖοι ἀριθμοὶ εἶναι διαιρετοὶ διὰ 9 ἢ 3. Πρόβλημα.** Δυνάμεθα νὰ μοιράσωμεν ἀκριβῶς 5 427 δρχ. εἰς 9 ἢ εἰς 3 μαθητὰς;

*Λύσις.* Παρατηροῦμεν ὅτι αἱ 5 427 δρχ. ἀποτελοῦνται ἀπὸ 5 χιλιοδραχμα, 4 ἑκατοντάδραχμα, 2 δεκάδραχμα, καὶ 7 δραχμάς. Ἄν μοιράσωμεν κάθε χιλιοδραχμον ἢ κάθε ἑκατοντάδραχμον ἢ κάθε δεκάδραχμον εἰς 9 ἢ 3 μαθητὰς, περισσεύει πάντοτε 1 δραχμή.

$$\begin{array}{r|l} 1000 & 9 \\ 10 & 111 \\ 10 & \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 100 & 9 \\ 10 & 11 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 100 & 3 \\ 10 & 33 \\ 1 & \end{array}$$

Ἐπομένως ἀπὸ τὰ 5 χιλιάδραχμα θὰ περισσεύσουν 5 δραχμ., ἀπὸ τὰ 4 ἑκατοντάδραχμα 4 δραχμαί, ἀπὸ τὰ 2 δεκάδραχμα 2 δραχμ., καὶ 7 δραχμαί, τὰς ὁποίας εἶχομεν ἐξ ἀρχῆς. Θὰ περισσεύσουν λοιπὸν ἐν ὄλῳ  $5 + 4 + 2 + 7$  ἢ 18 δρχ., αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ μοιρασθοῦν εἰς 9 ἢ 3 μαθητὰς, χωρὶς νὰ μείνη τίποτε.

Ἄν εἶχομεν 3567 δρχ. καὶ εἰργαζόμεθα ὁμοίως, θὰ εὐρίσκομεν ὅτι θὰ ἐπερίσσειον  $3 + 5 + 6 + 7$  ἢ 21 δρχ., αἱ ὁποῖαι μοιράζονται ἀκριβῶς εἰς 3 μαθητὰς, ἀλλ' ὄχι εἰς 9, διότι περισσεύουν 3 δραχμαί.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι:

**Ἄριθμός τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 3 ἢ 9, ἂν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ 3 ἢ 9.**

#### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

162 ) Ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 326, 219, 945, 1 302, 3 105 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 3, ποῖοι διὰ 9 καὶ διατί;

163 ) Ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 925, 436, 156, 324, 564, 3 024 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2, διὰ 3, διὰ 4, διὰ 5, διὰ 9 καὶ διατί;

164 ) Ποῖα ψηφία δυνάμεθα νὰ γράψωμεν δεξιὰ ἐκάστου τῶν ἀριθμῶν 74, 35, 87, 95, διὰ νὰ σχηματισθοῦν τριψήφιοι ἀριθμοὶ διαιρετοὶ διὰ 2, διὰ 3, διὰ 4, διὰ 5, διὰ 9, διὰ 25;

165 ) Ὅλα τὰ ψηφία ἐνὸς ἀριθμοῦ εἶναι 5. Εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι διαιρετὸς διὰ 2, διὰ 3, διὰ 4, διὰ 9, διὰ 25;

166 ) Ποῖος εἶναι ὁ μικρότερος ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν ἀριθμὸν 614, διὰ νὰ προκύψῃ ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 3, διὰ 4, διὰ 5, διὰ 9, διὰ 25;

167 ) Ἐνας ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 9. Ἐὰν ἀλλάξωμεν τὴν τάξιν τῶν ψηφίων του, ὁ προκύπτων ἀριθμὸς θὰ εἶναι διαιρετὸς διὰ 9 ἢ ὄχι;

168 ) Ἐνας γυμναστὴς θέλει νὰ τοποθετήσῃ 135 μαθητὰς, 1ον κατὰ δυάδας, 2ον κατὰ τριάδας καὶ 3ον κατὰ πεντάδας. Δύναται νὰ γίνῃ αὐτὸ χωρὶς νὰ περισσεύσῃ κανεὶς μαθητής;

**§ 131. Ποιοι αριθμοί είναι διαιρετοί δια 8 ἢ 125.** Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ μάθωμεν, χωρὶς νὰ κάμωμεν τὴν διαίρεσιν, ἂν ὁ ἀριθμὸς 43 120 εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 8 ἢ διὰ τοῦ 125.

Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι, ἐπειδὴ  $8 \times 125 = 1\,000$ , ἔπεται ὅτι ὁ 8 καὶ ὁ 125 διαιροῦν ἀκριβῶς τὸν 1 000 ἢ τὴν μίαν χιλιάδα. Ἀλλὰ τότε καθέννας ἐξ αὐτῶν θὰ διαιρῆ καὶ τὰς 43 χιλιάδας τοῦ 43 120. Ἄν λοιπὸν ὁ 8 ἢ ὁ 125 διαιρῆ ἀκριβῶς καὶ τὸν 120, δηλαδὴ τὸν ἀριθμὸν, ποῦ ἀποτελοῦν τὰ τρία τελευταῖα ψηφία τοῦ 43 120, ὡς ἔχουν γραφῆ, θὰ διαιρῆ ἀκριβῶς καὶ ὅλον τὸν ἀριθμὸν 43 120.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι:

**Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 8 ἢ 125, ἂν τὰ τρία τελευταῖα ψηφία του, ὡς ἔχουν γραφῆ, σχηματίζουν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ 8 ἢ 125.**

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

169 ) Ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 47 012, 91 480, 5 375, 83 024, 79 250 εἶναι διαιρετοί διὰ 8 καὶ ποῖοι διὰ 125 ;

170 ) Ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 3 125, 5 250, 62 300, 105 450, 204 875, 605 500 εἶναι διαιρετοί διὰ 125 ; Νὰ εὑρῆτε δὲ τὸ ὑπόλοιπον τῶν ἄλλων διὰ 125.

171 ) Ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν 35 930, διὰ νὰ προκύψῃ ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 8 ; Ποῖον δέ, διὰ νὰ προκύψῃ ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 125 ;

172 ) Ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν 7 242, διὰ νὰ προκύψῃ ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 8 ; Ποῖον δέ, διὰ νὰ προκύψῃ ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 125 ;

**§ 132. Ποιοι αριθμοί είναι διαιρετοί διὰ τοῦ 11.** Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ μάθωμεν, χωρὶς νὰ κάμωμεν τὴν διαίρεσιν, ἂν ὁ ἀριθμὸς 432 113 εἶναι διαιρετὸς διὰ 11.

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἂν ἀπὸ μνήμης διαιρέσωμεν μίαν ἑκατοντάδα, δηλαδὴ τὸν 100, δι' 11, θὰ εὑρωμεν ὑπόλοιπον 1, διότι  $11 \times 9 = 99$ . Ἐπειδὴ λοιπὸν ἀπὸ κάθε ἑκατοντάδα, ὅταν τὴν διαιρέσωμεν διὰ 11, εὑρίσκομεν ὑπόλοιπον 1, ἔπεται ὅτι ἀπὸ τὰς 4 321 ἐν ὄλῳ ἑκατοντάδας τοῦ ἀριθμοῦ 432 113 θὰ εὑρωμεν ὑπόλοιπον 4 321 μονάδας. Ὁμοίως ἀπὸ τὰς 43 ἑκατοντάδας τοῦ ἀριθμοῦ 4 321 θὰ εὑρωμεν ὑπό-

λοιπον 43 μονάδας, αί όποίαι μαζύ μέ τās 21 μονάδας του άριθμου 4321 καί τās 13 μονάδας του άριθμου 432113 άποτελοϋν έν όλω 43 + 21 + 13 μονάδας. Άν λοιπόν καί τó άθροισμα τουτο εΐναι διαιρετόν διά του 11 καί όλος ó άριθμός 432113 θά εΐναι διαιρετός διά του 11.

Έδω τó άθροισμα 43 + 21 + 13 εΐναι 77, ήτοι διαιρετόν διά 11, άρα καί όλος ó άριθμός 432113 εΐναι διαιρετός διά του 11.

Παρατηροϋμεν όμως ότι τó 43 + 21 + 13 εΐναι τó άθροισμα τών διψηφίων τμημάτων, εις τά όποία χωρίζεται ó άριθμός έκ δεξιών πρós τά άριστερά.

Έκ τών άνωτέρω συνάγομεν ότι:

**Άριθμός τις εΐναι διαιρετός διά 11, άν τó άθροισμα τών διψηφίων τμημάτων του, εις τά όποία χωρίζεται έκ δεξιών πρós τά άριστερά, εΐναι διαιρετόν διά 11.**

Π.χ. ó άριθμός 1353 εΐναι διαιρετός διά 11, διότι τó άθροισμα 13 + 53, ήτοι ó 66, εΐναι διαιρετός διά 11.

Άν τó πλήθος τών ψηφίων εΐναι περιττόν, τó τελευταίον πρós τά άριστερά τμήμα θά εΐναι μονοψήφιον.

Π.χ. ó άριθμός 31504 διαιρούμενος διά 11 άφήνει υπόλοιπον όσον καί τó άθροισμα 3 + 15 + 04 = 22, ήτοι 0. Εΐναι λοιπόν ó 31504 διαιρετός διά 11.

*Σημείωσις.* Άν τó άθροισμα τών τμημάτων τούτων έχη ψηφία περισσότερα τών δύο, εύρίσκομεν τó υπόλοιπον τής διαιρέσεως αυτού κατá τόν ίδιον τρόπον Π.χ. τó υπόλοιπον τής διαιρέσεως 356719 : 11 εΐναι ίσον μέ τó υπόλοιπον τής διαιρέσεως (35 + 67 + 19) : 11 ή 121 : 11. Αυτό δέ εΐναι ίσον πρós τó υπόλοιπον τής διαιρέσεως (1 + 21) : 11 ή 22 : 11, ήτοι 0.

Ό άριθμός λοιπόν 356719 εΐναι διαιρετός διά 11.

#### Άσκήσεις

173 ) Ποίοι άπό τούς διψηφίους άριθμούς εΐναι διαιρετοί διά 11;  
174 ) Ποίοι άπό τούς άριθμούς 332211, 570911, 633402, 31304, 730412 εΐναι διαιρετοί διά 11;

175 ) Νά γράψετε άπό ένα ψηφίον εις τήν άρχήν έκάστου τών άριθμών 73, 92, 3120, 51437 διά νά γίνη άριθμός διαιρετός διά 11

### 3. ΚΟΙΝΟΙ ΔΙΑΙΡΕΤΑΙ—ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ

§ 133. Κοινοὶ διαιρέται. Ἐστῶσαν οἱ ἀριθμοὶ 12, 18.

Οἱ διαιρέται τοῦ 12 εἶναι : 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Οἱ διαιρέται τοῦ 18 εἶναι : 1, 2, 3, 6, 9, 18.

Παρατηροῦμεν ὅτι οἱ 1, 2, 3, 6 εἶναι διαιρέται καὶ τοῦ 12 καὶ 18.

Οἱ 1, 2, 3, 6 λέγονται **κοινοὶ διαιρέται** τῶν 12 καὶ 18. Ὡστε:

**Κοινὸς διαιρέτης** δοθέντων ἀριθμῶν λέγεται **κάθε ἀριθμὸς, ὃ ὁποῖος διαιρεῖ αὐτοὺς ἀκριβῶς.**

§ 134. Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης (μ.κ.δ.). Ἐκ τῶν κοινῶν διαιρετῶν τοῦ 12 καὶ 18 μεγαλύτερος εἶναι ὁ 6. Οὗτος λέγεται **μέγιστος κοινὸς διαιρέτης** αὐτῶν. Ὡστε:

**Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης** δοθέντων ἀριθμῶν λέγεται ὁ **μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς κοινοὺς διαιρέτας** αὐτῶν.

§ 135. Πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοί. Ἐστῶσαν οἱ ἀριθμοὶ 25 καὶ 16.

Οἱ διαιρέται τοῦ 25 εἶναι : 1, 5, 25.

Οἱ διαιρέται τοῦ 16 εἶναι : 1, 2, 4, 8, 16.

Παρατηροῦμεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ 25 καὶ 16 δὲν ἔχουν παρὰ μόνον ἓνα κοινὸν διαιρέτην, **τὴν μονάδα.**

Οἱ τοιοῦτοι ἀριθμοὶ λέγονται **πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.** Ὡστε:

**Δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ** λέγονται **πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἂν δὲν ἔχουν ἄλλον κοινὸν διαιρέτην ἐκτὸς τῆς μονάδος.**

### 4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΙΡΕΤΩΝ

§ 136. Ἰδιότης I. Ἐστῶσαν οἱ ἀριθμοὶ 24, 36, 80 καὶ 4 ἓνας ἀπὸ τοὺς κοινοὺς διαιρέτας αὐτῶν.

Ὁ 4, ὡς διαιρῶν τοὺς 80 καὶ 24 θὰ διαιρῇ καὶ τὴν διαφορὰν  $80 - 24$ , ἦτοι τὸν 56. Θὰ εἶναι λοιπὸν ὁ 4 κοινὸς διαιρέτης καὶ τῶν ἀριθμῶν 24, 36, 56.

*Ἀντιστρόφως.* Ἐπειδὴ ὁ 4 διαιρεῖ τοὺς 24, 36, 56, θὰ διαιρῇ καὶ τὸ ἄθροισμα  $24 + 56 = 80$ . Θὰ εἶναι λοιπὸν ὁ 4 κοινὸς διαιρέτης καὶ τῶν ἀριθμῶν 24, 36, 80.

Οί αριθμοί λοιπόν 24, 36, 80 και οί αριθμοί 24, 36, 56 ἔχουν τοὺς αὐτοὺς κοινούς διαιρέτας. Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Οἱ κοινοὶ διαιρέται δοθέντων ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλονται, ἂν ἀπὸ ἑνα ἐξ αὐτῶν ἀφαιρεθῇ ἄλλος ἀπὸ αὐτοῦς.

§ 137. Ἰδιότης II. Ἐστώσαν οἱ ἀριθμοί, 24, 36, 80. Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν τὸν 24 ἀπὸ τὸν 80 εὐρίσκομεν 56. Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν τὸν 24 ἀπὸ τὸν 56, εὐρίσκομεν 32. Ἐὰν ἀπὸ τὸν 32 ἀφαιρέσωμεν πάλιν τὸν 24, εὐρίσκομεν  $32 - 24 = 8$ .

Ἐπειδὴ δὲ μετὰ κάθε ἀφαίρεσιν δὲν μεταβάλλονται οἱ κοινοὶ διαιρέται, ἐννοοῦμεν ὅτι :

οἱ ἀριθμοὶ 24, 36, 80

καὶ οἱ ἀριθμοὶ 24, 36, 8 ἔχουν τοὺς ἰδίους κοινούς διαιρέτας.

Ἐπειδὴ δὲ ἀφηρέσαμεν ἀπὸ τὸν 80 τρεῖς φορές τὸν 24 καὶ εὐρομεν τὸν 8, ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ 8 εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως  $80 : 24$ . Πράγματι εἶναι  $24 \times 3 + 8 = 72 + 8 = 80$ .

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Οἱ κοινοὶ διαιρέται δοθέντων ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλονται, ἂν ἕνας ἀπὸ αὐτοῦς ἀντικατασταθῇ μὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεώς του δι' ἄλλου ἀπὸ τοὺς ἰδίους ἀριθμούς.

##### 5. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ Μ.Κ.Δ. ΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 138. Πρόβλημα. Ἐνας ἀνθοπώλης ἔχει 385 γαρύφαλλα καὶ 35 τριαντάφυλλα. Θέλει δὲ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἄνθη νὰ κάμη ὁμοιόμορφους ἀνθοδέσμας. Νὰ εὐρεθῇ πόσας τὸ πολὺ ἀνθοδέσμας θὰ κάμη;

Λύσις. Διὰ νὰ εἶναι ὁμοιόμορφοι αἱ ἀνθοδέσμαι πρέπει καὶ τὰ γαρύφαλλα καὶ τὰ τριαντάφυλλα νὰ μοιρασθοῦν ἐξ ἴσου εἰς ὅλας τὰς ἀνθοδέσμας, χωρὶς νὰ περισσεύσῃ κανένα ἄνθος.

Ὁ ἀριθμὸς λοιπὸν τῶν ἀνθοδεσμῶν πρέπει νὰ εἶναι κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 385 καὶ 35. Ἐπειδὴ δὲ θέλει νὰ κάμη, ὅσον τὸ δυνατόν, περισσοτέρας ἀνθοδέσμας, πρέπει ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν νὰ εἶναι ὁ μέγιστος κοινὸς διαιρέτης τῶν 385 καὶ 35.

Δὲν δύναται δὲ νὰ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 35, διότι οὗτος ὑπ' οὐδενὸς μεγαλύτερου του διαιρεῖται. Θὰ εἶναι λοιπὸν ὁ 35 ἢ ἄλλος μικρότερος.

Ἐπειδὴ δὲ ὁ 35 διαιρεῖ τὸν ἑαυτόν του, θὰ εἶναι οὗτος κ.δ., ἂν διαιρῆ καὶ τὸν 385.

Ἐκτελοῦντες τὴν διαίρεσιν  $385 : 35$ , εὐρίσκομεν πηλίκον 11 καὶ ὑπόλοιπον μηδέν.

Εἶναι λοιπὸν ὁ 35 μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν 385 καὶ 35. Ἐπομένως δύναται νὰ κάμη τὸ πολὺ 35 ἀνθοδέσμας. Κάθε δὲ ἀνθοδέσμη θὰ περιέχη:

$$385 : 35 = 11 \text{ γαρύφαλλα καὶ } 35 : 35 = 1 \text{ τριαντάφυλλον.}$$

**§ 139. Πῶς εὐρίσκεται ὁ μ.κ.δ. δύο ἀριθμῶν.** 1ον. Ἀπὸ τοὺς συλλογισμοὺς, τοὺς ὁποίους ἐκάμαμεν, διὰ νὰ λύσωμεν τὸ προηγούμενον πρόβλημα, ἐννοοῦμεν ὅτι:

**Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης δύο ἀριθμῶν εἶναι ὁ μικρότερος ἀπὸ αὐτοὺς, ἂν διαιρῆ ἀκριβῶς τὸν ἄλλον.**

Ἐπομένως πρέπει πρῶτον νὰ διαιρέσωμεν τὸν μεγαλύτερον ἀριθμὸν διὰ τοῦ μικροτέρου. Καὶ ἂν ἴδωμεν ὅτι ἡ διαίρεσις αὕτη εἶναι τελεία, ὁ μικρότερος εἶναι ὁ ζητούμενος μέγιστος κοινὸς διαιρέτης.

Προηγούμενως π.χ. εὔρομεν ὅτι μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν 385 καὶ 35 εἶναι ὁ 35, διότι ἡ διαίρεσις  $385 : 35$  εἶναι τελεία.

2ον. Ἐστῶσαν τώρα οἱ ἀριθμοὶ 204 καὶ 60. Ἐκτελοῦντες τὴν διαίρεσιν  $204 : 60$ , εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον 24.

Τώρα ἐνθυμούμεθα τὴν ιδιότητα II (§ 137) καὶ ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ ζητούμενος μ.κ.δ. εἶναι καὶ μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν 60 καὶ 24. Πρέπει ἐπομένως νὰ κάμωμεν τὴν διαίρεσιν  $60 : 24$ , διὰ νὰ ἴδωμεν μήπως ὁ 24 εἶναι μ.κ.δ. αὐτῶν.

Ἐπειδὴ δὲ εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον 12, ἐννοοῦμεν ὁμοίως ὅτι πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὸν 24 διὰ 12.

Ἐπειδὴ δὲ ἡ διαίρεσις αὕτη εἶναι τελεία, συμπεραίνομεν ὅτι ὁ 12 εἶναι ὁ ζητούμενος μ.κ.δ.

Εἰς τὴν παραπλευρῶς διάταξιν τὸ πηλίκον ἐκάστης διαιρέσεως γράφεται ἐπάνω ἀπὸ τὸν διαιρέτην, διὰ νὰ μείνη ὑποκάτω θέσις διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἐπομένης διαιρέσεως. Κάθε δὲ ὑπόλοιπον διὰ-

Διάταξις τῆς πράξεως

$$\begin{array}{r|l|l|l} 204 & 3 & 2 & 2 \\ \hline & 60 & 24 & 12 \\ 24 & 12 & 0 & \end{array}$$

φορον τοῦ 0 γίνεται διαιρέτης τῆς ἐπομένης διαιρέσεως. Μέγιστος δὲ κοινὸς διαιρέτης εἶναι ὁ τελευταῖος διαιρέτης.

\* Ἄν ἐφαρμόσωμεν τὸν τρόπον αὐτὸν εἰς τοὺς ἀριθμοὺς 12 καὶ 43, εὐρίσκομεν μ.κ.δ. τὸν ἀριθμὸν 1, ὡς κάτωθι φαίνεται\*:

	3	1	1	2	2
43	12	7	5	2	1
7	5	2	1	0	

Οἱ ἀριθμοὶ λοιπὸν 43 καὶ 12 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

§ 140. Πῶς εὐρίσκεται ὁ μ.κ.δ. πολλῶν ἀριθμῶν. 1ον. Ὁ μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν 48, 144, 240 δὲν δύναται νὰ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 48. Θὰ εἶναι δὲ ὁ 48, ἂν αὐτὸς διαιρῆ ἀκριβῶς τοὺς ἄλλους. Διαίρουμεν λοιπὸν αὐτοὺς διὰ τοῦ 48 καὶ βλέπομεν ὅτι πράγματι ὁ 48 διαιρεῖ ἀκριβῶς καὶ τοὺς δύο ἄλλους. Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ ζητούμενος μ.κ.δ.

2ον. Ἄς προσπαθῆσωμεν τώρα νὰ εὐρωμεν τὸν μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν 48, 160, 228.

Ὅπως προηγουμένως εἴπομεν, δοκιμάζομεν πρῶτον μήπως μ.κ.δ. αὐτῶν εἶναι ὁ μικρότερος ἀπὸ αὐτοῦς, δηλ. ὁ 48. Πρὸς τοῦτο ἐκτελοῦμεν τὰς διαιρέσεις 160 : 48 καὶ 228 : 48. Ἐπειδὴ δὲ εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον ἀπὸ τὴν πρώτην μὲν 16, ἀπὸ δὲ τὴν δευτέραν τὸν 36, δὲν εἶναι ὁ 48 κοινὸς διαιρέτης αὐτῶν.

Ἄν δὲ ἐνθυμηθῶμεν πάλιν τὴν ιδιότητα II (§ 137), ἐννοοῦμεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ 48 160 228 ἔχουν τὸν ἴδιον μ.κ.δ. μὲ τοὺς ἀριθμοὺς 48 16 36

Ὡστε πρέπει νὰ εὐρωμεν τὸν μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν 48, 16, 36. Πρὸς τοῦτο διαίρουμεν τοὺς ἄλλους διὰ τοῦ μικροτέρου 16 καὶ εὐρίσκομεν ὑπόλοιπα 0 καὶ 4.

Διὰ τὸν ἴδιον λόγον πρέπει νὰ εὐρωμεν τὸν μ.κ.δ. τῶν ἀριθμῶν

0      16      4

\* Ἡ μέθοδος αὕτη εἶναι γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα « Ἀλγόριθμος τοῦ Εὐκλείδου ».

Ἐπειδὴ δὲ ὁ 4 διαιρεῖ τοὺς ἄλλους, αὐτὸς εἶναι ὁ ζητούμενος μ.κ.δ.

Εἰς τὴν ἀνωτέρω διάταξιν ὑποκάτω ἀπὸ κάθε διαιρέτην γράφομεν πάλιν τὸν διαιρέτην αὐτόν. Ὑποκάτω δὲ ἀπὸ κάθε διαιρετέον γράφομεν τὸ ἀντίστοιχον ὑπόλοιπον.

Συνεχίζονται δὲ αἱ διαιρέσεις μὲ τὸν μικρότερον καὶ διάφορον τοῦ 0 ἀριθμὸν κάθε σειρᾶς, ἕως ὅτου ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι 0. Ὁ τελευταῖος δὲ διαιρέτης εἶναι ὁ ζητούμενος μ.κ.δ.

*Σημείωσις.* Ἄν ὁ τελευταῖος διαιρέτης εἶναι 1, 5 7 11  
οἱ ἀριθμοὶ θὰ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. Π.χ. 5 2 1  
οἱ ἀριθμοὶ 5, 7, 11 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους 0 0 1

### Ἄσκήσεις

Α' Ὁ μ α ς. 176) Νὰ εὑρεθῆ ἀπὸ μνήμης ὁ μ.κ.δ. τῶν κάτωθι ἀριθμῶν:

- |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. 12 καὶ 48 | 3. 8 καὶ 12  | 5. 28 καὶ 42 |
| 2. 9 καὶ 63  | 4. 10 καὶ 35 | 6. 18 καὶ 63 |

177) Νὰ εὑρεθῆ ὁ μ.κ.δ. τῶν κάτωθι ἀριθμῶν:

- |               |                |                    |
|---------------|----------------|--------------------|
| 1. 88 καὶ 156 | 3. 144 καὶ 594 | 5. 1 986 καὶ 2 226 |
| 2. 99 καὶ 312 | 4. 609 καὶ 270 | 6. 328 καὶ 1 540   |

178) Νὰ εὑρεθῆ ὁ μ.κ.δ. τῶν κάτωθι ἀριθμῶν :

- |              |                      |  |
|--------------|----------------------|--|
| 1. 24 72 108 | 3. 560 728 328       |  |
| 2. 42 63 72  | 4. 3 420 2 610 7 020 |  |

Β' Ὁ μ α ς. 179) Μία οἰκογένεια ἠγόρασε 300 λευκὰ κουφέτα καὶ 125 κυανᾶ, διὰ τὰ κάμη μπομπονιέρας κατὰ τὴν βάπτισιν τοῦ τέκνου τῆς. Πόσας τὸ πολὺ ὁμοιομόρφους μπομπονιέρας δύναται νὰ σχηματίσῃ; Καὶ πόσα κουφέτα ἀπὸ κάθε εἶδος θὰ ἔχη κάθε μία;

180) Μία χορφεῖα ἀποτελεῖται ἀπὸ 60 ὑψιφώνους, 120 μέσους καὶ 40 βαθυφώνους. Πόσας τὸ πολὺ ὁμοίας ομάδας δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν ἀπὸ αὐτούς;

181) Ἐνας ἔρανος μιᾶς ἐπαρχιακῆς πόλεως ὑπὲρ τῶν εἰς αὐτὴν προσφύγων οἰκογενειῶν ἀπέδωκεν 880 000 δραχ., 200 ζεύγη κάλτσες καὶ 80 φανέλλας. Πόσας τὸ πολὺ οἰκογενείας δύναται νὰ βοηθήσουν ἕξ ἴσου μὲ τὰ εἶδη αὐτὰ καὶ πόσα ἀπὸ κάθε εἶδος θὰ λάβῃ κάθε οἰκογένεια;

## 6. ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 141. **Πολλαπλάσια.** Εἶδομεν ὅτι πολλαπλάσιον ἑνὸς ἀριθμοῦ λέγεται τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ τυχόντα ἀκέραιον ἀριθμόν. Εἶναι φανερόν λοιπὸν ὅτι ἕνας ἀριθμὸς ἔχει ἄπειρα πολλαπλάσια. Οὕτως τὰ 5 πρῶτα πολλαπλάσια τοῦ 12 εἶναι 12, 24, 36, 48, 60.

§ 142. **Κοινὰ πολλαπλάσια.** Ἐστωσαν οἱ ἀριθμοὶ 12 καὶ 18. Τὰ πολλαπλάσια τοῦ 12 εἶναι:

12, 24, **36**, 48, 60, **72**, 84, 96, **108**...

Τὰ πολλαπλάσια τοῦ 18 εἶναι:

18, **36**, 54, **72**, 90, **108**, 126, 144, 162, ...

Παρατηροῦμεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ 36, 72, 108, ... εἶναι πολλαπλάσια τῶν 12 καὶ 18.

Οἱ 36, 72, 108 λέγονται **κοινὰ πολλαπλάσια** τῶν 12 καὶ 18. Ὡστε:

**Κοινὸν πολλαπλάσιον** δοθέντων ἀριθμῶν καλεῖται κάθε ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος εἶναι πολλαπλάσιον ὄλων αὐτῶν.

§ 143. Ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον (ἐ.κ.π.). Ἐκ τῶν κοινῶν πολλαπλασίων τῶν ἀριθμῶν 12 καὶ 18 μικρότερον εἶναι ὁ 36. Οὗτος λέγεται **ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον** αὐτῶν. Ὡστε: Ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον δοθέντων ἀριθμῶν λέγεται τὸ μικρότερον ἐκ τῶν κοινῶν πολλαπλασίων αὐτῶν.

§ 144. Πῶς εὐρίσκομεν τὸ ἐ.κ.π. δοθέντων ἀριθμῶν. Ἄς υποθέσωμεν ὅτι θέλομεν νὰ λύσωμεν τὸ ἔξης πρόβλημα:

Ἐνα ἀτμόπλοιο ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ κάθε 4ην ἡμέραν, ἄλλο κάθε 6ην ἡμέραν καὶ τρίτον κάθε 8ην ἡμέραν. Συνέπεσε δὲ νὰ ἀναχωρήσουν ὅλα τὴν ἰδίαν ἡμέραν. Μετὰ πόσας ἡμέρας ἀπὸ αὐτὴν θὰ συμπέση νὰ ἀναχωρήσουν πάλιν ὅλα τὴν ἰδίαν ἡμέραν;

*Λύσις.* Ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς κοινῆς ἀναχωρήσεως μέχρι μιᾶς ἀκολουθοῦ ἀναχωρήσεως τοῦ πρῶτου ἀτμοπλοίου περνοῦν 4 ἢ  $4 \times 2$  ἢ  $4 \times 3$  κ.τ.λ. ἡμέραι. Ἦτοι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτῶν εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 4. Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν μέχρι νέας ἀναχωρήσεως τοῦ δευτέρου εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 6 καὶ τοῦ τρίτου πολλαπλάσιον τοῦ 8. Ἐπομένως διὰ νὰ συμ-

πίπτει νὰ ἀναχωροῦν ὅλα τὴν ἰδίαν ἡμέραν, πρέπει νὰ περάσει ἀριθμὸς ἡμερῶν, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν 4, 6, 8.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν, μετὰ τὰς ὁποίας διὰ πρώτην φοράν θὰ ἀναχωρήσουν πάλιν τὴν ἰδίαν ἡμέραν, θὰ εἶναι ἐ.κ.π. τῶν 4, 6, 8.

Αὐτὸ δὲ θὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς  $8 \times 1 = 8$ ,  $8 \times 2 = 16$ ,  $8 \times 3 = 24$ ,  $8 \times 4 = 32$  κ.τ.λ. Ἀπὸ αὐτὰ δὲ τὰ πολλαπλάσια τοῦ 8, ὁ 24 διαιρεῖται καὶ διὰ τῶν 4 καὶ 6· οὐδὲν δὲ ἄλλο μικρότερον τοῦ 24 διαιρεῖται δι' αὐτῶν. Εἶναι λοιπὸν ὁ 24 ἐ.κ.π. τῶν 4, 6, 8.

Ἐπομένως μετὰ 24 ἡμέρας τὰ 3 ἀτμόπλοια θὰ ἀναχωρήσουν τὴν ἰδίαν ἡμέραν.

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος αὐτοῦ βλέπομεν ὅτι:

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἐ.κ.π. δοθέντων ἀριθμῶν, πολλαπλασιαζόμεν τὸν μεγαλύτερον κατὰ σειρὰν ἐπὶ 1, 2, 3, κ.τ.λ., ἕως νὰ εὐρωμεν γινόμενον, τὸ ὁποῖον νὰ διαιρῆται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀκριβῶς. Αὐτὸ τὸ γινόμενον εἶναι τὸ ζητούμενον ἐ.κ.π.

§ 145. Ἄλλος τρόπος εὐρέσεως τοῦ ἐ.κ.π. Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἐ.κ.π. ἀριθμῶν ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς:

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ ἐ.κ.π. τῶν ἀριθμῶν 12, 14, 36, 45. Γράφομεν τοὺς ἀριθμοὺς αὐτοὺς ἐπὶ μιᾶς ὀριζοντίου σειρᾶς καὶ δεξιὰ αὐτῶν χαράσσομεν μίαν κατακόρυφον γραμμὴν.

12	14	36	45	2
6	7	18	45	2
3	7	9	45	3
1	7	3	15	3
1	7	1	5	

Παρατηροῦμεν κατόπιν, ἂν ὑπάρχουν **δύο τουλάχιστον** ἀπὸ τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς διαιρετοὶ διὰ 2. Βλέπομεν δὲ ὅτι οἱ ἀριθμοὶ 12, 14, 36 διαιροῦνται διὰ 2. Διαιροῦμεν αὐτοὺς διὰ 2 καὶ τὸν μὲν διαιρέτην 2 γράφομεν δεξιὰ τῆς κατακόρυφου γραμμῆς, τὰ δὲ πηλίκων 6, 7, 18 γράφομεν ὑπὸ κάτω τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν. Ἐπίσης γράφομεν εἰς τὴν αὐτὴν σειρὰν κάτω καὶ τὸν ἀριθμὸν 45, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι διαιρετὸς διὰ 2.

Ἐπειτα ἐργαζόμεθα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ διὰ τοὺς ἀριθμούς 6,7,18,45, τῆς δευτέρας σειρᾶς. Εἰς τὴν σειρὰν αὐτὴν ὑπάρχουν οἱ ἀριθμοὶ 6, 18, οἱ ὅποιοι εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2· καὶ ἐπομένως θὰ γράψωμεν τὸν διαιρέτην 2 δεξιὰ τῆς κατακορύφου γραμμῆς, τὰ δὲ πηλικά 3 καὶ 9 καθὼς καὶ τοὺς μὴ διαιρουμένους διὰ 2 ἀριθμούς 7 καὶ 45 εἰς μίαν τρίτην σειρὰν.

Εἰς τὴν τρίτην σειρὰν δὲν ὑπάρχουν ἀριθμοὶ διαιρετοὶ διὰ 2, ἀλλ' ὑπάρχουν οἱ ἀριθμοὶ 3,9,45, οἱ ὅποιοι εἶναι διαιρετοὶ διὰ 3. Γράφομεν τὸν 3 δεξιὰ τῆς κατακορύφου γραμμῆς καὶ τὰ πηλικά 1,3,15, καθὼς καὶ τὸν ἀριθμὸν 7, τὸν μὴ διαιρετὸν διὰ 3, εἰς μίαν τετάρτην σειρὰν.

Εἰς τὴν τετάρτην σειρὰν ὑπάρχουν οἱ ἀριθμοὶ 3 καὶ 15, οἱ ὅποιοι εἶναι διαιρετοὶ διὰ 3. Γράφομεν τὸν 3 δεξιὰ τῆς κατακορύφου γραμμῆς καὶ τὰ πηλικά 1 καὶ 5, καθὼς καὶ τοὺς ἀριθμούς 1 καὶ 7 εἰς μίαν ἐπομένην σειρὰν.

Ἐὰν εἰς τὴν ἐπομένην σειρὰν ὑπῆρχον δύο τουλάχιστον ἀριθμοὶ διαιρετοὶ διὰ 5 ἢ διὰ 7 ἢ διὰ 11 κ.τ.λ. θὰ ἐργαζόμεθα ὅπως ἀνωτέρω. Ἐπειδὴ ὅμως εἰς τὴν τελευταίαν σειρὰν δὲν ὑπάρχουν δύο τουλάχιστον ἀριθμοὶ διαιρετοὶ δι' ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, σταματῶμεν τὴν πρᾶξιν.

Τὸ ζητούμενον ἐ.κ.π. θὰ εἶναι τὸ γινόμενον ὅλων τῶν διαιρετῶν (δηλ. τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι εὐρίσκονται δεξιὰ τῆς κατακορύφου γραμμῆς) καὶ τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι ὑπάρχουν εἰς τὴν τελευταίαν σειρὰν.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω τὸ ἐ.κ.π. τῶν ἀριθμῶν 12, 14, 36, 45 εἶναι τὸ γινόμενον  $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 = 1260$ .

#### Ἄσκησεις

Α' Ὁμάς. 182) Εὔρετε τὰ 5 πρῶτα πολλαπλάσια τοῦ 7 καὶ 8.

183) Εὔρετε 3 κοινὰ πολλαπλάσια τῶν ἀριθμῶν 4 καὶ 7.

184) Εὔρετε τὸ ἐ.κ.π. τῶν ἀριθμῶν:

- |              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| 1. 6 καὶ 18  | 2. 8 καὶ 12  | 3. 5 καὶ 9     |
| 4. 9, 12, 18 | 5. 8, 20, 30 | 6. 6, 9, 12, 8 |

185) Εὔρετε τὸ ἐ.κ.π. τῶν κάτωθι ἀριθμῶν:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. 15, 18, 24, 42 | 4. 9, 12, 18, 32  |
| 2. 16, 36, 45, 18 | 5. 14, 21, 24, 48 |
| 3. 8, 50, 25, 32  | 6. 70, 14, 21, 56 |

Β' Ό μ α ς. 186) Κατά τοπικήν έορτήν ό κώδων τής μιᾶς έκκλησίας έπαρχιακῆς πόλεως ήχει ἀνά 3 λεπτά, τής β' ἀνά 5 καί τής γ' ἀνά 6 λεπτά. Ἄν ἀρχίσουν νά ήχοῦν συγχρόνως, μετὰ πόσον τουλάχιστον χρόνον θά ήχήσουν πάλιν ὅλοι τήν αὐτήν στιγμήν;

187) Εἰς τήν πλατεῖαν μιᾶς πόλεως καταλήγουν 4 γραμμαί τῶν τράμ. Ἀπό αὐτάς φθάνουν εἰς τήν πλατεῖαν ὀχήματα ἀνά 4, 8, 12, 16 λεπτά. Ἄν κατά τινά στιγμήν φθάσουν ὀχήματα ἀπό ὅλας τὰς γραμμάς, νά εὗρητε μετὰ πόσον χρόνον τουλάχιστον θά έπαναληφθῇ τοῦτο.

188) Τρεῖς ποδηλάται ἀναχωροῦν ταυτοχρόνως ἀπό τὸ αὐτὸ σημεῖον ἑνὸς κυκλικοῦ στίβου καί κινουῦνται κατά τήν αὐτήν φοράν. Ὁ πρῶτος διανύει τὸν στίβον εἰς 8 λεπτά τής ὥρας, ὁ δεύτερος εἰς 12 καί ὁ τρίτος εἰς 15 λ. Ζητεῖται μετὰ πόσον χρόνον ἀπὸ τής ἀναχωρήσεώς των θά συναντηθοῦν εἰς τὸ σημεῖον τής ἀφετηρίας καί πόσους γύρους θά ἔχη κάμει ἕκαστος ἐξ αὐτῶν.

## 7. ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

§ 146. Πρῶτοι καὶ σύνθετοι ἀριθμοί. Εἶδομεν προηγουμένως ὅτι μερικοὶ ἀριθμοὶ ἔχουν πολλοὺς διαιρέτας.

Π.χ. ὁ 12 ἔχει 6 διαιρέτας, τοὺς 1, 2, 3, 4, 6, 12.

ὁ 20 ἔχει 6 διαιρέτας, τοὺς 1, 2, 4, 5, 10, 20.

Ἐπάρχουν ὁμως καὶ ἄλλοι ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι δὲν ἔχουν ἄλλους διαιρέτας ἐκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ των καὶ τής μονάδος. Π.χ. ὁ 7 ἔχει δύο διαιρέτας, τοὺς 1 καὶ 7. Ὁ 11 ἔχει δύο διαιρέτας, τοὺς 1 καὶ 11.

Οἱ τοιοῦτοι ἀριθμοὶ λέγονται **πρῶτοι ἀριθμοί**. Ὡστε:

**Πρῶτος λέγεται κάθε ἀριθμός, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἄλλους διαιρέτας ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 1 καὶ ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του.**

Ὁ ἀριθμὸς 4 ἔχει διαιρέτας τοὺς ἀριθμοὺς 1, 2, 4. Δὲν εἶναι λοιπὸν πρῶτος. Αὐτὸς λέγεται **σύνθετος** ἀριθμὸς.

Διὰ τὸν ἴδιον λόγον οἱ 6, 8, 9 κ.τ.λ. εἶναι σύνθετοι ἀριθμοί. Ὡστε:

**Σύνθετος ἀριθμὸς λέγεται κάθε ἀριθμός, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι πρῶτος.**

**Σημείωσις I.** Δὲν πρέπει νά συγχέωμεν τοὺς πρῶτους ἀριθμοὺς πρὸς τοὺς πρῶτους πρὸς ἀλλήλους.

Π.χ. οί αριθμοί 4, 9, 10 είναι πρώτοι πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ οὐδεὶς εἶναι πρῶτος ἀριθμός.

II. Εἰς τὴν εὕρεσιν τοῦ ἐ.κ.π. (§ 145) καλύτερα νὰ ἀναζητῶμεν ὡς διαιρέτας πρώτους ἀριθμούς.

§ 147. Δεύτερος διαιρέτης. Ὁ ἀριθμὸς 8 ἔχει διαιρέτας τοὺς ἀριθμούς 1, 2, 4, 8. Ὁ 15 ἔχει διαιρέτας 1, 3, 5, 15.

Βλέπομεν ὅτι πρῶτος διαιρέτης, δηλ. μικρότερος ἀπὸ τοὺς διαιρέτας κάθε ἀριθμοῦ, εἶναι ὁ 1.

Δεύτερος μετ' αὐτὸν διαιρέτης τοῦ 8 εἶναι ὁ 2, τοῦ 15 ὁ 3. Ὁμοίως δεύτερος διαιρέτης τοῦ 49 εἶναι ὁ 7.

Ἀπὸ τὰ παραδείγματα αὐτὰ βλέπομεν ὅτι:

Ὁ δεύτερος διαιρέτης παντὸς ἀριθμοῦ εἶναι πρῶτος ἀριθμός.

#### Ἀσκήσεις

189) Ἄν εἰς ἓνα περιττὸν ἀριθμὸν, μεγαλύτερον τοῦ 1, προσθέσωμεν 1, νὰ ἐξετάσῃτε, ἂν προκύπτῃ πρῶτος ἢ σύνθετος ἀριθμός.

190) Ποῖος εἶναι ὁ δεύτερος διαιρέτης ἑνὸς ἀρτίου ἀριθμοῦ;

191) Τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων ἑνὸς περιττοῦ ἀριθμοῦ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 3. Ποῖος εἶναι ὁ δεύτερος διαιρέτης του;

§ 148. Πρόβλημα. Νὰ εὕρεθῶν ὅλοι οἱ πρῶτοι ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μικρότεροι τοῦ 100.

Λύσις. Γράφομεν κατὰ σειρὰν ὅλους τοὺς ἀριθμούς ἀπὸ τὸν 1 ἕως τὸν 100 (σχ. 5). Ἐπειτα διαγράφομεν τὸν  $2^2$ , δηλ. τὸν 4 καὶ ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν 5 μετροῦμεν τοὺς ἀριθμούς ἀνὰ δύο· διαγράφομεν δὲ κάθε δεύτερον. Οὕτω δὲ διαγράφομεν τοὺς 6, 8, 10 κ.τ.λ. δηλ. ὅλα τὰ πολλαπλάσια τοῦ 2.

Ἐπειτα διαγράφομεν τὸν  $3^2$ , δηλ. τὸν 9 καὶ ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν 10 μετροῦμεν τοὺς ἀριθμούς ἀνὰ 3 καὶ διαγράφομεν κάθε τρίτον, δηλ. τοὺς 12, 15 κ.τ.λ., ἤτοι τὰ πολλαπλάσια τοῦ 3.

Ἀφοῦ διαγράψωμεν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον τὰ πολλαπλάσια τοῦ 5 καὶ τοῦ 7, πρέπει νὰ διαγράψωμεν τὰ πολλαπλάσια τοῦ 11, διότι τὰ πολλαπλάσια τῶν 8, 10 διεγράφησαν ὡς πολλαπλάσια τοῦ 2, τὰ δὲ πολλαπλάσια τοῦ 9 διεγράφησαν ὡς πολλαπλάσια τοῦ 3.

Τὸ πρῶτον πολλαπλάσιον τοῦ 11, ἀπὸ τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἀρχίσωμεν εἶναι ὁ 11<sup>2</sup>, ἦτοι ὁ 121. Αὐτὸς ὅμως δὲν ἔχει γραφή, ὡς μεγαλύτερος τοῦ 100.

Τελειώνει λοιπὸν ἡ ἐργασία καὶ ὅσοι ἀριθμοὶ μένουσιν εἶναι ὅλοι πρῶτοι. Αὐτοὶ ἀναγράφονται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα.

1	2	3	<del>4</del>	5	<del>6</del>	7	<del>8</del>	<del>9</del>	<del>10</del>
11	<del>12</del>	13	<del>14</del>	<del>15</del>	<del>16</del>	17	<del>18</del>	19	<del>20</del>
<del>21</del>	<del>22</del>	23	<del>24</del>	<del>25</del>	<del>26</del>	<del>27</del>	<del>28</del>	29	<del>30</del>
31	<del>32</del>	<del>33</del>	<del>34</del>	<del>35</del>	<del>36</del>	37	<del>38</del>	<del>39</del>	<del>40</del>
41	<del>42</del>	43	<del>44</del>	<del>45</del>	<del>46</del>	47	<del>48</del>	<del>49</del>	<del>50</del>
<del>51</del>	<del>52</del>	53	<del>54</del>	<del>55</del>	<del>56</del>	<del>57</del>	<del>58</del>	59	<del>60</del>
61	<del>62</del>	<del>63</del>	<del>64</del>	<del>65</del>	<del>66</del>	67	<del>68</del>	<del>69</del>	<del>70</del>
71	<del>72</del>	73	<del>74</del>	<del>75</del>	<del>76</del>	<del>77</del>	<del>78</del>	79	<del>80</del>
<del>81</del>	<del>82</del>	83	<del>84</del>	<del>85</del>	<del>86</del>	<del>87</del>	<del>88</del>	89	<del>90</del>
<del>91</del>	<del>92</del>	<del>93</del>	<del>94</del>	<del>95</del>	<del>96</del>	97	<del>98</del>	<del>99</del>	<del>100</del>

Σχ. 5

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν τοὺς πρῶτους ἀριθμοὺς ἕως 500 ἢ 1 000 κ.τ.λ.

Ἡ μέθοδος αὕτη λέγεται **κόσκι-  
νον τοῦ Ἐρατοσθένους\***.

Πρῶτοι ἀριθμοὶ ἀπὸ 1—100

1	11	29	47	71	97
2	13	31	53	73	
3	17	37	59	79	
5	19	41	61	83	
7	23	43	67	89	

\* Ὁ Ἐρατοσθένης ἦτο Ἕλληνας ἐκ Κυρήνης τῆς Ἀφρικῆς. Ἐγενήθη τὸ 275 π.Χ. καὶ ἐσπούδασε πρῶτον εἰς τὴν Ἀλεξανδρεῖαν καὶ ἔπειτα εἰς Ἀθήνας. Τὸ 235 π.Χ. ἀνέλαβε τὴν διεύθυνσιν τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ περιφήμου βιβλιοθήκης. Διετήρησε δὲ τὴν θέσιν αὐτὴν μέχρι τοῦ θανάτου του.

8. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΥΤΗΣ

§ 149. Πώς αναλύομεν ἓνα ἀριθμὸν εἰς γινόμενον πρῶτων παραγόντων. Ἐστω ὁ σύνθετος ἀριθμὸς 720.

Ἄν διαιρέσωμεν αὐτὸν διὰ τοῦ δευτέρου διαιρέτου του 2, εὐρίσκομεν πηλίκον 360. Ἐπομένως εἶναι:  $720 = 2 \times 360$ .

Ὁμοίως εὐρίσκομεν  $360 = 2 \times 180$ . Ἐπομένως  
 $720 = 2 \times 2 \times 180$ .

Ἐπειδὴ δὲ  $180 = 2 \times 90$ , ἡ ἰσότης αὕτη γίνεται:  
 $720 = 2 \times 2 \times 2 \times 90$ .

Καὶ ἐπειδὴ  $90 = 2 \times 45$ , αὕτη γίνεται:  
 $720 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 45$ .

Ὁ 45 ἔχει δεύτερον διαιρέτην τὸν 3 καὶ εἶναι  $45 : 3 = 15$ . Ἐπομένως  $45 = 3 \times 15$ .

	Διάταξις τῆς πράξεως
Ἡ προηγουμένη λοιπὸν ἰσότης γίνεται :	720   2
$720 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 15$	360   2
Ἐπειδὴ δὲ $15 = 3 \times 5$ , ἔπεται ὅτι :	180   2
$720 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$	90   2
Ἀνελύθη λοιπὸν ὁ 720 εἰς γινόμενον,	45   3
τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ παράγοντες εἶναι	15   3
πρῶτοι ἀριθμοί. Τὸ γινόμενον τοῦτο	5   5
γράφεται συντομώτερον οὕτως:	1
$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$ .	

Εἰς τὴν παρακειμένην διάταξιν οἱ διαιρέται τῶν διαδοχικῶν διαιρέσεων γράφονται δεξιὰ τῆς γραμμῆς. Τὸ γινόμενον δὲ αὐτῶν εἶναι τὸ ζητούμενον. Καὶ συντομώτερον ἀκόμη δυνάμεθα νὰ κάμωμεν αὐτὴν τὴν ἀνάλυσιν. Διότι εἶναι φανερόν ὅτι:

$$720 = 72 \times 10 = 8 \times 9 \times 10.$$

Ἐπειδὴ δὲ  $8 = 2^3$ ,  $9 = 3^2$ , καὶ  $10 = 2 \times 5$ .  
ἔπεται ἀμέσως ὅτι:  $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$ .

Ἀσκήσεις

192 ) Νὰ αναλυθοῦν οἱ κάτωθι ἀριθμοὶ εἰς γινόμενα παραγόντων πρῶτων

	1.	128	260	372	840
	2.	3 600	9 720	3 850	7 260

§ 150. Πώς εύρισκομεν τὸ γινόμενον ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον  $75 \times 144 \times 360$ .

Ἀναλύοντες τοὺς ἀριθμοὺς 75, 144, 360 εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων εύρισκομεν:

$75 = 3 \cdot 5^2$	$75 \mid 3$	$144 \mid 2$	$360 \mid 2$
$144 = 2^4 \cdot 3^2$	$25 \mid 5$	$72 \mid 2$	$180 \mid 2$
$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$	$5 \mid 5$	$36 \mid 2$	$90 \mid 2$
	$1$	$18 \mid 2$	$45 \mid 3$
		$9 \mid 3$	$15 \mid 3$
		$3 \mid 3$	$5 \mid 5$
		$1$	$1$

Θὰ εἶναι λοιπόν:  $75 \times 144 \times 360$  ἢ

$$(3 \cdot 5^2) \times (2^4 \cdot 3^2) \times (2^3 \cdot 3^2 \cdot 5) = 3 \cdot 5^2 \cdot 2^4 \cdot 3^2 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \quad (\text{διατί;})$$

$$= 2^4 \cdot 2^3 \cdot 3 \cdot 3^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 5 \quad (\text{διατί;})$$

Ἐπειδὴ δὲ

$$2^4 \cdot 2^3 = 2^{4+3} = 2^7, \quad 3 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^{1+2+2} = 3^5, \quad 5^2 \cdot 5 = 5^{2+1} = 5^3,$$

ἢ προηγουμένη ἰσότης γράφεται:

$$(3 \cdot 5^2) \times (2^4 \cdot 3^2) \times (2^3 \cdot 3^2 \cdot 5) = 2^7 \cdot 3^5 \cdot 5^3$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι:

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμοὺς ἀναλελυμένους εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων, σχηματίζομεν ἓνα γινόμενον, τὸ ὁποῖον νὰ περιέχη ὅλους τοὺς πρώτους παράγοντας τῶν ἀριθμῶν καὶ μόνον αὐτοὺς, ἕκαστον δὲ μὲ ἐκθέτην ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκθετῶν, τοὺς ὁποῖους ὁ παράγων οὗτος ἔχει εἰς τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

193 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι πράξεις, ἀφοῦ προηγουμένως ἀναλυθοῦν οἱ ἀριθμοὶ εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων:

1.  $320 \times 460$     2.  $378 \times 154 \times 166$     3.  $516 \times 396 \times 978$

§ 151. Ὑψώσεις ἀριθμοῦ εἰς δύναμιν. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ ὑψώσωμεν τὸν ἀριθμὸν 360 εἰς τὴν δευτέραν δύναμιν, δηλ. νὰ εὐρωμεν τὴν δύναμιν  $360^2$ .

Ἀναλύοντες τὸν ἀριθμὸν 360 εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων εὐρίσκομεν  $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ . Θὰ εἶναι λοιπόν:

$$360^2 = (2^3 \cdot 3^2 \cdot 5)^2 = (2^3)^2 \times (3^2)^2 \times (5^1)^2$$

$$\eta \quad (2^3 \cdot 3^2 \cdot 5)^2 = 2^3 \times 2 \times 3^2 \times 2 \times 5^1 \times 2$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ τὴν ὑψώσωμεν εἰς δύναμιν ἀριθμὸν ἀναλελυμένον εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων, πολλαπλασιάζομεν τοὺς ἐκθέτας τῶν πρώτων παραγόντων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἐκθέτην τῆς δυνάμεως αὐτῆς.

### Ἀ σ κ ή σ ε ι ς

194) Νὰ εὐρεθῇ τὸ τετράγωνον καὶ ὁ κύβος τῶν κάτωθι ἀριθμῶν, ἀφοῦ προηγουμένως ἀναλυθῶσιν οὗτοι εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων:

1.	725	3.	2 340	5.	1 260
2.	312	4.	4 560	6.	7 290

§ 152. Πῶς διακρίνομεν, ἂν ἓνας ἀριθμὸς εἶναι διαιρετὸς δι' ἄλλου. Τὸ γινόμενον π.χ.  $12 \times 720$  εἶναι προφανῶς διαιρετὸν διὰ 12 καὶ εἶναι :

$$(12 \times 720) : 12 = 720.$$

Ἐπειδὴ δὲ  $12 = 2^2 \times 3$  καὶ  $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$  εὐρίσκομεν ὅτι :

$$12 \times 720 = (2^2 \times 3) \times (2^4 \times 3^2 \times 5) = 2^6 \times 3^3 \times 5$$

Βλέπομεν λοιπόν ὅτι :

Ἐνας ἀριθμὸς διαιρετὸς δι' ἄλλου ἔχει ὅλους τοὺς παράγοντας τοῦ ἄλλου καὶ οὐδένα μὲ μικρότερον ἐκθέτην.

Ἀντιστρόφως. Ὁ ἀριθμὸς  $A = 2^4 \times 3^3 \times 5^2 \times 7$  ἔχει ὅλους τοὺς παράγοντας τοῦ  $B = 2^2 \times 3 \times 5^2$  καὶ οὐδένα μὲ μικρότερον ἐκθέτην.

Ἄς ἐξετάσωμεν, ἂν ὁ  $A$  διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ τοῦ  $B$ . Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι  $2^4 = 2^2 \times 2^2$  καὶ  $3^3 = 3^2 \times 3$  καὶ ἐννοοῦμεν ὅτι :

$$A = 2^2 \times 2^2 \times 3^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$$

$$\eta \quad A = (2^2 \times 3 \times 5^2) \times (2^2 \times 3^2 \times 7)$$

Ἐπειδὴ  $2^2 \times 3 \times 5^2 = B$ , ἡ προηγουμένη ἰσότης γίνεται :

$$A = B \times (2^2 \times 3^2 \times 7)$$

Ἐκ τῆν ἰσότητα αὐτὴν βλέπομεν ὅτι ὁ  $A$  διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ  $B$  καὶ δίδει πηλίκον  $2^2 \times 3^2 \times 7$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

**Ἄν ἀριθμὸς ἔχῃ ὅλους τοὺς πρώτους παράγοντας ἄλλου καὶ οὐδένα μὲ μικρότερον ἐκθέτην, διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ ἄλλου.**

Τὰ συμπεράσματα αὐτὰ συνοψίζομεν ὡς ἑξῆς :

**Διὰ νὰ εἶναι ἓνας ἀριθμὸς διαιρετὸς δι' ἄλλου, πρέπει καὶ ἀρκεῖ νὰ ἔχῃ ὅλους τοὺς πρώτους παράγοντας τοῦ ἄλλου καὶ οὐδένα μὲ μικρότερον ἐκθέτην.**

§ 153. Πῶς εὐρίσκομεν τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως γινομένου πρώτων παραγόντων δι' ἄλλου τοιούτου.

Εἶδομεν προηγουμένως ὅτι :

$$(12 \times 720) : 12 = 720 \text{ ἢ } (2^6 \times 3^3 \times 5) : (2^2 \times 3) = 2^4 \times 3^2 \times 5.$$

$$\text{Ὁμοίως } (2^4 \times 3^3 \times 5^2 \times 7) : (2^2 \times 3 \times 5^2) = 2^2 \times 3^2 \times 7.$$

Ἐπειδὴ ἀπὸ τὸν διαιρέτην τοῦ πρώτου παραδείγματος λείπει ὁ παράγων 5 τοῦ διαιρετέου, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν τὸν διαιρέτην αὐτὸν καὶ ὡς ἑξῆς :  $2^2 \times 3 \times 5^0$ , διότι  $5^0 = 1$ .

Ὁμοίως τὸ πηλίκον τοῦ δευτέρου παραδείγματος δυνάμεθα νὰ τὸ γράψωμεν καὶ οὕτω :  $2^2 \times 3^2 \times 7 \times 5^0$ .

Ἀπὸ τὰ δύο ἀνωτέρω παραδείγματα συνάγομεν ὅτι :

**Τὸ πηλίκον δύο ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων ἔχει ὅλους τοὺς πρώτους παράγοντας τοῦ διαιρετέου· ἕκαστον δὲ μὲ ἐκθέτην τὴν διαφορὰν τοῦ ἐκθέτου, τὸν ὁποῖον ἔχει ὁ παράγων οὗτος εἰς τὸν διαιρέτην, ἀπὸ ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον ἔχει εἰς τὸν διαιρετέον.**

#### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

195 ) Νὰ ἀναγνωρισθῇ ποῖος ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς :

$$2^3 \times 5^2 \times 7, 2^2 \times 3^4 \times 5 \times 7^2, 2^5 \times 3^4 \times 5^2 \times 7^3$$

διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ  $2^2 \times 3^2 \times 5$  καὶ ποῖον εἶναι τὸ ἀντίστοιχον πηλίκον.

196 ) 1ον. Νὰ ἀναγνωρισθῇ δι' ἀναλύσεως τῶν ἀριθμῶν εἰς γινόμενα παραγόντων πρώτων ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 276, 524, 780, 2 436 διαιροῦνται διὰ 12 καὶ ποῖον τὸ ἀντίστοιχον πηλίκον.

20ν. Νὰ ἀναγνωρισθῆ ὁμοίως ποῖοι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 2 100, 2 250, 1 120, 13 230 διαιροῦνται διὰ 210 καὶ ποῖον τὸ ἀντίστοιχον πηλίκον.

§ 154. Πῶς εὐρίσκομεν τὸν μ.κ.δ. ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων. Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν μ.κ.δ. π.χ. τῶν ἀριθμῶν.

$A = 2^3 \times 3^2 \times 5^3 \times 7$ ,  $B = 2^3 \times 3^4 \times 5$ ,  $\Gamma = 2^5 \times 3^4 \times 7^3$   
σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Ὁ μ.κ.δ. αὐτῶν δὲν δύναται νὰ ἔχη ἓνα μὴ κοινὸν παράγοντα αὐτῶν. Διότι, ἂν εἶχε π.χ. τὸν 7, δὲν θὰ διήρει τὸν Β καὶ ἔπομένως δὲν θὰ ἦτο κοινὸς διαιρέτης τῶν Α, Β, Γ.

Ἐνα δὲ κοινὸν παράγοντα, π.χ. τὸν 2, δὲν δύναται νὰ τὸν ἔχη μὲ ἐκθέτην μεγαλύτερον τοῦ 3, διότι ἂν εἶχεν αὐτόν, π.χ. μὲ ἐκθέτην 4, δὲν θὰ διήρει τὸν Α οὔτε τὸν Β.

Οὐδὲ μὲ ἐκθέτην μικρότερον τοῦ 3 πρέπει νὰ ἔχη τὸν 2, διότι θὰ ὑπῆρχεν ἄλλος κοινὸς διαιρέτης μεγαλύτερός του. Ἐκεῖνος δηλ. ὁ ὁποῖος θὰ εἶχε τὸν 2 μὲ ἐκθέτην 3. Θὰ ἔχη λοιπὸν τὸν 2 μὲ ἐκθέτην 3. Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι θὰ ἔχη τὸν 3 μὲ ἐκθέτην τὸν 2.

Ὁ ζητούμενος λοιπὸν μ.κ.δ. εἶναι :  $2^3 \times 3^2$  ἢ  $8 \times 9 = 72$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν μ.κ.δ. ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων, σχηματίζομεν ἓνα γινόμενον, τὸ ὁποῖον ἔχει μόνον τοὺς κοινούς πρώτους παράγοντας τῶν δοθέντων ἀριθμῶν καὶ ἕκαστον μὲ τὸν μικρότερον ἀπὸ τοὺς ἐκθέτας, τοὺς ὁποῖους ἔχει οὗτος εἰς τοὺς δοθέντας ἀριθμούς.

§ 155. Πῶς εὐρίσκομεν τὸ ἐ.κ.π. ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων. Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἐ.κ.π. τῶν ἀριθμῶν  $A = 2^3 \times 3^2 \times 5$ ,  $B = 2^2 \times 3^2 \times 7$ ,  $\Gamma = 2^4 \times 3 \times 11$  σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Τὸ ζητούμενον ἐ.κ.π. ὡς διαιρούμενον ὑπὸ τῶν Α, Β, Γ, θὰ περιέχη ὅλους τοὺς παράγοντας 2, 3, 5, 7, 11 αὐτῶν. Διότι, ἂν π.χ. δὲν εἶχε τὸν 11, δὲν θὰ διηρείτο διὰ τοῦ Γ καὶ ἔπομένως δὲν θὰ ἦτο κοινὸν πολλαπλάσιον αὐτῶν. Κάθε δὲ παράγοντα θὰ τὸν ἔχη μὲ τὸν μεγαλύτερον ἀπὸ τοὺς ἐκθέτας, τοὺς ὁποῖους ἔχει οὗτος εἰς τοὺς δο-

θέντας ἀριθμούς. Π.χ. τὸν 2 θὰ τὸν ἔχη μὲ ἐκθέτην 4, διότι ἂν τὸν εἶχε μὲ ἐκθέτην 3, δὲν θὰ διηρεῖτο διὰ τοῦ Γ.

Ἄν δὲ εἶχε τὸ 2 μὲ ἐκθέτην μεγαλύτερον τοῦ 4, θὰ ὑπῆρχεν ἄλλο κοινὸν πολλαπλάσιον μικρότερόν του. Ἐκεῖνο δηλ. εἰς τὸ ὅποιον ὁ 2 θὰ εἶχεν ἐκθέτην 4.

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον δὲν δύναται νὰ ἔχη καὶ παράγοντα, μὴ ὑπάρχοντα εἰς τοὺς δοθέντας ἀριθμούς π.χ. τὸν 13.

Τὸ ζητούμενον λοιπὸν ἐ.κ.π. εἶναι:  $2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι:

**Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἐ.κ.π. ἀριθμῶν ἀναλελυμένων εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων, σχηματίζομεν ἓνα γινόμενον, τὸ ὅποιον ἔχει ὅλους τοὺς κοινούς καὶ μὴ κοινούς πρώτους παράγοντας τῶν δοθέντων ἀριθμῶν καὶ ἕκαστον μὲ τὸν μεγαλύτερον ἀπὸ τοὺς ἐκθέτας, τοὺς ὁποίους ἔχει οὗτος εἰς τοὺς δοθέντας ἀριθμούς.**

*Παρατήρησις.* Οἱ ἀριθμοὶ  $2^3 \times 5$ ,  $3^2 \times 7$ ,  $11^2 \times 13$  εἶναι πρώτοι πρὸς ἀλλήλους ἀνὰ δύο. Ἐπομένως δὲν ἔχουν κανένα κοινὸν παράγοντα. Ἐλάχιστον δὲ κοινὸν πολλαπλάσιον αὐτῶν θὰ εἶναι:

$2^3 \times 5 \times 3^2 \times 7 \times 11^2 \times 13$ , ἥτοι τὸ γινόμενον αὐτῶν.

#### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

197) Νὰ εὕρεθῇ τὸ ἐ.κ.π. καὶ ὁ μ.κ.δ. τῶν κάτωθι ἀριθμῶν:

1.  $A = 2^3 \times 3^2 \times 5$  καὶ  $B = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$

2.  $A = 2 \times 3 \times 5 \times 11$  καὶ  $B = 3^2 \times 7 \times 11$

3.  $A = 2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7$  καὶ  $B = 2 \times 3 \times 5 \times 11$

198) Νὰ εὕρεθῇ ὁ μ.κ.δ. καὶ τὸ ἐ.κ.π. τῶν κάτωθι ἀριθμῶν, δι' ἀναλύσεως τούτων εἰς γινόμενα πρώτων παραγόντων:

1. 144 καὶ 504

3. 132 252 420

2. 226 καὶ 198

4. 756 504 1260

# ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

## ΟΙ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

#### ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

##### 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

§ 156. Τί είναι κλασματικά μονάδες. Διὰ τὴν μοιράσῃ μίαν μητέρα ἕνα μήλον εἰς τὰ δύο μικρὰ τέκνα τῆς, χωρίζει αὐτὸ εἰς δύο ἴσα μέρη καὶ δίδει ἀπὸ ἕνα εἰς κάθε παιδίον. Τὸ μερίδιον λοιπὸν κάθε παιδίου εἶναι ἡμισυ μήλον καὶ γράφεται  $\frac{1}{2}$  μήλου.

Δηλ. 1 μήλον : 2 =  $\frac{1}{2}$  μήλου.

Ὅμοιως, ἂν ἀδελφοὶ χωρίσουν ἕνα ἀγρὸν εἰς 3 ἴσα μέρη, ὁ καθείς λαμβάνει ἕνα ἀπὸ τὰ τρία ἴσα μέρη, δηλ. τὸ ἕν τρίτον ἢ  $\frac{1}{3}$  τοῦ ἀγροῦ.

Ὡστε 1 ἀγρός : 3 =  $\frac{1}{3}$  ἀγροῦ. Ὅμοιως 1 : 4 =  $\frac{1}{4}$  κ.τ.λ.

Αὗτοι οἱ ἀριθμοί,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  κ.τ.λ. λέγονται κλασματικά μονάδες. Ὡστε :

Κλασματικὴ μονὰς λέγεται κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ ἴσα μέρη, εἰς τὰ ὁποῖα χωρίζομεν τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

§ 157. Τί εἶναι κλασματικοὶ ἀριθμοί. Διὰ τὴν μοιράσωμεν 3 ἄρτους εἰς 4 πτωχοὺς, μοιράζομεν πρῶτον τὸν ἕνα ἄρτον καὶ δίδομεν εἰς κάθε ἕνα ἀπὸ  $\frac{1}{4}$  τοῦ ἄρτου. Ἀπὸ τὸν δεύτερον ἄρτον δίδομεν ἀπὸ ἄλλο  $\frac{1}{4}$  καὶ ἀπὸ τὸν τρίτον ἀπὸ ἄλλο  $\frac{1}{4}$ .

Λαμβάνει λοιπὸν κάθε πτωχὸς τρεῖς φορές τὸ  $\frac{1}{4}$  τοῦ ἄρτου.

Δι' αὐτὸ λέγομεν ὅτι κάθε πτωχὸς ἔλαβε τρία τέταρτα τοῦ ἄρτου. Δηλ.  $3 : 4 = \frac{3}{4}$ .

Γνωρίζομεν ὅτι ἕνας πῆχυς διαιρεῖται εἰς 8 ἴσα μέρη, τὰ ὅποια λέγονται ρούπια. Ἐνα δηλ. ρούπιον εἶναι  $\frac{1}{8}$  τοῦ πῆχεως. Ἄν λοιπὸν μοιράσωμεν 6 πῆχεις σειρητίου εἰς 8 δεσποινίδας, ἡ κάθε μία θὰ λάβῃ ἕνα ρούπιον ἢ  $\frac{1}{8}$  τοῦ πῆχεως ἀπὸ κάθε πῆχυν. Ἐπομένως τὸ μερίδιόν των θὰ εἶναι 6 ρούπια ἢ  $\frac{6}{8}$  τοῦ πῆχεως.

$$\text{Εἶναι λοιπὸν } 6 : 8 = \frac{6}{8}$$

Αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{6}{8}$  κ.τ.λ. λέγονται **κλασματικοὶ ἀριθμοὶ** ἢ ἀπλῶς **κλάσματα**.

Καὶ αἱ κλασματικαὶ μονάδες εἶναι κλάσματα. Ὡστε:

**Κλασματικὸς ἀριθμὸς ἢ κλάσμα εἶναι κάθε ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος γίνεται ἀπὸ μίαν κλασματικὴν μονάδα, ἂν ληφθῇ μίαν ἢ καὶ περισσοτέρας φορές.**

Κάθε κλάσμα γράφεται μὲ δύο ἀκεραίους ἀριθμούς, τὸν ἕνα ὑποκάτω ἀπὸ τὸν ἄλλον· οὔτοι χωρίζονται ἀπὸ μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν.

Ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος γράφεται ὑποκάτω ἀπὸ τὴν γραμμὴν, λέγεται **παρονομαστής**. Οὗτος φανερώνει εἰς πόσα ἴσα μέρη διηρέθη ἡ ἀκεραία μονάς.

Ὁ ὑπεράνω τῆς γραμμῆς λέγεται **ἀριθμητής**· αὐτὸς φανερώνει πόσα ἀπὸ τὰ ἴσα μέρη τῆς ἀκεραίας μονάδος ἐλήφθησαν. Ὁ ἀριθμητής καὶ ὁ παρονομαστής μαζί λέγονται **ὄροι** τοῦ κλάσματος.

Ὅταν ὀνομάζωμεν ἕνα κλάσμα, τὸν μὲν ἀριθμητὴν ἀπαγγέλλομεν ὡς **ἀπόλυτον** ἀριθμητικόν, τὸν δὲ παρονομαστὴν ὡς **τακτικὸν** ἀριθμητικόν.

§ 158. Ἄκριβὲς πηλίκον δύο ἀριθμῶν. Μία ἀπὸ τὰς σπουδαιοτέρας ἐφαρμογὰς τῶν κλασμάτων εἶναι ὅτι, διὰ τῆς παραδοχῆς αὐτῶν, δυνάμεθα νὰ παριστάνωμεν τὸ **ἀκριβὲς πηλίκον** δύο ἀριθμῶν.

Πράγματι, ὅπως εἶδομεν, μὲ τὸ νὰ χωρίσωμεν κάθε ἄρτον εἰς 4 ἴσα μέρη, κατωρθώσαμεν νὰ μοιράσωμεν ἀκριβῶς τοὺς 3 ἄρτους εἰς

τους 4 πτωχούς, δηλ. νὰ διαιρέσωμεν τὸν 3 διὰ τοῦ 4. Εὐρήκαμεν δὲ ὅτι κάθε πτωχὸς θὰ λάβῃ  $\frac{3}{4}$  τοῦ ἄρτου ἀκριβῶς, χωρὶς νὰ μείνῃ τίποτε. Τὸ κλάσμα λοιπὸν  $\frac{3}{4}$  εἶναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαιρέσεως 3 : 4.

Ὅμοιως, ὅταν μοιράσωμεν ἐξ ἴσου 25 χιλιοδρ. εἰς 10 ἀνθρώπους, εὐρίσκομεν ὅτι ἕκαστος θὰ λάβῃ  $\frac{25}{10}$  τοῦ χιλιοδρ. ἦτοι εἶναι :  
 $25 : 10 = \frac{25}{10}$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι :

1ον. Κάθε διαίρεσις εἶναι δυνατὴ καὶ τελεία.

2ον. Τὸ πηλίκον κάθε διαιρέσεως εἶναι κλάσμα, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀριθμητὴν τὸν διαιρετέον καὶ παρονομαστὴν τὸν διαιρέτην.

3ον. Κάθε κλάσμα παριστάνει τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ του διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του.

Γενικῶς λοιπὸν εἶναι :

$$\boxed{\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta}} \quad \text{καὶ} \quad \boxed{\frac{\alpha}{\beta} = \alpha : \beta}$$

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

Α' Ὁ μά ς. Ἀπὸ μνήμης. 199 ) Πῶς ὀνομάζεται ἕκαστον μέρος τῆς μονάδος, ἂν διαιρεθῇ εἰς 4, εἰς 7, εἰς 8, εἰς 15, εἰς 28, εἰς 360 ἴσα μέρη;

200 ) Εἰς πόσα ἴσα μέρη πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὴν ἀκεραίαν μονάδα, διὰ νὰ ἀποτελεῖται αὐτὴ ἀπὸ τρίτα, τέταρτα, εἰκοστά, ἑκατοστά;

201 ) Ἀναγνώσατε τὰ κλάσματα :  $\frac{5}{8}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{15}{28}$ ,  $\frac{24}{132}$ ,  $\frac{502}{524}$ .

202 ) 1ον Ποῖον κλάσμα τοῦ πήχεως εἶναι τὸ 1 ρούπιον, τὰ 2 ρούπια, τὰ 5 ρούπια;

2ον. Ποῖον κλάσμα τῆς ὁκάς εἶναι τὸ 1 δράμιον, τὰ 10 δράμια, τὰ 120 δράμια;

3ον. Ποῖον κλάσμα τοῦ ἔτους εἶναι αἱ 5 ἡμέραι, αἱ 30 ἡμέραι, αἱ 240 ἡμέραι;

4ον. Ποῖον κλάσμα τῆς ὥρας εἶναι τὸ 1 λεπτόν, τὰ 15 λεπτά, τὰ 20 λεπτά;

B' Ὁ μ ά ς. 203) Ἐξ ὁμοίαι πλάκες σάπωνος ἔχουν βάρος 2 χλγ. Νά εὑρητε πόσον μέρος τοῦ χλγ. εἶναι τὸ βάρος κάθε μιᾶς.

204) Ἐνας γεωργὸς εἰς 5 ἡμέρας ἐθήρισε 3 στρέμματα ἑνὸς ἀγροῦ. Πόσον ἐθήρισε τὴν ἡμέραν;

205) Ἀπὸ ἕνα βαρέλιον οἴνου 350 χλγ. λαμβάνομεν 12, 29, 105 χλγ. Πόσον μέρος τοῦ οἴνου αὐτοῦ λαμβάνομεν κάθε φοράν;

206) Εἰς 15 πτωχὰς οἰκογενεῖας ἐμοιράσθη ἐξ ἴσου ἕνα ποσοῦν ἀλεύρου. Πόσον μέρος τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ ἔλαβον αἱ 9 ἐκ τῶν οἰκογενειῶν;

207) Πόσον μέρος τοῦ χιλιοδράχμου εἶναι αἱ 500 δραχμαί, αἱ 100 δραχμαί, αἱ 50 δραχμαί;

208) Καθένα ἐκ τῶν κλασμάτων  $\frac{5}{7}$ ,  $\frac{6}{11}$ ,  $\frac{23}{30}$  ποίας διαιρέσεως εἶναι πηλίκον;

209) Ποῖον εἶναι τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῶν διαιρέσεων:

$$1. \quad 3 : 8 \quad 5 : 12 \quad 4 : 25 \quad 48 : 250$$

$$2. \quad 37 : 5 \quad 43 : 7 \quad 126 : 11$$

210) Ποία ἡ διπλῆ σημασία καθενὸς τῶν κλασμάτων:

$$\frac{7}{8}, \frac{11}{18}, \frac{17}{23}$$

Γ' Ὁ μ ά ς. 211) Γράψατε ὑπὸ μορφήν κλάσματος: δύο ἑνατά· πέντε εἰκοστά· δέκα πέντε διακοσιοστά· τριάκοντα ὀκτώ χιλιοστά· ἑκατὸν τρία δισχιλιοστά· τριακοσιοστά· ἑβδομηκοστά· πρῶτα.

212) Χαράξατε μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν. Χωρίσατέ την εἰς 8 ἴσα μέρη. Κάτωθεν αὐτῆς γράψατε δύο ἄλλας, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία παριστᾷ τὰ  $\frac{3}{8}$  καὶ ἡ ἄλλη τὰ  $\frac{5}{8}$  τῆς πρώτης εὐθείας.

§ 159. Σύγκρισις κλασμάτων πρὸς τὴν ἀκεραίαν μονάδα. Ἐστω ὅτι ἐχωρίσαμεν δύο ὁμοίας πλάκας σάπωνος εἰς 4 ἴσα μέρη κάθε μίαν. Εἶναι φανερόν ὅτι τὰ τρία ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέρη ἀποτελοῦν μέρος μικρότερον ἀπὸ μίαν πλάκα. Εἶναι λοιπὸν  $\frac{3}{4} < 1$ . Τέσσαρα δὲ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτὰ ἀποτελοῦν μίαν πλάκα· ὥστε:  $\frac{4}{4} = 1$ . Πέντε δὲ ἀπὸ αὐτὰ ἀποτελοῦν 1 πλάκα καὶ περισσεύει καὶ  $\frac{1}{4}$ . Εἶναι

λοιπόν:  $\frac{5}{4} > 1$ .

Όμοίως έννοοῦμεν ὅτι  $\frac{4}{7} < 1$ ,  $\frac{7}{7} = 1$ ,  $\frac{9}{7} > 1$  κ.τ.λ.

Ἀπὸ τὴν σύγκρισιν αὐτὴν βλέπομεν ὅτι:

1ον. Ἄν ὁ ἀριθμητὴς ἑνὸς κλάσματος εἶναι μικρότερος ἀπὸ τὸν παρονομαστὴν, τὸ κλάσμα εἶναι μικρότερον ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

2ον. Ἄν οἱ ὄροι ἑνὸς κλάσματος εἶναι ἴσοι, τὸ κλάσμα εἶναι ἴσον πρὸς τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

3ον. Ἄν ὁ ἀριθμητὴς ἑνὸς κλάσματος εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν παρονομαστὴν του, τὸ κλάσμα εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

213) Ὀνομάσατε:

1ον Ὅλα τὰ μικρότερα τῆς ἀκεραίας μονάδος κλάσματα μὲ παρονομαστὴν 6

2ον Τρία κλάσματα μεγαλύτερα τῆς ἀκεραίας μονάδος μὲ τὸν ἴδιον παρονομαστὴν

3ον Κλάσματα μικρότερα καὶ ἄλλα μεγαλύτερα τῆς ἀκεραίας μονάδος μὲ ἀριθμητὴν 7

214) Χωρίσατε τὰ κάτωθι κλάσματα εἰς τρεῖς ὁμάδας, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ α' νὰ περιέχη τὰ κλάσματα τὰ μικρότερα τῆς ἀκεραίας μονάδος, ἡ β' τὰ κλάσματα τὰ ἴσα μὲ τὴν ἀκεραίαν μονάδα καὶ ἡ γ' τὰ κλάσματα τὰ μεγαλύτερα τῆς ἀκεραίας μονάδος:

$$\frac{7}{15}, \frac{7}{7}, \frac{13}{9}, \frac{25}{25}, \frac{35}{34}, \frac{51}{51}, \frac{17}{42}, \frac{102}{95}, \frac{45}{61}.$$

215) Ἄν ὁ α παριστᾷ ἓνα ἀκέραιον ἀριθμὸν, νὰ συγκρίνητε τὸ κλάσμα  $\frac{\alpha-1}{\alpha}$  πρὸς τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

§ 160. Πῶς ἓνας ἀκέραιος τρέπεται εἰς κλάσμα. Πρόβλημα. Πόσα ὄγδοα ἔχουν οἱ 5 πήχεις;

Λύσις. Ἐπειδὴ ὁ 1 πῆχυς ἔχει 8 ὄγδοα, οἱ 5 πήχεις θὰ ἔχουν 5 φορές τὰ 8 ὄγδοα, ἦτοι:

$$8 \text{ ὄγδοα} \times 5 = 40 \text{ ὄγδοα}$$

$$\Theta\acute{\alpha} \text{ εἶναι λοιπὸν } 5 \text{ πήχ.} = \frac{40}{8} \text{ πήχ.}$$

Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι 3 μέτρα ἔχουν 30 δέκατα τοῦ μέτρου ἤτοι :

$$3 = \frac{30}{10} \cdot \quad \text{"Ὡστε :}$$

Διὰ νὰ τρέψωμεν ἀκέραιον εἰς κλάσμα μὲ δοθέντα παρονομαστήν, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν δοθέντα παρονομαστήν καὶ τὸ γινόμενον θέτομεν ὡς ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος, ὡς παρονομαστήν δὲ αὐτοῦ θέτομεν τὸν δοθέντα.

*Ἰδιαιτέρα περίπτωσις.* Κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα εἶναι:

$$5 = \frac{5 \times 1}{1} = \frac{5}{1} \text{ καὶ } 8 = \frac{8}{1} \cdot \quad \text{"Ὡστε :}$$

Κάθε ἀκέραιος δύναται νὰ παρασταθῇ καὶ ὡς κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν αὐτὸν τὸν ἀκέραιον, παρονομαστήν δὲ τὴν μονάδα.

#### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

Α' Ὁ μ ᾶ ς. Προφορικῶς 216) 1ον. Πόσα ὄγδοα τοῦ πήχεως ἔχουν 6 πήχεις, 10 πήχεις, 20 πήχεις;

2ον. Πόσα ἑβδομα τῆς ἑβδομάδος ἔχουν 3 ἑβδομάδες, 7 ἑβδομάδες, 12 ἑβδομάδες;

3ον. Πόσα ἑκατοστὰ τῆς δραχμῆς ἔχουν 16 δραχμαί, 23 δραχμαί, 34 δραχμαί;

Β' Ὁ μ ᾶ ς. 217) Εὗρετε ἓνα κλάσμα μὲ παρονομαστήν 15 καὶ ἴσον πρὸς 3. Ἄλλο κλάσμα μὲ παρονομαστήν 20 καὶ ἴσον πρὸς 5. 218) Γράψατε :

1ον. Ἐνα κλάσμα ἴσον πρὸς ἀκέραιον ἀριθμὸν α μὲ παρονομαστήν 2, ἄλλο δὲ μὲ παρονομαστήν 5.

2ον. Ἐνα κλάσμα ἴσον πρὸς ἀκέραιον ἀριθμὸν α μὲ παρονομαστήν πάλιν α.

§ 161. Μεικτοὶ ἀριθμοί. Ἄν μοιράσωμεν 5 ὀκάδας φασόλια εἰς 2 πτωχούς, θὰ λάβῃ καθένας ἀπὸ 2 ὀκ. καὶ θὰ περισσεύσῃ 1 ὀκά. Ἄν μοιράσωμεν καὶ αὐτήν, θὰ λάβῃ ὁ καθένας ἀπὸ  $\frac{1}{2}$  τῆς ὀκάς.

Τὸ μερίδιον λοιπὸν ἐκάστου εἶναι 2 ὀκ. +  $\frac{1}{2}$  τῆς ὀκάς.

Αὐτὸ τὸ ἄθροισμα τὸ γράφομεν συντομώτερα οὕτω  $2\frac{1}{2}$  καὶ τὸ ἀπαγγέλλομεν δύο καὶ ἓν δεύτερον.

Ὁ ἀριθμὸς  $2\frac{1}{2}$  λέγεται **μεικτὸς ἀριθμὸς**.

Ὅμοίως οἱ ἀριθμοὶ  $5\frac{2}{3}$ ,  $10\frac{2}{5}$ ,  $23\frac{3}{8}$  κ. τ. λ. εἶναι **μεικτοὶ ἀριθμοί**. Ὡστε :

**Μεικτὸς ἀριθμὸς λέγεται κάθε ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀκέραιον καὶ ἀπὸ κλάσμα.**

§ 162. Πῶς ἕνας μεικτὸς τρέπεται εἰς κλάσμα. Εἰς τὸ προηγουμένον παράδειγμα εἶδομεν ὅτι καθένας ἀπὸ τοὺς 2 πτωχοὺς ἔλαβε  $2\frac{1}{2}$  ὀκάδας φασόλια. Ἐπειδὴ ὁμοῦ αἱ 2 ὀκάδες ἔχουν  $2 \times 2$ , ἤτοι 4 δεύτερα τῆς ὀκάς, τὸ μερίδιον κάθε πτωχοῦ εἶναι  $4 + 1$  ἢ 5 δεύτερα τῆς ὀκάς. Εἶναι λοιπὸν  $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ . Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$3\frac{2}{5} = \frac{3 \times 5 + 2}{5} = \frac{17}{5}.$$

Ἐκ τῶν παραδειγμάτων αὐτῶν συνάγομεν τὸν κάτωθι κανόνα:

**Διὰ νὰ τρέψωμεν μεικτὸν ἀριθμὸν εἰς κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος καὶ εἰς τὸ γινόμενον προσθέτομεν τὸν ἀριθμητὴν του. Τὸ ἐξαγόμενον θέτομεν ὡς ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν ἀφήνομεν τὸν ἴδιον.**

#### Ἄ σ κ σ ε ι ς

Ἀπὸ μνήμης. 219) Νὰ τραποῦν οἱ κάτωθι μεικτοὶ εἰς κλάσματα :

$$4\frac{1}{2}, 8\frac{7}{9}, 20\frac{1}{3}, 15\frac{3}{4}, 15\frac{2}{3}, 8\frac{5}{6}, 9\frac{2}{3}.$$

220) 1ον. Πόσα πέμπτα τῆς μονάδος ἔχει ἓν ὄλφ ἕκαστος τῶν μεικτῶν  $4\frac{3}{5}$ ,  $12\frac{2}{5}$ ,  $20\frac{4}{5}$  ;

2ον. Πόσα ὄγδοα τοῦ πήχεως ἔχουν  $10\frac{3}{8}$  πήχεις καὶ πόσα ἑκατοστὰ τῆς δραχμῆς ἔχουν  $20\frac{15}{100}$  δραχμαί;

3ον. Πόσα τετρακοσιοστὰ τῆς ὀκάς ἔχουν αἱ  $3\frac{100}{400}$  ὀκάδες, αἱ  $15\frac{80}{400}$  ὀκάδες;

221) 1ον. Ἐὰν  $5\frac{3}{4} = \frac{\alpha}{4}$ , νὰ εὕρητε ποῖον ἀριθμὸν παριστᾷναι τὸ γράμμα α.

2ον Νὰ τρέψητε τὸν μεικτὸν  $6\frac{X}{5}$  εἰς ἴσον κλάσμα

Γραπτῶς: 222 ) Νὰ τραποῦν εἰς κλάσματα οἱ κάτωθι μεικτοί:  
 $105\frac{7}{8}$ ,  $254\frac{25}{28}$ ,  $146\frac{7}{11}$ ,  $17\frac{80}{81}$ ,  $95\frac{21}{25}$ ,  $104\frac{52}{61}$ .

§ 163. Ἐξαγωγή τῶν ἀκεραίων μονάδων ἑνὸς κλάσματος. Ἄν 4 οἰκογένειαι μοιράσουν 83 ὀκάδας ἀνθράκων, τὸ μερίδιον κάθε μιᾶς εἶναι  $\frac{83}{4}$  τῆς ὀκάς.

Ἄν ὁμως ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν  $83 : 4$ , εὐρίσκομεν ὅτι κάθε μία λαμβάνει ἀπὸ 20 ὀκάδας καὶ περισσεύουν 3 ὀκάδες. Ἄπὸ αὐτὰς δὲ κάθε μία οἰκογένεια λαμβάνει  $\frac{3}{4}$  τῆς ὀκάς. Ὡστε τὸ μερίδιον κάθε οἰκογενείας εἶναι  $20\frac{3}{4}$  ὀκ. Εἶναι δηλ.  $\frac{83}{4} = 20\frac{3}{4}$ .

Εὕρομεν λοιπὸν ὅτι τὸ κλάσμα  $\frac{83}{4}$  ἔχει 20 ἀκεραίας μονάδας καὶ ἀκόμη  $\frac{3}{4}$  τῆς ἀκεραίας μονάδος.

Αὕτη ἡ ἐργασία λέγεται **ἐξαγωγή τῶν ἀκεραίων μονάδων**.

Ἄπὸ τὸ προηγούμενον δὲ παράδειγμα βλέπομεν ὅτι :

Διὰ νὰ ἐξαγάγωμεν τὰς ἀκεραίας μονάδας ἑνὸς κλάσματος, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ. Καὶ τὸ μὲν πηλίκον παριστάνει τὰς ζητουμένας ἀκεραίας μονάδας, τὸ δὲ ὑπόλοιπον φανερώνει τὸ πλῆθος τῶν κλασματικῶν μονάδων, αἱ ὁποῖαι περιέχονται ἀκόμη εἰς τὸ κλάσμα.

#### Ἀσκήσεις

Α'. Ὀ μ ἄ ς. Ἄπὸ μνήμης. 223 ) Νὰ ἐξαγάγητε τὰς ἀκεραίας μονάδας τῶν κλασμάτων:  $\frac{7}{2}$ ,  $\frac{9}{3}$ ,  $\frac{15}{4}$ ,  $\frac{20}{5}$ ,  $\frac{42}{8}$ ,  $\frac{60}{7}$ ,  $\frac{85}{9}$ .

224 ) Νὰ ἐξαγάγητε τὰς ἀκεραίας μονάδας τῶν κλασμάτων:  
 $\frac{135}{10}$ ,  $\frac{525}{100}$ ,  $\frac{1823}{10}$ ,  $\frac{4568}{100}$ ,  $\frac{27965}{1000}$ ,  $\frac{38584}{1000}$ .

225 ) Νὰ διακρίνητε ἀμέσως τί εἶδος ἀριθμοῦ θὰ προκύψῃ ἀπὸ κάθε ἓνα ἀπὸ τὰ κλάσματα :

$$\frac{164}{2}, \frac{328}{4}, \frac{423}{4}, \frac{561}{3}, \frac{460}{3}, \frac{525}{100}, \frac{4374}{9}$$

μετὰ τὴν ἐξαγωγήν τῶν ἀκεραίων μονάδων αὐτῶν.

226) Νά διακρίνητε άμέσως ποία άπό τά κλάσματα :

$$\frac{650}{25}, \frac{1432}{4}, \frac{340}{25}, \frac{2160}{8}, \frac{4517}{4}, \frac{3322}{11}$$

γίνονται άκέραιοι και ποία μεικτοί, άν εξαχθοϋν αί άκέραιοι μονάδες αϋτῶν.

Β' Όμάς. 227) Νά όρίσητε όλα τά κλάσματα, τά όποία έχουν παρονομαστήν 2, άριθμητήν μικρότερον τοϋ 15 και τά όποία είναι ίσα με άκεραίους άριθμούς.

228) Νά γράψητε όλα τά κλάσματα με παρονομαστήν 4 και άριθμητήν μικρότερον τοϋ 17, τά όποία είναι ίσα με άκεραίους άριθμούς.

229) 1ον. Ποία κλάσματα με παρονομαστήν 25 γίνονται άκέραιοι μεταξύ 2 και 5;

2ον. Ποία κλάσματα με παρονομαστήν 8 γίνονται άκέραιοι μεταξύ 5 και 12 ;


Γ' Όμάς. 230) "Αν τὸ κλάσμα  $\frac{\alpha}{4}$  είναι ίσον με τὸν άκέραιον 3, ποῖον άριθμὸν παριστάνει τὸ γράμμα α;

231) "Αν  $\frac{40}{\chi} = 8$ , ποῖον άριθμὸν παριστάνει τὸ γράμμα χ ;

232) "Αν τὸ κλάσμα  $\frac{\chi}{9}$  γίνεται άκέραιος μεταξύ 4 και 7, ποῖους άριθμούς παριστάνει τὸ χ;

§ 164. Τί παθαίνει ένα κλάσμα, άν οί όροι του πολλαπλασιασθοϋν ή διαιρεθοϋν δια τὸϋ αϋτοϋ άριθμοϋ. "Εστω τὸ κλάσμα  $\frac{3}{4}$ .

"Αν διπλασιάσωμεν τοϋς όρους του, εύρίσκομεν τὸ κλάσμα  $\frac{6}{8}$ .



Σχ. 6

Διὰ νά συγκρίνωμεν τά κλάσματα αϋτά εργαζόμεθα ὡς ἐξῆς :  
α') Παριστάνομεν τὴν μονάδα με τὸ τμήμα AB (σχ. 6).

\*Αν διαιρέσωμεν τούτο εις 4 ἴσα μέρη, βλέπομεν ὅτι  $\frac{3}{4}$  εἶναι τὸ τμήμα ΑΓ.

\*Αν δὲ κάθε ἓνα ἀπὸ τὰ 4 ἴσα μέρη τὸ διαιρέσωμεν εις δύο ἴσα μέρη, τὸ μὲν τμήμα ΑΒ διαιρεῖται εις 8 ἴσα μέρη, τὸ δὲ τμήμα ΑΓ εἰς 6 τοιαῦτα μέρη. Εἶναι λοιπὸν τὸ ΑΓ τὰ  $\frac{6}{8}$  τοῦ τμήματος ΑΒ.

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :  $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ .

\*Ομοίως βεβαιούμεθα ὅτι :  $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$ ,  $\frac{7}{10} = \frac{28}{40}$  κ.τ.λ.

\*Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι:

\***Αν οἱ ὄροι ἑνὸς κλάσματος πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἡ ἀξία τοῦ κλάσματος δὲν μεταβάλλεται.**

β') Εἶδομεν προηγουμένως ὅτι :  $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ .

\*Ἐπειδὴ δὲ τὸ κλάσμα  $\frac{3}{4}$  γίνεται ἀπὸ τὸ κλάσμα  $\frac{6}{8}$ , ἂν οἱ ὄροι τοῦ διαιρεθοῦν διὰ 2, συνάγομεν ὅτι:

\***Αν οἱ ὄροι ἑνὸς κλάσματος διαιρεθοῦν διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, ἡ ἀξία τοῦ κλάσματος δὲν μεταβάλλεται.**

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἶναι γενικῶς:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \times \gamma}{\beta \times \gamma}$$

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha : \gamma}{\beta : \gamma}$$

#### \* Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

233 ) Εὑρετε ἀμέσως πόσα ὄγδοα ἔχει κάθε ἓνα ἀπὸ τὰ κλάσματα :  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{16}$ ,  $\frac{6}{24}$ .

234 ) Ποῖον ἀπὸ τὰ κλάσματα, μὲ παρονομαστήν 4, εἶναι ἴσον μὲ τὸ  $\frac{1}{2}$  καὶ ποῖον μὲ τὸ  $\frac{12}{16}$ ;

235 ) Εὑρετε ἓνα κλάσμα:

1ον. Ἴσον μὲ τὸ  $\frac{1}{2}$ , τὸ ὁποῖον νὰ ἔχη παρονομαστήν 4, 8, 10, 12, 18.

2ον. Ἴσον μὲ τὸ  $\frac{3}{4}$ , τὸ ὁποῖον νὰ ἔχη παρονομαστήν 8, 12, 24, 32, 60.

236) Ἀντικαταστήσατε τὰ γράμματα μὲ τούς καταλλήλους ἀριθμούς εἰς τὰς ἐξῆς ἰσότητας :

$$\frac{9}{15} = \frac{\alpha}{45}, \quad \frac{9}{15} = \frac{63}{\beta}, \quad \frac{19}{35} = \frac{\alpha}{315}, \quad \frac{\gamma}{108} = \frac{17}{36}, \quad \frac{21}{8} = \frac{189}{900}.$$

## 2. ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

§ 165. Τί εἶναι ἀπλοποιήσις ἑνὸς κλάσματος. Ἐστω π. χ. τὸ κλάσμα  $\frac{8}{12}$ .

Ἄν διαιρέσωμεν τοὺς ὄρους αὐτοῦ διὰ τινος κοινοῦ διαιρέτου των π.χ. διὰ τοῦ 2, εὐρίσκομεν τὸ κλάσμα  $\frac{4}{6}$ , τὸ ὁποῖον ἔχει τὴν αὐτὴν ἀξίαν μὲ τὸ  $\frac{8}{12}$  (§ 164 β') καὶ ὄρους μικρότερους.

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι τὸ κλάσμα  $\frac{3}{4}$  ἔχει τὴν αὐτὴν ἀξίαν μὲ τὸ  $\frac{9}{12}$ . Ἦτοι εἶναι  $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$  κ.τ.λ. Αὐτὴ ἡ ἐργασία λέγεται ἀπλοποιήσις τοῦ  $\frac{8}{12}$ , τοῦ  $\frac{9}{12}$  κ.τ.λ. Ὡστε:

Ἀπλοποιήσις ἑνὸς κλάσματος λέγεται ἡ πρᾶξις, μὲ τὴν ὁποίαν εὐρίσκομεν κλάσμα ἴσον μὲ αὐτό, ἀλλὰ μὲ μικρότερους ὄρους.

Ἀπὸ τὰ προηγούμενα δὲ παραδείγματα ἐννοοῦμεν ὅτι :

Διὰ νὰ ἀπλοποιήσωμεν ἕνα κλάσμα, διαιροῦμεν τοὺς ὄρους του δι' ἑνὸς κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν.

Καὶ ἐπομένως.

Ἄν οἱ ὄροι ἑνὸς κλάσματος εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, τὸ κλάσμα δὲν ἀπλοποιεῖται.

Λέγεται δὲ τοῦτο ἀνάγωγον κλάσμα.

Π.χ. τὰ κλάσματα  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{7}{9}$  εἶναι ἀνάγωγα.]

§ 166. Παρατηρήσεις. Εἶδόμεν προηγουμένως ὅτι  $\frac{8}{12} = \frac{4}{6}$ .

Ἄλλὰ καὶ  $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ . Ὡστε:  $\frac{8}{12} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ . Τὸ τελευταῖον κλάσμα  $\frac{2}{3}$  εἶναι ἀνάγωγον. Εὐρίσκομεν δὲ αὐτὸ ἀμέσως ἀπὸ τὸ  $\frac{8}{12}$ , ἂν διαιρέσωμεν τοὺς ὄρους του διὰ τοῦ μ.κ.δ. αὐτῶν 4.

‘Ομοίως, ἂν διαιρέσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ  $\frac{15}{25}$  διὰ τοῦ μ.κ.δ. 5 τῶν ὄρων του, εὐρίσκομεν τὸ ἀνάγωγον κλάσμα  $\frac{3}{5}$ . Ὡστε:

**Ἐνα ἀπλοποιήσιμον κλάσμα γίνεται ἀμέσως ἀνάγωγον, ἂν οἱ ὄροι του διαιρεθοῦν διὰ τοῦ μ.κ.δ. αὐτῶν.**

Διὰ τῆς ἀπλοποιήσεως τῶν κλασμάτων ἐπιτυγχάνονται τὰ ἑξῆς:  
1ον. Ἔχομεν σαφεστέραν ἰδέαν τοῦ κλάσματος· δηλ. ἐννοοῦμεν καλύτερον τὰ  $\frac{3}{8}$  τοῦ πῆχους παρὰ τὰ  $\frac{39}{104}$  αὐτοῦ.

2ον. Ὅσον μικρότεροι γίνονται οἱ ὄροι τῶν κλασμάτων, τόσον περισσότερο εὐκολυνόμεθα εἰς τὰς πράξεις αὐτῶν, ὡς εἶδωμεν κατωτέρω.

### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

237 ) Ἀπλοποιήσατε ἀπὸ μνήμης τὰ κλάσματα :

$$\frac{4}{8}, \frac{6}{12}, \frac{9}{15}, \frac{6}{24}, \frac{10}{26}.$$

238 ) Μὲ μίαν ἀπλοποιήσιν καταστήσατε ἀνάγωγον καθένα ἀπὸ τὰ κλάσματα :

$$\frac{8}{16}, \frac{12}{36}, \frac{16}{40}, \frac{24}{32}, \frac{85}{120}, \frac{9}{24}, \frac{18}{24}, \frac{35}{49}, \frac{16}{64}, \frac{27}{81}.$$

§ 167. Ποῖα κλάσματα λέγονται ὁμώνυμα καὶ ποῖα ἑτερόνυμα. Τὰ κλάσματα  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{5}{8}$ ,  $\frac{7}{8}$  ἔχουν τὸν αὐτὸν παρονομαστήν. Διὰ τοῦτο δὲ ταῦτα λέγονται ὁμώνυμα κλάσματα.

Τὰ δὲ κλάσματα  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{4}{7}$ ,  $\frac{8}{9}$  ἔχουν διαφόρους παρονομαστές.

Λέγονται δὲ ταῦτα ἑτερόνυμα κλάσματα. Ὡστε :

**Ὅσα κλάσματα ἔχουν τὸν αὐτὸν παρονομαστήν, λέγονται ὁμώνυμα κλάσματα.**

**Ὅσα δὲ ἔχουν διαφόρους παρονομαστές, λέγονται ἑτερόνυμα κλάσματα.**

§ 168. Πῶς ἑτερόνυμα κλάσματα τρέπονται εἰς ὁμώνυμα.

Α' τρόπος. Ἐστώσαν τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα  $\frac{2}{5}$  καὶ  $\frac{3}{4}$ .

Διὰ νὰ τρέψωμεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Εύρισκομεν πρώτον τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν, τὸ ὅποιον εἶναι 20. Τὰ πηλίκα τοῦ 20 δι' ἐκάστου τῶν παρονομαστῶν εἶναι ἀντιστοίχως 4 καὶ 5.

Ἐπειτα πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὅρους τοῦ α' κλάσματος ἐπὶ 4, τοῦ β' ἐπὶ 5 καὶ εὐρίσκομεν τὰ κλάσματα  $\frac{8}{20}$ ,  $\frac{15}{20}$ . Αὐτὰ δὲ εἶναι ὁμώνυμα καὶ ἴσα ἀντιστοίχως πρὸς τὰ δοθέντα, ἕνα πρὸς ἕνα. Ὡστε:

α') Διὰ νὰ τρέψωμεν ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμώνυμα, διαιροῦμεν τὸ ἐ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν δι' ἐκάστου παρονομαστοῦ καὶ πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὅρους ἐκάστου κλάσματος ἐπὶ τὸ ἀντίστοιχον πηλίκον.

Ἡ ἀνωτέρω ἐργασία διατάσσεται ὡς ἀκολούθως :

$$\begin{array}{r} 4 \\ \hline 2 \\ \hline 5 \\ \hline 8 \\ \hline 20 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \hline 3 \\ \hline 4 \\ \hline 15 \\ \hline 20 \end{array} \quad (\text{ἐ.κ.π.} = 20)$$

Ὁμοίως ἐργαζόμενοι εὐρίσκομεν ὅτι τὰ κλάσματα:

$$\begin{array}{l} \frac{2}{5}, \frac{5}{6}, \frac{7}{10} \text{ γίνονται} \\ \frac{12}{30}, \frac{25}{30}, \frac{21}{30} \text{ ἤτοι ὁμώνυμα} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{r} 6 \\ \hline 2 \\ \hline 5 \\ \hline 12 \\ \hline 30 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \hline 5 \\ \hline 6 \\ \hline 25 \\ \hline 30 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ \hline 7 \\ \hline 10 \\ \hline 21 \\ \hline 30 \end{array} \quad (\text{ἐ.κ.π.} = 30)$$

Β' τρόπος. Παράδειγμα 1ον. Νὰ τραποῦν εἰς ὁμώνυμα τὰ κλάσματα  $\frac{3}{5}$  καὶ  $\frac{4}{7}$ .

Πολλαπλασιάζοντες καὶ τοὺς δύο ὅρους τοῦ πρώτου κλάσματος ἐπὶ τὸν παρονομαστήν 7 τοῦ δευτέρου εὐρίσκομεν

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 7}{5 \times 7} = \frac{21}{35}$$

Ὁμοίως πολλαπλασιάζομεν καὶ τοὺς δύο ὅρους τοῦ δευτέρου κλάσματος ἐπὶ τὸν παρονομαστήν 5 τοῦ πρώτου κλάσματος καὶ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\frac{4}{7} = \frac{4 \times 5}{7 \times 5} = \frac{20}{35}$$

Ἄντὶ λοιπὸν τῶν δοθέντων κλασμάτων, ἔχομεν τὰ κλάσματα  $\frac{21}{35}$  καὶ  $\frac{20}{35}$ , τὰ ὅποια εἶναι ὁμώνυμα καὶ ἴσα πρὸς τὰ δοθέντα.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι:

β') Διὰ νὰ τρέψωμεν δύο ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμόνυμα, πολλαπλασιάζομεν καὶ τοὺς δύο ὄρους ἐκάστου κλάσματος ἐπὶ τὸν παρονομαστήν τοῦ ἄλλου.

Παράδειγμα 2ον. Νὰ τραποῦν εἰς ὁμόνυμα τὰ κλάσματα

$$\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}.$$

Πολλαπλασιάζοντες καὶ τοὺς δύο ὄρους τοῦ  $\frac{2}{3}$  ἐπὶ  $4 \times 5$  εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times 5} = \frac{40}{60}.$$

Ὅμοίως πολλαπλασιάζοντες τοὺς ὄρους τοῦ  $\frac{3}{4}$  ἐπὶ  $3 \times 5$  εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5} = \frac{45}{60}.$$

Ἐπίσης πολλαπλασιάζοντες τοὺς ὄρους τοῦ  $\frac{4}{5}$  ἐπὶ  $3 \times 4$  εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4} = \frac{48}{60}.$$

Εὐρομεν λοιπὸν τὰ κλάσματα  $\frac{40}{60}$ ,  $\frac{45}{60}$ ,  $\frac{48}{60}$ , τὰ ὁποῖα εἶναι ὁμόνυμα καὶ ἴσα (διατί ; ) μὲ τὰ δοθέντα, ἓνα πρὸς ἓνα.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

γ') Διὰ νὰ τρέψωμεν ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμόνυμα πολλαπλασιάζομεν καὶ τοὺς δύο ὄρους ἐκάστου κλάσματος ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν ὅλων τῶν ἄλλων κλασμάτων.

§ 169. Παρατηρήσεις. 1η. Ἄν οἱ παρονομασταὶ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀνὰ δύο, ἔ.κ.π. τῶν παρονομαστῶν εἶναι τὸ γινόμενον αὐτῶν. Ἐπομένως ὁ Β' τρόπος τῆς τροπῆς ἑτερονύμων εἰς ὁμόνυμα συμπίπτει μὲ τὸν πρῶτον.

2α. Ἐνίοτε δι' ἀπλοποιήσεως τῶν ἑτερονύμων κλασμάτων ἢ μερικῶν μόνον ἐξ αὐτῶν προκύπτουν ὁμόνυμα κλάσματα.

Π.χ. ἂν τὸ β' τῶν κλασμάτων  $\frac{2}{5}$  καὶ  $\frac{24}{15}$  ἀπλοποιηθῆ, γίνεται  $\frac{8}{5}$ , ἥτοι ὁμόνυμον πρὸς τὸ  $\frac{2}{5}$ .

Ὅμοίως τὰ κλάσματα  $\frac{2}{8}$ ,  $\frac{9}{12}$ ,  $\frac{35}{20}$  δι' ἀπλοποιήσεως γίνονται  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{7}{4}$ , ἥτοι ὁμόνυμα.

## Άσκησης

Α' Ομάς. 239) Τρέψατε εις όμώνυμα τὰ κλάσματα :

1.  $\frac{5}{6}$  καὶ  $\frac{2}{3}$ ,      3.  $\frac{1}{4}$  καὶ  $\frac{7}{18}$ ,      5.  $\frac{8}{12}$  καὶ  $\frac{7}{38}$ ,  
 2.  $\frac{3}{4}$  καὶ  $\frac{7}{5}$ ,      4.  $\frac{5}{8}$  καὶ  $\frac{9}{18}$ ,      6.  $\frac{5}{14}$  καὶ  $\frac{8}{21}$ .

240) Τρέψατε εις όμώνυμα τὰ κλάσματα :

1.  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{7}{12}$ .      3.  $\frac{4}{6}$ ,  $\frac{6}{9}$ ,  $\frac{12}{8}$ ,  $\frac{24}{36}$ .  
 2.  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{7}{10}$ ,  $\frac{8}{20}$ .      4.  $\frac{7}{10}$ ,  $\frac{35}{100}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{45}{100}$ .

Β' Ομάς. 241) \*Αν είναι  $\frac{\alpha}{6} < 1$  καὶ τὸ κλάσμα  $\frac{\alpha}{6}$  εἶναι ανάγωγον, ποίους ἀκεραίους ἀριθμούς δύναται νὰ παριστάνη τὸ γράμμα α;

242) \*Αν  $\frac{8}{\chi} > 1$  καὶ τὸ  $\frac{8}{\chi}$  εἶναι ανάγωγον, ποίους ἀκεραίους ἀριθμούς δύναται νὰ παριστάνη τὸ χ;

243) \*Αν α καὶ β εἶναι ἀκέραιοι ἀριθμοὶ καὶ  $\beta < \alpha$ , νὰ συγκρίνητε πρὸς τὴν 1 τὰ κλάσματα  $\frac{\alpha}{\beta}$ ,  $\frac{\beta}{\alpha}$ ,  $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$ .

244) Ἀπλοποιήσατε τὰ κλάσματα :

$$\frac{5 \times \alpha}{9 \times \alpha}, \frac{\alpha}{2 \times \alpha}, \frac{6 \times \alpha}{8 \times \alpha}, \frac{\alpha \times \alpha}{3 \times \alpha}, \frac{2 \times \beta^2}{5 \times \beta}.$$

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'

### ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

#### 1. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

§ 170. Ὁ γνωστὸς ὀρισμὸς τῆς προσθέσεως τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν διατηρεῖται καὶ ὅταν οἱ προσθετέοι εἶναι τυχόντες ἀριθμοί.

§ 171. Πρόσθεσις ὁμωνύμων κλασμάτων. *Πρόβλημα.*  
 Ἐνας γυρολόγος ἐπώλησε  $\frac{2}{8}$  τοῦ πῆχεως ἀπὸ ἓνα σειρήτιον ἔπειτα ἐπώλησεν ἄλλα  $\frac{5}{8}$  τοῦ πῆχεως καὶ ἔπειτα ἄλλα  $\frac{3}{8}$  τοῦ πῆχεως. Νὰ εὑρεθῇ πόσον σειρήτιον ἐπώλησεν.

*Λύσις.* Εἶναι φανερὸν ὅτι πρέπει νὰ προσθέσωμεν τὰ πωληθέντα μέρη. Δηλ. νὰ εὔρωμεν τὸ ἄθροισμα  $\frac{2}{8} + \frac{5}{8} + \frac{3}{8}$  τοῦ πῆχεως. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἓνα ὄγδοον τοῦ πῆχεως εἶναι ἓνα ρούπιον, ὁ γυρολόγος ἐπώλησε 2 ρούπ. + 5 ρούπ. + 3 ρούπ. = 10 ρούπ. ἦτοι:

$$\frac{10}{8} \text{ πηχ.} = 1 \frac{2}{8} \text{ πηχ. ὥστε :}$$

$$\frac{2}{8} + \frac{5}{8} + \frac{3}{8} = \frac{10}{8} = 1 \frac{2}{8} \text{ πηχ.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ προσθέσωμεν ὁμώνυμα κλάσματα, προσθέτομεν τοὺς ἀριθμητὰς αὐτῶν καὶ ὑποκάτω ἀπὸ τὸ ἄθροισμα, ὡς παρονομαστήν, γράφομεν τὸν παρονομαστήν τῶν κλασμάτων.

Κατὰ ταῦτα θὰ εἶναι γενικῶς:

$$\boxed{\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\gamma}{\beta} + \frac{\delta}{\beta} = \frac{\alpha + \gamma + \delta}{\beta}}$$

§ 172. Πρόσθεσις ἑτερονύμων κλασμάτων. *Πρόβλημα.*  
 Ἐμπορος ἐπώλησε κατὰ σειράν τὰ  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{3}{10}$  ἔνός τεμαχίου  
 ὑφάσματος. Πόσον ἐπώλησεν ἐν ὄλῳ ;

*Λύσις.* Εἶναι προφανές ὅτι ὁ ἔμπορος ἐπώλησεν ἐν ὄλῳ :

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{8} + \frac{3}{10} \text{ τοῦ ὑφάσματος.}$$

Ἐπειδὴ δὲν δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν πέμπτα μὲ ὄγδοα, μὲ δέκατα, τρέπομεν τὰ κλάσματα εἰς ὁμώνυμα καὶ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{8} + \frac{3}{10} = \frac{16}{40} + \frac{5}{40} + \frac{12}{40} = \frac{33}{40} \quad \left| \quad \frac{\overbrace{8}^2}{5} \frac{\overbrace{5}^1}{8} \frac{\overbrace{4}^3}{10} \text{ (ἔ.κ.π. 40)} \right.$$

Ὡστε ἐπώλησε τὰ  $\frac{33}{40}$  τοῦ τεμαχίου τοῦ ὑφάσματος.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἑτερόνυμα κλάσματα, τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα καὶ προσθέτομεν αὐτὰ, ὅπως γνωρίζομεν.

§ 173. Πρόσθεσις οἰωνδήποτε ἀριθμῶν. Ἐπειδὴ οἱ μικτοὶ καὶ οἱ ἀκεραῖοι τρέπονται εἰς κλάσματα, ἡ πρόσθεσις οἰωνδήποτε ἀριθμῶν ἀνάγεται εἰς πρόσθεσιν ὁμωνύμων κλασμάτων. Π.χ.

$$2\frac{1}{3} + 3 + 6\frac{5}{9} = \frac{7}{3} + 3 + \frac{59}{9} = \frac{21}{9} + \frac{27}{9} + \frac{59}{9} = \frac{107}{9} = 11\frac{8}{9}.$$

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$2 + \frac{1}{4} + 3\frac{5}{8} = \frac{16}{8} + \frac{2}{8} + \frac{29}{8} = \frac{47}{8} = 5\frac{7}{8}.$$

§ 174. Διατήρησις τῶν ιδιοτήτων τῆς προσθέσεως. Ἀπὸ τὰ προηγούμενα παραδείγματα βλέπομεν ὅτι ἡ πρόσθεσις οἰωνδήποτε ἀριθμῶν ἀνάγεται εἰς πρόσθεσιν τῶν ἀριθμητῶν τῶν ὁμωνύμων κλασμάτων, δηλ. εἰς πρόσθεσιν ἀκεραίων ἀριθμῶν.

Ἐπομένως αἱ ιδιότητες τῆς προσθέσεως τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀληθεύουν καὶ διὰ τυχόντας προσθετέους. Π.χ.

$$\frac{2}{9} + \frac{3}{9} + \frac{7}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2+3+7+1}{9} = \frac{13}{9}$$

$$\text{καὶ } \frac{7}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{3}{9} = \frac{7+2+1+3}{9} = \frac{13}{9}.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :  $\frac{2}{9} + \frac{3}{9} + \frac{7}{9} + \frac{1}{9} = \frac{7}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{3}{9}$ .

§ 175. Διάφοροι συντομίες της προσθέσεως. I. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα  $5\frac{3}{8} + 2$ .

Ἐπειδὴ  $5\frac{3}{8} = 5 + \frac{3}{8}$ , πρέπει νὰ προσθέσωμεν τὸν 2 εἰς τὸ ἄθροισμα  $5 + \frac{3}{8}$ . Κατὰ τὴν γνωστὴν δὲ ιδιότητα τῆς προσθέσεως, τὸ ἄθροισμα αὐτὸ εἶναι :  $(5 + 2) + \frac{3}{8}$ , δηλ.  $7\frac{3}{8}$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ προσθέσωμεν εἰς μεικτὸν ἓνα ἀκέραιον, προσθέτομεν αὐτὸν εἰς τὸν ἀκέραιον τοῦ μεικτοῦ καὶ ἀφήνομεν τὸ κλάσμα ὅπως εἶναι.

II. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα :  $8\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ .

Κατὰ τὰ προηγούμενα, θὰ εἶναι :

$$8\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = 8 + \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = 8 + \left(\frac{9}{12} + \frac{2}{12}\right) = 8\frac{11}{12}.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ προσθέσωμεν εἰς μεικτὸν ἓνα κλάσμα, προσθέτομεν αὐτὸ εἰς τὸ κλάσμα τοῦ μεικτοῦ καὶ ἀφήνομεν τὸν ἀκέραιον ὅπως εἶναι.

§ 176. Ἄλλος τρόπος προσθέσεως οἰωνδήποτε ἀριθμῶν.

Πρόβλημα. Τρία δέματα ζυγίζουν ἀντιστοίχως  $5\frac{1}{4}$  χλγ,  $2\frac{3}{8}$  χλγ, 7 χλγ. Πόσον εἶναι τὸ ὅλικὸν βάρους των ;

Λύσις. Τὸ ζητούμενον βάρους εἶναι τὸ ἄθροισμα :

$$5\frac{1}{4} \text{ χλγ.} + 2\frac{3}{8} \text{ χλγ.} + 7 \text{ χλγ.} \quad \text{ἢ} \quad 5 + \frac{1}{4} + 2 + \frac{3}{8} + 7 \text{ χλγ.}$$

Κατὰ γνωστὴν ιδιότητα τῆς προσθέσεως, τὸ ἄθροισμα αὐτὸ εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα  $(5 + 2 + 7) + \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{8}\right)$ .

Ἐπειδὴ  $5 + 2 + 7 = 14$  καὶ  $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ ,

$$\text{θὰ εἶναι} \quad 5\frac{1}{4} + 2\frac{3}{8} + 7 = 14 + \frac{5}{8} = 14\frac{5}{8}.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ προσθέσωμεν διαφόρους ἀριθμούς, προσθέτομεν χωριστὰ τοὺς ἀκεραίους καὶ χωριστὰ τὰ κλάσματα αὐτῶν καὶ ἐνώνομεν τὰ δύο ἄθροίσματα.

### Άσκησεις

A' Όμάς. Από μνήμης. 245) Εύρετε τὰ ἀκόλουθα ἀθροί-  
σματα :  $\frac{1}{7} + \frac{3}{7} + \frac{2}{7}$ ,  $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} + \frac{1}{9} + \frac{7}{9}$ ,  $\frac{3}{12} + \frac{5}{12} + \frac{8}{12}$ .

246) Ποῖα ἀνάγωγα κλάσματα πρέπει νὰ προσθέσωμεν, διὰ νὰ προκύψουν τὰ κάτωθι κλάσματα :

$$\frac{7+9}{13}, \frac{8+11+17}{23}, \frac{16+35+18+1}{101}.$$

B' Όμάς. Γραπτῶς. 247) Εύρετε τὰ ἀκόλουθα ἀθροίσματα :  
 $\frac{3}{4} + \frac{4}{6} + \frac{1}{12}$ ,  $\frac{2}{6} + \frac{5}{9} + \frac{7}{18} + \frac{1}{36}$ ,  $\frac{2}{24} + \frac{3}{36} + \frac{5}{12} + \frac{6}{9}$ .

248) Εύρετε τὰ ἀκόλουθα ἀθροίσματα :

1.  $5\frac{3}{4} + 12$ ,  $4\frac{2}{9} + 6$ ,  $10\frac{1}{5} + 5$ ,  $6\frac{4}{7} + 10$ .

2.  $1\frac{1}{5} + \frac{3}{4}$ ,  $5\frac{3}{5} + \frac{1}{6}$ ,  $10\frac{5}{9} + \frac{2}{7}$ ,  $16\frac{3}{10} + \frac{7}{12}$ .

3.  $2\frac{1}{5} + 4\frac{3}{4}$ ,  $7\frac{1}{2} + 3\frac{5}{8}$ ,  $11\frac{1}{4} + 3\frac{5}{6}$ .

4.  $6\frac{1}{5} + 3\frac{2}{3} + 1\frac{1}{5}$ ,  $5\frac{2}{3} + 4\frac{1}{4} + 1\frac{5}{6}$ ,  $10\frac{1}{9} + 4\frac{1}{8} + 6\frac{5}{6}$ .

Γ' Όμάς. 249) Ἐνας οἰκογενειάρχης ἠγόρασε  $5\frac{3}{4}$  χλγ. σάπωνος ἀπὸ ἓνα παντοπώλην καὶ ἀπὸ ἄλλον ἄλλα  $3\frac{5}{8}$  χλγ. Πόσον σάπωνα ἠγόρασε τὸ ὄλον ;

250) Ἐνας ἔμπορος ἐπώλησε  $4\frac{1}{4}$  πήχεις ἀπὸ ἓνα τεμάχιον ὑφά-  
σματος. Ἐπειτα ἄλλους  $8\frac{5}{8}$  πήχεις καὶ ἔπειτα ἄλλους  $6\frac{3}{4}$  πήχεις.  
Παρατήρησε δὲ ὅτι ἔμειναν ἀκόμη  $30\frac{6}{8}$  πήχεις. Πόσους πήχεις εἶχε  
τὸ τεμάχιον τοῦτο ;

251) Ἐνας παντοπώλης ἐπώλησε πρὸ μεσημβρίας μιᾶς ἡμέ-  
ρας  $12\frac{3}{4}$  χλγ. τυροῦ ἀπὸ ἓνα βαρέλιον. Μετὰ μεσημβριαν ἐπώλη-  
σεν ἄλλα  $8\frac{1}{8}$  χλγ. Ἐμειναν δὲ εἰς τὸ βαρέλιον 4 χλγ. τεμάχια  
τυροῦ καὶ  $\frac{3}{4}$  τοῦ χλγ. τρίμματα. Πόσον τυρὸν εἶχε κατ' ἀρχὰς τὸ  
βαρέλιον τοῦτο ;

252 ) Μία πλύντρια εξώδευσε εις ένα μήνα  $22 \frac{1}{4}$  χλγ. σάπωνος, τὸν ἐπόμενον μήνα εξώδευσε  $18 \frac{5}{8}$  χλγ. καὶ τὸν μεθεπόμενον  $24 \frac{3}{4}$  χλγ. Πόσον σάπωνα εξώδευσε αὐτὴν τὴν τριμηνίαν ;

Δ' Ὅ μ α ς. 253 ) Πεζοπόρος διήνυσε κατὰ τὴν α' ἡμέραν  $28 \frac{3}{4}$  χιλιόμετρα, κατὰ τὴν β' ἡμέραν  $30 \frac{1}{2}$  χλμ. καὶ κατὰ τὴν γ'  $2 \frac{1}{2}$  χλμ. περισσότερον ἀπὸ τὴν β' ἡμέραν. Πόσα χιλιόμετρα διήνυσε κατὰ τὰς τρεῖς αὐτὰς ἡμέρας ;

254 ) Ἐνα φορτηγὸν αὐτοκίνητον μεταφέρει 3 κιβώτια. Τὸ α' ζυγίζει  $145 \frac{2}{5}$  χλγ. τὸ β' ζυγίζει  $10 \frac{1}{8}$  χλγ. περισσότερον ἀπὸ τὸ α', καὶ τὸ γ'  $15 \frac{5}{8}$  χλγ. περισσότερον ἀπὸ τὸ β'. Πόσον εἶναι τὸ βάρος τῶν 3 κιβωτίων ;

## 2. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

§ 177. Ὁ γνωστὸς γενικὸς ὀρισμὸς τῆς ἀφαιρέσεως ἑνὸς ἀκεραίου ἀπὸ ἄλλον ἀκέραιον, τὸν ὁποῖον ἐμάθομεν εἰς τὴν § 43, ἰσχύει δι' οἴουσδήποτε ἀριθμούς.

§ 178. Ἀφαιρέσεις κλάσματος ἀπὸ ἄλλον ὁμωνύμου.  
Πρόβλημα. Μία φιάλη γεμάτη μὲ ἔλαιον ἔχει βάρους  $\frac{350}{400}$  τῆς ὀκᾶς, κενὴ δὲ  $\frac{50}{400}$  τῆς ὀκᾶς. Πόσον ἔλαιον χωρεῖ αὐτὴ ;

Λύσις. Εἶναι φανερὸν ὅτι ἀπὸ ὅλον τὸ βᾶρος τῆς φιάλης μὲ τὸ ἔλαιον πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ βᾶρος μόνον τῆς φιάλης. Νὰ ἐκτελέσωμεν δηλ. τὴν ἀφαιρέσιν  $\frac{350}{400} - \frac{50}{400}$ .

Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι εἶναι τὸ ἴδιον νὰ ἀφαιρέσωμεν 50 δράμια ἀπὸ 350 δράμια. Τὸ βᾶρος λοιπὸν τοῦ ἔλαιου εἶναι :  
 $350 \text{ δράμ.} - 50 \text{ δράμ.} = 300 \text{ δράμια ἢ } \frac{300}{400}$  τῆς ὀκᾶς. Ὡστε :

$$\frac{350}{400} - \frac{50}{400} = \frac{300}{400}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἓνα κλάσμα ἀπὸ ἄλλο ὁμώνυμον, ἀφαιρούμεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ μειωτέου καὶ τὸ ἐξαγόμενον γράφομεν ἀριθμητὴν. Παρονομαστὴν δὲ θέτομεν τὸν παρονομαστὴν τῶν κλασμάτων τούτων.

Κατὰ ταῦτα θὰ εἶναι γενικῶς:

$$\boxed{\frac{\alpha}{\gamma} - \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha - \beta}{\gamma}} \quad \text{ἂν } \alpha > \beta$$

§ 179. Ἀφαιρέσεις κλάσματος ἀπὸ ἄλλου ἑτερονύμου.

\*Ἐστὼ ὅτι θέλομεν νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ κλάσμα  $\frac{2}{9}$  ἀπὸ τὸ κλάσμα  $\frac{5}{8}$ , δηλ. νὰ εὑρωμεν τὴν διαφορὰν  $\frac{5}{8} - \frac{2}{9}$ .

\*Ἄν τρέψωμεν τὰ κλάσματα αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα, εὐρίσκομεν τὰ κλάσματα  $\frac{45}{72}$  καὶ  $\frac{16}{72}$  καὶ ἀναγόμεθα εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν.

$$\text{Εἶναι λοιπὸν } \frac{5}{8} - \frac{2}{9} = \frac{45}{72} - \frac{16}{72} = \frac{29}{72}.$$

\*Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν κλάσμα ἀπὸ ἄλλου ἑτερονύμου, τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα καὶ ἐκτελοῦμεν τὴν ἀφαιρέσιν κατὰ τὰ γνωστά.

#### Ἀσκήσεις

Α' Ὁμάς. 255) Ἐκτελέσατε ἀπὸ μνήμης τὰς ἀκολουθούσας ἀφαιρέσεις καὶ τὴν δοκιμὴν αὐτῶν.

$$\begin{array}{ccccc} \frac{7}{8} - \frac{3}{8}, & \frac{8}{15} - \frac{3}{15}, & \frac{19}{25} - \frac{11}{25}, & \frac{37}{30} - \frac{7}{30}, & \frac{55}{50} - \frac{15}{50}, \\ \frac{4}{5} - \frac{3}{10}, & \frac{5}{6} - \frac{7}{12}, & \frac{9}{10} - \frac{4}{15}, & \frac{6}{8} - \frac{2}{6}, & \frac{17}{20} - \frac{11}{30}. \end{array}$$

Β' Ὁμάς. 256) Ἐνας ἐργάτης ἀνέλαβε νὰ σκάψῃ τὰ  $\frac{7}{8}$  μιᾶς ἀμπέλου. Μετὰ ἐργασίαν 3 ἡμερῶν ἔσκαψε τὰ  $\frac{3}{4}$  αὐτῆς. Πόσον μέρος τῆς ἀμπέλου αὐτῆς ἔχει ἀκόμη νὰ σκάψῃ ;

257) Ἐργάτης δύναται νὰ ἐκτελέσῃ ἓνα ἔργον εἰς 12 ἡμέρας καὶ

ὁ υἱὸς τοῦ εἰς 20 ἡμέρας. Τί μέρος τοῦ ἔργου δύναται νὰ ἐκτελέσῃ ὁ πατήρ περισσότερον ἀπὸ τὸν υἱὸν τοῦ εἰς 1 ἡμέραν;

258 ) Δύο γυναῖκες ἔπλεξαν, ἡ μὲν μία 15 μέτρα δαντέλλας εἰς 12 ἡμέρας, ἡ δὲ ἄλλη 18 μέτρα τοῦ αὐτοῦ πλάτους εἰς 14 ἡμέρας. Πόσον ἔπλεξε περισσότερον τὴν ἡμέραν ἢ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην;

**§ 180. Διατήρησις τῶν ιδιοτήτων τῆς ἀφαιρέσεως.** Ἀπὸ τὰ προηγούμενα παραδείγματα βλέπομεν ὅτι κάθε ἀφαίρεσις γίνεται δι' ἀφαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ ἐνὸς ἀφαιρετέου κλάσματος ἀπὸ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ μειωτέου, δηλ. ἀκεραίου ἀπὸ ἀκέραιον.

Ἐπομένως αἱ ιδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως, τὰς ὁποίας ἐμάθομεν, ὅταν ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος εἶναι ἀκέραιοι, ἀληθεύουν καὶ ὅταν οὗτοι εἶναι τυχόντες ἀριθμοί.

**§ 181. Διάφοροι συντομίαι τῆς ἀφαιρέσεως.** I. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὔρωμεν τὴν διαφορὰν  $6\frac{3}{5} - 4$ .

Ἐπειδὴ  $6\frac{3}{5} = 6 + \frac{3}{5}$ , πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν 4 ἀπὸ τὸ ἄθροισμα  $6 + \frac{3}{5}$ . Κατὰ τὴν γνωστὴν δὲ ιδιότητα τῆς ἀφαιρέσεως (§ 48), ἡ διαφορὰ αὐτὴ εἶναι  $(6 - 4) + \frac{3}{5}$ , δηλ.  $2\frac{3}{5}$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

**Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ μεικτὸν ἓνα ἀκέραιον, ἀφαιροῦμεν αὐτὸν ἀπὸ τὸν ἀκέραιον τοῦ μεικτοῦ καὶ εἰς τὸ ἐξαγόμενον προσθέτομεν τὸ κλάσμα τοῦ μεικτοῦ.**

II. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὔρωμεν τὴν διαφορὰν  $8\frac{4}{5} - \frac{7}{10}$ .

Κατὰ τὰ προηγούμενα, θὰ εἶναι :

$$8\frac{4}{5} - \frac{7}{10} = 8 + \frac{8}{10} - \frac{7}{10} = 8 + \left(\frac{8}{10} - \frac{7}{10}\right) = 8\frac{1}{10}.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

**Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ μεικτὸν ἓνα κλάσμα, ἀφαιροῦμεν αὐτὸ ἀπὸ τὸ κλάσμα τοῦ μεικτοῦ καὶ εἰς τὸ ἐξαγόμενον προσθέτομεν τὸν ἀκέραιον τοῦ μεικτοῦ.**

**Σημείωσις.** Ἄν τὸ κλάσμα τοῦ ἀφαιρετέου εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ κλάσμα τοῦ μειωτέου, αὐξάνομεν τοῦτο κατὰ μίαν ἀκεραίαν

μονάδα, την οποίαν δανειζόμεθα από τον άκέραιον του μεικτού.

$$\text{Π.χ. } 3\frac{1}{6} - \frac{3}{6} = 2\frac{7}{6} - \frac{3}{6} = 2\frac{4}{6} = 2\frac{2}{3}.$$

III. *Παράδειγμα 1ον.* Ἐστω ὅτι θέλομεν νά εὕρωμεν τήν διαφοράν  $8\frac{4}{5} - 3\frac{1}{5}$ .

Ἐπειδή  $3\frac{1}{5} = 3 + \frac{1}{5}$ , ἡ προηγουμένη διαφορά γράφεται :

$$8\frac{4}{5} - \left(3 + \frac{1}{5}\right).$$

Διὰ νά εὕρωμεν δέ αὐτήν, ἀφαιροῦμεν τόν άκέραιον 3 ἀπό τόν μειωτέον  $8\frac{4}{5}$  καί εὐρίσκομεν  $5\frac{4}{5}$ . Ἀπό τό ἐξαγόμενον αὐτό ἀφαιροῦμεν τό κλάσμα  $\frac{1}{5}$  καί εὐρίσκομεν  $5\frac{3}{5}$ . Ὡστε :

$$8\frac{4}{5} - 3\frac{1}{5} = 5\frac{3}{5}.$$

Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι :

$$10\frac{3}{4} - 6\frac{5}{8} = 10\frac{6}{8} - 6\frac{5}{8} = 4\frac{1}{8}.$$

*Παράδειγμα 2ον.* Ἐστω ὅτι θέλομεν νά εὕρωμεν τήν διαφοράν  $9\frac{1}{2} - 5\frac{3}{4}$ . Ἡ διαφορά αὐτή εἶναι ἴση πρὸς  $9\frac{2}{4} - 5\frac{3}{4}$ .

Ἐπειδή τό κλάσμα  $\frac{3}{4}$  δέν ἀφαιρεῖται ἀπό τό κλάσμα  $\frac{2}{4}$ , αὐξάνομεν αὐτό κατὰ μίαν άκεραίαν μονάδα, τήν ὁποίαν λαμβάνομεν ἀπό τόν άκέραιον τοῦ μειωτέου. Θά εἶναι λοιπόν :

$$9\frac{2}{4} - 5\frac{3}{4} = 8\frac{6}{4} - 5\frac{3}{4} = 3\frac{3}{4}.$$

Ἐκ τῶν άνωτέρω παραδειγμάτων συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νά ἀφαιρέσωμεν μεικτόν ἀπό μεικτόν, ἀφαιροῦμεν χωριστά τόν άκέραιον ἀπό τόν άκέραιον καί τό κλάσμα ἀπό τό κλάσμα καί ένώνομεν τά δύο έξαγόμενα.

#### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

Α' (Ὁ μ ά ς. 259) Νά έκτελεσθοῦν ἀπό μνήμης αἱ κάτωθι ἀφαιρέσεις.

$$\begin{array}{lll} 1. & 1 - \frac{3}{5}, & 12 - \frac{7}{8}, & 69 - \frac{3}{11}. \\ 2. & 3 - 2\frac{1}{4}, & 9 - 4\frac{3}{5}, & 18 - 7\frac{9}{10}. \end{array}$$

3.  $8\frac{4}{9} - 3$ ,  $12\frac{1}{5} - 8$ ,  $35\frac{3}{4} - 9$ .

4.  $5\frac{5}{9} - 4\frac{1}{9}$ ,  $9\frac{3}{4} - 3\frac{1}{4}$ ,  $18\frac{4}{5} - 9\frac{3}{5}$ .

Β' Όμ. 260) Να εκτελεστούν αι κάτωθι αφαιρέσεις και ή δοκιμή εκάστης :

1.  $6\frac{5}{12} - \frac{3}{24}$ ,  $3\frac{4}{9} - \frac{2}{9}$ ,  $25\frac{2}{5} - \frac{3}{4}$ .

2.  $10\frac{4}{5} - 5\frac{3}{10}$ ,  $15\frac{4}{7} - 10\frac{2}{5}$ ,  $40\frac{5}{6} - 8\frac{5}{9}$ .

3.  $5\frac{1}{2} - 3\frac{3}{4}$ ,  $18\frac{2}{5} - 10\frac{5}{6}$ ,  $28\frac{4}{9} - 16\frac{7}{8}$ .

261) Να συμπληρωθούν αι κάτωθι ισότητες :

$$\frac{11}{23} + ; = \frac{45}{46}, \quad ; + \frac{19}{25} = \frac{73}{75}, \quad 5\frac{7}{13} + ; = 29\frac{19}{26}.$$

Γ' Όμ. 262) Ένα δοχείον έχει βάρος  $\frac{7}{8}$  του χλγ. Αν δέ τὸ γεμίσωμεν με βούτυρον, εὐρίσκομεν ὅτι έχει βάρος  $6\frac{3}{4}$  χιλιόγρ. Πόσον βούτυρον χωρεῖ τοῦτο ;

263) Ένα σιδηροῦν δοχείον έχει βάρος  $3\frac{5}{12}$  χιλιόγρ. Γεμάτον δέ με ἔλαιον έχει βάρος  $12\frac{7}{8}$  χλγ. Πόσον ἔλαιον χωρεῖ ;

264) Ένας ὀρνιθοτρόφος ἠγόρασεν  $22\frac{3}{10}$  χλγ. ἀραβοσίτου διὰ τὰς ὀρνιθας. Μετά τινας ἡμέρας εὔρεν ὅτι ἔμειναν  $12\frac{4}{5}$  χλγ. Πόσα χλγ. ἔφαγον αι ὀρνιθες αὐτὰς τὰς ἡμέρας ;

265) Ένας οἰκογενειάρχης ἠγόρασεν ἕνα σάκκον ἀνθράκων βάρους  $40\frac{3}{4}$  χλγ. Ὁ σάκκος οὗτος κενὸς εἶχε βάρος  $1\frac{2}{5}$  χιλιόγρ. Πόσα χιλιόγρ. ἀνθράκων ἠγόρασεν ;

266) Ἡ πρωϊνή ὄμαξοστοιχία τῶν σιδηροδρόμων Πελοποννήσου ἀναχωρεῖ ἐκ Πειραιῶς τὴν  $8\frac{1}{3}$  ὥραν π.μ. καὶ φθάνει εἰς Κόρινθον τὴν  $10\frac{1}{10}$  π.μ. Πόσον χρόνον χρειάζεται, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς Κόρινθον ;

Δ' Όμ. 267) Ένας ἔμπορος εἶχεν ἕνα τεμάχιον ὑφάσματος

ἐκ 50 πήχων. Ἀπὸ αὐτὸ ἐπώλησε μίαν ἡμέραν  $8 \frac{1}{2}$  πήχεις· τὴν ἐπομένην ἐπώλησεν ἄλλους  $12 \frac{3}{4}$  πήχεις καὶ τὴν μεθεπομένην  $16 \frac{1}{8}$  πήχεις. Πόσοι πήχεις ἔμειναν ;

268 ) Ἐνας πεζοπόρος θέλει νὰ διανύσῃ μίαν ἀπόστασιν 100 χλμ. εἰς τρεῖς ἡμέρας. Τὴν α' ἡμέραν διήνυσε  $35 \frac{3}{4}$  χλμ., τὴν β'  $5 \frac{2}{5}$  χλμ. ὀλιγώτερον τῆς α'. Πόσα χιλιόμετρα πρέπει νὰ διανύσῃ τὴν τρίτην ἡμέραν ;

269 ) Τρία κιβώτια σάπωνος ζυγίζουν  $127 \frac{5}{8}$  χλγ. Τὰ δύο βαρύτερα ζυγίζουν  $94 \frac{3}{4}$  χλγ. Τὸ ἐλαφρότερον ζυγίζει  $10 \frac{1}{2}$  χλγ. ὀλιγώτερον τοῦ μεσαίου. Πόσον ζυγίζει ἕκαστον κιβώτιον ;

270 ) Τρία πρόσωπα ἐμοιράσθησαν ἓνα τεμάχιον ὑφάσματος. Τὸ α' ἔλαβε  $12 \frac{3}{5}$  μ., τὸ δεύτερον ἔλαβε  $2 \frac{2}{3}$  μ. ὀλιγώτερον τοῦ α' καὶ  $2 \frac{5}{8}$  μ. περισσότερον τοῦ γ'. Πόσον ἦτο τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος ;

271 ) Κρουνὸς γεμίζει μίαν δεξαμενὴν εἰς 8 ὥρας· δεύτερος τὴν γεμίζει εἰς 12 ὥρας· τρίτος κρουνός, ὁ ὁποῖος ἔχει τεθῆ εἰς τὴν βάσιν, ἀδειάζει αὐτὴν εἰς 15 ὥρας. Ἐὰν ἀνοιχθοῦν καὶ οἱ τρεῖς κρουνοὶ ταυτοχρόνως, τί μέρος τῆς δεξαμενῆς θὰ γεμίσουν εἰς 1 ὥραν ;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

### ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

#### ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙ ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ

§ 182. *Πρόβλημα.* "Ένα ώρολόγιον μένει όπίσω  $\frac{7}{60}$  του πρώτου λεπτοῦ εἰς μίαν ώραν. Νά εύρεθῆ πόσον μένει όπίσω εἰς ἓνα ἡμερονύκτιον.

*Λύσις.* Διά νά λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς:

Ἐφοῦ εἰς 1 ὥραν μένει όπίσω  $\frac{7}{60}$  τοῦ πρώτου λεπτοῦ, εἰς δύο ὥρας θά μένη όπίσω δύο φορές περισσότερον, ἤτοι  $\frac{7}{60} \times 2$ , εἰς 3 ὥρας θά μένη όπίσω τρεῖς φορές περισσότερον καὶ εἰς τὰς 24 ὥρας τοῦ ἡμερονυκτίου θά μένη όπίσω 24 φορές περισσότερον, ἤτοι  $\frac{7}{60} \times 24$  πρώτα λεπτά.

Ἐπειδὴ δὲ  $\frac{7}{60}$  τοῦ πρώτου λεπτοῦ εἶναι 7 δευτερόλεπτα, εἰς 24 ὥρας θά μένη όπίσω 7 δευτερόλεπτα  $\times 24 = 168$  δευτερόλεπτα, ἤτοι:  $\frac{168}{60}$  τοῦ πρώτου λεπτοῦ. Εἶναι λοιπόν:

$$\frac{7}{60} \times 24 = \frac{7 \times 24}{60} = \frac{168}{60} = 2 \frac{48}{60} \text{ πρώτα λεπτά.}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι:

Διά νά πολλαπλασιάσωμεν ἓνα κλάσμα ἐπὶ ἀκέραιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ τὸ γινόμενον θέτομεν ὡς ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ ἀφήνομεν τὸν ἴδιον.

Ἦτοι γενικῶς εἶναι:

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \gamma = \frac{\alpha \times \gamma}{\beta}$$

*Παρατήρησις.* Εἰς τὸ συμπέρασμα τοῦτο φθάνομεν καὶ ἂν ἐπε-

κτείνωμεν, τὸν ὀρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ ἀκέραιον καὶ ὅταν ὁ πολλαπλασιαστέος εἶναι κλάσμα.

Οὕτως εἶναι :

$$\frac{3}{8} \times 4 = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3+3+3+3}{8} = \frac{3 \times 4}{8} = \frac{12}{8}.$$

§ 183. Ἰδιαιτέρας περιπτώσεις. I. Τὸ αὐτὸ ὥρολόγιον εἰς 12 ὥρας μένει ὀπίσω  $\frac{7}{60} \times 12 = \frac{7 \times 12}{60}$ . Ἐὰν δὲ ἀπλοποιήσωμεν τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο, εὐρίσκομεν  $\frac{7}{5}$ . Εἶναι λοιπὸν :

$$\frac{7}{60} \times 12 = \frac{7}{60:12} = \frac{7}{5}.$$

Βλέπομεν δηλ. ὅτι :

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἓνα κλάσμα ἐπὶ ἀκέραιον, δυνάμεθα νὰ ἀφήσωμεν τὸν ἴδιον ἀριθμητὴν καὶ νὰ διαιρέσωμεν τὸν παρονομαστὴν διὰ τοῦ ἀκεραίου, ἂν διαιρῆται ἀκριβῶς.

II. Ἐπειδὴ  $\frac{3}{5} \times 5 = \frac{3 \times 5}{5} = 3$ , συνάγομεν ὅτι :

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν ἓνα κλάσμα ἐπὶ τὸν παρονομαστὴν του, εὐρίσκομεν τὸν ἀριθμητὴν του.

Ἦτοι γενικῶς εἶναι :

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \beta = \alpha$$

III. Προηγουμένως εὔρομεν ὅτι, ἂν τὸ κλάσμα  $\frac{3}{5}$  ληφθῆ 5 φορές, γίνεται 3. Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι, ἂν τοῦτο ληφθῆ 10 φορές, δηλ.  $5 \times 2$ , θὰ γίνῃ  $3 \times 2$ , ἦτοι 6. Εἶναι δηλ.  $\frac{3}{5} \times 10 = 3 \times 2 = 6$ .

Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι  $\frac{3}{5} \times 15 = 9$  κ.τ.λ. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἐπὶ πολλαπλάσιον τοῦ παρονομαστοῦ, εὐρίσκομεν τὸ ἰσοπολλαπλάσιον τοῦ ἀριθμητοῦ.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

A' Ὁ μ ἄ ς. 272 ) Νὰ εὑρεθοῦν ἀπὸ μνήμης τὰ ἀκόλουθα γινόμενα :

$$1. \quad \frac{2}{3} \times 3, \quad \frac{5}{6} \times 6, \quad \frac{7}{12} \times 12, \quad \frac{9}{14} \times 14.$$

$$2. \quad \frac{3}{4} \times 8, \quad \frac{4}{5} \times 15, \quad \frac{1}{8} \times 72, \quad \frac{7}{12} \times 60.$$

273 ) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ ἀκόλουθα γινόμενα :

$$\frac{3}{4} \times 12, \quad \frac{5}{6} \times 3, \quad \frac{7}{9} \times 4, \quad \frac{4}{6} \times 8, \quad \frac{7}{8} \times 20.$$

274 ) Μὲ ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ  $\frac{5}{8}$  διὰ νὰ εὐρωμεν γινόμενον 5 ; Μὲ ποῖον δέ, διὰ νὰ εὐρωμεν γινόμενον 10 ἢ 15 ;

275) 1ον. Ἐὰν  $\frac{3}{4} \times \alpha = 3$ , ποῖον ἀριθμὸν παριστάνει ὁ  $\alpha$  ;

2ον. Ἐὰν  $\frac{\alpha}{5} \times 5 = 4$ , ποῖον ἀριθμὸν παριστάνει ὁ  $\alpha$  ;

3ον. Ἐὰν  $\frac{4}{7} \times \alpha = 8$ , ποῖον ἀριθμὸν παριστάνει ὁ  $\alpha$  ;

Β' Ὁ μ α ς. 276) Μία λάμπρα πετρελαίου καίει  $\frac{3}{8}$  χλγ. πετρελαίου καθ' ἑσπέραν. Πόσον θὰ καύσῃ εἰς ἓνα μῆνα ;

277) Διὰ νὰ θέσωμεν τὸν οἶνον ἑνὸς βαρελίου εἰς φιάλας, χρειαζόμεθα 360 φιάλας τῶν  $\frac{3}{4}$  χλγ. Πόσος οἶνος ὑπάρχει εἰς τὸ βαρέλιον ;

278 ) Ἡ πλευρὰ ἑνὸς τετραγώνου ἔχει μῆκος  $\frac{3}{10}$  τοῦ μέτρου. Πόση εἶναι ἡ περίμετρος αὐτοῦ ;

279 ) Τὰς παραμονὰς τῶν Χριστουγέννων διενεμήθησαν ὑπὸ μιᾶς κοινότητος εἰς 156 ἀπόρους ἀνὰ ἓν χλγ. ἀλεύρου ἀξίας  $3\frac{1}{2}$  δρχ. καὶ ἀνὰ ἓν χλγ. κρέατος κατεψυγμένου ἀξίας  $8\frac{1}{2}$  δρχ. Πόσας δραχμὰς ἤξιζον ἓν ὄλω τὰ εἶδη, ποὺ διενεμήθησαν ;

§ 184. Πῶς ὀρίζομεν γενικῶς τὴν διαίρεσιν  $a : \delta$ . Γνωρίζομεν ὅτι :

$$12 : 6 = 2 \quad \text{καὶ} \quad 6 \times 2 = 12.$$

$$24 : 3 = 8 \quad \text{καὶ} \quad 8 \times 3 = 24.$$

$$\text{Ὁμοίως} \quad 3 : 4 = \frac{3}{4} \quad \text{καὶ} \quad \frac{3}{4} \times 4 = 3.$$

$$5 : 8 = \frac{5}{8} \quad \text{καὶ} \quad \frac{5}{8} \times 8 = 5.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διαίρεσις ἀριθμοῦ δι' ἄλλου εἶναι μία πρᾶξις, μὲ τὴν ὁποίαν εὐρίσκομεν τρίτον· οὗτος δὲ πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν δευτέρου πρέπει νὰ δίδῃ τὸν πρῶτον.

Ἄν λοιπὸν  $\boxed{\alpha : \delta = \nu}$ , θὰ εἶναι  $\boxed{\alpha = \nu \times \delta}$

Ἀντιστρόφως: Ἄν  $\boxed{\nu \times \delta = \alpha}$ , θὰ εἶναι  $\boxed{\alpha : \delta = \nu}$  ἢ καὶ  $\boxed{\alpha : \nu = \delta}$

§ 185. Σύγκρισις κλασμάτων. Ποῖα κλάσματα εἶναι ἴσα καὶ ποῖα ἄνισα. α') Ἐμάθομεν ὅτι  $\frac{2}{5} \times 10 = 4$  καὶ  $\frac{4}{10} \times 10 = 4$ .

Βλέπομεν δηλ. ὅτι, εἴτε τὸν  $\frac{2}{5}$  εἴτε τὸν  $\frac{4}{10}$  ἐπαναλάβωμεν 10 φορές, εὐρίσκομεν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον. Εἶναι λοιπὸν:  $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ .

Ὅμοίως ἀπὸ τὰς ἰσότητας  $\frac{5}{8} \times 24 = 15$ ,  $\frac{15}{24} \times 24 = 15$ , ἐννοοῦμεν ὅτι  $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$ . Ἐκ τούτων ὀδηγούμεθα καὶ δίδομεν τὸν ἐξῆς γενικὸν ὄρισμὸν τῶν ἴσων κλασμάτων:

Δύο κλάσματα εἶναι ἴσα, ἂν γίνωνται ἴσοι ἀκέραιοι διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον ἀριθμὸν.

β') Γνωρίζομεν ὅτι  $\frac{3}{4} \times 8 = 6$  καὶ  $\frac{7}{8} \times 8 = 7$ . Ἐπειδὴ δὲ  $7 > 6$ , ἐννοοῦμεν ὅτι  $\frac{7}{8} > \frac{3}{4}$ . Ὅμοίως ἀπὸ τὰς ἰσότητας  $\frac{4}{5} \times 10 = 8$ ,  $\frac{9}{10} \times 10 = 9$  καὶ ἀπὸ τὴν ἀνισότητα  $9 > 8$ , ἐννοοῦμεν ὅτι  $\frac{9}{10} > \frac{4}{5}$ . Ὡστε:

Δύο κλάσματα εἶναι ἄνισα, ἂν γίνωνται ἄνισοι ἀκέραιοι διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον. Μεγαλύτερον δὲ εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον γίνεται μεγαλύτερος ἀκέραιος.

Σημείωσις. Διὰ νὰ γίνωνται τὰ διάφορα κλάσματα ἀκέραιοι ἀριθμοί, τὰ πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ ἓνα κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν παρονομασῶν. Προτιμῶμεν δὲ ἀπὸ αὐτὰ τὸ ἐ.κ.π., διὰ νὰ γίνηται εὐκολώτερον ὁ πολλαπλασιασμός.

Διὰ νὰ συγκρίνωμεν π.χ. τὰ κλάσματα  $\frac{5}{8}$ ,  $\frac{7}{12}$ ,  $\frac{17}{24}$  πολλαπλασιάζομεν αὐτὰ ἐπὶ 24 καὶ εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\frac{5}{8} \times 24 = 15, \quad \frac{7}{12} \times 24 = 14, \quad \frac{17}{24} \times 24 = 17.$$

Ἐπειδὴ δὲ  $14 < 15 < 17$ , ἐννοοῦμεν ὅτι:  $\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{17}{24}$ .

§ 186. Ἰδιαιτέρας περιπτώσεις ἀνίσων κλασμάτων. Ἡ. Ἐστῶσαν τὰ ὁμώνυμα κλάσματα  $\frac{3}{9}$  καὶ  $\frac{5}{9}$ . Ἄν πολλαπλασιάσωμεν αὐτὰ ἐπὶ 9, εὐρίσκομεν ὅτι:  $\frac{3}{9} \times 9 = 3$ ,  $\frac{5}{9} \times 9 = 5$ . Ἐπειδὴ δὲ  $3 < 5$ , ἐννοοῦμεν ὅτι:  $\frac{3}{9} < \frac{5}{9}$ . Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

**Δύο ὁμώνυμα κλάσματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν διαφόρους ἀριθμητάς, εἶναι ἄνισα. Μεγαλύτερον δὲ εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἔχει μεγαλύτερον ἀριθμητήν.**

2α. Ἐστῶσαν τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα  $\frac{3}{5}$  καὶ  $\frac{3}{8}$ , τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸν αὐτὸν ἀριθμητήν.

Ἄν πολλαπλασιάσωμεν αὐτὰ ἐπὶ τὸ ἐ.κ.π. 40 τῶν παρονομαστῶν των, εὐρίσκομεν  $\frac{3}{5} \times 40 = 24$  καὶ  $\frac{3}{8} \times 40 = 15$ . Ἐπειδὴ δὲ  $15 < 24$ , συμπεραίνομεν ὅτι  $\frac{3}{8} < \frac{3}{5}$ . Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

**Δύο ἑτερόνυμα κλάσματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸν αὐτὸν ἀριθμητήν, εἶναι ἄνισα. Μεγαλύτερον δὲ εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἔχει μικρότερον παρονομαστήν.**

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

A' Ὁ μ ἄ ς. 280 ) Συγκρίνατε τὰ ἀκόλουθα κλάσματα:

$$\frac{3}{5} \text{ καὶ } \frac{9}{15}, \quad \frac{7}{9} \text{ καὶ } \frac{28}{36}, \quad \frac{8}{11} \text{ καὶ } \frac{32}{44}.$$

281 ) Ὅρισατε τὸν ἀριθμὸν, τὸν ὁποῖον παριστάνει κάθε γράμμα διὰ νὰ ἀληθεύσουν αἱ ἰσότητες:

$$\frac{4}{1} = \frac{\alpha}{14}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\beta}{27}, \quad \frac{6}{11} = \frac{24}{\gamma}, \quad \frac{7}{\alpha} = \frac{35}{20}.$$

282 ) Γράψατε τὰ ἀκόλουθα κλάσματα κατὰ τάξιν μεγέθους μὲ τὴν κατάλληλον τοποθέτησιν σημείου ἀνισότητος μεταξύ των:

$$1. \quad \frac{4}{15}, \quad \frac{7}{15}, \quad \frac{12}{15}, \quad \frac{9}{15}. \quad 2. \quad \frac{5}{7}, \quad \frac{5}{9}, \quad \frac{5}{6}, \quad \frac{5}{12}$$

283 ) Συγκρίνατε τὰ κατωτέρω κλάσματα καὶ διατάξατε αὐτὰ κατὰ τάξιν μεγέθους μὲ κατάλληλον τοποθέτησιν μεταξύ των τοῦ σημείου ἀνισότητος.

$$1. \frac{5}{8}, \frac{8}{12}, \frac{11}{24}. \quad 2. \frac{4}{5}, \frac{9}{10}, \frac{7}{8}, \frac{3}{4}.$$

B' Ὁ μ ἄ ς. 284) Ἐποθανὼν τις ὤρισε διὰ τῆς διαθήκης του ὁ υἱὸς του νὰ λάβῃ τὰ  $\frac{7}{15}$  τῆς περιουσίας του, καὶ τὰ  $\frac{5}{12}$  τὸ ταμεῖον τοῦ Ἐθνικοῦ Στόλου. Ποῖος κληρονόμος ἔλαβε περισσότερον μέρος ;

285 ) Ἐνα αὐτοκίνητον διέτρεξε τὰ  $\frac{5}{9}$  μιᾶς ὁδοῦ καὶ ἄλλο τὰ  $\frac{23}{45}$  αὐτῆς. Ποῖον διέτρεξε περισσότερον δρόμον ;

§ 187. Ἰδιότητες τῶν κλασμάτων. I. Τί παθαίνει ἓνα κλάσμα, ἂν ὁ ἀριθμητὴς του πολλαπλασιασθῇ ἢ διαιρεθῇ δι' ἐνὸς ἀκεραίου ἀριθμοῦ. Ἐστω τὸ κλάσμα  $\frac{15}{60}$  τῆς ὥρας. Ἄν διπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμητήν, προκύπτει τὸ κλάσμα  $\frac{30}{60}$ . Διὰ νὰ ἴδωμεν ποῖαν σχέσιν ἔχουν μεταξύ των τὰ κλάσματα αὐτά, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Τὰ  $\frac{15}{60}$  τῆς ὥρας εἶναι 15 πρῶτα λεπτὰ καὶ τὰ  $\frac{30}{60}$  τῆς ὥρας εἶναι 30 πρῶτα λεπτὰ.

Ἐπειδὴ δὲ τὰ 30 πρῶτα λεπτὰ εἶναι διπλάσια ἀπὸ τὰ 15 πρῶτα λεπτὰ, καὶ τὰ  $\frac{30}{60}$  θὰ εἶναι διπλάσια ἀπὸ τὰ  $\frac{15}{60}$ , ἤτοι  $\frac{30}{60} = \frac{15}{60} \times 2$ .

Ὁμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι  $\frac{15 \times 3}{60} = \frac{15}{60} \times 3$ . Ἀντιστρόφως :

$$\frac{30 : 2}{60} = \frac{15}{60} = \frac{30}{60} : 2, \quad \frac{45 : 3}{60} = \frac{15}{60} = \frac{45}{60} : 3.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Ἄν ὁ ἀριθμητὴς ἐνὸς κλάσματος πολλαπλασιασθῇ ἢ διαιρεθῇ δι' ἐνὸς ἀκεραίου ἀριθμοῦ, καὶ τὸ κλάσμα ἀντιστοίχως πολλαπλασιάζεται ἢ διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Ἄπὸ αὐτὰ προκύπτει πάλιν ὁ γνωστὸς κανὼν (§ 182) καὶ ὁ ἀκόλουθος κανὼν :

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν κλάσμα δι' ἀκεραίου, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ διὰ τοῦ ἀκεραίου, ἂν διαιρηθῆται ἀκριβῶς, παρονομαστὴν δὲ ἀφήνομεν τὸν ἴδιον.

### Ἀσκήσεις

Α' Ὁμάς. Ἀπὸ μνήμης. 286) Εὑρετε ἀμέσως :

1. Τὸ διπλάσιον τῶν κλασμάτων  $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \frac{8}{9}$ .

2. Τὸ τριπλάσιον τῶν κλασμάτων  $\frac{2}{5}, \frac{3}{22}, \frac{5}{23}, \frac{8}{15}$ .

287) Εὑρετε ἀμέσως :

1. Τὸ ἥμισυ τῶν κλασμάτων  $\frac{2}{3}, \frac{4}{7}, \frac{10}{12}, \frac{18}{26}$ .

2. Τὸ τρίτον τῶν κλασμάτων  $\frac{3}{4}, \frac{6}{8}, \frac{12}{5}, \frac{24}{30}$ .

Β' Ὁμάς. 288) Μὲ  $\frac{3}{8}$  πτήχ. χασὲ γίνεται ἓνα μανδήλιον. Πόσους πτήχεις πρέπει νὰ ἀγοράσῃ μία δεσποινίς, διὰ νὰ κάμῃ 24 τοιαῦτα μανδήλια ;

289) Ἐνα αὐτοκίνητον διέτρεξεν εἰς 3 ὥρας τὰ  $\frac{6}{9}$  μιᾶς ὁδοῦ. Πόσον μέρος τῆς ὁδοῦ διέτρεξεν εἰς μίαν ὥραν ;

290) Τέσσαρες ἀδελφοὶ ἐκληρονόμησαν τὰ  $\frac{8}{9}$  ἀγροκτήματος. Πόσον μέρος τοῦ ἀγροκτήματος ἔλαβεν ὁ καθένας ;

§ 188. II. Τί παθαίνει ἓνα κλάσμα, ἂν ὁ παρονομαστής τοῦ πολλαπλασιασθῆ ἢ διαιρηθῆ δι' ἑνὸς ἀκεραίου ἀριθμοῦ.

α') Ἐστω τὸ κλάσμα  $\frac{7}{10}$  τῆς δραχ. δηλαδὴ 70 λεπτά. Ἄν πολλαπλασιάσωμεν τὸν παρονομαστήν του ἐπὶ 10, εὐρίσκομεν τὸ κλάσμα  $\frac{7}{100}$  τῆς δραχ., δηλ. 7 λεπτά. Ἐπειδὴ δὲ τὰ 7 λεπτά εἶναι δέκα φορές ὀλιγώτερα ἀπὸ τὰ 70 λεπτά, συμπεραίνομεν ὅτι τὸ κλάσμα  $\frac{7}{100}$  εἶναι δέκα φορές μικρότερον ἀπὸ τὸ  $\frac{7}{10}$ . Τοῦτο δηλ. διηρέθη διὰ 10. Ὡστε :

$$\frac{7}{10 \times 10} = \frac{7}{100} = \frac{7}{10} : 10.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

"Αν ὁ παρονομαστής ἑνὸς κλάσματος πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ ἓνα ἀκέραιον ἀριθμὸν, τὸ κλάσμα διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀκεραίου.

β') "Αν τὸν παρονομαστήν τοῦ  $\frac{7}{100}$  διαιρέσωμεν διὰ 10, εὐρίσκουμεν τὸ κλάσμα  $\frac{7}{10}$  δηλ. δέκα φορές μεγαλύτερον. Εἶναι λοιπόν :

$$\frac{7}{100:10} = \frac{7}{10} = \frac{7}{100} \times 10. \text{ Ὡστε :}$$

"Αν ὁ παρονομαστής ἑνὸς κλάσματος διαιρεθῇ ἀκριβῶς δι' ἑνὸς ἀκεραίου, τὸ κλάσμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον.

### Ἀσκήσεις

291) Εὑρετε ἀπὸ μνήμης :

1. Τὸ ἕμισι τῶν κλασμάτων  $\frac{3}{5}, \frac{5}{4}, \frac{7}{10}, \frac{9}{12}$ .

2. Τὸ τρίτον τῶν κλασμάτων  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{5}{6}$ .

292) Χωρὶς νὰ μεταβάλητε τοὺς ἀριθμητὰς νὰ εὐρητε :

1. Τὸ διπλάσιον τῶν κλασμάτων  $\frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{12}, \frac{6}{10}$ .

2. Τὸ τρίτον τῶν κλασμάτων  $\frac{5}{7}, \frac{3}{4}, \frac{8}{9}, \frac{9}{10}$ .

293) Νὰ γίνουν τὰ κάτωθι κλάσματα 2, 3, 4 φορές μεγαλύτερα :

$$\frac{17}{20}, \frac{35}{42}, \frac{58}{120}, \frac{103}{360}, \frac{200}{1200}$$

§ 189. Πολλαπλασιασμὸς μεικτοῦ ἐπὶ ἀκέραιον. *Πρόβλημα.* "Ἐνα δοχεῖον χωρεῖ  $14 \frac{5}{8}$  χλγ. βουτύρου. "Ἐνας παντοπώλης ἠγόρασε 16 τοιαῦτα δοχεῖα. Πόσα χλγ. βουτύρου ἠγόρασεν οὗτος ;

*Λύσις.* Ἀφοῦ τὸ 1 δοχεῖον χωρεῖ  $14 \frac{5}{8}$  χλγ., τὰ 2 δοχεῖα χωροῦν 2 φορές περισσότερον, ἤτοι  $14 \frac{5}{8} \times 2$ , τὰ 3 δοχεῖα χωροῦν  $14 \frac{5}{8} \times 3$  καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς. Τὰ 16 λοιπὸν δοχεῖα χωροῦν  $14 \frac{5}{8} \times 16$  χλγ. Τὸν πολλαπλασιασμὸν αὐτὸν δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν κατὰ τοὺς ἑξῆς δύο τρόπους :

α') Ἐπειδὴ  $14 \frac{5}{8} = \frac{117}{8}$ , θὰ εἶναι :

$$14 \frac{5}{8} \times 16 = \frac{117}{8} \times 16 = \frac{117 \times 16}{8} = 234 \text{ χλγ.}$$

β') Τὰ 16 δοχεῖα ἀπὸ 14 χλγ. τὸ ἕνα χωροῦν :

$$14 \times 16 = 224 \text{ χλγ. Καὶ ἀπὸ } \frac{5}{8} \text{ χλγ. τὸ ἕνα χωροῦν } \frac{5}{8} \times 16 = 10 \text{ χλγ.}$$

Ὡστε τὰ 16 δοχεῖα χωροῦν  $224 + 10 = 234$  χλγ.

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

$$14 \frac{5}{8} \times 16 = (14 \times 16) + \left(\frac{5}{8} \times 16\right) = 224 + 10 = 234 \text{ χλγ.}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι :

**Διὰ τὸ νὰ πολλαπλασιάσωμεν μεικτὸν ἐπὶ ἀκέραιον :**

α') Τρέπομεν τὸν μεικτὸν εἰς κλάσμα καὶ πολλαπλασιάζομεν τοῦτο ἐπὶ τὸν ἀκέραιον.

β') Πολλαπλασιάζομεν χωριστὰ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ τὸ κλάσμα τοῦ μεικτοῦ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ προσθέτομεν τὰ δύο γινόμενα.

*Σημείωσις.* Ἄν παρατηρήσωμεν ὅτι  $14 \frac{5}{8} = 14 + \frac{5}{8}$ , ἡ προηγούμενη ἰσότης γίνεται  $(14 + \frac{5}{8}) \times 16 = (14 \times 16) + (\frac{5}{8} \times 16)$ .

Ἀληθεύει λοιπὸν εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ ἰδιότης τῆς § 60, τὴν ὁποῖαν ἐμάθομεν διὰ τοὺς ἀκεραίους ἀριθμούς.

### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

Α' Ὁ μ ά ς. 294) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα :

1.  $13 \frac{1}{2} \times 5$ ,      3.  $16 \frac{1}{5} \times 4$ ,      5.  $24 \frac{3}{5} \times 16$ .

2.  $27 \frac{1}{4} \times 8$ ,      4.  $29 \frac{5}{8} \times 3$ ,      6.  $150 \frac{1}{3} \times 20$ .

Β' Ὁ μ ά ς. 295) Μία οἰκογένεια δαπανᾷ  $6 \frac{3}{4}$  χλγ. ἔλαιου τὸν μῆνα. Πόσον ἔλαιον δαπανᾷ εἰς ἕν ἔτος ;

296) Ἐνα ἐπαρχιακὸν γραφεῖον καίει κάθε χειμῶνα τὸν μῆνα  $265 \frac{5}{8}$  χλγ. ξύλα διὰ τὴν θερμάστραν του. Πόσα ξύλα καίει κατὰ τοὺς τρεῖς μῆνας τοῦ χειμῶνος ;

297) Πεζός διανύει  $4\frac{3}{4}$  χλμ. τήν ὥραν. Πόσον θά διανύση εἰς 8 ὥρας;

298) Μία ἑμαξοστοιχία ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ καὶ φθάνει εἰς τὰς Πάτρας μετὰ 10 ὥρας μὲ δῶρον παραμονὴν εἰς τοὺς ἐνδιάμεσους σταθμούς. Ἐὰν ἡ ταχύτης αὐτῆς εἶναι  $23\frac{3}{4}$  χιλιόμετρα τήν ὥραν, πόσον μῆκος ἔχει ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Πειραιῶς - Πατρῶν;

## 2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙ ΚΛΑΣΜΑ

§ 190. *Πρόβλημα.* Ἐὰν τὸ χλγ. τοῦ ἐλαίου τιμᾶται  $\alpha$  δραχμάς, νὰ εὑρεθῇ ἡ τιμὴ τῶν  $\frac{3}{5}$  τοῦ χλγ. αὐτοῦ.

*Λύσις.* Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς:

Ἐφοῦ τὸ 1 χλγ. τιμᾶται  $\alpha$  δραχμάς, τὸ  $\frac{1}{5}$  τοῦ χλγ. θά τιμᾶται 5 φορές ὀλιγώτερον, δηλ. τὸ πέμπτον τῶν  $\alpha$  δραχμῶν, ἤτοι  $\frac{\alpha}{5}$  δραχ. Τὰ δὲ  $\frac{3}{5}$  τοῦ χλγ. θά τιμῶνται 3 φορές περισσότερον, ἤτοι  $\frac{\alpha}{5} \times 3$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ζητούμενον, διαιροῦμεν τὴν τιμὴν  $\alpha$  διὰ 5 καὶ τὸ πηλίκον  $\frac{\alpha}{5}$  πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 3. Λαμβάνομεν δηλ. τὸ πέμπτον τοῦ  $\alpha$  τρεῖς φορές.

Τὰς δύο ταύτας πράξεις ὀνομάζομεν **πολλαπλασιασμὸν τοῦ  $\alpha$  ἐπὶ  $\frac{3}{5}$** . Ὡστε  $\alpha \times \frac{3}{5} = \frac{\alpha}{5} \times 3$ . (1)

Κατὰ ταῦτα:

Νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ κλάσμα, σημαίνει νὰ ἐπαναλάβωμεν ἓνα μέρος τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ (ὀριζόμενον ὑπὸ τοῦ παρονομαστοῦ) τόσας φορές, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ ἀριθμητὴς τοῦ κλάσματος.

Κατὰ ταῦτα, θά εἶναι γενικῶς:

$$\alpha \times \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\alpha}{\gamma} \times \beta$$

Ἐπίσης ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου βλέπομεν ὅτι:

α') Ἐὰν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν ἀκεραίας μονάδος καὶ θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὴν τιμὴν μέρους τῆς μονάδος αὐτῆς, πολλαπλασιάζομεν τὴν τιμὴν τῆς ἀκεραίας μονάδος ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ ὁποῖον φανερώνει τὸ μέρος τοῦτο τῆς ἀκεραίας μονάδος.

β') Διὰ νὰ εὕρωμεν μέρος δοθέντος ἀριθμοῦ, πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ ὁποῖον φανερώνει τὸ μέρος αὐτό.

§ 191. Ἐφαρμογαί. α') Πῶς πολλαπλασιάζεται ἀκέραιος ἐπὶ κλάσμα. Ἄν ἡ τιμὴ  $\alpha$  τοῦ χλγ. τοῦ ἐλαίου εἶναι 20 δραχμαί, τὰ  $\frac{3}{5}$  τοῦ χλγ. αὐτοῦ θὰ τιμῶνται  $20 \times \frac{3}{5}$  δρχ. Κατὰ τὴν ἰσότητα (1) τῆς § 190 θὰ εἶναι:

$$20 \times \frac{3}{5} = \frac{20}{5} \times 3 = \frac{20 \times 3}{5} = \frac{60}{5} = 12 \text{ δρχ.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀκέραιον ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος καὶ ὑπὸ τὸ γινόμενον γράφομεν, ὡς παρονομαστήν, τὸν παρονομαστήν τοῦ κλάσματος.

Παρατήρησις. Ἀπὸ τὰς ἰσότητας  $20 \times \frac{3}{5} = \frac{20 \times 3}{5}$  καὶ  $\frac{3}{5} \times 20 = \frac{3 \times 20}{5}$

συμπεραίνομεν εὐκόλως ὅτι  $20 \times \frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times 20$ .

Ἀληθεύει δηλ. εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ θεμελιώδης ἰδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, τὴν ὁποῖαν ἐμάθομεν διὰ τοὺς ἀκεραίους ἀριθμούς.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

Α' Ὁ μ ἄ ς. Ἀπὸ μνήμης. 299) Νὰ εὕρεθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα:

$$3 \times \frac{5}{6}, \quad 10 \times \frac{1}{2}, \quad 25 \times \frac{2}{3}, \quad 8 \times \frac{3}{4}.$$

300) 1. Νὰ εὕρεθοῦν τὰ  $\frac{2}{3}$  τοῦ 18, τοῦ 24, τοῦ 54.

2. Νὰ εὕρεθοῦν τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ 20, τοῦ 60, τοῦ 104.

Β' Όμας. 301) "Εν αυτοκίνητον ἔχει ταχύτητα 25 χιλιομέτρων τὴν ὥραν. Πόσον διάστημα διανύει εἰς  $\frac{4}{5}$  τῆς ὥρας ;

302) "Ενας γεωργὸς ἔχρεώσται 600 δρχ. καὶ ἐπλήρωσε τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ χρέους του. Πόσα ὀφείλει ἀκόμη ;

303) Μία ἀμαξοστοιχία μὲ ταχύτητα 24 χιλιομέτρων τὴν ὥραν μεταβαίνει ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ εἰς Ἐλευσίνα εἰς  $\frac{5}{6}$  τῆς ὥρας. Πόσον μῆκος ἔχει ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Πειραιῶς — Ἐλευσίνας ;

§ 192. β') Πῶς πολλαπλασιάζεται κλάσμα ἐπὶ κλάσμα. Διὰ νὰ εὐρωμεν π.χ. τὰ  $\frac{5}{6}$  τοῦ κλάσματος  $\frac{3}{4}$ , πρέπει νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον  $\frac{3}{4} \times \frac{5}{6}$ , ὅπως εἴπομεν προηγουμένως (§ 190 β'). Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ εὐρωμεν τὸ ἕκτον τοῦ  $\frac{3}{4}$  καὶ νὰ τὸ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 5. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἕκτον τοῦ  $\frac{3}{4}$  εἶναι  $\frac{3}{4} : 6 = \frac{3}{4 \times 6}$ , ἐννοοῦμεν ὅτι:  $\frac{3}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{3}{4 \times 6} \times 5 = \frac{3 \times 5}{4 \times 6} = \frac{15}{24}$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν ἀριθμητὴν ἐπὶ ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν ἐπὶ παρονομαστὴν· θέτομεν δὲ τὸ μὲν γινόμενον τῶν ἀριθμητῶν ὡς ἀριθμητὴν, τὸ δὲ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν ὡς παρονομαστὴν.

Κατὰ τὸν κανόνα αὐτὸν θὰ εἶναι γενικῶς :

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \times \gamma}{\beta \times \delta}$$

Παρατήρησις. Κατὰ τὸν κανόνα αὐτὸν  $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{5 \times 3}{6 \times 4} = \frac{15}{24}$ .  
Εἶναι λοιπὸν  $\frac{3}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{4}$ . Ἀληθεύει δηλαδὴ καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ θεμελιώδης ιδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

Α' Όμας. 304) Εὑρετε ἀπὸ μνήμης τὰ ἀκόλουθα γινόμενα:

$$\frac{5}{6} \times \frac{1}{2}, \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}, \frac{3}{5} \times \frac{5}{3}, \frac{6}{7} \times \frac{2}{6}, \frac{3}{4} \times \frac{4}{6}.$$

305) Εύρετε από μνήμης :

1ον. Τὸ  $\frac{1}{2}$  τῶν κλασμάτων  $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{9}{12}$ .

2ον. Τὸ  $\frac{1}{3}$  τῶν κλασμάτων  $\frac{2}{5}, \frac{4}{9}, \frac{7}{10}, \frac{12}{20}$ .

3ον. Τὰ  $\frac{2}{3}$  τῶν κλασμάτων  $\frac{6}{8}, \frac{9}{10}, \frac{12}{17}$ .

Β' Ομάδα. 306) Δύο ἀδελφοὶ ἐκληρονόμησαν μίαν ἀμπελον. Ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἔδωκε τὰ  $\frac{2}{3}$  τοῦ μεριδίου του προῖκα εἰς τὴν κόρην του. Πόσον μέρος τῆς ἀμπέλου ἔδωκεν ὡς προῖκα ;

307) Τρεῖς ἀδελφοὶ ἐκληρονόμησαν ἕνα ἀγρόν. Ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἐπώλησε τὰ  $\frac{2}{5}$  τοῦ μεριδίου του. Πόσον μέρος τοῦ ἀγροῦ ἔμεινε εἰς αὐτόν ;

308) Μία φιάλη χωρεῖ  $\frac{3}{4}$  χλγ. οἴνου. Νὰ εὑρεθῇ τὸ κλάσμα τοῦ χλγ., τὸ ὁποῖον χωροῦν τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς φιάλης.

§ 193. γ') Πῶς πολλαπλασιάζεται μεικτὸς ἀριθμὸς ἐπὶ κλάσμα. Ἄν ἐν δοχεῖον χωρῆ  $6 \frac{2}{3}$  χλγ., τὰ  $\frac{3}{4}$  αὐτοῦ θὰ χωροῦν  $6 \frac{2}{3}$  χλγ.  $\times \frac{3}{4}$  ἢ  $(6 \frac{2}{3} \times \frac{3}{4})$  χλγ.

Τὸ γινόμενον αὐτὸ δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν κατὰ τοὺς ἐξῆς δύο τρόπους :

α') Ἐπειδὴ  $6 \frac{2}{3} = \frac{20}{3}$ , θὰ εἶναι :

$$6 \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{20}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{20 \times 3}{3 \times 4} = \frac{20}{4} = 5 \text{ χλγ.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

1ον. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν μεικτὸν ἐπὶ κλάσμα, τρέπομεν τὸν μεικτὸν εἰς κλάσμα καὶ πολλαπλασιάζομεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ δοθὲν κλάσμα.

β') Ἄν τὸ δοχεῖον ἐχώρει μόνον  $6$  χλγ., τὰ  $\frac{3}{4}$  αὐτοῦ θὰ ἐχώρουν  $6 \times \frac{3}{4} = \frac{18}{4}$  χλγ.

Ἐπειδὴ δὲ τὸ δοχεῖον χωρεῖ ἀκόμη  $\frac{2}{3}$  χλγ., τὰ  $\frac{3}{4}$  αὐτοῦ χωροῦν ἀκόμη  $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$  χλγ. Ὡστε τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ δοχείου χωροῦν τὸ ὅλον  $\frac{18}{4} + \frac{6}{12} = \frac{54+6}{12} = 5$  χλγ. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

$$6 \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \left(6 \times \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}\right) = \frac{18}{4} + \frac{6}{12} = \frac{54+6}{12} = 5 \text{ χλγ.}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

**2ον. Διὰ τὴν πολλαπλασιασάσωμεν μεικτὸν ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν χωριστὰ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ τὸ κλάσμα τοῦ μεικτοῦ ἐπὶ τὸ κλάσμα καὶ προσθέτομεν τὰ δύο γινόμενα.**

*Σημειώσεις.* Ἐπειδὴ  $6 \frac{2}{3} = 6 + \frac{2}{3}$ , θὰ εἶναι :

$$6 \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \left(6 + \frac{2}{3}\right) \times \frac{3}{4}.$$

Ἐπειδὴ δὲ  $6 \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \left(6 \times \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}\right)$ , ἔπεται ὅτι :

$$\left(6 + \frac{2}{3}\right) \times \frac{3}{4} = \left(6 \times \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}\right).$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην διατηρεῖται ἡ γνωστὴ (§ 60) ιδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἀθροίσματος ἐπὶ ἀριθμὸν.

### Ἀσκήσεις

Α' Ὁμάς. 309) Εὑρετε ἀπὸ μνήμης :

1. Τὸ ἡμισυ τοῦ  $4 \frac{2}{3}$ .      2. Τὰ  $\frac{2}{3}$  τοῦ  $6 \frac{1}{2}$ .

310) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ γινόμενα :

1.  $2 \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ ,       $5 \frac{2}{15} \times \frac{5}{6}$ ,       $7 \frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$ .

2.  $\left(2 + 3 \frac{1}{5}\right) \times \frac{5}{7}$ ,  $\left(6 + 3 \frac{2}{3}\right) \times \frac{6}{8}$ ,  $\left(\frac{8}{9} + \frac{4}{5}\right) \times \frac{3}{5}$ .

Β' Ὁμάς. 311) Εἰς οἰκογενειάρχης ἠγόρασεν  $8 \frac{5}{8}$  χλγ. βουτύρου. Κατὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ ὑπελόγησεν ὅτι τὸ  $\frac{1}{8}$  αὐτοῦ ἦτο ξέναί. Πόσον καθαρὸν βούτυρον ἠγόρασεν ;

312) Τὰ  $\frac{15}{100}$  τῶν ἀλεύρων τοῦ ἄρτου τοῦ δελτίου ἦσαν ἀπὸ ἀρα-

βόσιτον. Εἰς  $50 \frac{5}{6}$  χλγ. τοιούτου ἀλεύρου, πόσα χλγ. σιταλεύρου ὑπῆρχον;

313) Ἐνας οἰκογενειάρχης ἠγόρασεν ἓνα δοχεῖον μὲ ἐλαίας βάρους  $6 \frac{2}{5}$  χλγ. Τὸ ἀπόβαρον δὲ ἦτο  $\frac{3}{20}$  τοῦ βάρους αὐτοῦ. Πόσα χλγ. ἐλαιῶν ἠγόρασεν;

314) Μία οἰκοκυρὰ ἠγόρασεν ἀπὸ πλανόδιον ἀνθρακοπώλην  $4 \frac{1}{2}$  χλγ. ἀνθράκων. Ἀλλὰ τὰ  $\frac{2}{15}$  τοῦ βάρους τούτου ἦτο κόνης καὶ ὕδωρ. Πόσα χλγ. καθαροῦ ἀνθρακος ἠγόρασεν;

### 3. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙ ΜΕΙΚΤΟΝ

§ 194. *Πρόβλημα.* Ἄν τὸ χλγ. ἑνὸς ἐμπορεύματος τιμᾶται α δραχμάς, νὰ εὐρεθῆ ἡ τιμὴ  $8 \frac{3}{4}$  χλγ. αὐτοῦ.

*Λύσις. Α' τρόπος.* Τὰ 8 χλγ. τιμῶνται  $(\alpha \times 8)$  δραχ. Τὰ δὲ  $\frac{3}{4}$  χλγ. τιμῶνται  $(\alpha \times \frac{3}{4})$  δραχ. (§ 190). Ἐπομένως τὰ  $8 \frac{3}{4}$  χλγ. τιμῶνται  $[(\alpha \times 8) + (\alpha \times \frac{3}{4})]$  δραχ.

Τὰς πράξεις αὐτὰς ὀνομάζομεν **πολλαπλασιασμὸν τοῦ α ἐπὶ  $8 \frac{3}{4}$ .**

$$\text{Εἶναι λοιπὸν } \alpha \times 8 \frac{3}{4} = (\alpha \times 8) + (\alpha \times \frac{3}{4}). \quad (1)$$

Ἔστω :

Διὰ νὰ **πολλαπλασιάσωμεν** ἀριθμὸν ἐπὶ μεικτόν, **πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐκείνον χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ ἐπὶ τὸ κλάσμα τοῦ μεικτοῦ καὶ προσθέτομεν τὰ δύο γινόμενα.**

*Β' τρόπος.* Ἐπειδὴ  $8 \frac{3}{4} = \frac{35}{4}$ , ἡ ζητούμενη τιμὴ εἶναι  $\alpha \times \frac{35}{4}$ .

$$\text{Εἶναι λοιπὸν } \alpha \times 8 \frac{3}{4} = \alpha \times \frac{35}{4}. \quad (2)$$

Ἔστω :

Διὰ νὰ **πολλαπλασιάσωμεν** ἀριθμὸν ἐπὶ μεικτόν, **δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν τὸν μεικτόν εἰς κλάσμα καὶ ἐπ' αὐτὸ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐκείνον.**

§ 195. Έφαρμογαί. α') Πολλαπλασιασμός άκεραίου επί μεικτόν. "Αν ή τιμή α του χλγ. ήτο 100 δραχμαί, ή τιμή τών  $8\frac{3}{4}$  χλγ. θα ήτο  $100 \times 8\frac{3}{4}$ .

Κατά την ισότητα (1) τής § 194, θα είναι :

$$100 \times 8\frac{3}{4} = (100 \times 8) + (100 \times \frac{3}{4}) = 800 + 75 = 875 \text{ δρχ.}$$

Κατά την ισότητα (2) τής § 194, θα είναι :

$$100 \times 8\frac{3}{4} = 100 \times \frac{35}{4} = \frac{3500}{4} = 875 \text{ δρχ.}$$

§ 196. β') Πολλαπλασιασμός κλάσματος επί μεικτόν.

"Αν  $\alpha = \frac{7}{8}$ , αί ισότητες (1) και (2) τής § 194 γίνονται :

$$\frac{7}{8} \times 8\frac{3}{4} = \left(\frac{7}{8} \times 8\right) + \left(\frac{7}{8} \times \frac{3}{4}\right) = 7 + \frac{21}{32} = 7\frac{21}{32}.$$

$$\text{και } \frac{7}{8} \times 8\frac{3}{4} = \frac{7}{8} \times \frac{35}{4} = \frac{245}{32} = 7\frac{21}{32}.$$

§ 197. γ') Πώς πολλαπλασιάζεται μεικτός επί μεικτόν αριθμόν. "Αν ή τιμή ενός χλγ. ήτο  $256\frac{2}{5}$  δραχμαί, την τιμήν τών  $8\frac{3}{4}$  χλγ. εύρισκομεν κατά τους εξής δύο τρόπους :

Α' τρόπος. "Επειδή  $256\frac{2}{5} = \frac{1282}{5}$  και  $8\frac{3}{4} = \frac{35}{4}$ , πρέπει να εύρωμεν την τιμήν τών  $\frac{35}{4}$  του χλγ. πρὸς  $\frac{1282}{5}$  δραχ. τὸ χλγ.

Γνωρίζομεν δὲ ὅτι ή τιμή αὕτη είναι :

$$\frac{1282}{5} \times \frac{35}{4} = \frac{44870}{20} = 2243\frac{1}{2} \text{ δραχμαί.}$$

Β' τρόπος. Τὰ 8 χλγ. τιμῶνται :

$$256\frac{2}{5} \times 8 = (256 \times 8) + \left(\frac{2}{5} \times 8\right) = 2048 + \frac{16}{5}.$$

Τὰ δὲ  $\frac{3}{4}$  τοῦ χλγ. τιμῶνται :

$$256\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \left(256 \times \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}\right) = 192 + \frac{6}{20}.$$

Ἐπομένως τὰ  $8\frac{3}{4}$  χλγ. τιμῶνται :



319) "Ένας στοιχειοθέτης στοιχειοθετεί  $\frac{8}{9}$  τῆς σελίδος μαθηματικοῦ βιβλίου τὴν ὥραν. Πόσας σελίδας τοῦ βιβλίου αὐτοῦ στοιχειοθετεῖ εἰς  $6\frac{2}{3}$  ὥρας;

Γ' Ομάδα. 320) "Ένας ἠλεκτροκίνητος ἀργαλειὸς ὑφαίνει  $5\frac{3}{8}$  πῆχεις ὑφάσματος τὴν ὥραν. Πόσους πῆχεις ὑφαίνει ἀπὸ  $7\frac{1}{2}$  π. μ. μέχρι τῆς μεσημβρίας;

321) Μία πλέκτρια πλέκει μὲ πλεκτικὴν μηχανὴν 3 ζεύγη κάλτσες τὴν ὥραν. Πόσα ζεύγη πλέκει τὴν ἡμέραν, ἂν ἐργάζεται ἀπὸ  $8\frac{1}{4}$  ἕως 12 π. μ. καὶ ἀπὸ 2 ἕως  $4\frac{3}{4}$  μ.μ.;

322) Διὰ μίαν ἀνδρικήν ἐνδυμασίαν χρειάζονται  $4\frac{2}{8}$  πῆχεις. "Αν ὁ πῆχυς ἐνὸς ὑφάσματος πωλῆται 144 δραχ. καὶ τὰ ραπτικά εἶναι 800 δραχμαί, πόσον κοστίζει μία τοιαύτη ἐνδυμασία;

**§ 198. Γενικὸς ὀρισμὸς τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.** "Αν ὁ πολλαπλασιαστέος εἶναι τυχῶν ἀριθμὸς  $\alpha$ , ἐμάθομεν τὰς ἐξῆς περιπτώσεις πολλαπλασιασμοῦ αὐτοῦ:

1ον.  $\alpha \times 3 = \alpha + \alpha + \alpha$ , εἶναι δὲ καὶ  $3 = 1 + 1 + 1$ .

2ον.  $\alpha \times \frac{3}{4} = \frac{\alpha}{4} + \frac{\alpha}{4} + \frac{\alpha}{4}$ , εἶναι δὲ καὶ  $\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ .

3ον.  $\alpha \times 2\frac{3}{4} = (\alpha \times 2) + (\alpha \times \frac{3}{4}) = \alpha + \alpha + \frac{\alpha}{4} + \frac{\alpha}{4} + \frac{\alpha}{4}$ ,  
εἶναι δὲ καὶ  $2\frac{3}{4} = 1 + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι:

Πολλαπλασιασμὸς ἐνὸς ἀριθμοῦ  $\alpha$  ἐπὶ ἄλλον ἀριθμὸν εἶναι μία πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν τρίτον ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος γίνεται ἀπὸ τὸν  $\alpha$  καὶ ἀπὸ τὰ μέρη του, ὅπως ὁ πολλαπλασιαστὴς γίνεται ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα καὶ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτῆς.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω εὐκόλως ἐννοοῦμεν ὅτι:

1ον. Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ τὸν πολλαπλασιαστέον, ἂν ὁ πολλαπλασιαστὴς εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

2ον. Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν εἶναι ἴσον μὲ τὸν πολλαπλασιαστέον, ἂν ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι ἴσος μὲ τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

3ον. Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν εἶναι μικρότερον ἀπὸ τὸν πολλαπλασιαστέον, ἂν ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι μικρότερος ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

Τὰ συμπεράσματα ταῦτα τὰ ἐκφράζομεν συντόμως ὡς ἐξῆς :

1ον. Ἐάν  $\mu > 1$ , θὰ εἶναι  $\alpha \cdot \mu > \alpha$ .

2ον. Ἐάν  $\mu = 1$ , θὰ εἶναι  $\alpha \cdot \mu = \alpha$ .

3ον. Ἐάν  $\mu < 1$ , θὰ εἶναι  $\alpha \cdot \mu < \alpha$ .

§ 199. Ποῖοι ἀριθμοὶ λέγονται ἀντίστροφοι. Ἐάν ἀντιστρέψωμεν τοὺς ὅρους τοῦ κλάσματος  $\frac{3}{4}$ , προκύπτει τὸ κλάσμα  $\frac{4}{3}$ . Καὶ ἀπὸ τούτου ὁμοίως γίνεται τὸ κλάσμα  $\frac{3}{4}$ .

Δι' αὐτὸ ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀριθμοὺς λέγεται ἀντίστροφος τοῦ ἄλλου. Οἱ δύο δὲ μαζὶ λέγονται ἀντίστροφοι ἀριθμοί.

Κατὰ ταῦτα ἀντίστροφος τοῦ  $\frac{1}{8}$  εἶναι ὁ  $\frac{8}{1}$ , ἥτοι ὁ ἀκέραιος 8, καὶ τὰνάπαλιν τοῦ ἀκεραίου 6 =  $\frac{6}{1}$  ἀντίστροφος εἶναι ὁ  $\frac{1}{6}$ . Τοῦ δὲ μεικτοῦ  $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$  ἀντίστροφος εἶναι τὸ κλάσμα  $\frac{3}{7}$ .

Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι :

$$\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1, \quad 8 \times \frac{1}{8} = 1, \quad 2\frac{1}{3} \times \frac{3}{7} = \frac{7}{3} \times \frac{3}{7} = 1, \quad \text{ἥτοι :}$$

**Δύο ἀντίστροφοι ἀριθμοὶ ἔχουν γινόμενον 1.**

#### Ἀσκήσεις

323) Ὅρισατε ἀπὸ μνήμης τοὺς ἀντιστρόφους τῶν ἀριθμῶν  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{4}{7}$ , 8, 3 καὶ εὑρετε τοὺς ἀντιστρόφους τῶν ἀριθμῶν:

$$1\frac{2}{3}, \quad 3\frac{2}{5}, \quad 5\frac{1}{4}.$$

324) Εὑρετε τοὺς ἀντιστρόφους τῶν ἀκολουθῶν ἀριθμῶν :

$$5 + 2\frac{1}{4}, \quad 3\frac{2}{9} - 1\frac{2}{3}, \quad 5\frac{1}{6} \times 3\frac{5}{6}.$$

## 4. ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

§ 200. *Πρόβλημα.* "Ένας φιλόπατρις "Έλλην, από τούς έρ-  
γαζομένους εις την 'Αμερικήν, απέστειλεν εις την 'Ελλάδα  
50 000 δολάρια. Παρήγγειλε δέ τὰ  $\frac{3}{5}$  τοῦ ποσοῦ τούτου νά  
διατεθοῦν εις τὸν ἔρανον διὰ τὴν φανέλλαν τοῦ στρατιώτου· τὰ  
 $\frac{8}{15}$  τοῦ ποσοῦ, τὸ ὁποῖον διετέθη διὰ τὴν φανέλλαν, νά διατε-  
θοῦν διὰ τὰς παιδοπόλεις τῆς 'Αττικῆς καὶ τὰ ὑπόλοιπα διὰ τὸ  
σχολικὸν ταμεῖον τῆς ἰδιαιτέρας του Πατρίδος. Πόσα δολάρια  
διετέθησαν διὰ κάθε σκοπὸν;

*Λύσις.* Διετέθησαν :

$$\text{Διὰ τὸν ἔρανον τῆς φανέλλας } 50\,000 \times \frac{3}{5} = 30\,000 \text{ δολ.}$$

$$\text{Διὰ τὰς παιδοπόλεις 'Αττικῆς } 30\,000 \times \frac{8}{15} = 16\,000 \text{ δολ.}$$

$$\text{Διὰ τοὺς δύο σκοποὺς } 30\,000 + 16\,000 = 46\,000 \text{ δολ.}$$

$$\text{'Επομένως τὸ σχ. ταμ. ἔλαβε } 50\,000 - 46\,000 = 4\,000 \text{ δολ.}$$

§ 201. *Τί εἶναι γινόμενον πολλῶν καὶ οἰωνδήποτε πα-*  
*ραγόντων.* Διὰ νά εὔρωμεν προηγουμένως τὸ μερίδιον τῶν παιδο-  
πόλεων εἰργάσθημεν ὡς ἑξῆς: Εὔρωμεν πρῶτον τὸ μερίδιον διὰ τὴν  
φανέλλαν τοῦ στρατιώτου. Πρὸς τοῦτο δὲ ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸν  
50 000 ἐπὶ  $\frac{3}{5}$  καὶ εὔρωμεν γινόμενον 30 000. Ἐπειτα τὸ γινόμενον  
30 000 ἐπολλαπλασιάσαμεν ἐπὶ  $\frac{8}{15}$  καὶ εὔρωμεν 16 000.

Αὐτὸ τὸ ἔξαγόμενον ὀνομάζομεν γινόμενον τῶν ἀριθμῶν 50 000,  
 $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{8}{15}$  καὶ τὸ σημειώνομεν οὕτω:  $50\,000 \times \frac{3}{5} \times \frac{8}{15}$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι τὸ γινόμενον πολλῶν τυχόντων παραγόν-  
των ὀρίζεται καὶ σημειώνεται ὅπως καὶ ὅταν ὅλοι οἱ παράγοντες  
εἶναι ἀκέραιοι ἀριθμοὶ (§ 76).

§ 202. *Γινόμενον πολλῶν κλασμάτων.* Δυνάμεθα τοὺς ἀκε-  
ραίους καὶ μεικτοὺς παράγοντας ἑνὸς γινομένου πολλῶν παραγόντων  
νά τοὺς τρέψωμεν εἰς κλάσματα. Διὰ τοῦτο πρέπει νά γνωρίζω-  
μεν πῶς εὔρσκεται τὸ γινόμενον πολλῶν κλασματικῶν παραγόντων.

\*Εστω ότι θέλομεν νὰ εὔρωμεν τὸ γινόμενον  $\frac{2}{5} \times \frac{3}{6} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{8}$ .

Πρὸς τοῦτο εὔρισκομεν κατὰ σειρὰν ὅτι:  $\frac{2}{5} \times \frac{3}{6} = \frac{2 \times 3}{5 \times 6}$

$$\frac{2 \times 3}{5 \times 6} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 3 \times 4}{5 \times 6 \times 5}, \quad \frac{2 \times 3 \times 4}{5 \times 6 \times 5} \times \frac{5}{8} = \frac{2 \times 3 \times 4 \times 5}{5 \times 6 \times 5 \times 8}$$

$$\text{*Ἐπομένως: } \frac{2}{5} \times \frac{3}{6} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{8} = \frac{2 \times 3 \times 4 \times 5}{5 \times 6 \times 5 \times 8}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ γινόμενον πολλῶν κλασμάτων, γράφομεν ὡς ἀριθμητὴν τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμητῶν καὶ ὡς παρονομαστὴν τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν.

\*Ἦτοι γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\gamma}{\delta} \times \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha \times \gamma \times \epsilon}{\beta \times \delta \times \zeta}$$

§ 203. Γινόμενον οἰωνδήποτε παραγόντων. \*Εστω τὸ γινόμενον οἰωνδήποτε παραγόντων  $\frac{3}{5} \times 4 \times 2\frac{1}{4}$ .

\*Ἐπειδὴ  $4 = \frac{4}{1}$  καὶ  $2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$ , θὰ εἶναι :

$$\frac{3}{5} \times 4 \times 2\frac{1}{4} = \frac{3}{5} \times \frac{4}{1} \times \frac{9}{4} = \frac{3 \times 4 \times 9}{5 \times 1 \times 4} = \frac{27}{5} = 5\frac{2}{5}$$

§ 204. Διατήρησις τῶν ιδιοτήτων τοῦ γινομένου πολλῶν παραγόντων. Ἀπὸ τὰ προηγούμενα βλέπομεν ὅτι ἓνα γινόμενον οἰωνδήποτε πολλῶν παραγόντων εὔρεται κυρίως διὰ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἀριθμητῶν καὶ ἔπειτα τῶν παρονομαστῶν κλασματικῶν παραγόντων, δηλ. διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἀκεραίων ἀριθμῶν. Ἐπομένως ἀληθεύουν καὶ δι' αὐτὰ τὰ γινόμενα ὅλαι αἱ ιδιότητες τῶν γινομένων πολλῶν ἀκεραίων παραγόντων.

§ 205. Συντομίαι κατὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ γινομένου πολλῶν παραγόντων. Μὲ κατάλληλον χρησιμοποίησιν τῶν ιδιοτήτων τοῦ γινομένου πολλῶν παραγόντων δυνάμεθα πολλάκις νὰ συντομεύσωμεν τὴν εὔρεσιν αὐτοῦ, ὡς φαίνεται ἀπὸ τὰ κάτωθι παραδείγματα:

*Παράδειγμα 1ον.* Νὰ εὔρεθῇ τὸ γινόμενον  $3 \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{3}$ .

Κατά τήν γνωστήν ιδιότητα (§ 78), είναι :

$$3 \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \left(3 \times \frac{1}{3}\right) \times \frac{2}{5} = 1 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5}.$$

*Παράδειγμα 2ον* Νά εὑρεθῆ τὸ γινόμενον  $\frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{4}{3}$ .

$$\text{Ὅμοιως εἶναι } \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{4}{3} = \left(\frac{3}{4} \times \frac{4}{3}\right) \times \frac{5}{6} = 1 \times \frac{5}{6} = \frac{5}{6}.$$

Ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ παραδείγματα βλέπομεν ὅτι :

Δύο ἀντίστροφοι παράγοντες ἐνὸς γινομένου πολλῶν παραγόντων δύνανται νὰ παραλειφθοῦν.

*Παράδειγμα 3ον.* Νά εὑρεθῆ τὸ γινόμενον  $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{7}{10}$ .

Ἐπειδὴ

$$\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{7}{10} = \left(\frac{5}{6} \times \frac{7}{10}\right) \times \frac{3}{4} \text{ καὶ } \frac{5}{6} \times \frac{7}{10} = \frac{5 \times 7}{6 \times 10} = \frac{1 \times 7}{6 \times 2},$$

$$\text{βλέπομεν ὅτι : } \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{7}{10} = \frac{1 \times 7}{6 \times 2} \times \frac{3}{4} = \frac{1 \times 7 \times 3}{6 \times 2 \times 4} = \frac{21}{48}.$$

Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ διαιροῦμεν ἓνα ἀριθμητὴν καὶ ἓνα παρονομαστήν δι' ἐνὸς κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν. Οὕτω δὲ ἐπλοποιοῦμεν τὸ γινόμενον. Ἐννοοῦμεν δὲ εὐκόλα ὅτι εἰς τὴν ἐπλοποίησιν αὐτὴν ἓνα ἀκέραιον παράγοντα θὰ τὸν θεωροῦμεν ὡς ἀριθμητὴν. Π.χ.

$$3 \times \frac{3}{5} \times \frac{7}{6} = 1 \times \frac{3}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{10}, \quad \frac{2}{7} \times 6 \times \frac{3}{6} = \frac{2}{7} \times 1 \times \frac{3}{1} = \frac{6}{7}.$$

#### Ἀ σ κ ή σ ε ι ς

Α' Ὁ μ ά ς. 325) Εὑρετε κατὰ τὸν συντομώτερον τρόπον τὰ ἀκόλουθα γινόμενα :

$$1. \quad 3 \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{4}, \quad \frac{5}{8} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} \times 40, \quad \frac{2}{7} \times 24 \times \frac{3}{8} \times \frac{7}{5}.$$

$$2. \quad \frac{2}{5} \times \frac{5}{7} \times \frac{7}{9}, \quad \frac{3}{4} \times \frac{16}{8} \times \frac{5}{7}.$$

$$3. \quad 3\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{7} \times 5, \quad 8 \times 2\frac{3}{4} \times \frac{5}{8} \times \frac{1}{5}.$$

Β' Ὁ μ ά ς. 326) Ἡ μεραρχία Ἀθηνῶν ἐκτελοῦσα γυμνάσια διήνυσε 92 χιλιόμετρα ἀπ' Ἀθηνῶν μέχρι Θηβῶν. Τὴν α' ἡμέραν διέτρεξε τὸ  $\frac{1}{4}$  τῆς ἀποστάσεως ταύτης, τὴν β' τὰ  $\frac{3}{5}$  τῆς προηγουμένης ἀποστάσεως καὶ τὴν γ' ἡμέραν τὰ  $\frac{4}{9}$  τῆς κατὰ τὴν β' ἡμέραν διανυσθείσης. Πόσα χιλιόμετρα διήνυσε τὴν γ' ἡμέραν ;

327) Ένας όδοιπόρος ήθέλησε νά διανύση 60 χιλιόμετρα. Τήν α' ήμέραν διήνυσε τὰ  $\frac{2}{5}$  τῶν χιλιομέτρων τούτων. Τήν β' τὰ  $\frac{3}{4}$  τῶν χιλιομέτρων τῆς α' ήμέρας καί τήν γ' ήμέραν τὰ  $\frac{4}{9}$  τῶν χιλιομέτρων τῆς β' ήμέρας. Πόσα χιλιόμετρα διήνυσε τήν γ' ήμέραν;

328) Ένας ιδιοκτῆτης ἐπιτεταγμένης οίκιας εἰσπράττει ἐνοίκιον 1 500 δρχ. τὸν μῆνα ἀπὸ τὸν ἄνω ὄροφον. Ἀπὸ τὸν μεσαῖον τὰ  $\frac{4}{5}$  τοῦ προηγουμένου, καί ἀπὸ τὸν κάτω ὄροφον τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ μεσαίου. Πόσον ἐνοίκιον εἰσπράττει ἀπὸ τὸν κάτω ὄροφον;

329) Ένας ιδιοκτῆτης διὰ τήν ἐπισκευήν τοῦ ἄνω πατώματος τῆς οίκιας του ἐδαπάνησε 560 δρχ. Διὰ τὸ κάτω πάτωμα ἐδαπάνησε τὰ  $\frac{4}{5}$  τοῦ προηγουμένου ποσοῦ, καί διὰ τὸ ὑπόγειον τὰ  $\frac{5}{8}$  τοῦ ἀμέσως προηγουμένου. Πόσας δραχμὰς ἐξώδευσε διὰ τὸ ὑπόγειον;

330) Ὁ σῖτος δίδει τὰ  $\frac{11}{12}$  τοῦ βάρους του ὡς ἄλευρον, καί τὸ ἄλευρον δίδει τὰ  $\frac{13}{10}$  τοῦ βάρους του ὡς ἄρτον. Πόσον ἄρτον θὰ λάβωμεν ἀπὸ 75 χλγ. τοιούτου σίτου;

### Περίληψις τῶν κανόνων τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Ἐν α, β, γ, δ, ε, ζ, μ, ν παριστάνουν ἀκεραίους ἀριθμούς, ἐμάθομεν ὅτι :

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \mu = \frac{\alpha \times \mu}{\beta} \quad \eta \quad \frac{\alpha}{\beta} \times \mu = \frac{\alpha}{\beta : \mu}, \quad \text{ἂν } \beta = \text{πολλαπλάσιον τοῦ } \mu,$$

$$\left(\alpha + \frac{\beta}{\nu}\right) \times \mu = \frac{(\alpha \times \nu) + \beta}{\nu} \times \mu \quad \eta \quad \left(\alpha + \frac{\beta}{\nu}\right) \times \mu = (\alpha \times \mu) + \left(\frac{\beta}{\nu} \times \mu\right),$$

$$\alpha \times \frac{\mu}{\nu} = \frac{\alpha \times \mu}{\nu} \times \mu = \frac{\alpha \times \mu}{\nu}, \quad \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \times \gamma}{\beta \times \delta},$$

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\gamma}{\delta} \times \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha \times \gamma \times \epsilon}{\beta \times \delta \times \zeta},$$

$$\left(\alpha + \frac{\beta}{\gamma}\right) \times \frac{\mu}{\nu} = \frac{(\alpha \times \gamma) + \beta}{\gamma} \times \frac{\mu}{\nu}, \quad \eta \quad \left(\alpha + \frac{\beta}{\gamma}\right) \times \frac{\mu}{\nu} = \left(\alpha \times \frac{\mu}{\nu}\right) + \left(\frac{\beta}{\gamma} \times \frac{\mu}{\nu}\right),$$

$$\alpha \times \left(\beta + \frac{\mu}{\nu}\right) = \alpha \times \frac{(\beta \times \nu) + \mu}{\nu} \quad \eta \quad \alpha \times \left(\beta + \frac{\mu}{\nu}\right) = (\alpha \times \beta) + \left(\alpha \times \frac{\mu}{\nu}\right).$$

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'

### ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

#### 1. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙ' ΑΚΕΡΑΙΟΥ

§ 206. *Πρόβλημα 1ον.* Τρεῖς ἐργάται ἔσκαψαν εἰς δύο ἡμέρας τὰ  $\frac{6}{8}$  μιᾶς ἀμπέλου. Πόσον μέρος τῆς ἀμπέλου ἔσκαψεν ὁ καθένας;

*Λύσις :* Ἀφοῦ οἱ τρεῖς ἐργάται ἔσκαψαν τὰ  $\frac{6}{8}$  τῆς ἀμπέλου, ὁ ἕνας θὰ ἔσκαψε τρεῖς φορές ὀλιγώτερον, ἤτοι  $\frac{6}{8} : 3$ . Πρέπει δηλ. νὰ διαιρέσωμεν τὸ κλάσμα  $\frac{6}{8}$  διὰ τοῦ 3. Πρὸς τοῦτο ἐνθυμούμεθα (§ 187 I) ὅτι: Ἄν ὁ ἀριθμητῆς ἐνὸς κλάσματος διαιρεθῇ δι' ἐνὸς διαιρέτου τοῦ καὶ τὸ κλάσμα διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀκεραίου. Ἐπίσης ἕνα κλάσμα διαιρεῖται δι' ἀκεραίου, ἂν ὁ παρονομαστῆς τοῦ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον τοῦτον.

$$\begin{aligned} \text{Εἶναι λοιπὸν } \frac{6}{8} : 3 &= \frac{6 : 3}{8} = \frac{2}{8} \text{ τῆς ἀμπέλου ἢ καὶ} \\ \frac{6}{8} : 3 &= \frac{6}{8 \times 3} = \frac{6}{24} \end{aligned}$$

καὶ τοῦτο μετὰ τὴν διὰ 3 ἀπλοποίησιν γίνεται  $\frac{2}{8}$ . Προτιμῶμεν δὲ τὸν α' τρόπον, ἂν ὁ ἀκέραιος εἶναι διαιρέτης τοῦ ἀριθμητοῦ.

#### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

331) Ἐκτελέσατε τὰς ἀκολουθοῦσας διαιρέσεις καὶ τὴν δοκιμὴν ἐκάστης :

$$\frac{2}{5} : 2, \quad \frac{6}{7} : 3, \quad \frac{12}{17} : 4, \quad \frac{3}{4} : 2, \quad \frac{5}{6} : 3, \quad \frac{7}{9} : 5.$$

332) Εὑρετε ἀριθμόν, ὅστις ἑξαπλασιαζόμενος γίνεται  $\frac{4}{5}$ . Ἐπιπλεονεκτήτως εὑρετε ἄλλον, ὅστις ὀκταπλασιαζόμενος γίνεται  $\frac{5}{9}$ .

333) Ἄν  $\frac{8}{9} : \chi = \frac{2}{9}$ , ποῖον ἀριθμὸν παριστάνει τὸ γράμμα  $\chi$  ;  
 Ἄν δὲ  $\frac{\alpha}{9} : 3 = \frac{1}{9}$ , ποῖον ἀριθμὸν παριστάνει ὁ  $\alpha$  ;

§ 207. *Πρόβλημα 2ον.* Ἐνα αὐτοκίνητον διέτρεξεν  $60\frac{3}{4}$  χιλιόμετρα εἰς τρεῖς ὥρας μὲ τὴν αὐτὴν ταχύτητα. Πόση ἦτο ἡ ταχύτης του τὴν ὥραν ;

*Λύσις.* Ἀφοῦ εἰς τρεῖς ὥρας διέτρεξεν  $60\frac{3}{4}$  χιλιόμετρα, εἰς 1 ὥραν διέτρεξε 3 φορές ὀλιγώτερον, ἤτοι  $60\frac{3}{4} : 3$ . Αὐτὴν τὴν διαίρεσιν δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν κατὰ τοὺς ἐξῆς τρόπους:

1ον. Ἐπειδὴ  $60\frac{3}{4} = \frac{243}{4}$ , πρέπει νὰ κάμωμεν τὴν διαίρεσιν  $\frac{243}{4} : 3$ . Εἶναι δηλ.  $60\frac{3}{4} : 3 = \frac{243}{4} : 3 = \frac{81}{4} = 20\frac{1}{4}$  χιλιόμετρα.

2ον. Ἄν εἰς τὰς 3 ὥρας διέτρεχε μόνον 60 χιλιόμετρα, εἰς μίαν ὥραν θὰ διέτρεχεν  $60 : 3 = 20$  χιλιόμετρα. Ἄν δὲ εἰς 3 ὥρας διέτρεχε μόνον  $\frac{3}{4}$  τοῦ χιλιομέτρου, εἰς μίαν ὥραν θὰ διέτρεχε  $\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$  τοῦ χιλιομέτρου. Ἐπειδὴ δὲ διέτρεξε τὰ 60 χιλιόμετρα καὶ τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ χιλιομέτρου, εἰς 1 ὥραν διέτρεξεν  $20 + \frac{1}{4}$  ἢ  $20\frac{1}{4}$  χιλιόμετρα.

Εἶναι δηλ.  $60\frac{3}{4} : 3 = (60 : 3) + (\frac{3}{4} : 3) = 20 + \frac{1}{4} = 20\frac{1}{4}$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

1ον. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν μεικτὸν ἀριθμὸν δι' ἀκεραίου, τρέπομεν τὸν μεικτὸν εἰς κλάσμα καὶ διαιροῦμεν αὐτὸ διὰ τοῦ ἀκεραίου.

2ον. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν μεικτὸν δι' ἀκεραίου, διαιροῦμεν χωριστὰ τὸν ἀκεραῖον καὶ χωριστὰ τὸ κλάσμα διὰ τοῦ ἀκεραίου καὶ προσθέτομεν τὰ δύο πηλίκα.

Ὁ δεύτερος τρόπος δεικνύει ὅτι διατηρεῖται εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ ἰδιότης τῆς διαιρέσεως ἀθροίσματος δι' ἀριθμοῦ, τὴν ὁποῖαν ἐμάθομεν διὰ τοὺς ἀκεραίους (§ 89).

#### Ἀσκήσεις

Α' Ὁ μ α ς. 334) Ἐκτελέσατε ἀπὸ μνήμης τὰς ἐξῆς διαιρέσεις :

$$2 \frac{2}{5} : 2, \quad 4 \frac{6}{9} : 2, \quad 3 \frac{6}{7} : 3.$$

335) Ἐκτελέσατε κατὰ δύο τρόπους κάθε μίαν ἀπὸ τὰς ἀκολούθους διαιρέσεις :

$$8 \frac{4}{5} : 4, \quad 6 \frac{3}{7} : 3, \quad 4 \frac{2}{5} : 2.$$

Β' Ὁμάς. 336) Εἰς οἰκογενειάρχης εἶχε λάβει 5 δελτία καὶ ἔλαβε κατὰ μίαν διανομὴν  $7 \frac{1}{2}$  χλγ. φασολίων. Πόσα χλγ. φασολίων ἐμοιράζοντο κατὰ δελτίον ;

337) Μία οἰκοκυρὰ ἠγόρασεν  $22 \frac{1}{2}$  χλγ. ὄσπρια, διὰ νὰ περᾶσῃ τοὺς 3 μῆνας τοῦ χειμῶνος. Πόσα ὄσπρια πρέπει νὰ ἐξοδεύῃ τὸν μῆνα ;

338) Εἰς γεωργὸς εἶχε σπείρει μὲ σῖτον ἓνα ἄγρον 8 στρεμμάτων. Ὁ ἄγρος αὐτὸς ἀπέδωκε  $1050 \frac{1}{2}$  χλγ. σίτου. Πόση εἶναι ἡ ἀπόδοσις τοῦ ἀγροῦ τούτου κατὰ στρέμμα ;

## 2. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

§ 208. *Πρόβλημα 1ον.* Μία κυρία ἠγόρασεν  $\frac{6}{8}$  τοῦ πήχεως δαντέλλας καὶ ἔδωκεν α δραχμάς. Πρὸς πόσον ἠγόρασεν τὸν πῆχυν ;

*Λύσις.* Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς : Ἄν ἐγνωρίζομεν τὴν τιμὴν τοῦ πήχεως καὶ ἐπολλαπλασιάζομεν αὐτὴν ἐπὶ  $\frac{6}{8}$ , ἔπρεπε νὰ εὐρίσκομεν τὰς α δραχμάς, τὰς ὁποίας ἔδωκεν αὐτὴ ἡ κυρία. Αὐτὴ λοιπὸν ἡ τιμὴ τοῦ πήχεως εἶναι  $\alpha : \frac{6}{8}$  σύμφωνα μὲ τὸν γενικὸν ὀρισμὸν τῆς διαιρέσεως (§ 84).

Ἀπὸ αὐτὴν τὴν σκέψιν ἐννοοῦμεν ὅτι διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ πήχεως, πρέπει νὰ κάμωμεν τὴν διαίρεσιν  $\alpha : \frac{6}{8}$ .

Ἐπειδὴ ὁμως δὲν γνωρίζομεν πῶς γίνεται αὐτὴ ἡ διαίρεσις, θὰ προσπαθῆσωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ πήχεως μὲ ἄλλον τρόπον. Σκεπτόμεθα δὲ ὡς ἑξῆς :

Ἀφοῦ διὰ τὰ  $\frac{6}{8}$  τοῦ πήχεως ἔδωκεν α δραχμάς, διὰ τὸ  $\frac{1}{8}$  τοῦ πήχεως θὰ ἔδιδεν 6 φορές ὀλιγώτερον, ἤτοι  $\frac{\alpha}{6}$  δραχ., καὶ διὰ τὰ

$\frac{8}{8} = 1$  πῆχυν θὰ ἔδωκεν 8 φορές περισσότερον, ἤτοι  $\frac{\alpha}{6} \times 8$  δραχμάς.

Αὐτὸς ὁ τρόπος τῆς λύσεως λέγεται **μέθοδος τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα**. Ἐπειδὴ δὲ

$$\frac{\alpha}{6} \times 8 = \alpha \times \frac{8}{6}$$

ἐννοοῦμεν ὅτι :  $\alpha : \frac{6}{8} = \alpha \times \frac{8}{6}$  (1)

**§ 209. Πρόβλημα 2ον.** Τὸ ρούπιον μιᾶς δαντέλλας τιμᾶται  $\frac{2}{9}$  τοῦ πενταδράχμου. Πόσα ρούπια ἀπὸ αὐτὴν τὴν δαντέλλαν ἀγοράζομεν μὲ  $\alpha$  πεντάδραχμα;

*Λύσις.* Εἶναι φανερὸν ὅτι ἀγοράζομεν τόσα ρούπια, ὅσας φορές τὰ  $\frac{2}{9}$  τοῦ πενταδράχμου χωροῦν εἰς τὰ  $\alpha$  πεντάδραχμα, ἤτοι ἀγοράζομεν ( $\alpha : \frac{2}{9}$ ) ρούπια.

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ πηλίκον τοῦτο, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς:

Ἄφοῦ μὲ  $\frac{2}{9}$  τοῦ πενταδράχμου ἀγοράζομεν 1 ρούπιον,

$$\text{μὲ } \frac{1}{9} \text{ » » » } \frac{1}{2} \text{ »}$$

μὲ  $\frac{9}{9}$  » » ἤτοι μὲ 1 πεντ. ἀγοράζομεν

$$\frac{1}{2} \times 9 = \frac{9}{2} \text{ ρουπ.}$$

καὶ μὲ  $\alpha$  πεντ. ἀγοράζομεν  $\frac{9}{2} \times \alpha$  ἢ  $\alpha \times \frac{9}{2}$  ρουπ.

Θὰ εἶναι λοιπὸν:  $\alpha : \frac{2}{9} = \alpha \times \frac{9}{2}$ .

**§ 210. Πῶς διαιρεῖται ἀριθμὸς διὰ κλάσματος.** Διὰ τῆς λύσεως τῶν δύο προηγουμένων προβλημάτων κατελήξαμεν εἰς τὰς ἰσότητας:

$$\alpha : \frac{6}{8} = \alpha \times \frac{8}{6} \quad \text{καὶ} \quad \alpha : \frac{2}{9} = \alpha \times \frac{9}{2} \quad (2)$$

Ἐκ τούτων βλέπομεν ὅτι :

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ κλάσματος, πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρέτεον ἐπὶ τὸν διαιρέτην ἀντεστραμμένον.

Εἶναι δὲ εὐνόητον ὅτι ὁ διαιρετέος α δύναται νὰ εἶναι ἀκέραϊος ἢ κλάσμα ἢ μεικτός. Π.χ.

$$12 : \frac{6}{8} = 12 \times \frac{8}{6} = \frac{12}{6} \times 8 = 16.$$

$$\frac{3}{4} : \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{6} = \frac{3 \times 8}{4 \times 6} = 1.$$

$$3\frac{1}{2} : \frac{4}{5} = 3\frac{1}{2} \times \frac{5}{4} = \left(3 \times \frac{5}{4}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{5}{4}\right) = \frac{15}{4} + \frac{5}{8} = \frac{35}{8} = 4\frac{3}{8}.$$

### Ἄσκησεις

Α' Ὁμάς. 339) Ἐκτελέσατε τὰς ἀκολουθοῦσας διαιρέσεις :

$$6 : \frac{3}{4}, 8 : \frac{2}{5}, 10 : \frac{5}{6}, 3 : \frac{1}{2}, 5 : \frac{2}{3}, 9 : \frac{4}{3}, 2\frac{1}{3} : \frac{1}{3}.$$

Β' Ὁμάς. 340) Ἐνα αὐτοκίνητον εἰς  $\frac{3}{4}$  τῆς ὥρας διέτρεξε 18 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα διέτρεχε τὴν ὥραν ;

341) Ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ τῶν Ἑλληνικῶν σιδηροδρόμων ἀπὸ Πειραιῶς μέχρις Ἀθηνῶν ἔχει μῆκος 10 χιλιόμετρα. Μία δὲ ἀμαξοστοιχία φθάνει ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ εἰς Ἀθήνας εἰς  $\frac{5}{12}$  τῆς ὥρας. Πόση εἶναι ἡ ταχύτης αὐτῆς εἰς μίαν ὥραν ;

342) Τὰ  $\frac{5}{8}$  ἐνὸς κιβωτίου χωροῦν 10  $\frac{3}{4}$  χλγ. μακαρονίων. Πόσα χλγ. μακαρονίων χωρεῖ ὅλον τὸ κιβώτιον ;

343) Ἐνας παντοπώλης ἤνοιξε μίαν ἡμέραν ἕνα βαρέλιον τυροῦ. Ἀφοῦ ἐπώλησε τὰ  $\frac{3}{10}$  αὐτοῦ ἔμειναν 19  $\frac{3}{5}$  χλγ. Πόσα χλγ. εἶχεν εἰς τὴν ἀρχὴν τὸ βαρέλιον αὐτό ;

### 3. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΑ ΜΕΙΚΤΟΥ

§ 211. *Πρόβλημα 1ον.* Ἐνας οἰκογενειάρχης ἠγόρασε 5  $\frac{1}{2}$  χλγ. σάπωνος ἀντὶ 33 δραχμῶν. Νὰ εὑρεθῇ ἡ τιμὴ τοῦ 1 χλγ. τοῦ σάπωνος τούτου.

*Λύσις.* Ἀφοῦ τὰ 5  $\frac{1}{2}$  χιλιόγραμ. τιμῶνται 33 δραχμᾶς, τὸ 1

χλγ. θὰ τιμᾶται  $5 \frac{1}{2}$  φορές ὀλιγώτερον, ἤτοι  $33 : 5 \frac{1}{2}$ . Ἐπειδὴ δὲ  $5 \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$ , θὰ εἶναι  $33 : 5 \frac{1}{2} = 33 : \frac{11}{2} = 33 \times \frac{2}{11} = 6$ .

Ἡ τιμὴ λοιπὸν τοῦ χλγ. ἦτο 6 δραχμαί.

Ἄν ἡ τιμὴ τῶν  $5 \frac{1}{2}$  χλγ. ἦτο  $\alpha$  δραχμαί, μὲ τοὺς ἰδίους συλλογισμοὺς ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ τιμὴ τοῦ χλγ. θὰ ἦτο  $(\alpha : 5 \frac{1}{2})$  δραχμαί.

Ἐπειδὴ δὲ  $5 \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$ , θὰ εἶναι  $\alpha : 5 \frac{1}{2} = \alpha : \frac{11}{2}$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ τὰ διαιρέσωμεν οἰονδήποτε ἀριθμὸν  $\alpha$  διὰ μεικτοῦ, τρέπομεν τὸν μεικτὸν εἰς κλάσμα καὶ δι' αὐτοῦ διαιροῦμεν τὸν  $\alpha$ .

$$\text{Π. χ. } 6 : 2 \frac{1}{3} = 6 : \frac{7}{3} = 6 \times \frac{3}{7} = \frac{18}{7} = 2 \frac{4}{7},$$

$$\frac{5}{8} : 1 \frac{1}{4} = \frac{5}{8} : \frac{5}{4} = \frac{5}{8} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{2},$$

$$6 \frac{2}{3} : 2 \frac{3}{6} = \frac{20}{3} : \frac{15}{6} = \frac{20}{3} \times \frac{6}{15} = \frac{4}{1} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3} = 2 \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{ἢ } 6 \frac{2}{3} : 2 \frac{3}{6} &= 6 \frac{2}{3} : \frac{15}{6} = 6 \frac{2}{3} \times \frac{6}{15} = (6 \times \frac{6}{15}) + (\frac{2}{3} \times \frac{6}{15}) \\ &= \frac{36}{15} + \frac{4}{15} = \frac{40}{15} = \frac{8}{3} = 2 \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

§ 212. Πρόβλημα 2ον. Ἐνα ὥρολόγιον ἔμενεν ὀπίσω  $2 \frac{3}{4}$  δευτερόλεπτα τὴν ὥραν. Εἰς πόσας ὥρας θὰ μείνη ὀπίσω  $45 \frac{3}{8}$  δευτερόλεπτα ;

Λύσις. Μὲ μικρὰν σκέψιν ἐννοοῦμεν ὅτι τὸ ζητούμενον θὰ συμβῆ μετὰ  $(45 \frac{3}{8} : 2 \frac{3}{4})$  ὥρ. ἢ μετὰ  $45 \frac{3}{8} : \frac{11}{4} = 45 \frac{3}{8} \times \frac{4}{11} = 16 \frac{1}{2}$  ὥρ.

Παρατήρησις. Ἀπὸ τὰ προηγούμενα προβλήματα τῆς διαιρέσεως βλέπομεν εὐκόλως ὅτι κατὰ τὸν μερισμὸν καὶ τὴν μέτρησιν ὁ διαιρέτης δύναται νὰ εἶναι κλάσμα ἢ καὶ μεικτὸς ἀριθμὸς. Οἱ δὲ κανόνες τῶν §§ 107 καὶ 109 ἰσχύουν καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτάς.

### Ἀσκήσεις

Α' Ὁμάς. 344) Ἐκτελέσατε τὰς ἀκολουθοῦσας διαιρέσεις καὶ τὴν δοκιμὴν αὐτῶν :

1.  $1 : 1\frac{3}{4}, \quad 3 : 2\frac{3}{5}, \quad 12 : 5\frac{2}{5}.$   
 2.  $\frac{2}{5} : 2\frac{1}{2}, \quad \frac{5}{8} : 3\frac{1}{4}, \quad \frac{7}{9} : 2\frac{1}{3}.$   
 3.  $3\frac{1}{4} : 2\frac{3}{5}, \quad 7\frac{1}{2} : 3\frac{5}{6}, \quad 10\frac{3}{4} : 3\frac{1}{5}.$

B' Όμ. 345) Ένας παντοπώλης έπώλησεν ένα βαρέλιον τυροϋ βάρους  $27\frac{3}{4}$  χλγ. και εισέπραξε 555 δραχμάς. Πρὸς πόσας δραχμάς έπώλει τὸ χλγ ;

346) Ένας υπάλληλος ηγόρασε  $4\frac{1}{4}$  πήχεις ύφάσματος, διὰ νὰ κάμη μίαν ένδυμασίαν και έδωκε 459 δραχ. Πρὸς πόσον ηγόρασε τὸν πήχυν ;

347) Ένα ώρολόγιον εἰς  $17\frac{1}{2}$  ώρας μένει ὀπίσω  $\frac{7}{60}$  τῆς ώρας. Πόσον μένει ὀπίσω εἰς μίαν ώραν ;

348) Μία ὀμαξοστοιχία εἰς  $14\frac{2}{5}$  ώρας καθυστέρησεν  $\frac{8}{9}$  τῆς ώρας. Πόσῃ καθυστέρησιν εἶχε κάθε ώραν ;

349) Ένα τεμάχιον ύφάσματος εἶναι  $63\frac{6}{8}$  πήχεις. Διὰ μίαν δὲ ἀνδρικήν ένδυμασίαν χρειάζονται  $4\frac{2}{8}$  πήχεις ἀπὸ τὸ ύφασμα. Πόσαι ἀνδρικαὶ ένδυμασίαι γίνονται ἀπὸ αὐτὸ τὸ τεμάχιον ;

350) Μία κυρία ηγόρασεν  $13\frac{1}{2}$  πήχεις ύφάσματος διὰ νὰ κάμη παραπετάσματα διὰ τὰ παράθυρα τῆς οἰκίας της. Παρετήρησε δὲ ὅτι διὰ κάθε παράθυρον ἐχρειάσθησαν  $3\frac{3}{8}$  πήχεις. Διὰ πόσα παράθυρα ἔκαμε παραπετάσματα με αὐτὸ τὸ ύφασμα ;

§ 213. Συγχώνευσις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ και τῆς διαιρέσεως. Εἰς τὰ προηγούμενα ἐμάθομεν ὅτι :

$$\text{Π.χ. } 5 : \frac{2}{3} = 5 \times \frac{3}{2}, \quad \frac{2}{5} : \frac{4}{7} = \frac{2}{5} \times \frac{7}{4}, \quad 3\frac{1}{5} : \frac{5}{6} = 3\frac{1}{5} \times \frac{6}{5},$$

$$\text{Εἶναι και } 8 : 3 = 8 : \frac{3}{1} = 8 \times \frac{1}{3}, \quad \frac{4}{9} : 5 = \frac{4}{9} : \frac{5}{1} = \frac{4}{9} \times \frac{1}{5},$$

$$6\frac{1}{3} : 4 = 6\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}, \quad 7\frac{2}{5} : \frac{4}{9} = 7\frac{2}{5} \times \frac{9}{4} \text{ κ.τ.λ.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν γενικῶς ὅτι :

1ον. Ἡ διαίρεσις δι' ἑνὸς ἀριθμοῦ εἶναι πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ τὸν ἀντίστροφόν του.

Καὶ ἀντιστρόφως :

2ον. Ὁ πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ ἕνα ἀριθμὸν εἶναι διαίρεσις διὰ τοῦ ἀντιστρόφου του.

Περίληψις τῶν κανόνων τῆς διαιρέσεως

$$\frac{\alpha}{\beta} : \mu = \frac{\alpha : \mu}{\beta}, \text{ ἂν } \alpha \text{ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ } \mu, \text{ ἢ } \frac{\alpha}{\beta} : \mu = \frac{\alpha}{\beta \times \mu},$$

$$\left(\alpha + \frac{\beta}{\gamma}\right) : \mu = \frac{(\alpha \times \gamma) + \beta}{\gamma} : \mu = \frac{(\alpha \times \gamma) + \beta}{\gamma \times \mu} \quad \text{ἢ}$$

$$\left(\alpha + \frac{\beta}{\gamma}\right) : \mu = (\alpha : \mu) + \left(\frac{\beta}{\gamma} : \mu\right),$$

$$\alpha : \frac{\mu}{\nu} = \alpha \times \frac{\nu}{\mu}, \quad \alpha : \left(\beta + \frac{\gamma}{\nu}\right) = \alpha : \frac{(\beta \times \nu) + \gamma}{\nu} = \frac{\alpha \times \nu}{(\beta \times \nu) + \gamma}.$$

#### 4. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

§ 214. Τί εἶναι σύνθετα κλάσματα. Ἐμάθομεν μέχρι τοῦδε ὅτι π.χ.  $7 : 8 = \frac{7}{8}$ ,  $4 : 3 = \frac{4}{3}$  κ.τ.λ. Δηλαδή :

Τὸ πηλίκον ἑνὸς ἀκεραίου δι' ἄλλου ἀκεραίου παριστάνεται μὲ κλάσμα, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀριθμητὴν τὸν διαιρετέον καὶ παρονομαστὴν τὸν διαιρέτην.

Ἄν θέλωμεν νὰ παραστήσωμεν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ τὰ πηλικά π.χ.

$$5 : \frac{3}{4}, \quad 8 : 2\frac{1}{4}, \quad \frac{4}{5} : \frac{3}{7}, \quad \frac{7}{8} : 4\frac{1}{3}, \quad 5\frac{2}{3} : \frac{7}{8}, \quad 10\frac{1}{4} : 4\frac{2}{5},$$

$$\text{εὐρίσκομεν ὅτι : } 5 : \frac{3}{4} = \frac{5}{\frac{3}{4}}, \quad 8 : 2\frac{1}{4} = \frac{8}{2\frac{1}{4}},$$

$$\frac{4}{5} : \frac{3}{7} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{7}} \quad \frac{7}{8} : 4\frac{1}{3} = \frac{\frac{7}{8}}{4\frac{1}{3}}$$

$$5 \frac{2}{3} : \frac{7}{8} = \frac{5 \frac{2}{3}}{\frac{7}{8}}, \quad 10 \frac{1}{4} : 4 \frac{2}{5} = \frac{10 \frac{1}{4}}{4 \frac{2}{5}},$$

Οί αριθμοί  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{8}{2 \frac{1}{4}}$  κ. τ. λ. λέγονται **σύνθετα κλάσματα**.

Τὰ ἄλλα κλάσματα, τὰ ὁποῖα ἐγνωρίσαμεν ἕως τῶρα, λέγονται **ἀπλᾶ κλάσματα**. Ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὴν γραμμὴν ἐνὸς συνθέτου κλάσματος, λέγεται πάλιν **ἀριθμητῆς**, ὁ δὲ ἄλλος, **παρονομαστῆς** τοῦ συνθέτου κλάσματος. Καὶ οἱ δύο μαζί λέγονται **ὄροι** αὐτοῦ.

Εἰς κάθε ἀπλοῦν κλάσμα καὶ οἱ δύο ὄροι εἶναι ἀκέραιοι ἀριθμοί. Εἰς δὲ τὰ σύνθετα κλάσματα ὁ ἕνας τουλάχιστον ὄρος δὲν εἶναι ἀκέραιος ἀριθμὸς. Τονίζομεν δὲ πάλιν ὅτι :

**Κάθε κλάσμα ἀπλοῦν ἢ σύνθετον παριστάνει τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ του διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του.**

§ 215. Τροπὴ συνθέτου κλάσματος εἰς ἀπλοῦν. Τὰ σύνθετα κλάσματα ἔχουν ὅλας τὰς ιδιότητες τῶν ἀπλῶν κλασμάτων. Ἐν π.χ. ἐνθυμηθῶμεν ὅτι τὸ πηλίκον δὲν βλάπτεται, ἂν πολλαπλασιάσωμεν διαιρέτην καὶ διαιρετέον ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἐννοοῦμεν ὅτι :

$$\text{Π.χ. } \frac{3}{4} = \frac{3 \times \lambda}{4 \times \lambda}, \quad \frac{5}{8} = \frac{5 \times \lambda}{8 \times \lambda}, \quad \frac{12}{5} = \frac{12 \times \lambda}{5 \times \lambda} \quad \text{κ. τ. λ.} \quad \text{Δηλαδή :}$$

Ἐάν οἱ ὄροι ἐνὸς συνθέτου κλάσματος πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἡ ἀξία αὐτοῦ δὲν βλάπτεται.

Αὐτὴν τὴν ιδιότητα δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν, διὰ νὰ τρέψωμεν ἕνα σύνθετον κλάσμα εἰς ἀπλοῦν.

Ἐν π.χ. εἰς τὸ γ' ἀπὸ τὰ προηγούμενα παραδείγματα κάμωμεν τὸν λ ἴσον μὲ τὸν κοινὸν παρονομαστὴν 5 τῶν ὄρων τοῦ συνθέτου κλάσματος, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\frac{12}{5} = \frac{12}{5} \times 5 = \frac{12}{3} = 4.$$

Ἐάν εἰς τὸ α' παράδειγμα θέσωμεν 4 ἀντὶ λ, εὐρίσκομεν :

$$\frac{\frac{3}{4}}{4} = \frac{\frac{3}{4} \times 4}{4 \times 4} = \frac{3}{16}.$$

Εἰς δὲ τὸ β' θέτομεν ἀντὶ λ τὸ ἐ.κ.π. 8 τῶν ἰδιαίτερον παρονομαστῶν τῶν ὄρων τοῦ συνθέτου κλάσματος καὶ εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\frac{\frac{5}{8}}{\frac{7}{4}} = \frac{\frac{5}{8} \times 8}{\frac{7}{4} \times 8} = \frac{5}{14}.$$

Συνήθως ὅμως τὴν τροπὴν αὐτὴν κάμνομεν, ἂν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν τοῦ ἀριθμητοῦ τοῦ συνθέτου κλάσματος διὰ τοῦ παρονομαστοῦ αὐτοῦ. Π.χ.

$$\frac{\frac{8}{4}}{\frac{5}{5}} = 8 : \frac{4}{5} = 8 \times \frac{5}{4} = 10,$$

$$\frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{6}} = \frac{4}{5} : \frac{3}{6} = \frac{4}{5} \times \frac{6}{3} = \frac{24}{15}.$$

$$\frac{\frac{7}{8}}{4 \frac{1}{3}} = \frac{7}{8} : 4 \frac{1}{3} = \frac{7}{8} : \frac{13}{3} = \frac{7}{8} \times \frac{3}{13} = \frac{21}{104} \text{ κ.τ.λ.}$$

*Παρατηρήσεις.* Αἱ πράξεις ἐπὶ τῶν συνθέτων κλασμάτων δύναται νὰ γίνουσι κατὰ τοὺς κανόνας τῶν πράξεων τῶν ἀπλῶν κλασμάτων. Εὐκολώτερον ὅμως εἶναι νὰ τρέπωνται ταῦτα εἰς ἀπλᾶ καὶ ἔπειτα νὰ ἐκτελῶνται αὐταί.

### Ἐσκήσεις

351 ) Νὰ τραποῦν εἰς ἀπλᾶ τὰ ἀκόλουθα κλάσματα :

$$1. \quad \frac{5}{6}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{1}{5}, \quad \frac{7}{10}.$$

$$2. \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{1}{5}, \quad \frac{7}{2}, \quad \frac{3}{8}.$$

$$3. \quad \frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{6}}, \quad \frac{\frac{4}{5}}{\frac{1}{5}}, \quad \frac{\frac{3}{8}}{\frac{5}{10}}, \quad \frac{\frac{7}{8}}{\frac{3}{4}}.$$

$$4. \quad \frac{5}{2\frac{1}{2}}, \quad \frac{3\frac{1}{4}}{13}, \quad \frac{5}{2\frac{1}{4}}, \quad \frac{3\frac{1}{5}}{2\frac{4}{5}}.$$

352) Νά εκτελεσθοῦν αἱ ἀκόλουθοι πράξεις :

$$1. \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{2}. \quad 2. \quad \frac{2}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}.$$

$$3. \quad \frac{1\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} + \frac{\frac{4}{5}}{2\frac{2}{5}} + \frac{2\frac{1}{2}}{3\frac{1}{4}}. \quad 4. \quad \frac{6}{\frac{1}{2}} - \frac{2}{\frac{3}{4}}.$$

$$5. \quad \frac{\frac{8}{9}}{2} - \frac{\frac{7}{10}}{2\frac{1}{9}}. \quad 6. \quad \frac{4\frac{1}{5}}{2\frac{3}{10}} - \frac{1\frac{2}{5}}{3\frac{3}{10}}.$$

353) Νά εκτελεσθοῦν αἱ ἀκόλουθοι πράξεις :

$$1. \quad \frac{1}{4} \times \frac{6}{3}, \quad \frac{2}{5} \times \frac{7}{8}, \quad 6\frac{1}{2} \times \frac{3}{4\frac{1}{6}}.$$

$$2. \quad \frac{5}{\frac{1}{8}} : \frac{3}{2\frac{5}{8}}, \quad \frac{4\frac{1}{9}}{2\frac{1}{3}} : \frac{7}{3\frac{2}{3}}, \quad \frac{8}{3\frac{1}{4}} : \frac{5\frac{1}{6}}{\frac{7}{6}}.$$

354) Νά τραποῦν εἰς ἀπλᾶ τὰ κάτωθι σύνθετα κλάσματα :

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{6}, \quad \frac{3}{5} - \frac{5}{9}, \quad 7\frac{1}{2} : 1\frac{3}{4}.$$

$$\frac{5}{9} - \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{2}, \quad \frac{2}{5} \times \frac{10}{11}.$$

#### 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ

§ 216. Πρόβλημα 1ον. Νά εὑρεθοῦν τὰ  $\frac{4}{5}$  τοῦ ἀριθμοῦ 40.  
Λύσις. Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα αὐτό, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς :

Ἀφοῦ ὅλος ὁ ἀριθμὸς, δηλ. τὰ  $\frac{5}{5}$  αὐτοῦ, εἶναι 40, τὸ  $\frac{1}{5}$  αὐτοῦ θὰ εἶναι 5 φορές ὀλιγώτερον, ἥτοι  $\frac{40}{5}$ , τὰ δὲ  $\frac{4}{5}$  αὐτοῦ θὰ εἶναι 4 φορές περισσότερον ἀπὸ τὸ προηγούμενον, ἥτοι  $\frac{40}{5} \times 4 = 32$ .  
 Ὡστε τὰ  $\frac{4}{5}$  τοῦ 40 εἶναι 32.

*Σημείωσις.* Ἀπὸ μνήμης εὐρίσκομεν ἀμέσως ὅτι τὸ  $\frac{1}{5}$  τοῦ 40 εἶναι 8 καὶ ἐπομένως τὰ  $\frac{4}{5}$  αὐτοῦ θὰ εἶναι  $8 \times 4 = 32$ .

*Πρόβλημα 2ον.* **Νὰ εὐρεθοῦν τὰ  $\frac{5}{8}$  τοῦ κλάσματος  $\frac{4}{5}$ .**

*Λύσις.* Ἀφοῦ ὅλος ὁ ἀριθμὸς, δηλ. τὰ  $\frac{8}{8}$  αὐτοῦ, εἶναι  $\frac{4}{5}$ , τὸ  $\frac{1}{8}$  αὐτοῦ θὰ εἶναι 8 φορές ὀλιγώτερον, ἥτοι  $\frac{4}{5} : 8$ , ἥτοι  $\frac{4}{5 \times 8}$ , καὶ τὰ  $\frac{5}{8}$  αὐτοῦ θὰ εἶναι 5 φορές περισσότερον ἀπὸ τὸ προηγούμενον, ἥτοι  $\frac{4}{5 \times 8} \times 5 = \frac{4 \times 5}{5 \times 8} = \frac{1}{2}$ . Ὡστε τὰ  $\frac{5}{8}$  τοῦ  $\frac{4}{5}$  εἶναι  $\frac{1}{2}$ .

*Πρόβλημα 3ον.* **Νὰ εὐρεθοῦν τὰ  $\frac{5}{6}$  τοῦ ἀριθμοῦ  $3\frac{1}{4}$ .**

*Λύσις. Α' τρόπος.* Τρέπομεν τὸν μεικτὸν  $3\frac{1}{4}$  εἰς κλάσμα καὶ εὐρίσκομεν ὅτι  $3\frac{1}{4} = \frac{13}{4}$ . Πρέπει λοιπὸν νὰ εὑρωμεν τὰ  $\frac{5}{6}$  τοῦ  $\frac{13}{4}$ .

Σκεπτόμενοι δὲ ὅπως προηγούμενος, εὐρίσκομεν ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι  $\frac{13}{4 \times 6} \times 5 = \frac{65}{24} = 2\frac{17}{24}$ .

*Β' τρόπος.* Ἄν κάμωμεν τοὺς ἰδίους συλλογισμοὺς, χωρὶς νὰ τρέψωμεν τὸν μεικτὸν  $3\frac{1}{4}$  εἰς κλάσμα, εὐρίσκομεν ὅτι τὸ ζητούμενον εἶναι  $3\frac{1}{4} \times 5 = \frac{13}{4} \times 5 = \frac{13}{4} \times 5 = \frac{65}{4} = 2\frac{17}{4}$ .

*Πρόβλημα 4ον.* Ἐνα αὐτοκίνητον διανύει  $24\frac{2}{2}$  χιλιόμετρα τὴν ὥραν. Διὰ νὰ μεταβῇ δὲ ἀπὸ τὰς Ἀθήνας εἰς Κηφισιὰν

κάμνει  $\frac{5}{8}$  τῆς ὥρας. Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἀπόστασις τῆς Κηφισιάς ἀπὸ τὰς Ἀθήνας.

*Λύσις.* Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα αὐτό, πρέπει νὰ εὐρωμεν πόσα χιλιόμετρα διανύει τὸ αὐτοκίνητον εἰς  $\frac{5}{8}$  τῆς ὥρας. Σκεπτόμεθα λοιπὸν ὡς ἑξῆς :

Ἄφοῦ εἰς 1 ὥραν διανύει  $24 \frac{1}{2}$  χιλιόμετρα

εἰς  $\frac{1}{8}$  ὥρας διανύει  $\frac{24 \frac{1}{2}}{8}$  χιλιόμετρα

καὶ εἰς  $\frac{5}{8}$  τῆς ὥρας διανύει:

$$\frac{24 \frac{1}{2}}{8} \times 5 = \frac{49}{8} \times 5 = \frac{49}{16} \times 5 = \frac{245}{16} = 15 \frac{5}{16} \text{ χιλιόμετρα.}$$

Ἔσπε ἡ ζητούμενη ἀπόστασις εἶναι  $15 \frac{5}{16}$  χιλιόμετρα.

*Πρόβλημα 5ον.* Νὰ εὐρεθῇ ὁ ἀριθμὸς, τοῦ ὁποίου τὰ  $\frac{3}{5}$  εἶναι  $\frac{6}{9}$ .

*Λύσις.* Ἄφοῦ τὰ  $\frac{3}{5}$  τοῦ ζητουμένου ἀριθμοῦ εἶναι  $\frac{6}{9}$ , τὸ  $\frac{1}{5}$  αὐτοῦ θὰ εἶναι τρεῖς φορές ὀλιγώτερον, ἤτοι  $\frac{6}{9 \times 3}$  καὶ τὰ  $\frac{5}{5}$  αὐτοῦ, ἤτοι ὅλος ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς, θὰ εἶναι  $\frac{6}{9 \times 3} \times 5 = \frac{10}{9} = 1 \frac{1}{9}$ .

Ἔσπε ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι  $1 \frac{1}{9}$ .

*Πρόβλημα 6ον.* Νὰ εὐρεθῇ ὁ ἀριθμὸς, τοῦ ὁποίου τὰ  $\frac{4}{7}$  εἶναι  $5 \frac{1}{4}$ .

*Λύσις.* Ἄφοῦ τὰ  $\frac{4}{7}$  τοῦ ζητουμένου ἀριθμοῦ εἶναι  $5 \frac{1}{4}$ , τὸ  $\frac{1}{7}$  αὐτοῦ θὰ εἶναι 4 φορές ὀλιγώτερον, ἤτοι  $\frac{5 \frac{1}{4}}{4}$  καὶ τὰ  $\frac{7}{7}$  αὐτοῦ, ἤτοι ὅλος ὁ ἀριθμὸς, θὰ εἶναι 7 φορές περισσότερον, ἤτοι :

$$\frac{5 \frac{1}{4}}{4} \times 7 = \frac{21}{4} \times 7 = \frac{21}{16} \times 7 = \frac{147}{16} = 9 \frac{3}{16}.$$

Ἔσπε ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι  $9 \frac{3}{16}$ .

*Πρόβλημα 7ον.* Ἐνα αὐτοκίνητον διέτρεξεν  $84 \frac{3}{4}$  χιλιόμετρα εἰς  $2 \frac{7}{12}$  ὥρας. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ταχύτης του τὴν ὥραν.

*Λύσις.* Ἀφοῦ εἰς  $2 \frac{7}{12}$  τῆς ὥρας διέτρεξεν  $84 \frac{3}{4}$  χιλιόμετρα, εἰς 1 ὥραν διέτρεχε  $2 \frac{7}{12}$  φορές ὀλιγώτερον, ἦτοι :

$$\frac{84 \frac{3}{4}}{2 \frac{7}{12}} = \frac{\frac{339}{4}}{\frac{31}{12}} = \frac{339 \times 12}{4 \times 31} = \frac{1017}{31} = 32 \frac{25}{31} \text{ χιλιόμετρα.}$$

Ὡστε ἡ ταχύτης τοῦ αὐτοκινήτου εἶναι  $32 \frac{25}{31}$  χλμ. τὴν ὥραν.

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

A' Ὁ μ á ς. 355 ). Νὰ εὑρεθοῦν ἀπὸ μνήμης τὰ  $\frac{4}{5}$  τῶν ἀριθμῶν 20, 40, 60, 80, 100, 200. Ἐπειτα δὲ τὰ  $\frac{3}{4}$  τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν.

356 ) Εὑρετε διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα :

1ον. Τὰ  $\frac{5}{6}$  τοῦ ἀριθμοῦ  $\frac{2}{3}$     2ον. Τὰ  $\frac{4}{9}$  τοῦ ἀριθμοῦ  $5 \frac{2}{7}$ .

B' Ὁ μ á ς. Νὰ λυθοῦν διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα τὰ ἀκόλουθα προβλήματα :

357 ) Ἐνα αὐτοκίνητον εἶχε νὰ διατρέξῃ μίαν ἀπόστασιν 90 χιλιομέτρων. Εἰς τὰς δύο πρώτας ὥρας διέτρεξε τὰ  $\frac{3}{5}$  αὐτῆς τῆς ἀποστάσεως. Πόσα χιλιόμετρα ἔχει νὰ διατρέξῃ ἀκόμη ;

358 ) Μία αὐτοκινητάμαξα τῶν σιδηροδρόμων Πειραιῶς — Ἀθηνῶν — Πελοποννήσου διανύει 36 χιλιόμετρα τὴν ὥραν καὶ μεταβαίνει ἐκ Πειραιῶς εἰς Κόρινθον εἰς  $2 \frac{3}{4}$  ὥρας, ἂν δὲν κάμη ἐνδιαμέσους στάσεις. Πόσον εἶναι τὸ μῆκος τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Πειραιῶς — Κόρινθου ;

359 ) Μία μηχανὴ πλέκει εἰς μίαν ὥραν  $3 \frac{3}{5}$  χλγ. νήματος. Πόσον νῆμα θὰ πλέξῃ εἰς  $\frac{5}{6}$  τῆς ὥρας ;

360 ) Μία ύφαντρια ύφαίνει εις 1 ὥραν  $2\frac{1}{4}$  πήχεις ύφάσματος. Πόσον ύφασμα ύφαίνει εις  $5\frac{2}{3}$  ὥρας;

361 ) \*Ενας ἔμπορος ύφασμάτων ἠγόρασεν ἀπὸ ἕνα ύφαντουργεῖον μίαν ποσότητα ύφάσματος, τὸ ὁποῖον ἔπωλεῖτο πρὸς 120 δραχμὰς τὸν πῆχυν. \*Ἐκαμε δὲ ἡ διεύθυνσις τοῦ ύφαντουργεῖου ἔκπτωσιν ἴσην πρὸς τὰ  $\frac{12}{100}$  τῆς ἀξίας του. Πρὸς πόσον ἐπλήρωσε τὸν πῆχυν;

362 ) \*Ενας υπάλληλος ἠγόρασε  $4\frac{2}{8}$  πήχεις ύφάσματος, διὰ νὰ κάμη μίαν ἐνδυμασίαν. Τὸ ύφασμα τοῦτο ἔπωλεῖτο πρὸς 120 δρχ. τὸν πῆχυν, ἀλλ' ἔγινεν εις αὐτὸν ἔκπτωσις ἴση πρὸς τὸ  $\frac{1}{10}$  τῆς ἀξίας του. Πόσα χρήματα ἐπλήρωσεν;

363 ) Νὰ εὐρεθῆ ἄριθμὸς, τοῦ ὁποῖου τὰ  $\frac{2}{5}$  καὶ τὰ  $\frac{3}{4}$  ὁμοῦ ἀποτελοῦν τὸν ἀριθμὸν 23.

364 ) \*Ἄν ἀπὸ τὸ  $\frac{1}{4}$  ἐνὸς ἀριθμοῦ ἀφαιρέσωμεν τὸ  $\frac{1}{6}$  αὐτοῦ, εὐρίσκομεν 2. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς ἐκεῖνος;

365 ) Τὰ  $\frac{2}{5}$  τῶν  $\frac{3}{4}$  ἐνὸς ἀριθμοῦ εἶναι  $46\frac{2}{3}$ . Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς ἐκεῖνος;

366 ) Μία οἰκοκυρὰ ἠγόρασε  $\frac{3}{5}$  τοῦ χλγ. ζάκχαριν καὶ ἔδωκε 6 δραχ. Πρὸς πόσον τὸ χλγ. ἔπωλεῖτο ἡ ζάκχαρις;

367 ) Τὰ  $\frac{3}{4}$  μιᾶς φιάλης χωροῦν  $\frac{3}{8}$  τοῦ χλγ. ἐλαίου. Πόσον ἔλαιον χωρεῖ ἡ φιάλη;

368 ) \*Ενας ἔμπορος ύφασμάτων ἐπώλησε τὰ  $\frac{3}{10}$  ἐνὸς τεμαχίου ύφάσματος καὶ εἶδεν ὅτι ἔμειναν ἀκόμη  $38\frac{1}{2}$  πήχεις ἀπ' αὐτό. Πόσους πήχεις εἶχε κατ' ἀρχὰς αὐτὸ τὸ τεμάχιον;

369 ) Γεωργὸς ἠγόρασεν ἕνα κτῆμα καὶ ἐπλήρωσε 3 645 δρχ. διὰ τὰ  $\frac{5}{8}$  αὐτοῦ. Πόση ἦτο ἡ ἀξία τοῦ κτήματος;

370 ) \*Ἐνα ἐμπόρευμα ἐπωλήθη ἀντὶ 6 324 δρχ. με κέρδος ἴσον πρὸς τὰ  $\frac{5}{12}$  τῆς τιμῆς τῆς ἀγορᾶς. Νὰ εὐρεθῆ ἡ τιμὴ τῆς ἀγορᾶς.

## 6. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

§ 217. *Πρόβλημα 1ον.* "Ένα τετραγωνικόν λειβάδιον ἔχει πλευράν  $\frac{2}{5}$  τοῦ χιλιομέτρου. Νά εὑρεθῇ τὸ ἔμβαδόν αὐτοῦ.

*Λύσις.* Γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Γεωμετρίαν ὅτι: Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς τετραγώνου, πολλαπλασιάζομεν τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς του ἐπὶ τὸν ἑαυτὸν του. Τὸ λειβάδιον λοιπὸν αὐτὸ θὰ ἔχη ἔμβαδὸν  $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 5} = \frac{4}{25}$  τοῦ τετραγωνικοῦ χιλιομέτρου.

§ 218. *Πρόβλημα 2ον.* "Ένας φιλόπατρις καὶ φιλόανθρωπος "Έλλην παρήγγειλε διὰ τῆς διαθήκης αὐτοῦ τὰ ἑξῆς: Τὰ  $\frac{2}{4}$  τῆς περιουσίας του, ἢ ὁποία θὰ εὑρεθῇ μετὰ τὸν θάνατόν του, νὰ δοθοῦν εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ Ἐθνικοῦ Στόλου. Τὰ  $\frac{2}{4}$  τοῦ μεριδίου τοῦ Ἐθνικοῦ Στόλου νὰ δοθοῦν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τῆς ἰδιαιτέρας Πατρίδος του, καὶ τὰ  $\frac{2}{4}$  τοῦ μεριδίου τοῦ Νοσοκομείου εἰς τὸ σχολικὸν ταμεῖον τῆς Πατρίδος του. Νά εὑρεθῇ πόσον μέρος τῆς περιουσίας του θὰ λάβῃ τὸ σχολικὸν ταμεῖον.

*Λύσις.* Τὸ ταμεῖον τοῦ Ἐθνικοῦ Στόλου θὰ λάβῃ τὰ  $\frac{2}{4}$  τῆς περιουσίας. Τὸ Νοσοκομεῖον θὰ λάβῃ τὰ  $\frac{2}{4}$  τοῦ μεριδίου τοῦ Στόλου, ἥτοι  $\frac{2}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{2 \times 2}{4 \times 4} = \frac{4}{16}$  τῆς περιουσίας. Τὸ σχολικὸν ταμεῖον θὰ λάβῃ τὰ  $\frac{2}{4}$  τῶν  $\frac{4}{16}$ , ἥτοι  $\frac{4}{16} \times \frac{2}{4} = \frac{8}{64}$  τῆς περιουσίας.

§ 219. Τί εἶναι δύναμις κλασμάτων ἢ μεικτῶν. α') Ἀπὸ τὰ προηγούμενα παραδείγματα βλέπομεν ὅτι εἶναι δυνατόν οἱ παράγοντες ἑνὸς γινομένου νὰ εἶναι δύο ἢ περισσότερα κλάσματα ἴσα πρὸς ἓνα κλάσμα. Π.χ.

$$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}, \quad \frac{2}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{4}, \quad \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5}.$$

Αὐτὰ γράφονται συντόμως οὕτω:  $\left(\frac{2}{5}\right)^2$ ,  $\left(\frac{2}{4}\right)^3$ ,  $\left(\frac{4}{5}\right)^4$  καὶ λέγονται δυνάμεις τῶν  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{2}{4}$ ,  $\frac{4}{5}$ . Ὡστε:

Δύναμις ἐνὸς κλάσματος λέγεται κάθε γινόμενον, τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ παράγοντες εἶναι ἴσοι πρὸς τὸ κλάσμα τοῦτο.

Διατηρεῖται λοιπὸν ὁ ὀρισμὸς τῶν δυνάμεων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Ὁμοίως διατηρεῖται ὁ ὀρισμὸς τῆς βάσεως καὶ ἐκθέτου καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀναγνώσεως τῶν δυνάμεων.

$$\text{Εἶναι π. χ. } \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 5} = \frac{2^2}{5^2},$$

$$\left(\frac{4}{5}\right)^4 = \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{4 \times 4 \times 4 \times 4}{5 \times 5 \times 5 \times 5} = \frac{4^4}{5^4}.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ ὑψώσωμεν ἓνα κλάσμα εἰς μίαν δύναμιν, ὑψώνομεν καὶ τοὺς δύο ὄρους αὐτοῦ εἰς τὴν αὐτὴν δύναμιν.

β') Τὰ γινόμενα  $2\frac{3}{4} \times 2\frac{3}{4}$ ,  $5\frac{1}{6} \times 5\frac{1}{6} \times 5\frac{1}{6}$  κ.τ.λ., λέγονται δυνάμεις τῶν μεικτῶν ἀριθμῶν  $2\frac{3}{4}$ ,  $5\frac{1}{6}$  κ.τ.λ. Γράφονται δὲ συντόμως  $\left(2\frac{3}{4}\right)^2$ ,  $\left(5\frac{1}{6}\right)^3$  κ.τ.λ. Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι  $\left(2\frac{3}{4}\right)^2 = \left(\frac{11}{4}\right)^2$ ,  $\left(5\frac{1}{6}\right)^3 = \left(\frac{31}{6}\right)^3$  κ.τ.λ. Ἐπομένως:

Διὰ νὰ εὑρωμεν μίαν δύναμιν ἐνὸς μεικτοῦ, τρέπομεν αὐτὸν εἰς κλάσμα καὶ εὐρίσκομεν τὴν αὐτὴν δύναμιν τοῦ κλάσματος τοῦτου.

### Ἀ σ κ ή σ ε ι ς

371) Εὑρετε τὰς ἀκολουθούς δυνάμεις :

$$1. \left(\frac{1}{2}\right)^2, \left(\frac{1}{3}\right)^2, \left(\frac{2}{3}\right)^2. \quad 3. \left(\frac{1}{10}\right)^4, \left(\frac{1}{100}\right)^3, \left(\frac{1}{1000}\right)^2.$$

$$2. \left(\frac{1}{2}\right)^3, \left(\frac{1}{3}\right)^3, \left(\frac{2}{3}\right)^3, \quad 4. \left(4\frac{1}{2}\right)^2, \left(2\frac{2}{3}\right)^3, \left(2\frac{1}{2}\right)^4.$$

372) Νὰ γίνῃ μία δύναμις κάθε ἓνα ἀπὸ τὰ γινόμενα :

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4.$$

373) Μία ἐλαστικὴ σφαῖρα ἀφέθη νὰ πέσῃ ἀπὸ ὕψους  $\frac{2}{3}$  τοῦ μέτρου καὶ ἀναπηδᾷ εἰς τὰ  $\frac{2}{3}$  τοῦ ὕψους, ἀπὸ τὸ ὁποῖον πίπτει κάθε φοράν. Νὰ εὐρεθῇ τὸ ὕψος, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἀνυψωθῇ κατὰ τὴν τρίτην ἀναπήδησιν.

### Διάφορα προβλήματα πρὸς ἐπανάληψιν τῶν πράξεων τῶν κλασμάτων

Α' Ὁμάς. 374) Μία ράπτρια ἠγόρασε μίαν ραπτομηχανὴν ἀντὶ 3 200 δραχμῶν. Κατὰ τὴν παραλαβὴν ἐπλήρωσε τὰ  $\frac{3}{8}$  τῆς ἀξίας καὶ μετὰ μίαν τριμηνίαν ἐπλήρωσε τὰ  $\frac{3}{4}$  τῆς ἀ' δόσεως. Πόσα ἐχρεώσται ἀκόμη;

375) Ἀπὸ ἓνα κρουνὸν ρέουν  $\frac{3}{5}$  τοῦ χλγ. ὕδατος εἰς 1 λεπτὸν τῆς ὥρας. Μετὰ  $2\frac{1}{4}$  ὥρας ὁ κρουνὸς οὗτος γεμίζει τὰ  $\frac{4}{15}$  μιᾶς ὕδαταποθήκης. Πόσα χιλιόγρ. ὕδατος χωρεῖ αὐτὴ ἡ ὕδαταποθήκη;

376) Ἐνας οἰνομάγειρος εἶχε δύο βαρέλια οἴνου. Τὸ ἓνα εἶχε 250 χλγ., τὸ δὲ ἄλλο τὰ  $\frac{4}{5}$  τῶν χλγ. τοῦ πρώτου. Ὁ οἶνος αὐτὸς ἐκόστισε 2 700 δραχ. Πρὸς πόσον πρέπει νὰ πωλῆ τὸ χλγ., διὰ νὰ κερδίσῃ τὰ  $\frac{20}{100}$  τοῦ κόστους;

377) Ἐνας παντοπώλης πωλεῖ τὸ ἔλαιον πρὸς 20 δραχμὰς τὸ χλγ. Ἀπὸ τὸ ἔλαιον ἑνὸς βαρελίου ἔμειναν τὰ  $\frac{7}{10}$  αὐτοῦ, ἀπὸ δὲ τὸ πωληθὲν εἰσέπραξε 2 100 δραχμὰς. Πόσον ἔλαιον χωρεῖ αὐτὸ τὸ βαρέλιον;

378) Παρατηρήθη ὅτι τὰ ἄλευρα μιᾶς ποιότητος ἀπορροφοῦν ὕδωρ ἴσον πρὸς  $\frac{55}{100}$  τοῦ βάρους των κατὰ τὴν ζύμωσιν. Πόσῃν ζύμην παράγει ἓνας ἄρτοποιὸς μὲ  $85\frac{3}{5}$  χλγ. ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἄλευρα;

379) Παρατηρήθη ὅτι ἡ ζύμη χάνει τὸ  $\frac{1}{40}$  τοῦ βάρους αὐτῆς, ὅταν ψήνηται. Πόσαι ὀκάδες ἄρτου γίνονται ἀπὸ 100 ὀκ. ἄλευρα τῆς ποιότητος, διὰ τὴν ὁποίαν ὀμιλεῖ τὸ προηγούμενον πρόβλημα, χωρὶς νὰ ὑπολογισθῇ τὸ περιεχόμενον ἄλας;

380) Ἐνας παντοπώλης εἶχε ἓνα βαρέλιον τυροῦ. Ὄταν τὸ ἤνοιξεν ἐπώλησε τὰ  $\frac{3}{7}$  αὐτοῦ. Τὴν ἄλλην ἡμέραν ἐπώλησε τὰ  $\frac{3}{7}$  τοῦ προηγούμενης πωληθέντος. Οὕτω δὲ ἔμειναν ἀκόμη  $10\frac{6}{7}$  χλγ. Πόσον τυρὸν εἶχε κατ' ἀρχὰς αὐτὸ τὸ βαρέλιον;

Β' 'Ο μ α ς. 381 ) 'Ο ιδιοκτήτης μιᾶς οἰκίας εἰσπράττει ὡς ἐνοίκιον ἀπὸ κάθε πατώμα τὰ  $\frac{5}{6}$  τοῦ ἐνοικίου τοῦ ἀμέσως ὑψηλοτέρου πατώματος. Ἡ οἰκία του ἔχει 4 ἐνοικιαζόμενα πατώματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ μηνιαῖον ἐνοίκιον ὑπολογίζεται μὲ ἀκρίβειαν εἰς δραχμὰς 5 591  $\frac{2}{3}$ . Νὰ εὑρεθῇ τὸ ἐνοίκιον κάθε πατώματος.

382 ) \*Ένας παράξενος ὀρειβάτης ἠρωτήθη πόσον ὕψος ἔχει ὁ \*Όλυμπος καὶ ἀπήντησεν : Ἀνήλθον εἰς αὐτὸν 1 750  $\frac{1}{5}$  μέτρα καὶ ὑπελόγησα ὅτι ἕως τὴν κορυφὴν εἶναι ἀκόμη τὰ  $\frac{2}{3}$  τῶν  $\frac{3}{4}$  τῶν  $\frac{4}{5}$  τοῦ ὕψους τοῦ \*Όλύμπου. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὕψος αὐτό.

383 ) Μία πόλις ἔχει σήμερον 74 025 κατοίκους. Πόσους κατοίκους εἶχε πρὸ δέκα ἐτῶν, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι κατὰ τὸ χρονικὸν αὐτὸ διάστημα ὁ πληθυσμὸς τῆς ηὔξήθη κατὰ τὰ  $\frac{5}{16}$  τοῦ ἀρχικοῦ;

384 ) Οἰνοπώλης ἐπώλησε τὰ  $\frac{3}{7}$  τοῦ οἴνου του καὶ εἰσέπραξεν 864 δραχ. Πόσον θὰ εἰσέπραττεν, ἐὰν ἐπώλει τὰ  $\frac{9}{14}$  αὐτοῦ ;

385 ) \*Έμπορος ἐπώλησε τὰ  $\frac{5}{8}$  ἐνὸς ὑφάσματος καὶ τοῦ ἔμειναν 27 μέτρα. Πόσα μέτρα ἦτο τὸ ὕφασμα καὶ πόσα εἰσέπραξεν ἐκ τοῦ πωληθέντος πρὸς 68 δραχ. τὸ μέτρον ;

Γ' 'Ο μ α ς. 386 ) \*Έπλήρωσέ τις ἀπέναντι ἐνὸς χρέους τρεῖς δόσεις. Ἡ α' δόσις ἦτο ἴση μὲ τὰ  $\frac{3}{8}$  τοῦ χρέους, ἡ β' 16 500 δραχ. καὶ ἡ γ' 26 250 δραχ. Αἱ τρεῖς δόσεις μαζί ἀνέρχονται εἰς 72 750 δραχ. Πόσον ἦτο τὸ χρέος ;

387 ) Μία κληρονομία διενεμήθη μεταξὺ 3 κληρονόμων. 'Ο α' ἔλαβε τὰ  $\frac{3}{8}$  αὐτῆς, ὁ β' τὰ  $\frac{2}{5}$  αὐτῆς καὶ ὁ γ' τὸ ὑπόλοιπον. Νὰ εὑρεθῇ τὸ μερίδιον ἐκάστου κληρονόμου, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι ὁ α' ἔλαβεν 876 000 δραχμὰς.

388 ) \*Έπλήρωσέ τις τὸ  $\frac{1}{3}$  ἐνὸς χρέους του, ἔπειτα τὰ  $\frac{2}{5}$  καὶ τέλος τὰ  $\frac{2}{15}$  αὐτοῦ, ἦτοι ἐν ὅλῳ 78 000 δραχ. Πόσον ἦτο τὸ χρέος του καὶ πόσον ὀφείλει ἀκόμη ;

Δ' 'Ο μ α ς. 389 ) Κτηνοτρόφος ἐπώλησε 2 βόας καὶ 54 πρόβατα ἀντὶ 21 000 δραχ. Ἡ τιμὴ τῶν βοῶν ἦτο τὰ  $\frac{15}{27}$  τῆς τιμῆς

όλων τῶν προβάτων. Πόσον ἐπώλησε κάθε βοῦν καὶ πόσον κάθε πρόβατον ;

390 ) Κτηνοτρόφος ἠγόρασεν 86 πρόβατα ἀντὶ 21 600 δρχ. Τὰ 6 πρόβατα ἀπέθανον καὶ παρὰ τὴν ἀπώλειαν αὐτὴν ὁ κτηνοτρόφος θέλει νὰ κερδίσῃ τὸ  $\frac{1}{15}$  τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς τῶν προβάτων. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ ἕκαστον τῶν ὑπολοίπων προβάτων ;

391 ) \*Εμπορος ἠγόρασεν 120 μ. ὑφάσματος ἀντὶ 5 520 δρχ. \*Ἐπώλησε τὸ  $\frac{1}{4}$  αὐτοῦ πρὸς 45 δρχ. τὸ μέτρον, τὸ  $\frac{1}{5}$  αὐτοῦ πρὸς 54 δρχ. τὸ μέτρον καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 48 δρχ. τὸ μέτρον. \*Ἐκέρδισεν ἢ ἔχασεν ἐκ τῆς πωλήσεως αὐτοῦ καὶ πόσα ;

Ε' Ὁ μ ἄ ς. 392 ) \*Ἐργάτης δύναται νὰ ἐκτελέσῃ ἓνα ἔργον εἰς 8 ἡμ. Δεύτερος ἔργατης δύναται νὰ ἐκτελέσῃ τὸ αὐτὸ ἔργον εἰς 5 ἡμ. \*Ἐὰν ἐργασθοῦν συγχρόνως, εἰς πόσας ἡμέρας δύνανται νὰ ἐκτελέσουν τὸ ἔργον ;

393 ) \*Ἐργάτης ἐκτελεῖ τὰ  $\frac{2}{3}$  ἐνὸς ἔργου εἰς 9 ἡμέρας. \*Ἄλλος ἔργατης ἐκτελεῖ τὰ  $\frac{5}{8}$  τοῦ αὐτοῦ ἔργου εἰς 5 ἡμ. Εἰς πόσας ἡμέρας δύνανται νὰ ἐκτελέσουν τὸ ὅλον ἔργον, ἐὰν ἐργασθοῦν καὶ οἱ δύο συγχρόνως ;

394 ) \*Ἡρώτησάν τινα πόσων ἐτῶν εἶναι καὶ ἀπήνησεν ὡς ἑξῆς: Τὰ  $\frac{2}{3}$  καὶ τὰ  $\frac{3}{4}$  τῆς ἡλικίας μου κάμνουν 68 ἔτη. Πόσων ἐτῶν ἦτο;

395 ) \*Ἐνα βαρέλιον περιέχει οἶνον κατὰ τὰ  $\frac{3}{4}$ . \*Ἀδειάζομεν τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ περιεχομένου οἴνου καὶ μένουں ἀκόμη εἰς αὐτὸ 280 χλγ. Πόσα χλγ. οἴνου χωρεῖ ὀλόκληρον τὸ βαρέλιον ;

396 ) Τὰ  $\frac{3}{5}$  ἐνὸς ἀριθμοῦ εἶναι 362. Τὰ  $\frac{3}{4}$  ἐνὸς ἄλλου εἶναι 248. Ποῖον εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν δύο ἀριθμῶν ;

397 ) Νὰ εὑρεθῇ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος αὐξανόμενος κατὰ τὸ  $\frac{1}{5}$  αὐτοῦ γίνεται 720.

398 ) Τὸ  $\frac{1}{3}$  καὶ τὰ  $\frac{3}{8}$  ἐνὸς ποσοῦ εἶναι 1 700 δρχ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ ποσοῦν τοῦτο.

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

### ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΑΡΙΘΜΟΥ, ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

##### 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

§ 220. Όρισμοί. Αί κλασματικά μονάδες  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{1000}$ , αἱ ὅποιοι ἔχουν παρονομαστήν τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ ἓνα ἢ περισσότερα μηδενικά, λέγονται **δεκαδικαὶ κλασματικαὶ μονάδες**.

Τὰ κλάσματα  $\frac{3}{10}$ ,  $\frac{51}{100}$ ,  $\frac{25}{1000}$  εἶναι μικρότερα τῆς ἀκεραίας μονάδος καὶ ἔχουν παρονομαστήν τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ ἓνα ἢ περισσότερα μηδενικά. Τὰ κλάσματα αὐτὰ λέγονται **δεκαδικὰ κλάσματα**. Ὡστε :

Δεκαδικὸν κλάσμα λέγεται **κάθε κλάσμα**, τοῦ ὁποίου ὁ παρονομαστής εἶναι ἡ μονὰς ἀκολουθουμένη ἀπὸ ἓνα ἢ περισσότερα μηδενικά.

Τὰ μέχρι τοῦδε γνωστὰ κλάσματα λέγονται **κοινὰ κλάσματα**.

Π.χ. τὸ κλάσμα  $\frac{827}{1000}$  εἶναι ἓνα δεκαδικὸν κλάσμα, τὸ δὲ  $\frac{1}{8}$  εἶναι ἓνα κοινὸν κλάσμα.

Τὸ δεκαδικὸν κλάσμα λαμβάνεται πάντοτε μικρότερον τῆς ἀκεραίας μονάδος.

§ 221. Δεκαδικὸς ἀριθμὸς. Ὁ ἀριθμὸς  $15\frac{37}{100}$  ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἀκεραῖον 15 καὶ ἀπὸ τὸ δεκαδικὸν κλάσμα  $\frac{37}{100}$  Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς λέγεται **δεκαδικὸς ἀριθμὸς**.

**Κάθε αριθμός, ό οποίος αποτελείται από ένα άκεραίο και από ένα δεκαδικόν κλάσμα, λέγεται δεκαδικός αριθμός.**

Ο άκεραίος αριθμός ενός δεκαδικού αριθμού λέγεται **άκεραίο μέρος** του δεκαδικού αριθμού. Το δέ δεκαδικόν κλάσμα αυτού λέγεται **δεκαδικόν μέρος** αυτού.

Κατ' επέκτασιν και ένα δεκαδικόν κλάσμα θεωρείται ως δεκαδικός αριθμός, του οποίου το άκεραίο μέρος είναι μηδέν.

§ 222. **Δεκαδικαί μονάδες διαφόρων τάξεων.** Έστωσαν αί διαδοχικαί δεκαδικαί κλασματικά μονάδες.

$$\frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10000} \dots$$

Τά δέκατα λέγονται δεκαδικαί μονάδες τής πρώτης τάξεως

Τά έκατοστά » » » » δευτέρας »

Τά χιλιοστά » » » » τρίτης »

κ.ο.κ.

Από τας ισότητας π.χ.  $\frac{1}{10} = \frac{10}{100} = \frac{1}{100} \times 10$ ,

$$\frac{1}{100} = \frac{10}{1000} = \frac{1}{1000} \times 10 \text{ κτλ. βλέπομεν ότι:}$$

**Κάθε μονάς μιᾶς τυχούσης δεκαδικῆς τάξεως είναι ἴση με δέκα μονάδας τῆς ἐπομένης δεκαδικῆς τάξεως.**

*Καί ἀντιστρόφως :*

**Κάθε μονάς μιᾶς τυχούσης δεκαδικῆς τάξεως είναι ἴση με τὸ δέκατον τῆς προηγούμενης δεκαδικῆς μονάδος.**

§ 223. Πῶς γράφομεν δεκαδικόν ἀριθμόν ὑπὸ δεκαδικῆν μορφήν. Έστω ὁ δεκαδικός ἀριθμός  $3 + \frac{456}{1000}$  ἢ  $\frac{3456}{1000}$ .

Ἐπειδὴ ὁ ἀριθμητῆς 3 456 εἶναι ἴσος με  $3000 + 400 + 50 + 6$ , θά εἶναι:  $\frac{3456}{1000} = \frac{3000}{1000} + \frac{400}{1000} + \frac{50}{1000} + \frac{6}{1000}$  ἢ  $\frac{3456}{1000} = 3 + \frac{4}{10} + \frac{5}{100} + \frac{6}{1000}$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι κάθε δεκαδικός ἀριθμός δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς ἄθροισμα ἑνὸς ἀκεραίου ἀριθμοῦ (ὁ ὁποῖος δύναται νὰ μὴ ὑπάρχη, ἐάν τὸ δεκαδικόν κλάσμα εἶναι μικρότερον τῆς ἀκεραίας μονάδος) καὶ δεκαδικῶν κλασμάτων.

Ἐμάθομεν (§ 17) ὅτι, διὰ νὰ γράψωμεν τοὺς ἀκεραίους ἀριθμούς, ἐστηρίχθημεν εἰς τὴν ἐξῆς συνθήκην: «Κάθε ψηφίον γραφόμενον ἀμέσως πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἄλλου παριστάνει μονάδας τῆς ἀμέσως

άνωτέρας τάξεως». Ἐπεκτείνοντες λοιπὸν αὐτὴν τὴν συνθήκην καὶ εἰς τοὺς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς δυνάμεθα νὰ γράψωμεν αὐτοὺς χωρὶς παρονομαστῶς.

Πρὸς τοῦτο δεξιὰ τοῦ ἀκεραίου ἀριθμοῦ γράφομεν ὑποδιαστολήν (,) καὶ δεξιὰ ταύτης τὰ δέκατα, ἔπειτα τὰ ἑκατοστὰ κ.ο.κ.

Ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἀκέραιαι μονάδες ἢ ἄλλη τις δεκαδικὴ μονὰς ἄνωτέρα τῆς τελευταίας, θέτομεν εἰς τὴν θέσιν τῆς 0.

Κατὰ τὰ ἄνωτέρω θὰ εἶναι  $\frac{3\ 456}{1\ 000} = 3,456$ . Θὰ λέγωμεν δὲ ὅτι ἐγράφωμεν τὸν δεκαδ. ἀριθμὸν  $3 + \frac{456}{1\ 000}$  ἢ  $\frac{3\ 456}{1\ 000}$  ὑπὸ **δεκαδικὴν μορφήν**.

Τὰ ψηφία, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται δεξιὰ τῆς ὑποδιαστολῆς, λέγονται **δεκαδικὰ ψηφία**.

Ἐκ τῶν ἄνωτέρω συνάγομεν τὸν κάτωθι κανόνα :

Διὰ νὰ γράψωμεν ἓνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἢ ἓνα δεκαδικὸν κλάσμα ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν, γράφομεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ δοθέντος κλάσματος καὶ χωρίζομεν ἀπὸ τὰ δεξιὰ του πρὸς τὰ ἀριστερὰ διὰ μιᾶς ὑποδιαστολῆς τόσα ψηφία, ὅσα μηδενικὰ ἔχει ὁ παρονομαστής.

Ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς δὲν ἔχη ἄρκετὰ ψηφία, διὰ νὰ ἐφαρμοσθῇ ὁ κανὼν, γράφομεν πρὸς τὰ ἀριστερὰ του, ὅσα μηδενικὰ χρειάζονται.

Κατὰ τὸν ἄνωτέρω κανόνα θὰ εἶναι :

$$\frac{3\ 704}{10} = 370,4 \quad \frac{5\ 764}{1\ 000} = 5,764 \quad \frac{321}{10\ 000} = 0,0321 \quad \frac{25}{1\ 000} = 0,025$$

$$24 + \frac{3}{100} = \frac{2\ 403}{100} = 24,03 \quad 156 + \frac{17}{100} = \frac{15\ 617}{100} = 156,17.$$

§ 224. Πῶς γράφομεν ἓνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν ὑπὸ μορφήν δεκαδικοῦ κλάσματος. Γνωρίζομεν ὅτι  $3 + \frac{75}{100} = 3,75$ . Ἐὰν ἀλλάξωμεν τὰ μέλη αὐτῆς τῆς ἰσότητος, θὰ εἶναι  $3,75 = 3 + \frac{75}{100} = \frac{375}{100}$

Ὅμοιως εὐρίσκομεν ὅτι  $0,0048 = \frac{48}{10\ 000}$ .

Ἀπὸ τὰ ἄνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ γράψωμεν ἓνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος ἔχει δεκαδικὴν μορφήν, ὑπὸ μορφήν δεκαδικοῦ κλάσματος, παραλείπομεν τὴν ὑποδιαστολήν καὶ τὸν οὕτω προκύπτοντα ἀριθμὸν θέτομεν ὡς ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ θέτομεν τὴν μονάδα ἀκο-

λουθουμένην ἀπὸ τόσα μηδενικά, ὅσα εἶναι τὰ δεκαδικὰ ψηφία τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ.

Κατὰ τὸν κανόνα αὐτὸν θὰ εἶναι :

$$48,7 = \frac{487}{10}, 0,19 = \frac{19}{100}, 3,009 = \frac{3\,009}{1\,000}, 0,0007 = \frac{7}{10\,000}.$$

**§ 225. Ἀπαγγελία δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ.** 1ον. Ἐπειδὴ 3,765 =  $\frac{3\,765}{1\,000}$ , ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 3,765 ἀπαγγέλλεται 3 765 **χιλιοστά**. Δηλαδή ἀπαγγέλλομεν τὸν ἀριθμὸν, ὁ ὅποιος προκύπτει, ἂν παραλείψωμεν τὴν ὑποδιαστολήν, καὶ δίδομεν εἰς αὐτὸν τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τῆς τελευταίας τάξεως.

2ον. Ἐπειδὴ  $4,58 = 4 + \frac{5}{10} + \frac{8}{100}$ , ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 4,58 ἀπαγγέλλεται 4 **ἀκέραιαι μονάδες**, 5 **δέκατα** καὶ 8 **ἐκατοστά**. Δηλαδή ἀπαγγέλλομεν χωριστὰ κάθε ψηφίον μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων, τὰς ὁποίας τοῦτο παριστᾷ.

3ον. Ἐπειδὴ  $35,74 = 35 + \frac{74}{100}$ , ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 35,74 ἀπαγγέλλεται: 35 **ἀκέραιος** καὶ 74 **ἐκατοστά**. Δηλαδή ἀπαγγέλλομεν πρῶτον τὸ ἀκέραιον μέρος του καὶ ἔπειτα τὸ δεκαδικόν του, δίδοντες εἰς αὐτὸ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τῆς τελευταίας τάξεως.

**Σημείωσις.** Εἰς τὴν πρᾶξιν χρησιμοποιοῦμεν συνήθως μίαν **τελείως ἐσφαλμένην** ἀπαγγελίαν, ἀλλὰ πολὺ συντομωτέραν.

Π.χ. διὰ τοὺς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς :

2,15	λέγομεν :	2 κόμμα 15
4,075	»	4 κόμμα μηδὲν 75
48,00259	»	48 κόμμα μηδὲν μηδὲν 259.

### Ἀσκήσεις

399 ) Νὰ γραφοῦν ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν τὰ δεκαδικὰ κλάσματα:

$$\frac{3}{10}, \frac{25}{100}, \frac{32}{1\,000}, \frac{248}{1\,000}, \frac{45}{10\,000}.$$

400 ) Νὰ γραφοῦν ὑπὸ μορφήν δεκαδικῶν κλασμάτων οἱ κάτωθι δεκαδικοὶ ἀριθμοί :

0,470 0,758 0,4235 0,03012 2,43 45,72 8,654 125,3.

401 ) Νὰ γραφοῦν ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν: 3 ἐκατοστά· 2002 χιλιοστά· 564 δεκάκις χιλιοστά· 4 ἀκέραιος καὶ 75 χιλιοστά· 125

ἀκέραιος καὶ 3 ἑκατοντάκις χιλιοστά· 368 ἀκέραιος καὶ 12 ἑκατομμυριοστά.

402 ) 1ον. Νὰ τραποῦν 2,5 εἰς δέκατα, εἰς χιλιοστά, εἰς δεκάκις χιλιοστά. 2ον. Νὰ τραποῦν 0,605 εἰς ἑκατομμυριοστά.

## 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 226. Ἰδιότης I. Ἐστω τὸ δεκαδικὸν κλάσμα  $\frac{35}{100}$ . Ἐπειδὴ  $\frac{35}{100} = \frac{350}{1000} = \frac{3500}{10000}$ , ἔπεται ὅτι  $0,35 = 0,350 = 0,3500$ . Εἶναι δὲ φανερὸν ὅτι  $04 = 4$ . Ἐπίσης  $4,6 = 04,6$ .

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα :

Ἡ ἀξία ἑνὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ δὲν μεταβάλλεται, ἂν γράψωμεν ὅσαδήποτε μηδενικά εἰς τὸ τέλος ἢ εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, ἢ παραλείψωμεν τὰ ὑπάρχοντα εἰς τὸ τέλος μηδενικά.

§ 227. Ἰδιότης II. Πῶς πολλαπλασιάζομεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1 000 κ.τ.λ. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν δεκαδικὸν ἀριθμὸν 3,25 ἐπὶ 10. Ἐπειδὴ  $3,25 = \frac{325}{100}$  θὰ εἶναι:  $3,25 \times 10 = \frac{325}{100} \times 10 = \frac{325}{10} = 32,5$ . Ὀμοίως εὐρίσκομεν ὅτι  $4,358 \times 100 = 435,8$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν κάτωθι ἰδιότητα :

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1 000 κ.τ.λ., ἀρκεῖ νὰ μεταθέσωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν τοῦ πρὸς τὰ δεξιὰ τόσας θέσεις, ὅσα μηδενικά ἀκολουθοῦν τὴν μονάδα. Ἄν δὲ δὲν ἔχη ὁ ἀριθμὸς ἐπαρκῆ ψηφία, ἀναπληρώνομεν τὰ ἐλλείποντα μὲ μηδενικά.

§ 228. Ἰδιότης III. Πῶς διαιρεῖται δεκαδικὸς ἀριθμὸς διὰ 10, 100, 1 000 κ.τ.λ. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν δεκαδικὸν ἀριθμὸν 7,48 διὰ 100. Ἐπειδὴ  $7,48 = \frac{748}{100}$ , θὰ εἶναι :  $7,48 : 100 = \frac{748}{100} : 100 = \frac{748}{100 \times 100} = \frac{748}{10000} = 0,0748$ .

Ὀμοίως εὐρίσκομεν ὅτι  $549,35 : 10 = 54,935$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἓνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν διὰ 10, 100, 1 000, ... μεταθέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν πρὸς τὰ ἀριστερὰ τόσας θέσεις, ὅσα μηδενικὰ ἀκολουθοῦν τὴν μονάδα. Ἐὰν δὲ δὲν ὑπάρχουν ἀρκετὰ ψηφία, γράφομεν εἰς τὴν ἀρχὴν του, ὅσα μηδενικὰ χρειάζονται.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν θὰ ἔχωμεν :

$$56,75 : 1\ 000 = 0,05675 \quad 0,7 : 10 = 0,07 \text{ κ.τ.λ.}$$

*Παρατήρησις.* Αἱ προηγούμεναι ιδιότητες δύνανται νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ εἰς τοὺς ἀκεραίους ἀριθμούς, ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι κάθε ἀκέραιος ἀριθμὸς δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς δεκαδικὸς ἀριθμὸς, τοῦ ὁποῦ τοῦ δεκαδικὸν μέρος ἀποτελεῖται ἀπὸ μηδενικὰ ( διατί ; )  
Θὰ ἔχωμεν λοιπόν :

- I.  $48 = 48,0 = 48,00$
- II.  $48 \times 10 = 480, \quad 48 \times 100 = 4\ 800$
- III.  $48 : 10 = 4,8 \quad 48 : 100 = 0,48.$

### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

403 ) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ κάτωθι γινόμενα :

1.  $6,375 \times 100, \quad 0,094 \times 1\ 000, \quad 0,3 \times 10\ 000$
2.  $0,008 \times 100, \quad 325,07 \times 1\ 000, \quad 4,02 \times 10\ 000.$

404 ) Νὰ γραφοῦν ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοί :  
5, 49, 475, 607.

405 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι διαιρέσεις :

1.  $45,7 : 10, \quad 125,75 : 100, \quad 4\ 706,5 : 1\ 000$
2.  $0,78 : 10, \quad 348,09 : 100, \quad 0,4874 : 1\ 000.$

406 ) Τί παθαίνει ὁ ἀριθμὸς 35,6 ἂν παραλείψωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν ;

407 ) Ἐὰν τὰ 1 000 πορτοκάλια τιμῶνται 1 250 δρχ., πόσον τιμᾶται τὸ ἓνα ; πόσον τὰ 10 ; καὶ πόσον τὰ 100 ;

408 ) Νὰ τραποῦν 18,5 χιλιόμετρα εἰς μέτρα.

### 3. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 229 Ἡ πρόσθεσις καὶ ἡ ἀφαίρεσις τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν ὀρίζεται, ὅπως ἡ πρόσθεσις καὶ ἡ ἀφαίρεσις τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν.

§ 230. Πρόσθεσις δεκαδικῶν. Παράδειγμα 1ον. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα  $85,7 + 124,56 + 0,749$ . Τὸ ἄθροισμα αὐτὸ γράφεται :

$$\frac{857}{10} + \frac{12456}{100} + \frac{749}{1000} \text{ ἢ } \frac{85700}{1000} + \frac{124560}{1000} + \frac{749}{1000} \text{ ἢ } \frac{85700 + 124560 + 749}{1000} = \frac{211009}{1000} = 211,009.$$

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ὀδηγοῦμεθα νὰ γράφωμεν τοὺς ἀριθμοὺς τὸν ἓνα κάτωθι τοῦ ἄλλου εἰς τρόπον, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην, νὰ προσθέτωμεν ἔπειτα αὐτοὺς, ὡς νὰ ἦσαν ἀκέραιοι, καὶ νὰ θέτωμεν εἰς τὸ ἔξαγόμενον μίαν ὑποδιαστολὴν εἰς τὴν στήλην τῶν ὑποδιαστολῶν τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

	Διάταξις τῆς πράξεως	
	85,700	85,7
	124,560	124,56
	0,749	ἢ συντόμως 0,749
ἄθροισμα	211,009	211,009

Παράδειγμα 2ον. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ προσθέσωμεν τοὺς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς 4,754 75,635 καὶ 0,211.

	Διάταξις τῆς πράξεως	
	4,754	
	75,635	
	0,211	
ἄθροισμα	80,600	

Δυνάμεθα νὰ παραλείψωμεν τὰ μηδενικά, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται εἰς τὸ τέλος τοῦ ἄθροισματος· ἐπομένως τὸ ἄθροισμα τῶν δοθέντων δεκαδικῶν ἀριθμῶν εἶναι 80,6.

#### \* Ασκήσεις

Α' Ὀμάς. 409 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν ἀπὸ μνήμης αἱ κάτωθι προσθέσεις :

$47,3 + 52,9$	$142,8 + 35,1$	$453,6 + 18,4$
$120,25 + 40,6$	$36,54 + 32,7$	$100,85 + 0,2$

410 ) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ κάτωθι ἀθροίσματα,

$$1. 72,804 + 0,0487 + 3,252 + 356,4 + 1\ 800$$

$$2. 504,18 + 503,81 + 85,17 + 48,97 + 49,001.$$

Β' Ὁ μ ἄ ς. 411 ) Τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος ἔχουν μῆκος πρὸς τὴν Ἀλβανίαν 250,5 χιλιόμε. Πρὸς τὴν Γιουγκοσλαβίαν 236,8 χιλιόμε. καὶ πρὸς τὴν Βουλγαρίαν 480,5 χιλιόμε. Νὰ εὐρεθῆ τὸ μῆκος τῆς μεθορίου γραμμῆς μετὰ αὐτὰς τὰς χώρας.

412 ) \*Ἐμπορος ἠγόρασεν 28,5 μέτρα ὑφάσματος ἀντὶ 845,75 δραχμῶν, 14,75 μ. ἄλλου ὑφάσματος ἀντὶ 560 δραχ. καὶ τέλος 43,80 μ. ἀντὶ 790,50 δραχ. Πόσα μέτρα ἠγόρασε καὶ πόσα ἐπλήρωσε ἐν ὄλῳ;

413 ) Παντοπώλης διέθεσε 328,75 δραχ. διὰ νὰ ἀγοράσῃ ζάχαριν, 2 756,50 δραχ. δι' ἔλαιον καὶ 504,8 δραχ. δι' ὄσπρια. Ἐὰν θέλῃ νὰ κερδίσῃ τὸ δέκατον τῆς ἀξίας τῶν εἰδῶν αὐτῶν, νὰ εὐρεθῆ πόσα πρέπει νὰ εἰσπράξῃ ἐν ὄλῳ ἀπὸ τὴν πώλησιν.

§ 231. Ἀφαίρεσις δεκαδικῶν ἀριθμῶν. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἀπὸ δεκαδικόν, γράφομεν τὸν ἀφαιρετέον κάτωθι τοῦ μειωτέου οὕτως, ὥστε αἱ ὑποδιαστολαὶ τῶν νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην. Ἐκτελοῦμεν ἔπειτα τὴν ἀφαίρεσιν, ὅπως εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν καὶ θέτομεν εἰς τὸ ἐξαγόμενον μίαν ὑποδιαστολὴν κάτωθι τῶν δύο προηγουμένων ὑποδιαστολῶν.

Παράδειγμα. 1ον. \*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρώμεν τὴν διαφορὰν 4725,758 — 840,89.

$$\begin{array}{r} \text{Διάταξις τῆς πράξεως} \\ 4\ 725,758 \\ \underline{840,89} \\ \text{Διαφορὰ} \quad 3\ 884,868 \end{array}$$

Παράδειγμα 2ον. \*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρώμεν τὴν διαφορὰν 135,4 — 72,658.

$$\begin{array}{r} \text{Διάταξις τῆς πράξεως} \\ 135,4 \qquad \qquad \qquad 135,400 \\ \underline{72,658} \qquad \qquad \eta \qquad \underline{72,658} \\ \text{Διαφορὰ} \qquad \qquad \underline{62,742} \end{array}$$

Εἰς τὸ παράδειγμα αὐτὸ συνεπληρώσαμεν τὰ ἐλλείποντα δεκαδικὰ ψηφία τοῦ μειωτέου μὲ μηδενικά.

*Σημείωσις.* Ἡ ἐξήγησις τοῦ κανόνος τῆς ἀφαιρέσεως γίνεται ὅπως εἰς τὴν πρόσθεσιν.

### Ἀσκήσεις

Α' Ὁμάς. 414 ) Νὰ εὑρεθοῦν ἀπὸ μνήμης αἱ κάτωθι διαφοραί :

$$1. 0,85 - 0,30 \quad 4,25 - 2,10 \quad 25,75 - 12,60$$

$$2. 6,75 - 2,30 \quad 7,35 - 2,75 \quad 12 - 9,05.$$

415 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι ἀφαιρέσεις καὶ νὰ γίνουν αἱ δοκιμαὶ των :

$$1. 375 - 148,90 \quad 1\ 764 - 895,45 \quad 7 - 6,375$$

$$2. (85,40 + 75,65) - (18,45 + 104,95).$$

Β' Ὁμάς. 416 ) Ἡγόρασέ τις ἀπὸ παντοπωλὴν ἔλαιον ἀξίας 36,40 δρχ. καὶ ζάχαριν ἀξίας 18,75 δρχ. καὶ ἔδωκε τρία χαρτονομίσματα τῶν 20 δρχ. Πόσα θὰ λάβῃ ὑπόλοιπον (ρέστα) ;

417 ) Ὁ Γεώργιος εἶχε 15,60 δρχ. καὶ ἐξώδευσε 4,75 δρχ. Ὁ Παῦλος εἶχε 3,45 δρχ. καὶ ἔλαβεν ἀκόμη 8,90 δρχ. Ποῖος ἔχει περισσότερα καὶ πόσα ;

### 4. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 232. Πῶς πολλαπλασιάζονται δεκαδικοὶ ἀριθμοί. *Παράδειγμα 1ον.* Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμόν  $24,75 \times 5$ . Ἐπειδὴ  $24,75 = \frac{2\ 475}{100}$ , θὰ εἶναι :

$$24,75 \times 5 = \frac{2\ 475}{100} \times 5 = \frac{2\ 475 \times 5}{100} = \frac{12\ 375}{100} = 123,75.$$

*Παράδειγμα 2ον.* Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὑρωμεν τὸ γινόμενον  $16,75 \times 3,5$ . Ἐπειδὴ  $16,75 = \frac{1\ 675}{100}$  καὶ  $3,5 = \frac{35}{10}$ , θὰ εἶναι :

$$16,75 \times 3,5 = \frac{1\ 675}{100} \times \frac{35}{10} = \frac{1\ 675 \times 35}{100 \times 10} = \frac{58\ 625}{1\ 000} = 58,625.$$

Ἀπὸ τὰ δύο ἀνωτέρω παραδείγματα συνάγομεν τὸν κάτωθι κανόνα :

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ ἀκέραιον ἢ δύο δεκαδικούς ἀριθμούς, πολλαπλασιάζομεν αὐτούς, ὡς νὰ ἦσαν ἀκέραιοι, καὶ χωρίζομεν ἔπειτα μὲ ὑποδιαστολὴν ἀπὸ τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουν καὶ οἱ δύο παράγοντες.

Ἡ διάταξις τῶν πράξεων τῶν δύο προηγουμένων παραδειγμάτων γίνεται ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{r}
 24,75 \\
 \quad 5 \\
 \hline
 123,75 \\
 \\
 16,75 \\
 \quad 3,5 \\
 \hline
 8375 \\
 \quad 5025 \\
 \hline
 58,625
 \end{array}$$

### Ἀσκήσεις

A' Ὁ μ ἄ ς : 418 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ κάτωθι πολλαπλασιασμοί :

$$354 \times 8,2 \qquad 4\,506 \times 0,75 \qquad 1\,008 \times 6,405$$

$$96,007 \times 18,208 \qquad 1,25 \times 4,009 \qquad 190,058 \times 0,94$$

B' Ὁ μ ἄ ς. 419 ) Τὸ μέτρον ἑνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 14,5 δρχ. Πόσον τιμῶνται τὰ 15,4 μέτρα τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ;

420 ) Ἰδιοκτῆτης ἐπώλησεν 25 δέματα χόρτου τῶν 48 χλγ. ἕκαστον πρὸς 1,60 δρχ. τὸ χλγ. Πόσον θὰ λάβῃ ;

421 ) Ἠγόρασε τις 3 χλγ. ζυμαρικά πρὸς 6,4 δρχ. τὸ χλγ. καὶ ἔδωσεν ἓνα χαρτονόμισμα τῶν 20 δραχ. Πόσον θὰ λάβῃ ὑπόλοιπον ;

422 ) Ἐνα αὐτοκίνητον, μὲ ταχύτητα 25,6 χιλιόμετρα τὴν ὥραν, ἔκαμε 5,6 ὥρας, διὰ νὰ μεταβῇ ἀπὸ τὰς Ἀθήνας εἰς τὸ Ἄργος. Νὰ εὐρεθῇ ἡ ἀπόστασις τοῦ Ἄργους ἀπὸ τῶν Ἀθηνῶν.

423 ) Οἰκογενειάρχης ἠγόρασε 12,60 μέτρ. ὑφάσματος πρὸς 24,50 δρχ. τὸ μέτρον καὶ 4,25 μ. ἄλλου ὑφάσματος πρὸς 14,5 δρχ. τὸ μέτρον. Πόσα πρέπει νὰ πληρώσῃ ἐν ὄλῳ ;

424 ) Μία ἐργάτρια ὑφαίνει 3,25 μ. ὑφάσματος τὴν ἡμέραν καὶ λαμβάνει 8,75 δρχ. κατὰ μέτρον. Πόσον θὰ λάβῃ, ἐὰν ἐργασθῇ 25 ἡμέρας ;

425 ) Ἐργοστασιάρχης χρησιμοποιεῖ εἰς τὸ ἐργοστάσιόν του 18 ἀνδρας καὶ 12 γυναίκας. Τὸ ἡμερομίσθιον κάθε ἀνδρὸς εἶναι 65,40 δρχ. καὶ κάθε γυναικὸς 58,75 δρχ. Νὰ εὐρεθῇ πόσον πληρώνει καθ' ἡμέραν δι' ἡμερομίσθια.

## 5. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 233. Πώς διαιρείται δεκαδικὸς ἀριθμὸς δι' ἀκεραίου.  
*Πρόβλημα.* Ἐνα ἐργοστάσιον ἐμοίρασεν ἐξ ἴσου 409,60 μέτρα κάμποι εἰς τοὺς 16 ἐργάτας του. Πόσον θὰ λάβῃ κάθε ἐργάτης; Κάθε ἐργάτης θὰ λάβῃ 409,60 μέτρα : 16.

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι πρέπει νὰ διαιρέσωμεν ἓνα δεκαδικὸν ἀριθμὸν δι' ἑνὸς ἀκεραίου.

Ἐπειδὴ  $409,60 = \frac{40960}{100}$ , ἡ προηγουμένη διαίρεσις γράφεται :

$$409,60 : 16 = \frac{40960}{100} : 16 = \frac{40960 : 16}{100} = \frac{2560}{100} = 25,60.$$

Ὅστε κάθε ἐργάτης θὰ λάβῃ 25,60 μέτρα κάμποι.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν δι' ἀκεραίου, ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν, ὡς ἐὰν ὁ διαιρετέος ἦτο ἀκέραιος, ἀλλὰ προσέχομεν νὰ θέτωμεν εἰς τὸ πηλίκον ὑποδιαστολὴν πρὶν κατεβάσωμεν τὸ πρῶτον δεκαδικὸν ψηφίον τοῦ διαιρετέου.

*Παράδειγμα.* Νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ διαίρεσις  $35,40 : 15$ .

35,40	15
54	2,36
90	
0	

Ἐκτελοῦντες τὴν διαίρεσιν, συμφώνως πρὸς τὸν προηγούμενον κανόνα, εὐρίσκομεν πηλίκον 2,36.

§ 234. Πηλίκον κατὰ προσέγγισιν. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν  $49,63 : 12$ .

Ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν, ὅπως γνωρίζομεν, καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 4,13 καὶ ὑπόλοιπον 7 ἑκατοστά.

49,63	12
16	4,1358
43	
70	
100	
4	

Ἐπειδὴ μένει ὑπόλοιπον, τὸ πηλίκον 4,13 δὲν εἶναι ἀκριβές. Διὰ νὰ εὐρώμεν τὸ ἀκριβές πηλίκον τῆς διαιρέσεως αὐτῆς, πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ 4,13 καὶ τὰ  $\frac{7}{12}$  τοῦ ἑκατοστοῦ. Ἄν ὁμως θεωρήσωμεν

ὡς πηλίκον τὸ 4,13 καὶ παραλείψωμεν τὰ  $\frac{7}{12}$  τοῦ ἑκατοστοῦ, θὰ λέγομεν τότε ὅτι τὸ 4,13 εἶναι πηλίκον κατὰ προσέγγισιν.

Παραλείποντες τὰ  $\frac{7}{12}$  τοῦ ἑκατοστοῦ κάμνομεν λάθος μικρότερον

του ἑκατοστοῦ καὶ διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $49,63 : 12$  εἶναι  $4,13$  **κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς ἑκατοστοῦ**.

Ἐπειδὴ ὅμως εἶναι μικρότερον τοῦ πραγματικοῦ, θὰ λέγωμεν ὅτι τὸ πηλίκον ὑπελογίσθη μὲ προσέγγισιν ἑνὸς ἑκατοστοῦ καὶ **κατ' ἔλλειψιν**. Ἄν λάβωμεν ὅμως ἀντὶ τοῦ πηλίκου  $4,13$  τὸ  $4,14$  δηλ. ἐὰν αὐξήσωμεν τὸ τελευταῖον δεκαδικὸν ψηφίον κατὰ μίαν μονάδα, πάλιν κάμνομεν λάθος, διότι αὐξάνομεν τὸ πηλίκον κατὰ  $\frac{5}{12}$  τοῦ ἑκατοστοῦ. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν λέγομεν ὅτι τὸ πηλίκον ὑπελογίσθη μὲ προσέγγισιν ἑνὸς ἑκατοστοῦ, ἀλλὰ **καθ' ὑπεροχὴν**.

Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὸ πηλίκον μὲ μεγαλυτέραν προσέγγισιν, θέτομεν ἓνα ἢ περισσότερα μηδενικὰ δεξιὰ τοῦ διαιρετέου καὶ ἐξακολουθοῦμεν τὴν διαίρεσιν.

Οὕτω τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $49,63 : 12$  εἶναι  $4,135$  κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς χιλιοστοῦ ἢ  $4,1358$  κατὰ προσέγγισιν **ἑνὸς δεκάκις χιλιοστοῦ** κατ' ἔλλειψιν κ.ο.κ.

**Σημείωσις.** Κατωτέρω, ὅταν λέγωμεν πηλίκον κατὰ προσέγγισιν, θὰ ἐννοοῦμεν κατ' ἔλλειψιν δηλαδὴ μικρότερον τοῦ ἀκριβοῦς.

#### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

Α' Ὁ μ ἄ ς. 426 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι διαίρεσεις :

$$520,60 : 4 \qquad 256,06 : 39 \qquad 1046,24 : 204$$

$$(3,4 \times 10 + 25,637 \times 100) : 40 \qquad (56,35 \times 10 - 7,45 \times 5) : 80.$$

427 ) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ κάτωθι πηλίκα κατὰ προσέγγισιν  $0,01$

$$1\,724,50 : 235 \qquad 749,5 : 125 \qquad 32,725 : 48.$$

428 ) Νὰ εὑρεθοῦν τὰ κάτωθι πηλίκα κατὰ προσέγγισιν  $0,001$  :

$$7\,653,27 : 354 \qquad 1,235 : 427 \qquad 45,03 : 124.$$

Β' Ὁ μ ἄ ς. 429 ) Μία κρήνη εἰς 5 ὥρας γεμίζει μίαν δεξαμενὴν, ἢ ὅποια χωρεῖ  $1\,441,40$  χιλιόγραμμα ὕδατος. Πόσον ὕδωρ ρεεῖ ἀπὸ τὴν κρήνην αὐτὴν εἰς μίαν ὥραν ;

430 ) Ἐνας κηπουρὸς ἔχει μίαν δεξαμενὴν, ἢ ὅποια χωρεῖ  $3560,4$  χιλιόγραμμα. Ὄταν ἀνοίγῃ τὸν κρουνὸν τῆς, διὰ νὰ ποτίσῃ τὸν κήπὸν του, αὐτὴ κενουταί εἰς 4 ὥρας. Πόσον ὕδωρ ρεεῖ ἀπὸ αὐτὸν τὸν κρουνὸν εἰς κάθε πρῶτον λεπτὸν τῆς ὥρας ;

431) Ένας γεωργός έχει αγρόν 17 στρεμμάτων και έλιπτανεν αυτόν με 212,5 χιλιογράμμα λιπάσματος. Πόσον λίπασμα έριριφε κατά στρέμμα ;

432) Ένας άγροτικός συνεταιρισμός έπρομηθεύθη 23 644,60 χιλιογράμμα λιπάσματος και διένειμεν αυτό έξ ίσου εις τά 35 μέλη αυτού. Πόσον λίπασμα έλαβε κάθε μέλος ;

§ 235. Πώς διαιρείται άκέραιος ή δεκαδικός άριθμός διά δεκαδικού άριθμού. Παράδειγμα 1ον. Έστω ότι θέλομεν να έκτελέσωμεν τήν διαίρεσιν  $385,125 : 3,75$ . Γνωρίζομεν (§ 92) ότι, αν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον και διαιρέτην μιās διαιρέσεως επί τόν αυτόν άριθμόν, τó μέν πηλίκον δέν μεταβάλλεται, τó δέ υπόλοιπον πολλαπλασιάζεται επί τόν αυτόν άριθμόν. Πολλαπλασιάζομεν λοιπόν τόν διαιρετέον και τόν διαιρέτην τής δοθείσης διαιρέσεως επί 100, διά να γίνη ή διαιρέτης άκέραιος και έχομεν τότε να έκτελέσωμεν τήν διαίρεσιν

$$\begin{array}{r|l} \text{Δ ι ά τ α ξ ι ς} & \\ \text{τής πράξεως} & \\ 38512,5 & 375 \\ 01012 & \overline{102,7} \\ 2625 & \\ 000 & \end{array}$$

$$38\ 512,5 : 375$$

Έκτελοῦντες τήν διαίρεσιν αυτήν (§ 233), εύρίσκομεν πηλίκον 102,7 και υπόλοιπον μηδέν.

Παράδειγμα 2ον. Έστω ότι θέλομεν να διαιρέσωμεν  $835 : 7,42$ . Πολλαπλασιάζομεν διαιρετέον και διαιρέτην επί 100 και έχομεν να έκτελέσωμεν τήν διαίρεσιν  $83500 : 742$ .

$$\begin{array}{r|l} \text{Δ ι ά τ α ξ ι ς} & \\ \text{τής πράξεως} & \\ 835 & 7,42 \text{ ή} \end{array}$$

Έκτελοῦντες τήν διαίρεσιν, εύρίσκομεν πηλίκον 112 και υπόλοιπον 396. Τó ακριβές υπόλοιπον τής δοθείσης διαιρέσεως είναι 100 φοράς μικρότερον, δηλ. 3,96 (διατί ; )

$$\begin{array}{r|l} 83500 & 742 \\ 930 & \overline{112} \\ 1880 & \\ 396 & \end{array}$$

Αν συνεχίσωμεν τήν διαίρεσιν, θα εύρωμεν τó πηλίκον με ένα, δύο,.. δεκαδικά ψηφία, δηλ. με μεγαλύτεραν προσέγγισιν.

Έκ τών άνωτέρω παραδειγμάτων συνάγομεν τόν κάτωθι κανόνα :

Διά να διαιρέσωμεν δεκαδικόν άριθμόν διά δεκαδικού, παραλείπομεν τήν ύποδιαστολήν του διαιρέτου και μεταθέτομεν τήν

ὑποδιαστολὴν τοῦ διαιρετέου πρὸς τὰ δεξιὰ τόσας θέσεις, ὅσα δεκαδικὰ ψηφία εἶχεν ὁ διαιρέτης καὶ ἐκτελοῦμεν ἔπειτα τὴν διαίρεσιν, ὡς γνωρίζομεν.

*Σημείωσις.* Ἄν ὁ διαιρετέος εἶναι ἀκέραιος ἢ δὲν ἔχη ἄρκετὰ ψηφία πρὸς μετὰθεσιν τῆς ὑποδιαστολῆς, γράφομεν εἰς τὸ τέλος του, ὅσα μηδενικὰ χρειάζονται. Π.χ. εἶναι :

$$35 : 7,42 = 3\ 500 : 742$$

$$4,7 : 0,025 = 4\ 700 : 25$$

### Ἄσκησεις

A' Ὁμάς. 433 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι διαιρέσεις :

$$675 : 0,05 \qquad 345 : 0,15 \qquad 135 : 0,045$$

$$2,88 : 0,9 \qquad 444,64 : 0,56 \qquad 2400,4 : 3,4.$$

434 ) Νὰ εὑρεθῇ τὸ πηλίκον τῶν κάτωθι διαιρέσεων κατὰ προσέγγισιν 0,01 :

$$28,8 : 2,05 \qquad 644,32 : 0,64 \qquad 117,67 : 2,43$$

$$4,742 : 3,25 \qquad 48,76 : 8,2 \qquad 2\ 375,49 : 15,4.$$

B' Ὁμάς. 435 ) Ἐνας ἐμπορορράπτης ἠγόρασεν 68,75 μέτρα ὑφάσματος, διὰ νὰ κάμη ἀνδρικός ἐνδυμασίας. Ὑπελόγισε δὲ ὅτι διὰ κάθε ἐνδυμασίαν χρειάζονται 2,75 μέτρα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὕφασμα. Πόσας ἐνδυμασίας θὰ κάμη μὲ αὐτό ;

436 ) Ἡ Ὀλυμπία ἀπέχει ἀπὸ τὸν Πύργον 21,19 χιλιόμετρα. Πόσον χρόνον χρειάζεται μία ἀμαξοστοιχία, διὰ νὰ διανύσῃ τὴν ἀπόστασιν αὐτὴν ἀπὸ τὸν Πύργον εἰς τὴν Ὀλυμπίαν μὲ ταχύτητα 16,3 χιλιόμετρα τὴν ὥραν ;

437 ) Ἐνα κιβώτιον περιέχει 30,72 χιλιόγραμμα σάπωνος. Κάθε δὲ πλάξ ἔχει βάρος 0,256 χιλιόγραμμα. Πόσας πλάκας ἔχει τὸ κιβώτιον ;

438 ) Μία οἰκογένεια δαπανᾷ 2,88 χιλιόγρ. ἐλαίου τὴν ἐβδομάδα. Εὔρετε πόσας ἐβδομάδας περνᾷ μὲ ἓνα δοχεῖον, τὸ ὁποῖον χωρεῖ 11,52 χιλιόγρ. ἐλαίου.

439 ) Οἱ τροχοὶ ἑνὸς ποδηλάτου ἔχουν περιφέρειαν 1,80 μ. Πόσας στροφὰς θὰ κάμη ἕκαστος τροχός, ἂν διανύσῃ τις μὲ τὸ ποδήλατον αὐτὸ διάστημα 25 740 μέτρων ;

§ 236. Πώς πολλαπλασιάζεται ή διαιρείται δεκαδικός αριθμός δια κοινού κλάσματος. Με συλλογισμούς, τους οποίους έ κάμαμεν εις τὰ προηγούμενα δια τὴν λύσιν διαφόρων προβλημάτων, έμάθομεν διαφόρους κανόνες πολλαπλασιασμοῦ ἢ διαιρέσεως ἀριθμοῦ  $\alpha$  ἀκεραίου ἢ κλάσματος ἢ μεικτοῦ δια κλάσματος. Οἱ συλλογισμοὶ ὅμως ἐκεῖνοι δύνανται νὰ ἐπαναληφθοῦν καὶ ὅταν ὁ  $\alpha$  εἶναι δεκαδικὸς ἀριθμὸς. Καὶ ἐπομένως καὶ οἱ κανόνες ἐκεῖνοι ἀληθεύουν καὶ ὅταν  $\alpha$  εἶναι δεκαδικὸς ἀριθμὸς. Π.χ. εἶναι :

$$\begin{aligned} 5,16 \times \frac{3}{4} &= \frac{5,16 \times 3}{4} = \frac{15,48}{4} = 3,87 \\ 2,4 : \frac{3}{4} &= 2,4 \times \frac{4}{3} = \frac{9,6}{3} = 3,2 \\ 6,35 \times 2\frac{1}{5} &= 6,35 \times \frac{11}{5} = \frac{69,85}{5} = 13,97 \\ 10,60 : 3\frac{2}{4} &= 10,60 : \frac{14}{4} = 10,60 \times \frac{4}{14} \text{ κ.τ.λ.} \end{aligned}$$

#### Ἀσκήσεις

440 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ ἀκόλουθοι πράξεις :

$$12,25 \times \frac{4}{5}, \quad 15,16 : \frac{2}{5}, \quad 5,124 \times 3\frac{1}{4}, \quad 20,85 : 2\frac{2}{3}.$$

441 ) Ἐνα αὐτοκίνητον διανύει εἰς μίαν ὥραν 24,60 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα διανύει εἰς  $\frac{3}{4}$  τῆς ὥρας ;

442 ) Ἐνας παντοπώλης ἐπώλησε τὰ  $\frac{3}{5}$  τοῦ τυροῦ ἑνὸς βαρέλιου καὶ ἔμειναν 12,85 χιλιόγραμμα. Πόσον τυρὸν εἶχε κατ' ἀρχὰς τὸ βαρέλιον τοῦτο ;

443 ) Ἀπὸ ἕνα κρουνὸν χύνονται 2,35 χιλιόγρ. ὕδατος εἰς 1 ὥραν. Πόσον ὕδωρ χύνεται εἰς  $5\frac{1}{4}$  ὥρας ;

§ 237. Πώς τρέπεται κοινὸν κλάσμα εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν. *Πρόβλημα 1ον.* Τέσσαρα κυτία σάπωνος πολυτελείας ἔχουν βάρους 3 χιλιόγραμμα. Νὰ εὔρεθῇ τὸ βᾶρος ἐκάστου κυτίου.

*Λύσις.* Εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ βᾶρος ἐκάστου κυτίου εἶναι  $3 : 4 = \frac{3}{4}$  τοῦ χιλιογράμμου.

Ἄν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν  $3 : 4$ , εὐρίσκομεν πηλίκον  $0,75$ . Εἶναι λοιπὸν  $\frac{3}{4} = 0,75$ .

$$\begin{array}{r} \text{Διὰ τὰ ξίς} \\ \text{τῶν πράξεων} \\ 3,0 \overline{) 4} \\ \underline{20} \phantom{0} \\ 0 \phantom{0} \end{array}$$

Αὕτῃ ἡ ἐργασία λέγεται **τροπή τοῦ κλάσματος**  $\frac{3}{4}$  εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν.

Ἄν ἐκτελέσωμεν αὐτὴν τὴν ἐργασίαν διὰ τὸ κλάσμα  $\frac{7}{12}$ , βλέπομεν ὅτι ἡ διαίρεσις δὲν τελειώνει. Τοῦτο σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει δεκαδικὸς ἀριθμὸς ἀκριβῶς ἴσος μὲ τὸ κλάσμα  $\frac{7}{12}$ .

$$\begin{array}{r} 7,00 \overline{) 12} \\ 100 \phantom{0} \\ \underline{40} \phantom{0} \\ 40 \phantom{0} \\ \underline{4} \phantom{0} \end{array}$$

Δυνάμεθα ὁμως νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ  $\frac{7}{12}$  γίνεται  $0,58$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{100}$  ἢ γίνεται  $0,583$  κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{1000}$  κ.τ.λ.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

**Διὰ νὰ τρέψωμεν ἓνα κοινὸν κλάσμα εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του, ἕως ὅτου εὐρωμεν ὑπόλοιπον 0 ἢ ἕως ὅτου εὐρεθῇ πηλίκον μὲ ὅσην θέλομεν προσέγγισιν.**

**Παρατήρησις.** Ἄν ὁ παρονομαστής κοινῶς ἀναγῶγος κλάσματος διαιρῆ ἓνα ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 10, 100, 1 000 κ.τ.λ., ἡ τροπὴ αὕτη γίνεται καὶ ὡς ἑξῆς :

Π.χ. διὰ τὸ κλάσμα  $\frac{3}{5}$  παρατηροῦμεν ὅτι  $10 : 5 = 2$  καὶ ἔπομένως  $\frac{3}{5} = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} = \frac{6}{10} = 0,6$ .

Ὁμοίως  $\frac{17}{25} = \frac{17 \times 4}{25 \times 4} = \frac{68}{100} = 0,68$ .

**§ 238. Πῶς διακρίνομεν ποῖα κοινὰ κλάσματα τρέπονται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν.** Εἴπομεν προηγουμένως ὅτι, ἂν ὁ παρονομαστής ἑνὸς κοινῶς ἀναγῶγος κλάσματος εἶναι διαιρέτης ἑνὸς τῶν ἀριθμῶν 10, 100, 1 000 κ.τ.λ., τὸ κλάσμα αὐτὸ γίνεται δεκαδικὸς ἀριθμὸς ἀκριβῶς.

Ἐπειδὴ  $10 = 2 \times 5$ ,  $100 = 10^2 = 2^2 \times 5^2$ ,  $1000 = 10^3 = 2^3 \times 5^3$  κ.τ.λ., διὰ νὰ συμβαίη τὸ προηγούμενον, πρέπει ὁ παρονομαστής τοῦ ἀναγῶγος κλάσματος νὰ μὴ ἔχη πρῶτους παράγοντας διαφόρους ἀπὸ τὸν 2 καὶ 5.

Π.χ. ο παρονομαστής  $6 = 2 \times 3$  οὐδένα ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς  $2 \times 5$ ,  $2^2 \times 5^2$ ,  $2^3 \times 5^3$  κ.τ.λ. διαιρεῖ ἀκριβῶς (§ 152). Ἐπομένως τὰ κλάσματα  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{7}{6}$ ,  $\frac{11}{6}$  κ.τ.λ. δὲν τρέπονται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς.

Διὰ νὰ διακρίνωμεν λοιπὸν, ἂν ἓνα κλάσμα κοινὸν τρέπηται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Καθιστῶμεν τὸ κλάσμα ἀνάγωγον, ἂν δὲν εἶναι τοιοῦτον. Ἐπειτα ἀναλύομεν τὸν παρονομαστήν του εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων. Ἐὰν δὲ ὁ παρονομαστής ἔχη μόνον τοὺς παράγοντας 2 καὶ 5 ἢ μόνον ἓνα ἐξ αὐτῶν, τὸ κλάσμα τρέπεται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν. Ἄλλως δὲν τρέπεται.

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

444 ) Ποῖα ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα κλάσματα τρέπονται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς ;

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{5}{9}, \frac{7}{16}, \frac{16}{12}, \frac{19}{25}, \frac{7}{12}, \frac{27}{18}.$$

445 ) Νὰ τραποῦν τὰ ἀκόλουθα κλάσματα εἰς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς :

$$\frac{3}{5}, \frac{8}{25}, \frac{15}{24}, \frac{21}{48}, \frac{25}{64}, \frac{12}{75}.$$

446 ) Νὰ τραποῦν τὰ κάτωθι κλάσματα εἰς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς (μὲ προσέγγισιν 0,01) :

$$\frac{3}{7}, \frac{3}{11}, \frac{7}{9}, \frac{5}{24}, \frac{5}{13}, \frac{17}{60}.$$

447 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι πράξεις :

$$\begin{array}{lll} 1. \frac{3}{4} + 0,85 + 2\frac{1}{2} & 3. \frac{5}{8} \times 4,5 & 5. 5\frac{4}{25} - 3,75 \\ 2. \frac{4}{5} - 0,724 & 4. 3\frac{1}{8} \times 9,25 & 6. 1,04 : \frac{2}{5}. \end{array}$$

448 ) Νὰ ὑπολογισθῇ κατὰ προσέγγισιν 0,01 ἡ τιμὴ τῶν :

$$\begin{array}{ll} 1. 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{10}} & 2. \frac{\left(\frac{13}{7} \times \frac{4}{5}\right) - \left(\frac{2}{5} \times \frac{5}{7}\right)}{\left(6 \times \frac{5}{8}\right) - \left(\frac{2}{5} \times \frac{3}{7}\right)}. \end{array}$$

### 239. Συντομίες πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως.

#### 1. Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 0,5.

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ 0,5 λαμβάνομεν τὸ ἥμισυ τοῦ ἀριθμοῦ ( διότι  $0,5 = \frac{1}{2}$  ).  
Π.χ.  $48 \times 0,5$ . Τὸ ἥμισυ τοῦ 48 = 24. Ἄρα  $48 \times 0,5 = 24$ .

#### 2. Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 0,05.

Λαμβάνομεν τὸ ἥμισυ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τὸ ἐξαγόμενον διαιροῦμεν διὰ 10 ( διατί ; )  
Π.χ.  $36 \times 0,05$ . Τὸ ἥμισυ τοῦ 36 = 18·  $18 : 10 = 1,8$ .  
Ἄρα  $36 \times 0,05 = 1,8$ .

#### 3. Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 0,25.

Λαμβάνομεν τὸ τέταρτον τοῦ ἀριθμοῦ ( διατί ; )  
Π.χ.  $56 \times 0,25$ . Τὸ τέταρτον τοῦ 56 = 14. Ἄρα  $56 \times 0,25 = 14$ .

#### 4. Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 2,5.

Λαμβάνομεν τὸ τέταρτον τοῦ ἀριθμοῦ καὶ πολλαπλασιάζομεν τὸ ἐξαγόμενον ἐπὶ 10 ( διατί ; )  
Π.χ.  $32 \times 2,5$ . Τὸ τέταρτον τοῦ 32 = 8.  $8 \times 10 = 80$ .  
Ἄρα  $32 \times 2,5 = 80$ .

#### 5. Πολλαπλασιασμός ἐπὶ 0,1 0,01 0,001...

Διαιροῦμεν τὸν ἀριθμὸν διὰ 10, 100, 1 000, ...  
Π.χ.  $45 \times 0,1 = 45 : 10 = 4,5$   
 $342 \times 0,01 = 342 : 100 = 3,42$   
 $128 \times 0,001 = 128 : 1000 = 0,128$

#### 1. Διαίρεσις διὰ 0,5.

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ 0,5 διπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν. ( διατί ; )  
Π.χ.  $53 : 0,5$ . Τὸ διπλάσιον τοῦ 53 εἶναι 106. Ἄρα  $53 : 0,5 = 106$

#### 2. Διαίρεσις διὰ 0,05.

Διπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν καὶ πολλαπλασιάζομεν τὸ ἐξαγόμενον ἐπὶ 10 ( διατί ; )  
Π.χ.  $38 : 0,05$ . Τὸ διπλάσιον τοῦ 38 εἶναι 76·  $76 \times 10 = 760$ .  
Ἄρα  $38 : 0,05 = 760$ .

#### 3. Διαίρεσις διὰ 0,25.

Πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 4. Π.χ.  $75 : 0,25$ . Τὸ τετραπλάσιον τοῦ 75 εἶναι 300.  
Ἄρα  $75 : 0,25 = 300$ .

#### 4. Διαίρεσις διὰ 2,5.

Πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 4 καὶ διαιροῦμεν τὸ ἐξαγόμενον διὰ 10. Π.χ.  $43 : 2,5$ . Τὸ τετραπλάσιον τοῦ 43 εἶναι 172.  
 $172 : 10 = 17,2$ .  
Ἄρα  $43 : 2,5 = 17,2$ .

#### 5. Διαίρεσις διὰ 0,1 0,01 0,001...

Πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1 000, ...  
Π.χ.  $38 : 0,1 = 38 \times 10 = 380$   
 $13,5 : 0,01 = 13,50 \times 100 = 1350$   
 $0,25 : 0,001 = 0,25 \times 1000 = 250$

### Ἄσκησεις

449 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν ἀπὸ μνήμης αἱ κάτωθι πράξεις :

- |                      |                   |                  |                |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1. $56 \times 0,5$   | $75 : 0,5$        | $46 \times 0,05$ | $73 : 0,05$    |
| 2. $44 \times 0,25$  | $15 : 0,25$       | $24 \times 2,5$  | $19 : 2,5$     |
| 3. $13,5 \times 0,1$ | $3,7 \times 0,01$ | $5,7 : 0,1$      | $6,5 : 0,01$   |
| 4. $0,01 \times 0,1$ | $0,1 \times 0,01$ | $0,01 : 0,1$     | $0,01 : 0,001$ |

§ 240. Τί εἶναι δεκαδικὰ περιοδικὰ κλάσματα. Εἶδομεν προηγουμένως ( § 237 ) ὅτι τὰ ψηφία τοῦ πηλίκου  $7 : 12$  ἀπὸ τῶν ἑκατοστῶν καὶ ἐξῆς εἶναι ὅλα 3 καὶ ἄπειρα.

Ὅμοίως βεβαιούμεθα ὅτι τὸ κλάσμα  $\frac{3}{7}$

30	7
20	0,42857142..
60	
40	
50	
10	
30	

δὲν τρέπεται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν. Ἡ διαιρέσις λοιπὸν  $3 : 7$  οὐδέποτε τελειώνει. Παρατηροῦμεν δὲ ὅτι τὰ δυνατὰ ὑπόλοιπα εἶναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ἐπομένως μετὰ 6 τὸ πολὺν διαιρέσεις εὐρίσκομεν ἓνα ἀπὸ τὰ προηγούμενα ὑπόλοιπα. Ἀπὸ τὴν στιγμὴν δὲ αὐτὴν θὰ ἐκτελῶμεν προηγουμένης διαιρέσεις καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν σειράν. Ἐπομένως θὰ εὐρίσκωμεν τὰ αὐτὰ ψηφία τοῦ πηλίκου καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν σειράν. Πράγματι δέ, ἂν ἐξακολουθήσωμεν τὴν διαιρέσιν εὐρίσκομεν πηλίκον  $0,428571428571\dots$  δηλ. τὰ ψηφία 428571 ἐπαναλαμβάνονται τὰ αὐτὰ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν σειράν.

Ὁ ἀριθμὸς  $0,428571\ 428571\ 428571\dots$  λέγεται **δεκαδικὸν περιοδικὸν κλάσμα**. Καὶ ὁ ἀριθμὸς  $0,58333\dots$  εἶναι **δεκαδικὸν περιοδικὸν κλάσμα**. Ὡστε :

**Δεκαδικὸν περιοδικὸν κλάσμα** εἶναι δεκαδικὸς ἀριθμὸς μὲ ἄπειρα δεκαδικὰ ψηφία, τὰ ὅποια ἀπὸ μίαν τάξιν καὶ ἐφεξῆς ἐπαναλαμβάνονται τὰ αὐτὰ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν σειράν.

Τὸ σύνολον τῶν ψηφίων, τὰ ὅποια ἐπαναλαμβάνονται τὰ αὐτὰ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν, λέγεται **περίοδος**.

Ἡ περίοδος 428571 τοῦ ἀριθμοῦ  $0,428571\ 428571\dots$  ἀρχίζει ἀμέσως μετὰ τὴν ὑποδιαστολήν. Διὰ τοῦτο αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς λέγεται **ἀπλοῦν περιοδικὸν κλάσμα**.

Ἡ περίοδος 3 τοῦ ἀριθμοῦ  $0,58333\dots$  δὲν ἀρχίζει ἀμέσως μετὰ

τήν ὑποδιαστολήν. Αὐτὸς δὲ ὁ ἀριθμὸς λέγεται **μεικτὸν περιοδικὸν κλάσμα**.

Ὅταν λοιπὸν ἓνα κοινὸν κλάσμα δὲν τρέπεται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν, αὐτὸ τρέπεται εἰς περιοδικὸν δεκαδικὸν κλάσμα ἀπλοῦν ἢ μεικτὸν.

§ 241. Πῶς εὐρίσκεται τὸ κοινὸν κλάσμα, τὸ ὁποῖον τρέπεται εἰς δοθὲν περιοδικὸν δεκαδικὸν κλάσμα. I. Εἶδομεν προηγουμένως ὅτι τὸ ἀπλοῦν περιοδικὸν κλάσμα  $0,428571\ 428571\dots$  γίνεται ἀπὸ τὸ κλάσμα  $\frac{3}{7}$ .

\* Ἄν τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος τούτου πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸ πηλίκον  $428\ 571 : 3 = 142\ 857$ , εὐρίσκομεν ὅτι  $\frac{3}{7} = \frac{428571}{999999}$ .

\* Ἀπὸ τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο ὀδηγούμεθα νὰ ἐξετάσωμεν μήπως π.χ. καὶ ὁ ἀριθμὸς  $0,3737\dots$  γίνεται ἀπὸ τὸ κλάσμα  $\frac{37}{99}$ .

Πρὸς τοῦτο διαιροῦμεν τὸν 37 διὰ 99 μὲ τὸν σύντομον τρόπον ποὺ γνωρίζομεν (§ 103) καὶ εὐρίσκομεν 0 ἀκέραιον πηλίκον καὶ 37 ὑπόλοιπον. Τοῦτο τρέπομεν εἰς 3 700 ἑκατοστὰ. Ταῦτα διαιροῦμεν διὰ 100 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 37 ἑκατοστὰ καὶ ὑπόλοιπον 37 ἑκατοστὰ. Τοῦτο τρέπομεν εἰς 3 700 δεκάκις χιλιοστὰ, τὰ ὁποῖα διαιροῦμεν διὰ 100 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 37 δεκάκις χιλιοστὰ καὶ ὑπόλοιπον 37 δεκάκις χιλιοστὰ. Ἐξακολουθοῦντες τὴν διαίρεσιν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον βλέπομεν ὅτι τὸ πηλίκον εἶναι πράγματι  $0,373737\dots$

$$\begin{array}{r} \text{Δ ι ά τ α ξ ι ς} \\ \text{τ ῆ ς π ρ ά ξ ε ω ς} \\ 37 \overline{) 99} \\ 37 \overline{) 0,3737\dots} \end{array}$$

Ἐπομένως  $0,373737\dots = \frac{37}{99}$ . Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Κάθε ἀπλοῦν περιοδικὸν μὲ ἀκέραιον μέρος 0 γίνεται ἀπὸ κλάσμα, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀριθμητὴν μίαν περίεσον, παρονομαστὴν δὲ ἀριθμὸν, τοῦ ὁποῖου ὅλα τὰ ψηφία εἶναι 9 καὶ τόσα, ὅσα εἶναι τὰ ψηφία τῆς περιόδου.

Κατὰ ταῦτα εἶναι  $0,99999\dots = \frac{9}{9} = 1$ .

II. Ἐστω τὸ ἀπλοῦν περιοδικὸν κλάσμα  $1,536\ 536\ 536\dots$  Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$1,536\ 536\ 536\dots = 1 + 0,536\ 536\dots = 1 + \frac{536}{999} = \frac{999 + 536}{999}$$

Ἐάντι 999 θέσωμεν  $1\,000 - 1$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$1,536\,536\dots = \frac{(1000-1) + 536}{999} = \frac{1536-1}{999}.$$

Ὁμοίως :

$$3,2828\dots = 3 + \frac{28}{99} = \frac{3 \times 99 + 28}{99} = \frac{3 \times (100-1) + 28}{99} = \frac{328-3}{99} \text{ κ.τ.λ.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι καὶ εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν τὰ ψηφία τοῦ παρονομαστοῦ εἶναι 9 καὶ ὅσα τὰ ψηφία τῆς περιόδου. Ὁ δὲ ἀριθμητὴς γίνεται ὡς ἑξῆς :

Παραλείπομεν τὴν ὑποδιαστολὴν καὶ ὅλας τὰς περιόδους ἐκτὸς τῆς πρώτης. Ἀπὸ δὲ τὸν προκύπτοντα ἀκέραιον ἀφαιροῦμεν τὸν ἀκέραιον τοῦ δεκαδικοῦ περιοδικοῦ.

III. Ἐάν τὸ περιοδικὸν κλάσμα εἶναι μεικτὸν, π.χ.  $2,41313\dots$  ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς : Παρατηροῦμεν ὅτι :

$$2,41313\dots = 2,41313\dots \times 10 \times \frac{1}{10} = 24,1313\dots \times \frac{1}{10}.$$

Ἐπειδὴ δέ, κατὰ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν, εἶναι :

$$24,1313\dots = \frac{2\,413-24}{99}, \text{ ἐννοοῦμεν ὅτι :}$$

$$2,41313\dots = \frac{2\,413-24}{99} \times \frac{1}{10} = \frac{2\,413-24}{990}.$$

Ὁμοίως  $1,53267267\dots = 153,267\,267\dots \times \frac{1}{100} =$

$$\frac{153\,267-153}{999} \times \frac{1}{100} = \frac{153\,267-153}{99\,900}.$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ κλάσμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖον γίνεται μεικτὸν περιοδικὸν κλάσμα, μεταθέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν πρὸς τὰ δεξιά, ὥστε τὸ περιοδικὸν νὰ γίνῃ ἀπλοῦν. Εὐρίσκομεν τὸ κοινὸν κλάσμα, τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ἀπλοῦν αὐτό, καὶ δεξιά ἀπὸ τὸν παρονομαστήν αὐτοῦ γράφομεν τόσα μηδενικά, ὅσα εἶναι τὰ δεκαδικὰ ψηφία τοῦ μὴ περιοδικοῦ μέρους.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

450 ) Νὰ εὐρεθοῦν τὰ κοινὰ κλάσματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα παράγονται τὰ ἀκόλουθα δεκαδικὰ περιοδικὰ κλάσματα :

0,777..	0,161616..	0,564564564..	5,6666..
12,345345..	0,528888..	4,14555..	15,23147147...

451 ) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ ἀκόλουθοι πράξεις :

1.  $0,232323\dots + 0,5858\dots + 0,151515\dots$

2.  $\frac{15}{11} - 0,676767\dots$        $0,7272\dots \times 99$        $2,136136\dots \times 999$

452 ) Νὰ εὐρεθοῦν :

τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ  $0,242424\dots$  τὰ  $\frac{11}{5}$  τοῦ  $0,1515\dots$  τὰ  $\frac{9}{2}$  τοῦ  $3,0707\dots$

453 ) Νὰ εὐρεθῆ ὁ ἀριθμὸς, τοῦ ὁποῖου τὰ  $\frac{4}{9}$  εἶναι  $0,888\dots$

### Προβλήματα ἐπὶ τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν

Α' Ὁ μ α ς. 454 ) Ἦγόρασέ τις 65 μέτρα ὑφάσματος ἀντὶ 942,5 δραχμῶν. Μετεπώλησε δὲ αὐτὸ πρὸς 52,50 δρχ. τὰ 5 μέτρα. Ἐκέρδισεν ἢ ἐζημιώθη καὶ πόσον κατὰ μέτρον ;

455 ) Οἰνοπώλης ὀφείλει 816,7 δρχ. Πληρῶνει κατ' ἀρχὰς 145 δρχ., ἔπειτα 217,5 δρχ. καὶ τέλος 275 δρχ. Διὰ νὰ ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος του δίδει εἰς τὸν δανειστήν του οἶνον πρὸς 3,20 δρχ. τὸ χλγ. Πόσα χλγ. οἴνου ἔδωκεν ;

456 ) Δύο γεωργοὶ ἠγόρασαν ἓνα κτῆμα 9,5 στρεμμάτων ἀντὶ 46 265 δρχ. Ὁ πρῶτος ἔλαβε 5,60 στρέμματα, ὁ δὲ β' τὸ ὑπόλοιπον. Πόσα πρέπει νὰ πληρώσῃ ἕκαστος ;

457 ) Ἐργάτης εἰργάσθη 25 ἡμέρας καὶ ἔλαβε 1 612,50 δρχ. Τὸν ἄλλον μῆνα εἰργάσθη 24 ἡμέρας, τὸν δὲ τρίτον μῆνα 20 ἡμέρας μὲ τὸ αὐτὸ ἡμερομίσθιον. Πόσα χρήματα ἔλαβε κατὰ τὴν τριμηνίαν αὐτήν ;

458 ) Δύο ἐργάται, οἱ ὁποῖοι ἐλάμβανον τὸ αὐτὸ ἡμερομίσθιον, ἔλαβον ἐν ὄλῳ 2802,8 δρχ. Ὁ πρῶτος, ὁ ὁποῖος εἰργάσθη ἐπὶ 25 ἡμέρας, ἔλαβε 1592,5 δρχ. Πόσας ἡμέρας εἰργάσθη ὁ β' ;

459 ) Ἦγόρασέ τις αὐγὰ πρὸς 15,5 δρχ. τὰ 10. Δίδει δύο χαρτονομίσματα τῶν 20 δρχ. καὶ λαμβάνει ὑπόλοιπον 2,80 δρχ. Πόσα αὐγὰ ἠγόρασεν ;

460 ) Διὰ νὰ πληρώσῃ τις 12,60 μέτρα ἐνὸς ὑφάσματος πρὸς 18 δρχ. τὸ μέτρον, διέθεσε τὰ  $\frac{3}{4}$  τῶν χρημάτων, τὰ ὁποῖα εἶχε. Πόσα χρήματα εἶχεν ;

461 ) Μία οικογένεια εξοδεύει 2 χλγ. ελαίου καθ' εβδομάδα, τὸ ὅποῖον ἀγοράζει πρὸς 19,8 δρχ. τὸ χλγ. Πόσῃν οἰκονομίαν θὰ ἔχη καθ' εβδομάδα, ἐὰν ἀγοράσῃ χονδρικῶς ἓνα δοχεῖον ἔλαιον τῶν 12,5 χλγ. ἀντὶ 228,75 δρχ. ;

Β' Ὁ μ α ς. 462 ) Ἐμπορος ἠγόρασεν 82,75 μέτρα ὑφάσματος ἀντὶ 5047,75 δρχ. Ἐπειτα ἓνα ἄλλο ὑφασμα ἀντὶ 998,8 δρχ. Τὸ μέτρον τοῦ β' ὑφάσματος κοστίζει 4,25 δρχ. ὀλιγώτερον ἀπὸ τὴν ἀξίαν τοῦ μέτρον τοῦ α' ὑφάσματος. Πόσα μέτρα ἠγόρασεν ἐκ τοῦ β' ὑφάσματος ;

463 ) ἠγόρασέ τις ἓνα ὑφασμα πρὸς 219 δρχ. τὰ 6 μέτρα καὶ τὸ ἐπώλησε πρὸς 364,80 δρχ. τὰ 8 μέτρα. Ἐκ τῆς πωλήσεως αὐτοῦ ἐκέρδισε 318,50 δρχ. Πόσον ὑφασμα εἶχεν ἀγοράσει ;

464 ) Γεωργὸς ἔσπειρεν 150 χλγ. σίτου, τὸν ὅποῖον εἶχεν ἀγοράσει πρὸς 2,3 δρχ. τὸ χλγ. Ἐκ τῆς σπορᾶς αὐτῆς παρήχθη σίτος δεκατετραπλασίας ποσότητος, τὸν ὅποῖον ἐπώλησε πρὸς 2,50 δρχ. τὸ χλγ. Νὰ εὑρεθῇ τὸ κέρδος τοῦ γεωργοῦ, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι τὰ ἔξοδα τῆς καλλιέργειας ἀνηθον εἰς τὸ  $\frac{1}{5}$  τῆς τιμῆς τῆς πωλήσεως.

465 ) Μία οἰκοκυρὰ διὰ νὰ κάμῃ πετσέτες τοῦ προσώπου ἠγόρασεν ὑφασμα καὶ ἔδωκεν 92,8 δρχ. Ἄν ὅμως ἠγόραζεν 1,25 μέτρα ἀκόμη, θὰ ἔκαμνε 18 πετσέτες. Διὰ κάθε πετσέτα χρειάζεται 0,875 μέτρα. Πόσον ἀξίζει τὸ μέτρον τοῦ ὑφάσματος ;

466 ) Μία οἰκοκυρὰ ἠγόρασε δύο ὑφάσματα τῆς αὐτῆς ποιότητος. Διὰ τὸ ἓνα ἔδωκεν 161 δρχ. καὶ διὰ τὸ ἄλλο, τὸ ὅποῖον ἦτο κατὰ 2,125 μέτρα περισσότερο τοῦ πρώτου, ἔδωκε 239,2 δρχ. Πόσα μέτρα ἦτο τὸ καθένα ;

Γ' Ὁ μ α ς. 467 ) Παντοπώλης εἶχεν ἀγοράσει 75,50 χλγ. νωποῦ σάπωνος πρὸς 7,8 δρχ. τὸ χλγ. Μετὰ τινα χρόνον ζυγίζει τὸν σάπωνα καὶ παρατηρεῖ ὅτι τὸ βάρος τοῦ σάπωνος εἶχεν ἐλαττωθῆ κατὰ 8,75 χλγ. Πωλεῖ ἔπειτα τὸν σάπωνα καὶ κερδίζει 25,2 δρχ. Πόσον ἐπώλησε τὸ χλγ. ;

468 ) Ἐμπορος ἠγόρασε 360 χλγ. γεωμήλων. Τὸ  $\frac{1}{9}$  αὐτῶν ἐσάπισε καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἐπώλησε πρὸς 1,4 δρχ. τὸ χλγ. Ἐὰν

γνωρίζωμεν ὅτι ἐζημιώθη 38 δρχ., νὰ εὐρεθῆ πόσον ἠγόρασε τὸ χλγ.

469 ) Ἐμπορος ἠγόρασε 45 μέτρα ὑφάσματος πρὸς 64,50 δρχ. τὸ μέτρον. Ἐπώλησε τὰ  $\frac{3}{5}$  αὐτοῦ πρὸς 75 δρχ. τὸ μέτρον. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸ μέτρον τοῦ ὑπολοίπου ὑφάσματος διὰ νὰ κερδίσῃ ἐν ὄλῳ 369,9 δρχ. ;

470 ) Ἐμπορος ἠγόρασε σῖτον πρὸς 2,40 δρχ. τὸ χλγ. καὶ ἐπλήρωσεν 820,8 δρχ. Ἐπώλησεν ἔπειτα τὸ  $\frac{1}{4}$  αὐτοῦ εἰς τὴν τιμὴν τῆς ἀγορᾶς καὶ ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον ἔχασεν 0,20 δρχ. τὸ χλγ. Πόσον εἰσέπραξεν ἐκ τῆς πωλήσεως ;

Δ' Ὁ μ ἄ ς. 471 ) Εἰς μίαν ἐκδρομὴν ἔλαβον μέρος 14 ἄτομα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ ἐξώδευσαν ἐν ὄλῳ 620,2 δρχ. Καθένας ἀπὸ τοὺς ἄνδρας ἐξώδευσε 53 δρχ. καὶ κάθε μία ἀπὸ τὰς γυναῖκας 32,7 δρχ. Πόσοι ἦσαν οἱ ἄνδρες καὶ πόσαι αἱ γυναῖκες ;

*Λύσις.* Ἐὰν ἦσαν ὅλοι ἄνδρες, θὰ ἐξώδευον  $53 \times 14 = 742$  δρχ. Ἀλλὰ ὅλα τὰ ἐξοδα ἦσαν 620,2 δρχ. Ἡ διαφορὰ, ἡ ὁποία εἶναι  $742 - 620,2 = 121,8$  δρχ. προέρχεται ἀπὸ τὰς γυναῖκας, διότι καθεμία ἐξώδευσε 20,3 δρχ. ὀλιγώτερον καθενὸς ἀνδρός. Ὅσας λοιπὸν φορὰς ὁ 20,3 χωρεῖ εἰς τὸ 121,8 τόσαι ἦσαν αἱ γυναῖκες. Ἄρα αἱ γυναῖκες ἦσαν  $121,8 : 20,3 = 6$  καὶ οἱ ἄνδρες 8.

472 ) Ἐνας χωρικός ἐπώλησεν 69 αὐγά καὶ ἔλαβεν 115,2 δρχ. Ἐξ αὐτῶν ἐπώλησεν ἄλλα πρὸς 1,6 δρχ. τὸ καθένα καὶ ἄλλα πρὸς 1,8 δρχ. τὸ καθένα. Πόσα αὐγά ἐπώλησε πρὸς 1,6 δρχ. καὶ πόσα πρὸς 1,8 δρχ. ;

473 ) Ἐμπορος ἐπώλησεν 67,50 μέτρα ὑφάσματος ἀντὶ 990 δρχ. Ἐὰν γνωρίζωμεν ὅτι τὸ κέρδος, ποῦ προῆλθεν ἐκ τῆς πωλήσεως, ἦτο ἴσον μὲ τὰ  $\frac{2}{9}$  τῆς τιμῆς τῆς ἀγορᾶς τοῦ ὑφάσματος, νὰ εὐρεθῆ πόσον εἶχεν ἀγοράσει τὸ μέτρον.

§ 242. **Τετράγωνον ἀριθμοῦ.** Γνωρίζομεν ὅτι **τετράγωνον** ἑνὸς ἀριθμοῦ λέγεται τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἑαυτὸν του.

Οὕτω τὸ τετράγωνον τοῦ 5 εἶναι  $5 \times 5$ , δηλ. 25 καὶ γράφεται  $5^2$ .

Ὁμοίως τὸ τετράγωνον τοῦ  $\frac{3}{4}$  εἶναι  $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$ .

Τὰ τετράγωνα τῶν ἀριθμῶν

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

εἶναι ἀντιστοίχως τὰ ἑξῆς :

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.

§ 243. **Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ.** Εἶδομεν ὅτι τετράγωνον τοῦ 5 εἶναι ὁ 25. Ὁ 5 λέγεται **τετραγωνικὴ ρίζα** τοῦ 25. Ὁμοίως, ἐπειδὴ  $4^2 = 16$ , ὁ 4 εἶναι τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 16. Ὡστε :

**Τετραγωνικὴ ρίζα δοθέντος ἀριθμοῦ λέγεται ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ὑψούμενος εἰς τὸ τετράγωνον δίδει τὸν δοθέντα.**

Οὕτως ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 49 εἶναι 7, διότι  $7^2 = 49$ . Ὁμοίως ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ  $\frac{9}{16}$  εἶναι  $\frac{3}{4}$ , διότι  $(\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16}$ .

Τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν παριστῶμεν μὲ τὸ σύμβολον  $\sqrt{\quad}$ , τὸ ὁποῖον λέγεται **ριζικόν**. Ἐντὸς τοῦ ριζικοῦ γράφομεν τὸν ἀριθμὸν, τοῦ ὁποῖου ζητοῦμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν. Οὕτως ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 64 σημειοῦται οὕτω :  $\sqrt{64}$ . Εἶναι δὲ  $\sqrt{64} = 8$ , διότι  $8^2 = 64$ .

§ 244. **Τέλεια τετράγωνα.** **Τετραγωνικὴ ρίζα ἀκριβῆς ἢ κατὰ προσέγγισιν.** Οἱ ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι τετράγωνα ἄλλων ἀριθμῶν, ὅπως 49, 64, 81, ...  $\frac{9}{16}$ ,  $\frac{25}{64}$ , ... λέγονται **τέλεια τετράγωνα**.

Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ἑνὸς τελείου τετραγώνου ἀκεραίου ἢ κλάσματος, εἶναι ἀντιστοίχως ἀκέραιος ἢ κλάσμα καὶ λέγεται ἀκριβῆς τετ. ρίζα αὐτοῦ. Οὕτω  $\sqrt{36} = 6$ ,  $\sqrt{100} = 10$ ,  $\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$ .

Ὁ ἀριθμὸς 20 δὲν εἶναι τέλειον τετράγωνον. Ἀμέσως μικρότερον τοῦ 20 τέλειον τετράγωνον εἶναι ὁ 16 καὶ ἀμέσως μεγαλύτερον εἶναι ὁ 25. Ἡ τετρ. ρίζα λοιπὸν τοῦ 20 εἶναι μικρότερα ἀπὸ τὴν  $\sqrt{25} = 5$  καὶ μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν  $\sqrt{16} = 4$ .

Ἄν δὲ λάβωμεν ὡς τετρ. ρίζαν τοῦ 20 τὸν 4, κάμνομεν λάθος. Ἀλλὰ τὸ λάθος τοῦτο εἶναι μικρότερον τῆς 1. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον ὁ 4 λέγεται τετρ. ρίζα τοῦ 20 κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος.

Ὅμοίως τετρ. ρίζα τοῦ 58 κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος εἶναι ὁ 7, διότι  $7^2 = 49 < 58$ , ἀλλὰ  $8^2 = 64 > 58$ . Γενικῶς :

**Τετραγωνικὴ ρίζα ἀκεραίου ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος λέγεται ὁ μεγαλύτερος ἀκέραιος, τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνον χωρεῖ εἰς αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν.**

Ἡ εὕρεσις τῆς τετρ. ρίζης ἀκριβοῦς ἢ κατὰ προσέγγισιν λέγεται **ἐξαγωγή τῆς τετραγωνικῆς ρίζης.**

Οἱ ἀριθμοί, οἱ περιλαμβανόμενοι μεταξὺ δύο διαδοχικῶν τελείων τετραγώνων, ἔχουν τὴν αὐτὴν, κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος, τετραγωνικὴν ρίζαν.

Οὕτως ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τῶν 65, 66, 67, ... 80, εἶναι ὁ 8 κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος.

§ 245. **Ἐξαγωγή τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ἑνὸς ἀκεραίου ἀριθμοῦ.** Διὰ νὰ ἐξαγάγωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἑνὸς ἀριθμοῦ μικροτέρου τοῦ 100, εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζωμεν ἀπὸ μνήμης τὰ τετράγωνα τῶν 10 πρώτων ἀριθμῶν.

Οὕτως ἡ  $\sqrt{81}$  εἶναι 9, διότι  $9^2 = 81$ . Ἡ  $\sqrt{75}$  εἶναι 8 κατὰ προσέγγισιν μονάδος.

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἀριθμοῦ μεγαλύτερου τοῦ 100 π.χ. τοῦ 74 568, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Χωρίζομεν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν εἰς διψήφια τμήματα, ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερὰ (τὸ τελευταῖον τμήμα δύναται νὰ εἶναι μονοψήφιον).

Εὐρίσκομεν ἔπειτα τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 7, ἢ ὁποία εἶναι 2 (κατὰ προσέγγισιν ἀκ. μονά-

7'45'68	273 τ. ρίζα		
4	48	47	543
34.5	8	7	3
32 9	384	329	1629
1 66.8			
1 62 9			
3 9			

δος). Το 2 είναι το πρώτον ψηφίον τῆς ρίζης τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ. Γράφομεν τοῦτο δεξιὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον τὸ χωρίζομεν διὰ κατακορύφου γραμμῆς. Ἀφαιροῦμεν ἔπειτα τὸ τετράγωνον τοῦ 2, δηλ. τὸν 4, ἀπὸ τὸν 7 καὶ δεξιὰ τοῦ ὑπολοίπου 3 καταβιβάζομεν τὸ ἀκόλουθον διψήφιον τμήμα, ὁπότε σχηματίζεται ὁ ἀριθμὸς 345. Χωρίζομεν διὰ στιγμῆς τὸ τελευταῖον ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ 345.

Διπλασιάζομεν τὸ ψηφίον 2 τῆς ρίζης καὶ τὸ διπλάσιον αὐτοῦ 4 γράφομεν κάτωθι τοῦ 2. Παρατηροῦμεν πόσας φορές χωρεῖ ὁ 4 εἰς τὸν 34. Ὁ 4 εἰς τὸν 34 χωρεῖ 8. Γράφομεν τὸ 8 παραπλευρῶς τοῦ 4 καὶ τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν 48 πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 8. Ἐπειδὴ τὸ γινόμενον  $48 \times 8 = 384$  δὲν δύναται νὰ ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τὸν 345, θέτομεν παραπλευρῶς τοῦ 4 τὸν 7 (ἀμέσως κατώτερον τοῦ 8). Τὸ γινόμενον  $47 \times 7 = 329$  ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὸν 345 καὶ ἐπομένως τὸ 7 εἶναι τὸ δεύτερον ψηφίον τῆς ρίζης. Γράφομεν τὸν 7 παραπλευρῶς τοῦ 2. Ἀφαιροῦμεν ἔπειτα τὸ γινόμενον 329 ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 345 καὶ εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον 16.

Δεξιὰ αὐτοῦ καταβιβάζομεν τὸ ἀκόλουθον διψήφιον τμήμα 68, ὁπότε προκύπτει ὁ ἀριθμὸς 1 668. Τούτου χωρίζομεν πάλιν τὸ τελευταῖον ψηφίον 8 διὰ στιγμῆς. Διπλασιάζομεν τὸ εὔρεθὲν μέρος τῆς ρίζης 27 καὶ τὸ διπλάσιον τούτου 54 γράφομεν κάτωθι τῆς ὀριζοντίου γραμμῆς. Διαιροῦμεν τὸ 166 διὰ τοῦ 54. Τὸ πηλίκον εἶναι 3. Γράφομεν τὸ 3 δεξιὰ τοῦ 54, ὁπότε προκύπτει ὁ ἀριθμὸς 543. Πολλαπλασιάζομεν τοῦτον ἐπὶ 3 καὶ τὸ γινόμενον  $543 \times 3 = 1 629$  ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸ 1 668 καὶ εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον 39. Τὸ 3 εἶναι τὸ τρίτον ψηφίον τῆς ρίζης· γράφομεν τοῦτο παραπλευρῶς τοῦ 27. Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα λοιπὸν τοῦ 74 568 εἶναι 273 κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος.

Ὅμοιως ἐργαζόμενοι εὐρίσκομεν ὅτι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 5 625 εἶναι 75 ἀκριβῶς.

*Παρατήρησις.* Ἐὰν μία ἐκ τῶν ἐκτελουμένων διαιρέσεων δώσῃ πηλίκον μηδέν, γράφομεν ἕνα 0 δεξιὰ τοῦ προηγούμενου ψηφίου τῆς ρίζης καὶ καταβιβάζομεν τὸ ἀκόλουθον διψήφιον τμήμα. Ἄν πάλιν μία ἐκ τῶν ἐκτελουμένων διαιρέσεων δώσῃ πηλίκον μεγαλύτερον τοῦ 9, ἀρχίζομεν τὰς δοκιμὰς ἀπὸ τοῦ 9.

56'25	75
49	145
72.5	5
72 5	725
0	

§ 246. **Δοκιμή.** Διὰ νὰ εἶναι τὸ ἐξαγόμενον τῆς πράξεως ἀκριβές, πρέπει :

1ον. Κάθε ὑπόλοιπον νὰ μὴ ὑπερβαίνει τὸ διπλάσιον τοῦ εὑρεθέντος μέρους τῆς ρίζης.

2ον. Τὸ τετράγωνον τῆς ρίζης αὐξανόμενον κατὰ τὸ ὑπόλοιπον νὰ δίδῃ τὸν δοθέντα ἀριθμὸν.

Π.χ. Εἶδομεν ἀνωτέρω ὅτι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ 74568 εἶναι 273 καὶ τὸ ὑπόλοιπον 39. Ἡ πράξις εἶναι ἀκριβής, διότι  $273^2 + 39 = 74\,529 + 39 = 74\,568$ .

**Σημείωσις 1η.** Ἐὰν ὁ ἀκέραιος ἀριθμὸς λήγῃ εἰς 2 ἢ 3 ἢ 7 ἢ 8 ἢ εἰς περιττὸν ἀριθμὸν μηδενικῶν δὲν εἶναι τετράγωνον ἄλλου.

**Σημείωσις 2α.** Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ἑνὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ ἀκεραίου του.

Π.χ. ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 25,17 κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος εἶναι 5. Διότι  $5^2 = 25 < 25,17$  ἐνῶ  $6^2 = 36 > 25,17$ .

§ 247. **Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{10}$ ,**

$\frac{1}{100}$  κ.λ.π. Ἐὰν σχηματίσωμεν τὸ τετράγωνον τῶν ἀριθμῶν

$$\frac{1}{10} \quad \frac{2}{10} \quad \dots \quad \frac{16}{10} \quad \frac{17}{10} \quad \frac{18}{10}$$

εὐρίσκομεν ἀντιστοίχως τοὺς ἀριθμοὺς

$$\frac{1}{100} \quad \frac{4}{100} \quad \dots \quad \frac{256}{100} \quad \frac{289}{100} \quad \frac{324}{100}$$

Ἐὰν συγκρίνωμεν αὐτὰ τὰ τετράγωνα πρὸς τὸν ἀριθμὸν π.χ. 3, βλέπομεν εὐκόλως ὅτι ὁ 3 περιέχεται μεταξύ τῶν ἀριθμῶν 2,89 καὶ 3,24. Εἶναι δηλαδή  $2,89 < 3 < 3,24$  ἢ  $1,7^2 < 3 < 1,8^2$ .

Ἐκ τῶν σχέσεων ταύτας ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 3 εἶναι μεταξύ τοῦ 1,7 καὶ τοῦ 1,8, οἱ ὅποιοι διαφέρουν κατὰ  $\frac{1}{10}$ .

Ἐὰν λοιπὸν λάβωμεν ὡς τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 3 τὸν ἀριθμὸν 1,7 ἢ  $\frac{17}{10}$ , κάμνομεν λάθος μικρότερον ἀπὸ  $\frac{1}{10}$ .

Δι' αὐτὸ ὁ ἀριθμὸς 1,7 λέγεται τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 3 κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{10}$ . Ὡστε :

Τετραγωνική ρίζα ενός αριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν  $\frac{1}{10}$  εἶναι τὸ μεγαλύτερον ἀπὸ τὰ κλάσματα μὲ παρονομαστήν 10, τὰ ὅποια ἔχουν τετράγωνα μικρότερα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον.

Αὐτὴ ἡ ἐργασία, τὴν ὁποίαν ἐκάμαμεν προηγουμένως, διὰ τὴν εὐρωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν 1,7 τοῦ 3, εἶναι πολὺ ἐπίτιμος.

Πρακτικῶς διὰ τὴν εὐρωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἐνὸς ἀκεραίου ἢ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,1 ἢ 0,01 ἢ 0,001... ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Πολλαπλασιάζομεν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ τετράγωνον τοῦ 10 ἢ τοῦ 100 ἢ τοῦ 1000 κ.τ.λ. καὶ τοῦ προκύπτοντος ἀριθμοῦ ἐξάγομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν ἀκ. μονάδος. Τὴν οὕτως εὐρεθεῖσαν ρίζαν διαιροῦμεν ἔπειτα διὰ 10 ἢ 100 ἢ 1000...

*Παραδείγματα.* Νὰ ἐξαχθῇ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα κατὰ προσέγγισιν 0,01 (ὄν) τοῦ ἀριθμοῦ 3, 2ὄν) τοῦ ἀριθμοῦ 45,7.

3'00'00	173	45'7 0'0 0	676	
1	27	36	127	1346
20.0	7	97.0	7	6
189	189	889	889	8076
110.0		810.0		
1029		8076		
71		24		

Ὡστε:  $\sqrt{3} = 1,73$  κατὰ προσέγγισιν 0,01·ὑπόλοιπον 0,0071.

$\sqrt{45,7} = 6,76$  κατὰ προσέγγισιν 0,01·ὑπόλοιπον 0,0024.

§ 248. Ἐξαγωγή τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ἐνὸς κλάσματος. Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα ἐνὸς κλάσματος εὐρίσκεται, ἂν διαιρέσωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τῆς τετραγωνικῆς ρίζης τοῦ παρονομαστοῦ.

Κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ κανόνος τούτου εἶναι δυνατόν νὰ παρουσιασθοῦν αἱ κάτωθι περιπτώσεις :

*Περίπτωσης 1η.* Ἐὰν οἱ δύο ὄροι τοῦ κλάσματος εἶναι τέλεια τετράγωνα. Ἐστω τὸ κλάσμα  $\frac{25}{36}$ . Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα του εἶναι :

$$\sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{36}} = \frac{5}{6}. \text{ 'Ομοίως είναι : } \sqrt{\frac{1}{49}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{49}} = \frac{1}{7}.$$

*Περίπτωσης 2α.* Ἐὰν μόνον ὁ παρονομαστής εἶναι τέλειον τετράγωνον.

$$\text{Π.χ. θὰ εἶναι } \sqrt{\frac{2}{81}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{81}} = \frac{1,41}{9}.$$

$$\text{'Ομοίως εἶναι } \sqrt{\frac{58}{64}} = \frac{\sqrt{58}}{\sqrt{64}} = \frac{7,6}{8} = \frac{76}{80}.$$

*Περίπτωσης 3η.* Ἐὰν ὁ παρονομαστής δὲν εἶναι τέλειον τετράγωνον. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν πολλαπλασιάζομεν καὶ τοὺς δύο ὄρους τοῦ κλάσματος ἐπὶ τὸν παρονομαστὴν του καὶ ἐργαζόμεθα ἔπειτα ὅπως εἰς τὴν 2α περίπτωσιν.

$$\text{Π.χ. } \sqrt{\frac{5}{12}} = \sqrt{\frac{5 \times 12}{12 \times 12}} = \frac{\sqrt{60}}{\sqrt{144}} = \frac{7,7}{12} = \frac{77}{120}.$$

*Σημείωσις.* Δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν τὸ κλάσμα εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν καὶ νὰ εὕρωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,1, ἢ 0,01 ἢ 0,001...

#### Ἀ σ κ ή σ ε ι ς

474 ) Νὰ ἐξαχθῆ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τῶν κάτωθι ἀριθμῶν :

$$441 \quad 2\,704 \quad 7\,056 \quad 697\,225$$

475 ) Νὰ ἐξαχθῆ κατὰ προσέγγισιν ἀκ. μονάδος ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τῶν κάτωθι ἀριθμῶν :

$$5\,179 \quad 5\,741 \quad 57\,482 \quad 82\,609$$

$$5\,039,47 \quad 437,89 \quad 99\,225,08 \quad 12\,324,8$$

476 ) Νὰ ὑπολογισθῆ κατὰ προσέγγισιν 0,01 ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τῶν κάτωθι ἀριθμῶν :

$$5 \quad 7 \quad 11 \quad 13 \quad 437 \quad 57,98 \quad 457,63 \quad 69,560$$

477 ) Νὰ ἐξαχθῆ ἀπὸ μνήμης ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τῶν κάτωθι κλασμάτων :

$$\frac{25}{36} \quad \frac{49}{81} \quad \frac{1}{100} \quad \frac{64}{9} \quad \frac{36}{100}$$


478 ) Νὰ ἐξαχθῆ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τῶν κάτωθι κλασμάτων κατὰ προσέγγισιν 0,01 :

$$\frac{12}{81} \quad \frac{24}{25} \quad \frac{55}{49} \quad \frac{47}{100} \quad \frac{174}{1025} \quad \frac{912}{1849}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'  
ΜΕΤΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

§ 249. **Μέτρον ποσοῦ.** Γνωρίζομεν ὅτι, διὰ νὰ μετρήσωμεν ἓνα συνεχές ποσόν, πρέπει νὰ τὸ συγκρίνωμεν πρὸς ἓνα ἄλλο ὁμοειδές καὶ γνωστὸν ποσόν, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς μονάδα. Ἐκ τῆς συγκρίσεως αὐτῆς προκύπτει ἓνας ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται **μέτρον** τοῦ ποσοῦ καὶ ὁ ὁποῖος φανερώνει ἀπὸ πόσας μονάδας καὶ μέρος αὐτῆς ἀποτελεῖται τὸ δοθὲν ποσόν.

§ 250. **Μονάδες μήκους.** Τὸ ἐξαγόμενον τῆς μετρήσεως μιᾶς



γραμμῆς λέγεται **μῆκος** αὐτῆς. Αἱ δὲ μονάδες, τὰς ὁποίας χρησιμοποιοῦμεν διὰ τὴν μέτρησιν τῶν γραμμῶν, λέγονται **μονάδες μήκους**. Συνηθέστεραι δὲ μονάδες μήκους εἶναι αἱ ἑξῆς :

α' ) 1ον. Τὸ μέτρον ἢ ὁ βασιλικὸς πῆχυς. Τὸ μέτρον ὠρίσθη ἴσον μὲ τὸ


$$\frac{1}{40\,000\,000}$$

τοῦ γηίνου μεσημβρινοῦ (σχ. 7).

Ἐποδιαίρεσεις τοῦ μέτρον. Τὸ μέτρον διαιρεῖται εἰς δέκα ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα λέγονται **παλάμαι**.

Σχ. 7

Κάθε παλάμη διαιρείται επίσης εις 10 ἴσα μέρη (σχ. 8), τὰ ὁποῖα λέγονται **δάκτυλοι** (κοινῶς **πόντοι**).



*Ἡ παλάμη διηρημένη εἰς 10 δακτύλους.*

Σχ. 8

Κάθε δὲ δάκτυλος διαιρεῖται εἰς 10 ἴσας γραμμάς.

Ἔστω :

1 μέτρ.	=	10 παλ.	=	100 δακτ.	=	1 000 γραμμ.
1	»	=	10	»	=	100
		1	»	=	10	»

Ὁ δάκτυλος λοιπὸν εἶναι τὸ  $\frac{1}{100}$  τοῦ μέτρου· δι' αὐτὸ λέγεται καὶ **ἐκατοστόμετρον**.

Ἡ γραμμὴ εἶναι  $\frac{1}{1000}$  τοῦ μέτρου· δι' αὐτὸ λέγεται καὶ **χιλιοστόμετρον**.

Ὡς παρατηροῦμεν, κάθε μία τῶν ἀνωτέρω μονάδων εἶναι δεκαπλασία τῆς ἀμέσως κατωτέρας τῆς. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ γράφωμεν τὰ μήκη τῶν γραμμῶν ὡς δεκαδικούς ἀριθμούς.

Ἀντὶ π.χ. νὰ εἴπωμεν ὅτι μία γραμμὴ ἔχει μῆκος 5 μέτρα 6 παλάμας 7 δακτύλους 9 γραμμάς, λέγομεν ὅτι ἔχει μῆκος 5,679 μέτρα. Καὶ ἀντιστρόφως, μῆκος 3,468 μ. εἶναι ἴσον πρὸς μῆκος 3 μέτρων 4 παλαμῶν 6 δακτύλων 8 γραμμῶν.

Πολλαπλασία τοῦ μέτρου εἶναι τὰ ἑξῆς :

Τὸ <b>δεκάμετρον</b>	τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ	10 μ.
Τὸ <b>ἐκατόμμετρον</b>	» » » »	100 μ.
Τὸ <b>χιλιόμετρον ἢ στάδιον*</b>	» » » »	1 000 μ.

2ον. Ὁ **μικρὸς πῆχυς τῆς Κωνσταντινουπόλεως**, ὁ ὁποῖος λέγεται καὶ ἀπλῶς **πῆχυς**. Ὁ πῆχυς ἰσοῦται πρὸς τὰ 0,648 μ. περίπου καὶ διαιρεῖται εἰς 8 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα λέγονται **ροῦπια**. Τὸν πῆχυν χρησιμοποιοῦμεν συνήθως διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ὑφασμάτων\*\*.

\* Τὸ στάδιον ἦτο μονὰς μήκους καὶ τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων ἴση πρὸς 185 μέτρα περίπου.

\*\* Ἀπὸ τινος χρόνου ἀντικατεστάθη οὗτος ὑπὸ τοῦ μέτρου.

3ον. Ὁ **τεκτονικὸς πῆχυς**, ὁ ὅποιος ἰσοῦται μὲ τὰ 0,75 τοῦ μέτρ. β') Εἰς τὴν Ἑγγλίαν καὶ τὰς Ἑνωμένας Πολιτείας μεταχειρίζονται τὴν **ὑάρδα**, ἡ ὅποια εἶναι ἴση μὲ τὰ 0,914 περίπου τοῦ μέτρου. Διαιρεῖται εἰς 3 **πόδας**, ἕκαστος δὲ πούς εἰς 12 **δακτύλους** (ἴντσες). γ') Οἱ ναυτικοὶ χρησιμοποιοῦν τὰς κάτωθι μονάδας :

1ον. Τὴν **ναυτικὴν λεύγαν** = 5555,55 μ.

2ον. Τὸ **ναυτικὸν μίλιον** = 1852 μ. Τὸ ναυτικὸν μίλιον εἶναι τὸ μήκος ἑνὸς πρώτου λεπτοῦ τῆς μοίρας τῆς περιφέρειας τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς Γῆς.

3ον. Τὸν **κόμβον**. Ὁ κόμβος εἶναι τὸ ἑκατοστὸν εἰκοστὸν τοῦ ναυτικοῦ μιλίου, ἤτοι ἰσοῦται μὲ 15,43 μέτρα. Ὁ κόμβος εἶναι μονάς, τὴν ὁποίαν χρησιμοποιοῦν οἱ ναυτικοὶ διὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν ταχύτητα τῶν πλοίων. Διὰ νὰ ὑπολογίσουν τὴν ταχύτητα ἑνὸς πλοίου εὐρισκομένου ἐν πλῶ, ἀριθμοῦν (\*) πόσους κόμβους διανύει τὸ πλοῖον εἰς 30 δευτερόλεπτα.

Οὕτως, ἂν ἓνα πλοῖον εἰς 30 δευτερόλεπτα διανύη 10 κόμβους, ἔχει ταχύτητα 10 μιλίων, δηλαδὴ  $1852 \times 10 = 18520$  μέτρα εἰς 1 ὥραν. Ὅμοιως, ἂν μία τορπίλη διανύη 25 κόμβους, ἔχει ταχύτητα 25 μιλίων καθ' ὥραν.

### Ἀσκήσεις

479 ) Πόσον μέρος τοῦ μέτρου εἶναι ἓνα ρούπι καὶ πόσα ρούπια ἔχει ἓνα μέτρον ;

480 ) Νὰ τραποῦν : 1ον ) 48 πήχεις εἰς μέτρα, 2ον ) 25,80 μέτρα εἰς πήχεις καὶ εἰς ὑάρδας καὶ 3ον ) 58 ὑάρδαί εἰς μέτρα καὶ εἰς πήχεις.

\* Ἡ ἀρίθμησις τῶν κόμβων γίνεται ὡς ἐξῆς : Ἀπὸ τὸ πλοῖον πετοῦν εἰς τὴν θάλασσαν ἓνα μεταλλικὸν ὄργανον, τὸ **δρομόμετρον**. Τὸ δρομόμετρον εἶναι συνδεδεμένον μὲ ἓνα καλώδιον, τὸ ὅποιον φέρει κόμβους εἰς ἀπόστασιν 15,43 μ. ὁ ἓνας ἀπὸ τὸν ἄλλον. Τὸ δρομόμετρον μένει σχεδὸν ἀκίνητον, ὅταν τὸ πλοῖον ἐξακολουθῇ τὴν πορείαν του. Ἀφίνου ἐπειτα νὰ ξεδιπλωθῇ τὸ καλώδιον ἐπὶ ἥμισυ λεπτόν τῆς ὥρας ( 30'' ) καὶ ἀριθμοῦν πόσοι κόμβοι διήλθον, κατὰ τὸν χρόνον αὐτόν, ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ ὑπολογίζοντος τὴν ταχύτητα. Ἐάν π.χ. διήλθον 15 κόμβοι, κατὰ τὸν χρόνον αὐτόν, τὸ πλοῖον διανύει κατὰ τὸ ἥμισυ λεπτόν  $15,43 \text{ μέτρα} \times 15$  καὶ ἐπομένως καθ' ὥραν διανύει  $15,43 \mu. \times 15 \times 120$  ἢ  $( 15,43 \times 120 ) \mu. \times 15$  ἢ 1 μιλ.  $\times 15 = 15$  μίλια. ( Ἐπειδὴ ὁ κόμβος εἶναι τὸ  $\frac{1}{120}$  τοῦ ναυτικοῦ μιλίου ).

481 ) Τὸ μέτρον ἑνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 24 δραχ. Πόσον τιμᾶται ὁ πῆχυς καὶ πόσον ἡ ὑάρδα ;

482 ) Ἡ ὑάρδα ἑνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 84 δραχ. Πόσον τιμᾶται τὸ μέτρον καὶ πόσον ὁ πῆχυς ;

483 ) Ὁ πῆχυς ἑνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 78 δραχ. Πόσον τιμᾶται τὸ μέτρον καὶ πόσον ἡ ὑάρδα ;

§ 251. Μονάδες ἐπιφανειῶν. α') Αἱ συνήθεις μονάδες, μετὰ τὰς ὁποίας μετροῦμεν τὰς ἐπιφανείας, εἶναι αἱ ἑξῆς :

1ον. Τὸ **τετραγωνικὸν μέτρον** (τ.μ.). Αὐτὸ εἶναι τετράγωνον μετὰ πλευρὰν 1 μέτρον.

Ἐποδιαίρεσεις τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρον. Τὸ τετρ. μέτρον διαιρεῖται εἰς 100 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα λέγονται **τετραγωνικαὶ παλάμαι**. Εἶναι δὲ ἡ τετρ. παλάμη ἓνα τετράγωνον μετὰ πλευρὰν 1 παλάμης.

Ἡ τετραγωνικὴ παλάμη διαιρεῖται εἰς 100 ἴσα τετράγωνα μετὰ πλευρὰν 1 δακτύλου, τὰ ὁποῖα λέγονται **τετραγωνικοὶ δάκτυλοι** ἢ **τετραγωνικὰ ἑκατοστόμετρα** (σχ. 9).

Κάθε τετραγ. δάκτυλος διαιρεῖται εἰς 100 ἴσα τετράγωνα μετὰ πλευρὰν 1 γραμμῆς. Αὐτὰ λέγονται **τετραγωνικὰ γραμμὰ** ἢ **τετραγωνικὰ χιλιοστόμετρα**.

Κατὰ ταῦτα :

1 τετρ.μέτρον	=	100 τ.παλ.	=	10 000 τ.δακτ.	=	1 000 000 τ.γρ.
		1 τ.παλ.	=	100 τ.δακτ.	=	10 000 τ.γρ.
				1 τ.δακτ.	=	100 τ.γρ.

Ἐπειδὴ κάθε μία τῶν ἀνωτέρω μονάδων εἶναι ἑκατονταπλάσια τῆς ἀμέσως κατωτέρας τῆς, δυνάμεθα νὰ γράφωμεν τὰ ἔμβαδὰ τῶν ἐπιφανειῶν ὡς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς.


Π.χ. ἀντὶ νὰ εἴπωμεν ὅτι μία ἐπιφάνεια ἔχει ἔμβαδὸν 4 τ.μ. 12 τ.παλ. 7 τ.δ., λέγομεν ὅτι ἔχει ἔμβαδὸν 4,1207 τ.μ. Καὶ ἀντιστρόφως, ἔμβαδὸν 3,047380 τ.μέτρ. εἶναι ἴσον μετὰ 3 τ.μ. 4 τ.παλ. 73 τ.δακτ. καὶ 80 τ.γρ.

Πολλαπλάσια τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρον εἶναι :

Τὸ **βασιλικὸν στρέμμα**, τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μετὰ 1.000 τ.μ.

Τὸ **παλαιὸν στρέμμα**, τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μετὰ 1 270 τ.μ.

Τὸ τετραγωνικὸν χιλιόμετρον. Τοῦτο εἶναι ἓνα τετράγωνον με πλευρὰν 1 000 μέτρων. Ἔχει ἐπομένως  $1\ 000 \times 1\ 000 = 1\ 000\ 000$  τετ. μέτρα. Μεταχειριζόμεθα δὲ αὐτὸ διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἐπιφανειῶν πολὺ μεγάλων ἐκτάσεων π.χ. νομῶν, κρατῶν, ἡπείρων.



Ἡ τετρ. παλάμη διηρημένη εἰς 100 τετρ. δακτύλους

Σχ. 9

2ον. Ὁ τετραγωνικὸς τεκτονικὸς πήχυς. Αὐτὸς εἶναι ἓνα τετράγωνον με πλευρὰν ἓνα τεκτονικὸν πήχυον δηλ. 0,75 μ. ἢ  $\frac{3}{4}$  τοῦ μέτρου. Αὐτὸς λοιπὸν ἰσοῦται πρὸς  $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$  τοῦ τετρ. μέτρου.

\*Άλλοτε πολύ συχνά μετεχειρίζοντο τὸν τ.τ. πῆχυν διὰ τὴν μέτρησιν τῶν οἰκοπέδων. Βαθμηδὸν ὅμως ἡ χρῆσις αὐτοῦ περιορίζεται.

β') Εἰς τὴν Γαλλίαν διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἐπιφανειῶν χρησιμοποιοῦν : 1ον τὸ **τετραγωνικὸν μέτρον**, 2ον τὸ **ἄρ** (are) = 100 τ.μ. καὶ 3ον τὸ **ἑκτάρ** (hectare) = 100 ἄρ = 10 000 τ.μ.

### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

484 ) Νὰ τραποῦν :

1ον ) 350 τ.τ. πῆχ. εἰς τ.μέτρα καὶ 2ον ) 400 τ.μ. εἰς τ.τ. πῆχεις.

485 ) Ἐνα οἰκόπεδον 420 τ.τ. πῆχ. πωλεῖται πρὸς 320 δρχ. τὸ τ. μέτρον. Πόσον τιμᾶται ;

486 ) Ἐνα οἰκόπεδον 560 τ.μ. πωλεῖται πρὸς 25 δρχ. τὸν τ.τ. πῆχυν. Πόσον τιμᾶται ;

487 ) Ἐνα οἰκόπεδον ἐπωλήθη ἀντὶ 14 400 δρχ. Πόσους τ.τ. πῆχεις ἦτο τὸ οἰκόπεδον, ἂν τὸ τ.μ. ἐπωλήθη πρὸς 36 δρχ. ;

§ 252. **Μονάδες ὄγκου καὶ χωρητικότητος.** α') Ὡς μονὰς διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ὄγκων τῶν σωμάτων λαμβάνεται τὸ **κυβικὸν μέτρον**. Τοῦτο εἶναι ἕνας κύβος μὲ ἀκμὴν ἑνὸς μέτρον.

Ἐποδιαίρεσις τοῦ κυβικοῦ μέτρον. Τὸ κυβικὸν μέτρον διαιρεῖται εἰς 1 000 ἴσους κύβους μὲ ἀκμὴν μιᾶς παλάμης. Κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς λέγεται **κυβικὴ παλάμη** (σχ. 10).

Κάθε κυβικὴ παλάμη διαιρεῖται εἰς 1 000 κύβους μὲ ἀκμὴν ἑνὸς δακτύλου. Κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς λέγεται **κυβικὸς δάκτυλος**.

Κάθε κυβικὸς δάκτυλος διαιρεῖται εἰς 1 000 **κυβικὰς γραμμὰς**, δηλ. κύβους μὲ ἀκμὴν μιᾶς γραμμῆς.


Κατὰ ταῦτα :

1 κ.μ. = 1 000 κ.παλ. = 1 000 000 κ.δ. = 1 000 000 000 κ.γρ.
1 » = 1 000 » = 1 000 000 »
1 » = 1 000 »

\*Ἐπειδὴ κάθε μία ἐκ τῶν ἀνωτέρω μονάδων εἶναι 1 000 φορές μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν ἀμέσως κατωτέρα, διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ γράφωμεν τοὺς ὄγκους τῶν σωμάτων ὡς δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ γράφωμεν ὡς ἀκέραιον μέρος τὰ κυβικὰ μέτρα, ὡς χιλιοστὰ

τὰς κυβ. παλάμας, ὡς ἑκατομμυριοστὰ τοὺς κυβ. δακτύλους καὶ ὡς δισεκατομμυριοστὰ τὰς κυβ. γραμμάς.

Π.χ. ἀντὶ νὰ εἴπωμεν ὅτι ἕνας ὄγκος εἶναι 5 κ.μ. 254 κ.παλ. 65 κ.δακτ. 156 κ.γρ., λέγομεν ὅτι ὁ ὄγκος οὗτος εἶναι 5,254065156



Σχ. 10

κυβικά μέτρα. Καὶ ἀντιστρόφως, ἕνας ὄγκος 2,0548756 κ.μ. ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 κ.μ. 54 κ.παλ. 875 κ.δ. καὶ 600 κ.γρ.

β') Αἱ συνηθέστεραι μονάδες χωρητικότητος εἶναι αἱ ἑξῆς :

1ον. Ἡ λίτρα. Ὁ χώρος αὐτῆς ἔχει ὄγκον μιᾶς κυβ. παλάμης.

2ον. Ἡ μετρικὴ ὄκα. Αὐτὴ εἶναι ἕνα δοχεῖον, τὸ ὁποῖον χωρεῖ

ὕδωρ ἀπεσταγμένον  $4^{\circ}$  K καὶ βάρους μιᾶς ὀκάς. Μεταξὺ τῆς λίτρας καὶ τῆς μετρικῆς ὀκάς ὑπάρχει ἡ σχέσις :

1 μετρικὴ ὀκά = 1,280 λίτρας.

γ' ) Διὰ τοὺς δημητριακοὺς καρποὺς μεταχειρίζονται οἱ χωρικοὶ τὸ **μετρικὸν κιλόν**. Αὐτὸ ἔχει 100 λίτρας. Ἐπομένως ὁ χῶρος του ἔχει ὄγκον 100 κυβ. παλάμας, ἤτοι  $\frac{1}{10}$  τοῦ κυβικοῦ μέτρου.

Τὰ ἐκ τῆς Ἀμερικῆς εἰσαγόμενα σιτηρὰ ἐκτιμῶνται εἰς **μποῦσελ** = 36,348 λίτρας.

δ' ) Οἱ ναυτικοὶ διὰ τὴν μέτρησιν τῆς χωρητικότητος τῶν πλοίων μεταχειρίζονται τὸν **τόννον** τῶν πλοίων ἢ **κόρον**. Ὁ χῶρος αὐτοῦ ἔχει ὄγκον 2,85 κυβικὰ μέτρα.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

488 ) Μία ἀποθήκη ἔχει ἐσωτερικὸν ὄγκον 2 000 κυβ. μέτρα. Πόσα κιλὰ σίτου χωρεῖ ;

489 ) Τὸ ἐσωτερικὸν ἐνὸς πλοίου ἔχει ὄγκον 5 700 κυβ. μέτρα. Πόσων τόννων εἶναι ἡ χωρητικότης αὐτοῦ ;

§ 253. Μονάδες βάρους. α' ) Οἱ περισσότεροι πολιτισμένοι λαοὶ μεταχειρίζονται τὰς ἐξῆς μονάδας βάρους :

Τὸ **γραμμάριον**, δηλ. τὸ βᾶρος ἀπεσταγμένου ὕδατος  $4^{\circ}$  K., τὸ ὅποιον ἔχει ὄγκον 1 κυβικοῦ δακτύλου.

Τὸ **χιλιόγραμμον** = 1 000 γραμμάρια. Εἶναι δὲ τοῦτο βᾶρος ἀπεσταγμένου ὕδατος  $4^{\circ}$  K., τὸ ὅποιον ἔχει ὄγκον μίαν κυβ. παλάμην.

Τὸν **τόννον** = 1 000 χιλιόγρ. = 1 000 000 γραμμάρια. Ἐπομένως **τόννος** εἶναι τὸ βᾶρος ἀπεσταγμένου ὕδατος  $4^{\circ}$  K., τὸ ὅποιον ἔχει ὄγκον ἓνα κυβικὸν μέτρον.

β' ) Ἡμεῖς μεταχειρίζομεθα ἄλλοτε τὰς ἐξῆς μονάδας βάρους :  
1ον. Τὴν **ὀκᾶν**. Αὐτὴ διαιρεῖται εἰς 400 **δράμια**.

2ον. Τὸν **στατήρα**. Αὐτὸς ἰσοδυναμεῖ μὲ 44 ὀκάδας.

Ἡ ὀκά ἰσοδυναμεῖ μὲ 1 280 γραμμάρια ἢ 1,280 χιλιόγραμμα.

Τὸ χιλιόγραμμον ἰσοδυναμεῖ μὲ 312,5 δράμια.

Ὁ τόννος ἰσοδυναμεῖ μὲ 781 ὀκάδας καὶ 100 δράμια.

γ') Εἰς τὴν Πελοπόννησον διὰ τὸ βάρος τῆς σταφίδος μεταχειρίζονται τὸ **χιλιόλιτρον** = 375 ὀκάδας.

Εἰς τὴν Ἐπτανήσον μεταχειρίζονται καὶ τὴν **Ἀγγλικὴν λίτραν**, ἣ ὁποία ἔχει 453,55 γραμμάρια.

**Σημείωσις.** Διὰ τοὺς πολυτίμους λίθους λαμβάνεται ὡς μονὰς βάρους τὸ **καράτιον**, τὸ ὁποῖον ἰσοδυναμεῖ μὲ 0,205 γραμμάρια ἢ 0,20 γραμμάρια περίπου.

δ') Εἰς τὴν Ἀγγλίαν ἀρχικὴ μονὰς βάρους εἶναι ἡ **λίβρα** (Lb). Ἡ λίβρα ὑποδιαιρεῖται εἰς 16 **οὐγγιάς** (oz) καὶ κάθε οὐγγιά εἰς 16 **δράμια** (dr.). Ἡ 1 λίβρα ἰσοδυναμεῖ μὲ  $141 \frac{3}{4}$  δράμια ἢ μὲ 141,75 δράμια ἢ 1 οὐγγιά = 8,86 δράμια.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

490) Νὰ τραποῦν: 1ον) 3,025 κυβ. μέτρα εἰς λίτρας. 2ον) 175,400 κ.μ. εἰς κιλά. 3ον) 15 ὀκάδες εἰς χιλιόγραμμα. 4ον) 25,4 χιλιόγραμμα εἰς ὀκάδας.

491) Ἡ ὀκά τοῦ ἐλαίου τιμᾶται 25,6 δρχ. Πόσον τιμᾶται τὸ χιλιόγραμμον;

492) Τὸ χιλιόγραμμον ἑνὸς ἐμπορεύματος τιμᾶται 18 δρχ. Πόσον τιμᾶται ἡ ὀκά;

493) Μία δεξαμενὴ χωρεῖ 74 κ.μ. ὕδατος. Ὄταν εἶναι γεμάτη, ἀφήνομεν νὰ χυθοῦν 4500 λίτρα. Πόσαι ὀκάδες ὕδατος ἔμειναν εἰς τὴν δεξαμενὴν;

§ 254. Μονάδες χρόνου. Ἀρχικὴ μονὰς διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ χρόνου εἶναι ἡ **ἡμέρα** (ἡμερονύκτιον).

Εἶναι δὲ **ἡμέρα ὁ χρόνος μιᾶς πλήρους περιστροφῆς τῆς Γῆς περὶ τὸν ἄξονά της.**

Ἡ ἡμέρα διαιρεῖται εἰς 24 **ῥας**· κάθε ῥα εἰς 60 **πρῶτα λεπτά** (') καὶ κάθε πρῶτον λεπτόν εἰς 60 **δεύτερα λεπτά** (").

Πολλαπλάσια τῆς ἡμέρας εἶναι ἡ **ἐβδομάς** = 7 ἡμέραι, ὁ **μῆν**, τὸ **πολιτικὸν ἔτος** καὶ ὁ **αἰὼν**.

Ἀπὸ τὰ πολιτικὰ ἔτη ἄλλα εἶναι **κοινὰ** καὶ ἄλλα **δίσεκτα** ἔτη. Κάθε κοινὸν ἔτος ἔχει 365 ἡμέρας καὶ κάθε δίσεκτον 366 ἡμέρας. Δίσεκτα εἶναι τὰ ἔτη, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμὸς διαιρεῖται διὰ 4. Π.χ.

τὸ ἔτος 1948 ἦτο δίσεκτον. Ἐάν ὅμως ὁ ἀριθμὸς ἑνὸς ἔτους διαιρῆται διὰ 100, τοῦτο θὰ εἶναι δίσεκτον, ὅταν καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἑκατοντάδων αὐτοῦ διαιρῆται διὰ 4. Π.χ. τὸ ἔτος 1900 δὲν ἦτο δίσεκτον· τὸ ἔτος ὅμως 2 000 θὰ εἶναι δίσεκτον.

Τὸ ἔτος ἔχει 12 μῆνας. Ἀπὸ αὐτοὺς ἄλλοι ἔχουν 30 καὶ ἄλλοι 31 ἡμέρας, ἐκτὸς τοῦ Φεβρουαρίου. Οὗτος ἔχει 28 ἡμέρας κατὰ τὰ κοινὰ ἔτη καὶ 29 κατὰ τὰ δίσεκτα. Εἰς τὰς ἐμπορικὰς ὅμως συναλλαγὰς πρὸς εὐκολίαν ὅλοι οἱ μῆνες λογαριάζονται ἀπὸ 30 ἡμέρας. Ἐπομένως τὸ ἐμπορικὸν ἔτος θεωρεῖται ὅτι ἔχει  $30 \times 12 = 360$  ἡμέρας. Ὁ αἰὼν ἔχει 100 ἔτη.

**§ 255. Ποῖαι εἶναι αἱ συνηθέστεραι μονάδες τῶν τόξων.** Συνηθεστέρα μονὰς διὰ τὴν μέτρησιν τῶν τόξων εἶναι ἡ **μοῖρα** ( $^{\circ}$ ), ἥτοι τὸ  $\frac{1}{360}$  τῆς περιφερείας.

Ἡ μοῖρα διαιρεῖται εἰς 60 ἴσα μέρη, τὰ ὅποια λέγονται **πρῶτα λεπτὰ** τῆς μοίρας ( $'$ ) καὶ τὸ πρῶτον λεπτόν εἰς 60 δευτέρα λεπτὰ ( $''$ ).

Ἀπὸ τινων ἐτῶν ἤρχισε νὰ γίνεταί χρῆσις καὶ τοῦ βαθμοῦ ( $\gamma$ ), ἥτοι τοῦ  $\frac{1}{400}$  τῆς περιφερείας. Ὁ βαθμὸς διαιρεῖται εἰς 100 πρῶτα λεπτὰ καὶ τὸ πρῶτον λεπτόν εἰς 100 δευτέρα λεπτὰ.

#### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

494 ) Πόσα δευτερόλεπτα ἔχει ἡ ὥρα καὶ πόσα ἡ ἡμέρα ;

495 ) Πόσα δευτέρα λεπτὰ ἔχει ἡ μοῖρα καὶ πόσα μία περιφέρεια ;

496 ) Πόσων μοιρῶν καὶ πόσων βαθμῶν εἶναι τὸ  $\frac{1}{4}$  τῆς περιφερείας, τὸ  $\frac{1}{2}$  αὐτῆς καὶ τὰ  $\frac{3}{4}$  αὐτῆς ;

**§ 256. Μονάδες νομισμάτων.** Κατὰ τὸ ἔτος 1865 ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἑλβετία καὶ τὸ Βέλγιον προῆλθον εἰς ἔνωσιν, ἡ ὅποια ὠνομάσθη **Λατινικὴ νομισματικὴ ἔνωσις**. Κατ' αὐτὴν τὰ Κράτη αὐτὰ ἀνεγνώρισαν ὡς κοινὴν μονάδα νομισμάτων τὸ **φράγκον**.

Κατὰ τὸ 1868 προσεχώρησε καὶ ἡ Ἑλλάς εἰς τὴν ἔνωσιν αὐτὴν καὶ παρεδέχθη ὡς μονάδα τὸ φράγκον, τὸ ὅποῖον ἡμεῖς ὀνομάζομεν **δραχμὴν**. Εἶναι δὲ αὕτη νόμισμα βάρους 5 γραμμαρίων καὶ ἀποτελεῖται κατὰ τὰ 0,835 ἀπὸ ἄργυρον κατὰ δὲ τὰ 0,165 ἀπὸ χαλκόν.

Δηλ. εις ἓν γραμμάριον αὐτοῦ τοῦ κράματος ὑπάρχουν 0,835 τοῦ γραμμαρίου ἄργυρος, δηλ. πολύτιμον μέταλλον καὶ 0,165 τοῦ γραμμαρίου χαλκός. Δι' αὐτὸ λέγομεν ὅτι ὁ **βαθμὸς τῆς καθαρότητος** ἢ ὁ **τίτλος** αὐτοῦ τοῦ κράματος εἶναι 0,835.

Ἐκτὸς τῆς δραχμῆς τὰ Κράτη τῆς Λατινικῆς ἐνώσεως ἔκοψαν καὶ τὰ ἐξῆς νομίσματα :

**Χρυσᾶ.** Πεντάδραχμον, δεκάδραχμον, εἰκοσάδραχμον, πεντηκοντάδραχμον, ἑκατοντάδραχμον. Κάθε ἓνα ἀπὸ αὐτὰ ἐγινεν ἀπὸ κρᾶμα χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ βαθμοῦ καθαρότητος 0,900.

**Ἀργυρᾶ.** Πεντάδραχμον, δίδραχμον, πεντηκοντάλεπτον, εἰκοσάλεπτον. Αὐτὰ ἐγιναν ἀπὸ κρᾶμα ἀργύρου καὶ χαλκοῦ βαθμοῦ καθαρότητος 0,900 τὸ πεντάδραχμον καὶ 0,835 τὰ ἄλλα.

**Χαλκᾶ.** Διώβολον (δεκάρα), ὀβολὸς (πεντάρα), δίλεπτον καὶ μονόλεπτον. Αὐτὰ ἐγιναν ἀπὸ κρᾶμα 95 μερῶν χαλκοῦ, 4 μερῶν κασιτέρου καὶ 1 μέρους ἀντιμονίου.

Ἀπὸ πολλοῦ ὁμως τὸ Κράτος ἀπέσυρεν ἀπὸ τὴν κυκλοφορίαν ὅλα αὐτὰ τὰ νομίσματα καὶ οὐδὲν ἀπὸ αὐτὰ κυκλοφορεῖ.

Ἐντὶ αὐτῶν κυκλοφοροῦν χαρτονομίσματα τῶν 50, 100, 500 καὶ 1 000 δραχμῶν. Ἐκτὸς αὐτῶν κυκλοφοροῦν καὶ μεταλλικὰ κέρματα τῶν 20, 10, 5, 2, 1 δραχ. καὶ τῶν 50, 20, 10 καὶ 5 λεπτῶν.

Εἰς τὴν Ἑγγλίαν ἀρχικὴ μονὰς εἶναι ἡ **Ἑγγλικὴ λίρα** (£) **στερλίνα**. Αὐτὴ ἔχει 25,22 χρυσᾶ φράγκα.

Διαιρεῖται δὲ εἰς 20 **σελλίνια** (s), τὸ σελλίνιον εἰς 12 **πέννας** (p) καὶ ἡ πέννα εἰς 4 **φαρδίνια** (f).

Συμβολικῶς αἱ 5 λίρ. 18 σελ. 9 π. 3 φ. γράφονται 5-18-9-3.

Ἡ χρυσὴ Ἑγγλικὴ λίρα ἔχει βάρους 7,988 γραμμάρια καὶ βαθμὸν καθαρότητος 0,916.

Κυκλοφορεῖ δὲ κυρίως καὶ χαρτίνη Ἑγγλικὴ λίρα. Αὐτὴ διὰ νόμου ἔχει 80 ἰδικὰς μας δραχμάς. Ἐνῶ ἡ τιμὴ τῆς χρυσῆς λίρας κυμαίνεται σήμερον περὶ τὰς 280 δραχμάς.

Εἰς τὴν Ἀμερικὴν ἀρχικὴ μονὰς εἶναι τὸ **δολλᾶριον** (\$). Τοῦτο ἔχει 5,1825 χρυσᾶ φράγκα καὶ διαιρεῖται εἰς 100 **σέντς**. Παρ' ἡμῖν ἡ νόμιμος τιμὴ τοῦ χαρτίνου δολλαρίου εἶναι 30 δραχμαί.

Εἰς τὴν Τουρκίαν ἀρχικὴ μονὰς εἶναι ἡ **Τουρκικὴ λίρα** (χρυσῆ). Αὐτὴ ἔχει 22,80 χρυσᾶ φράγκα. Διαιρεῖται δὲ εἰς 100 **γρόσια**, τὸ γρόσιον δὲ εἰς 40 **παράδες**.

Εἰς τὴν **Αἴγυπτον** ἀρχικὴ μονὰς εἶναι ἡ **Αἰγυπτιακὴ λίρα** (χρυσῆ). Αὐτὴ ἔχει 25,74 χρυσᾶ φράγκα. Διαιρεῖται δὲ εἰς 100 γρόσια. Τὸ γρόσιον εἰς 40 παράδες καὶ ὁ παρᾶς εἰς 120 **τρεχούμενα ἄσπρα** ἢ 100 **καλὰ ἄσπρα**.

*Σημείωσις.* Ὅπως βλέπομεν, τὰ Τουρκικὰ καὶ Αἰγυπτιακὰ νομίσματα ἔχουν κοινὰ ὀνόματα. Ἡ ἀξία ὁμῶς τῶν ὁμωνύμων νομισμάτων τῶν χωρῶν αὐτῶν δὲν εἶναι ἡ αὐτή.

Εἰς τὴν **Γερμανίαν** ἀρχικὴ μονὰς ἦτο τὸ **μάριον** (R.M.), τὸ ὅποῖον εἶχε 13 χρυσᾶ φράγκα.

Εἰς τὴν **Ρωσίαν** ἀρχικὴ μονὰς εἶναι τὸ **ρούβλιον**. Τὸ 1 ρούβλιον = 100 **καπίκια**.

Αἱ ἐμπορικαὶ συναλλαγαὶ γίνονται συνήθως μὲ χάρτινα νομίσματα τῶν διαφόρων χωρῶν. Δι' αὐτὸ εἰς τὰς διαφόρους ἀσκήσεις, ὅταν λέγωμεν λίρας, δολλάρια κ.τ.λ. θὰ ἐννοοῦμεν χάρτινα τοιαῦτα.

#### Ἄσκήσεις

497 ) Πόσας δραχμὰς ἔχει τὸ σελλίνιον καὶ πόσας ἢ πέννα μὲ τὴν νόμιμον τιμὴν τῆς χαρτίνης Ἀγγλικῆς λίρας ;

498 ) Πόσας δραχμὰς ἔχει τὸ σέντς μὲ τὴν νόμιμον τιμὴν τοῦ δολλαρίου ;

499 ) Πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ δώσῃ τις, διὰ νὰ ἀγοράσῃ 25 λίρας Ἀγγλίας, διὰ νὰ τὰς στείλῃ εἰς τὸν ἐν Λονδίνω σπουδάζοντα υἱόν του ;

500 ) Ἄλλοτε, ὅταν οἱ εἰσαγωγεῖς ἐμπορευμάτων ἐξ Ἀμερικῆς ἠγόραζον δολλάρια, διὰ νὰ πληρώσουν τὰ ἐμπορεύματα αὐτά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν νόμιμον τιμὴν τοῦ δολλαρίου εἰς δραχμὰς ἐπλήρωναν καὶ ἓνα πρόσθετον ποσὸν κατὰ δολλάριον. Αὐτὸ τὸ πρόσθετον ποσὸν ἐλέγετο μπόν. Ἄν λοιπὸν ἓνας ἔμπορος ἠγόραζε 1 400 δολλάρια, πόσας δραχμὰς θὰ ἔδιδεν, ὅταν τὸ μπόν ἦτο 4,99 δραχμαί ;

501 ) Ἐνας ἔμπορος ἤθελε νὰ εἰσαγάγῃ ἀπὸ τὴν Ἀγγλίαν ἐμπορεύματα ἀξίας 500 Ἀγγλικῶν λιρῶν. Πόσας δραχμὰς θὰ ἔδιδε, διὰ νὰ ἀγοράσῃ ἀπὸ τὴν Τράπεζαν τὰς λίρας, ὅταν τὸ μπόν ἦξιζε 12,10 δραχ. κατὰ λίραν ;

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'

### ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

#### 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

§ 257. Τί είναι συμμιγείς ἀριθμοί. Ὄταν ἓνας ἔμπορος θέλη νὰ μάθῃ τὸ μήκος ἑνὸς τεμαχίου ὑφάσματος, τὸ ὁποῖον ἔμεινεν, μετρεῖ αὐτὸ μὲ τὸν πῆχυν.

Ἄς ὑποθέσωμεν π.χ. ὅτι ὁ πῆχυν χωρεῖ εἰς αὐτὸ 3 φορές, περισσεύει δὲ καὶ ἓνα μέρος ὀλιγώτερον ἀπὸ ἓνα πῆχυν. Αὐτὸ τὸ μετρεῖ μὲ τὸ ρούπι. Ἄν δὲ ἴδῃ ὅτι τὸ ρούπι χωρεῖ εἰς αὐτὸ π.χ. 5 φορές, λέγει ὅτι τὸ ὑφασμα ἔχει μήκος 3 πῆχεις καὶ 5 ρούπια.

Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη. Τὸ ἓνα ἀπὸ αὐτὰ γίνεται ἀπὸ τὸν πῆχυν καὶ τὸ ἄλλο ἀπὸ τὸ ρούπι, τὸ ὁποῖον εἶναι ὑποπολλαπλάσιον τοῦ πῆχεως. Λέγεται δὲ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς **συμμιγής**.

Ὅμοιως οἱ ἀριθμοὶ : 2 στατῆρες 15 ὀκάδες καὶ 100 δράμια καὶ 5 ὄρ. 20π 8δ εἶναι συμμιγεῖς ἀριθμοί. Ὡστε :

Συμμιγῆς ἀριθμὸς λέγεται κάθε συγκεκριμένους ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄλλους ἀριθμούς, τῶν ὁποίων αἱ μονάδες φέρουν ἰδιαίτερα ὀνόματα καὶ εἶναι πολλαπλάσια ἢ ὑποπολλαπλάσια μιᾶς ἀρχικῆς μονάδος.

Πρὸς διάκρισιν οἱ ἄλλοι συγκεκριμένοι ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι γίνονται ἀπὸ μίαν ὀρισμένην μονάδα ἢ μέρη αὐτῆς, λέγονται **ἀπλοῖ ἀριθμοί**.

Οὕτως οἱ ἀριθμοὶ  $3\frac{5}{8}$  ὀκάδες,  $15\frac{3}{4}$  ἡμέραι, 12 μέτρα κ.τ.λ. εἶναι ἀπλοῖ ἀριθμοί.

#### 2. ΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΙΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣ ΑΠΛΟΥΝ ΚΑΙ Τ' ΑΝΑΠΑΛΙΝ

§ 258. *Πρόβλημα.* Ἐκ μίαν κρήνην ρέουν 5 δράμια ὕδατος κατὰ δευτερόλεπτον. Νὰ εὑρεθῇ πόσον ὕδωρ χωρεῖ μία ὕδατα-

**ποθήκη, τὴν ὁποῖαν ἡ κρήνη αὐτὴ γεμίζει εἰς 2<sup>ω</sup>· 20<sup>π</sup> 30<sup>δ</sup>.**

*Λύσις.* Ἐάν γνωρίζωμεν εἰς πόσα δευτερόλεπτα γεμίζει αὐτὴ ἡ ἀποθήκη, εὐρίσκομεν ἀμέσως πόσον ὕδωρ χωρεῖ, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὰ 5 δράμια ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν δευτερολέπτων.

Πρέπει λοιπὸν νὰ τρέψωμεν τὸν συμιγῆ ἀριθμὸν 2 ὥρ. 20<sup>π</sup> 30<sup>δ</sup> εἰς δευτερόλεπτα.

Πρὸς τοῦτο εὐρίσκομεν πρῶτον ὅτι αἱ 2 ὥραι ἔχουν  $60 \times 2 = 120^{\pi}$ .

Εἰς αὐτὰ προσθέτομεν καὶ τὰ 20<sup>π</sup> τοῦ συμιγοῦς καὶ εὐρίσκομεν 140<sup>π</sup>.

Ἐπειτα εὐρίσκομεν ὅτι 140<sup>π</sup> ἔχουν  $60 \times 140 = 8\,400^{\delta}$ . Εἰς αὐτὰ δὲ προσθέτομεν καὶ τὰ 30<sup>δ</sup> τοῦ συμιγοῦς καὶ εὐρίσκομεν 8\,430 δευτερόλεπτα.

Ἡ ὕδαταποθήκη λοιπὸν χωρεῖ  $5 \times 8\,430 = 42\,150$  δράμια ὕδατος.

Ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦτο βλέπομεν ὅτι ὑπάρχουν προβλήματα, διὰ τὴν λύσιν τῶν ὁποίων χρειάζεται νὰ γνωρίζωμεν νὰ τρέπωμεν ἓνα συμιγῆ ἀριθμὸν εἰς ἀπλοῦν ἀκέραιον ἀριθμὸν.

Ἀπὸ τὸν τρόπον δέ, κατὰ τὸν ὁποῖον ἐγένετο ἡ προηγουμένη τροπὴ, ἐννοοῦμεν ὅτι διὰ νὰ γίνῃ ἀκέραιος ὁ συμιγῆς, πρέπει νὰ τροπῆ εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὸ προηγούμενον ἐπίσης παράδειγμα ἐννοοῦμεν εὐκόλα πῶς γίνεται ἡ τροπὴ αὐτὴ καὶ διατυπώνομεν τὸν σχετικὸν κανόνα.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

502 ) Νὰ τροποῦν :

1. 10 πήχεις καὶ 3 ρούπια εἰς ρούπια.
2. 5 στατῆρες 35 ὀκάδες καὶ 240 δράμια εἰς δράμια.
3. 5 ὥραι 12<sup>π</sup> καὶ 25<sup>δ</sup> εἰς δευτερόλεπτα.
4. 20<sup>ο</sup> 40' 35'' εἰς δευτέρα λεπτά.
5. 4 λίραι 8 σελλίνια 6 πένναι καὶ 2 φαρδίνια εἰς φαρδίνια.

§ 259. Πῶς τρέπεται ἓνας συμιγῆς ἀριθμὸς εἰς ἀπλοῦν ἀριθμὸν μονάδων τάξεως διαφόρου τῆς τελευταίας.

1. Ἐάν εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα τὰ 5 δράμια ἔρρεον

εις ένα πρώτον λεπτόν, ἔπρεπε νὰ τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ ἀριθμὸν 2 ὥραι 20<sup>π</sup> 30<sup>δ</sup> εἰς πρώτα λεπτά.

Ἡ τροπὴ αὕτη γίνεται κατὰ τοὺς ἐξῆς δύο τρόπους :

*A' τρόπος.* Εὐρίσκομεν ὅπως προηγουμένως ὅτι

$$2 \text{ ὥραι } 20^{\pi} 30^{\delta} = 8\,430^{\delta}.$$

Ἐπειδὴ δὲ  $1^{\delta} = \frac{1}{60}$  τοῦ πρώτου λεπτοῦ, τὰ  $8\,430^{\delta}$  θὰ εἶναι  $\frac{8430}{60}$  τοῦ πρώτου λεπτοῦ. Εἶναι λοιπὸν  $2 \text{ ὥραι } 20^{\pi} 30^{\delta} = \frac{8430^{\pi}}{60}$ .

*B' τρόπος.* Εὐρίσκομεν πρώτον ὅτι  $2 \text{ ὥραι } 20^{\pi} = 140^{\pi}$ .

Ἐπειδὴ δὲ τὰ  $30^{\delta} = \frac{30^{\pi}}{60}$ , θὰ εἶναι  $2 \text{ ὥρ. } 20^{\pi} 30^{\delta} = 140 \frac{30}{60}$  πρώτα λεπτά.

II. Ἄν εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα τὰ 5 δράμια ἔρρεον εἰς 1 ὥραν, ἔπρεπε τὸν συμμιγῆ ἀριθμὸν 2 ὥραι 20<sup>π</sup> 30<sup>δ</sup> νὰ τρέψωμεν εἰς ὥρας.

Καὶ αὕτη ἡ τροπὴ γίνεται κατὰ τοὺς ἐξῆς τρόπους :

*A' τρόπος.* Τρέπομεν αὐτὸν εἰς 8 430 δεύτερα λεπτά. Ἐπειδὴ δὲ 1 ὥρα =  $60 \times 60 = 3\,600^{\delta}$ , τὸ  $1^{\delta}$  εἶναι  $\frac{1}{3600}$  τῆς ὥρας. Ἐπομένως  $8\,430^{\delta} = \frac{8430}{3600}$  τῆς ὥρας. Εἶναι λοιπὸν  $2 \text{ ὥρ. } 20^{\pi} 30^{\delta} = \frac{8430}{3600}$  ὥρ.

*B' τρόπος.* Εὐρίσκομεν ὅτι  $20^{\pi} 30^{\delta} = 20 \times 60 + 30 = 1\,230^{\delta} = \frac{1230}{3600}$  τῆς ὥρας. Ἐπομένως  $2 \text{ ὥρ. } 20^{\pi} 30^{\delta} = 2 \frac{1230}{3600}$  τῆς ὥρας.

Ἄπὸ αὐτὰ βλέπομεν ὅτι :

Ἄν ἓνας συμμιγῆς ἀριθμὸς τραπῆ εἰς ἀπλοῦν ἀριθμὸν μονάδων διαφόρων ἀπὸ τὴν τελευταίαν τάξιν, γίνεται κλάσμα κατὰ τὸν ἓνα τρόπον καὶ μεικτὸς κατὰ τὸν ἄλλον.

Ἄπλουστερον ὅμως εἶναι νὰ τρέπωμεν αὐτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα, ἂν θέλωμεν ἐξάγομεν τὰς ἀκεραίας μονάδας, ὅποτε γίνεται μεικτὸς. Ἐργαζόμεθα λοιπὸν συνήθως κατὰ τὸν ἐξῆς κανόνα :

Διὰ νὰ τρέψωμεν συμμιγῆ ἀριθμὸν εἰς μονάδας μιᾶς ὠρισμένης τάξεως του (ἐκτὸς τῆς τελευταίας), τρέπομεν αὐτὸν πρώτον εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως του. Τὸ ἐξαγόμενον θέτομεν ἀριθμητῆν, παρονομαστῆν δὲ θέτομεν τὸν ἀριθμὸν, ὁ ὁποῖος

φανερώνει πόσαι μονάδες τῆς τελευταίας τάξεώς του ἀποτελοῦν μίαν μονάδα τῆς ὀρισθείσης τάξεως.

### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

503 ) Νὰ τραποῦν :

1. 2 στατῆρες 25 ὀκάδες 200 δράμια εἰς δράμια.
2. 925 πήχεις 4 ρούπια εἰς ρούπια.
3. 2 λίραι 15 σελλίνια 10 πένναι 3 φαρδίνια εἰς φαρδίνια.
4. 2 ὥραι 15<sup>π</sup> 50<sup>δ</sup> εἰς δευτερόλεπτα.

504 ) Νὰ τραποῦν οἱ συμμιγεῖς :

1. 8 πήχεις 6 ρούπια εἰς πήχεις.
2. 3 στατῆρες 40 ὀκάδες 250 δράμια εἰς στατῆρας καὶ εἰς ὀκάδας.
3. 3 λίραι 15 σελλίνια 8 πένναι 3 φαρδίνια εἰς σελλίνια καὶ εἰς λίρας.
4. 25<sup>ο</sup> 30' 40'' εἰς μοίρας.
5. 2 ἡμέραι 12 ὥραι 20π 40δ εἰς ὥρας καὶ εἰς πρῶτα λεπτά.

505 ) Διὰ νὰ διανύσῃ μίαν ἀπόστασιν μεταξὺ δύο πόλεων μία ἀτμομηχανὴ θὰ ἐχρειάζετο 6 ὥρ. 12<sup>π</sup>. Ἐνα ἀεροπλάνον θὰ ἐχρειάζετο 1 ὥρ. 25<sup>π</sup> καὶ ἓνα αὐτοκίνητον θὰ ἐχρειάζετο 8 ὥρ. 16<sup>π</sup> 30<sup>δ</sup>. Νὰ ἐκφρασθοῦν οἱ χρόνοι αὐτοὶ εἰς δευτερόλεπτα.

506 ) Ὁ χρόνος μεταξὺ δύο Πανσελήνων εἶναι 29 ἡμ. 12 ὥρ. 43π. Νὰ τραπῆ ὁ χρόνος οὗτος εἰς λεπτά τῆς ὥρας.

507 ) Ἡ Σελήνη κάμνει ἓνα ὀλόκληρον γῦρον περὶ τὴν Γῆν εἰς 27 ἡμ. 7 ὥρ. 43<sup>π</sup>. Νὰ τραπῆ ὁ χρόνος οὗτος εἰς δευτερόλεπτα.

§ 260. Πῶς τρέπεται εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν ἓνας συγκεκριμένος ἀκέραιος ἀριθμὸς. Ἐὰν ἀκούσωμεν ἓνα νὰ λέγῃ : «Ἡγόρασα 110 635 δράμια ἀνθράκων», δὲν ἀντιλαμβανόμεθα σαφῶς πόσον εἶναι αὐτὸ τὸ βᾶρος. Δι' αὐτὸ εὐρίσκομεν πόσαι ὀκάδες γίνονται ἀπὸ αὐτὰ τὰ δράμια. Πρὸς τοῦτο ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν

$$\begin{array}{r|l}
 \text{Δ ι ἄ τ α ξ ι ς} & \\
 \text{τ ῆ ς π ρ ᾶ ξ ε ω ς} & \\
 110635 & | 400 \\
 3063 & | 276 \text{ ὀκ.} \quad | 44 \\
 2635 & | 12 \text{ ὀκ.} \quad | 6 \text{ στ.} \\
 \hline
 & 235 \text{ δρμ.}
 \end{array}$$

Ἐὰν δὲ κάμωμεν καὶ τὴν διαίρεσιν 276 : 44 εὐρίσκομεν ὅτι ἀπὸ

αὐτὰς τὰς ὀκάδας γίνονται 6 στατῆρες, περισσεύουν δὲ καὶ 12 ὀκάδες. Ὡστε: 110 635 δράμια = 6 στατῆρες 12 ὀκάδες 235 δράμια.

Ἀπὸ τὸ παράδειγμα αὐτὸ ἐννοοῦμεν εὐκόλα, πῶς τρέπομεν ἓνα συγκεκριμένον ἀκέραιον εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν.

§ 261. Πῶς τρέπεται συγκεκριμένον κλάσμα εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν. *Πρόβλημα.* Κατὰ ἓνα βαρὺν χειμῶνα μία κοινότης ἐμοίρασεν εἰς 8 πτωχὰς οἰκογενείας τῆς κοινότητος ταύτης 27 στατῆρας ἀνθράκων. Νὰ εὑρεθῇ τὸ βάρος τῶν ἀνθράκων, τοὺς ὁποίους ἔλαβε κάθε πτωχὴ οἰκογένεια.

*Λύσις.* Ἀφοῦ αἱ 8 οἰκογένειαι ἔλαβον 27 στατῆρας, ἡ 1 οἰκογένεια ἔλαβεν 8 φορές ὀλιγώτερον, ἥτοι  $\frac{27}{8}$  τοῦ στατῆρος.

Ἡ κοινότης ὁμως ἐμοίρασε τοὺς 27 στατῆρας καὶ ἔδωκεν εἰς καθεμίαν ἀπὸ 3 στατῆρας καὶ ἐπε-

ρίσσευσαν καὶ 3 στατῆρες, ἥτοι Διὰ τὰ ξίς τῆς πράξεως

$44 \times 3 = 132$  ὀκάδες. Ἐπειτα ἡ 27 στατ. | 8  
κοινότης ἐμοίρασε καὶ αὐτὰς τὰς ὀκάδας καὶ ἔδωκεν εἰς καθεμίαν ἀπὸ 3 στατ. | 3 στ. 16 ὀκ. 200 δρμ.

$\times 44$   
16 ὀκάδας, ἐπερίσσευσαν δὲ καὶ 4  $\overline{132}$  ὀκ.

ὀκάδες, ἥτοι  $400 \times 4 = 1\ 600$  δράμια. 52

Ἀπὸ αὐτὰ δὲ ἔδωκεν εἰς κάθε 4 ὀκ.  
οἰκογένειαν  $1600 : 8 = 200$  δράμια.  $\times 400$

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον βλέ-  $\overline{1\ 600}$  δρμ  
πομεν ὅτι κάθε οἰκογένεια ἔλαβε 000  
3 στατῆρας 16 ὀκάδας 200 δράμια.

Εἶναι λοιπὸν  $\frac{27}{8}$  στατῆρος = 3 στατῆρες 16 ὀκάδες 200 δράμια.

Ἀπὸ τὴν ἐργασίαν αὐτὴν ἐννοοῦμεν εὐκόλως πῶς τρέπομεν συγκεκριμένον κλάσμα εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν.

§ 262. Πῶς τρέπομεν συγκεκριμένον μεικτὸν εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν. Ἔστω π.χ. ὅτι θέλομεν νὰ τρέψωμεν εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν τὸν ἀριθμὸν  $2\ \frac{3}{5}$  ἡμέραι.

Τὴν τροπὴν ταύτην δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν κατὰ τοὺς ἑξῆς δύο τρόπους:

*A' τρόπος.* Ἐπειδὴ  $2\frac{3}{5}$  ἡμ. =  $\frac{13}{5}$  τῆς ἡμέρας, τὸ ζήτημα ἀνάγεται εἰς τὸ προηγούμενον. Εὐρίσκομεν λοιπὸν ὅτι :

$$2\frac{3}{5} \text{ ἡμέρας} = 2 \text{ ἡμέραι } 14 \text{ ὥραι } 24^{\pi}.$$

*B' τρόπος.* Ἐπειδὴ  $2\frac{3}{5}$  ἡμέρας = 2 ἡμέραι +  $\frac{3}{5}$  ἡμέρας, ἐννοοῦμεν ὅτι πρέπει νὰ τρέψωμεν τὰ  $\frac{3}{5}$  τῆς ἡμέρας εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν καὶ νὰ αὐξήσωμεν κατὰ 2 τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Εὐρίσκομεν λοιπὸν ὅτι  $\frac{3}{5}$  ἡμέρας = 0 ἡμέραι 14 ὥραι 24<sup>π</sup> καὶ ἐπομένως  $2\frac{3}{5}$  ἡμέρας = 2 ἡμέραι 14 ὥραι 24<sup>π</sup>.

#### Διάταξις τῶν πράξεων

$\begin{array}{r} 13 \text{ ἡμ.} \quad   \quad 5 \\ 3 \text{ ἡμ.} \quad   \quad \hline \times 24 \\ \hline 72 \text{ ὥρ.} \\ 22 \\ 2 \text{ ὥρ.} \\ \times 60 \\ \hline 120^{\pi} \\ 20 \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \text{ ἡμ.} \quad   \quad 5 \\ \times 24 \quad   \quad \hline 72 \text{ ὥρ.} \quad 2 \\ 22 \quad   \quad 2 \text{ ἡμ. } 14 \text{ ὥρ. } 24^{\pi} \\ \hline 2 \text{ ὥρ.} \\ \times 60 \\ \hline 120^{\pi} \\ 20 \\ 0 \end{array}$
---	---

*Σημείωσις.* Ἄν ἀπὸ τὸν ἀκέραιον τοῦ μεικτοῦ γίνωνται μονάδες ἀνωτέρας τάξεως, δυνάμεθα νὰ ξεχωρίσωμεν αὐτάς. Π.χ.  $45\frac{3}{4}$  τοῦ σελλινίου = 45 σελλίνια 9 πένναι. Ἐπειδὴ δὲ 45 σελλίνια = 2 λίραι 5 σελλίνια, συμπεραίνομεν ὅτι  $45\frac{3}{4}$  σελλινίου = 2 λίραι 5 σελλίνια 9 πένναι.

#### Ἄσκησεις

- 508 ) Νὰ τραποῦν εἰς συμμιγεῖς ἀριθμοὺς οἱ κάτωθι ἀριθμοί:
1. 194 ρούπια, 6 705 ρούπια, 10 480 ρούπια
  2. 5 760 δράμια, 43 680 δράμια, 678 000 δράμια

3. 3 754 δευτερόλ. 18 645 δευτερόλ. 887 590 δευτερ.  
 4. 15 740'' 74 560'' 900 300''  
 5. 5 670 σελλίνια, 37 480 φαρδίνια, 748 564 πένναι.  
 509) Νά τραπουν εἰς συμμαγεῖς ἀριθμοὺς οἱ κάτωθι ἀριθμοί :
1.  $12\frac{5}{8}$  στατ.  $5\frac{4}{11}$  στατ.  $108\frac{7}{25}$  στατ.  
 2.  $68\frac{3}{4}$  ὑάρδ.  $508\frac{7}{8}$  ὑάρδ.  $270\frac{15}{26}$  ὑάρδ.
- 510) Οἱ ἀστρονόμοι ἔχουν εὑρεῖ ὅτι ἡ διάρκεια τοῦ ἔτους εἶναι 365,2422 ἡμ. Νά τραπηῖ ὁ χρόνος οὗτος εἰς συμμαγιῇ ἀριθμόν.

### 3. ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 263. *Πρόβλημα.* Ἐνα γραφεῖον μιᾶς πόλεως τῆς Βορείου Ἑλλάδος τὸν πρῶτον μῆνα τοῦ χειμῶνος ἔκαυσε 5 στατῆρας 25 ὀκάδας 300 δράμια ἀνθράκων, τὸν δεύτερον μῆνα 6 στατῆρας 35 ὀκάδας καὶ τὸν τρίτον 4 στατῆρας 40 ὀκάδας 250 δράμια. Πόσους ἀνθρακας ἔκαυσε αὐτοὺς τοὺς τρεῖς μῆνας ;

*Λύσις.* Εἶναι φανερόν ὅτι τὸ ζητούμενον βᾶρος εἶναι :  
 (5 στατ. 25 ὀκ. 300 δρμ.) + (6 στατ. 35 ὀκ.) + (4 στατ. 40 ὀκ. 250 δρμ.).

Ἀποτελεῖται δὲ τὸ βᾶρος τοῦτο ἀπὸ  
 (5 + 6 + 4) στατ. + (25 + 35 + 40) ὀκάδας + (300 + 250) δρμ.  
 ἢ 15 στ. + 100 ὀκάδ. + 550 δράμια.

Ἐπειδὴ δὲ 550 δράμ. = 1 ὀκ. 150 δρ.,  
 τὸ προηγούμενον ἄθροισμα γίνεται : Διάταξις τῆς πράξεως  
 15 στατ. + 101 ὀκ. + 150 δράμ. 5 στατ. 25 ὀκ. 300 δρμ.  
 Ὅμοίως, ἐπειδὴ 101 ὀκ. = 2 στ. 13 ὀκ. 6 στατ. 35 ὀκ.  
 τὸ τελευταῖον ἄθροισμα γίνεται : 4 στατ. 40 ὀκ. 250 δρμ.  
 17 στατ. 13 ὀκ. 150 δράμια. 15 στατ. 100 ὀκ. 550 δρμ.  
 Αὐτὴ ἡ ἐργασία συνοψίζεται εἰς 15 στατ. 101 ὀκ. 150 δρμ.  
 τὴν παραπλευρῶς διάταξιν : 17 στατ. 13 ὀκ. 150 δρμ.

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

Α' Ὁ μ ᾶ ς. 511) Νά ὑπολογισθοῦν τὰ κάτωθι ἄθροίσματα :  
 1ον. 8 στατ. 14 ὀκ. 300 δράμ. + 5 στατ. 38 ὀκ. 275 δράμ. +  
 39 ὀκ. 325 δρμ.

2ον. 25 πήχ. 7 ρούπ. + 18 πήχ. 4 ρούπ. + 49 πήχ. 7 ρούπ.  
3ον. 7 ὥρ. 40<sup>π</sup> 50<sup>δ</sup> + 3 ἡμ. 25<sup>π</sup> 40<sup>δ</sup> + 8 ὥρ. 45<sup>π</sup>.

4ον. 15 λίρ. 12 σελ. 9 πέν. + 27 λίρ. 15 σελ. 8 πέν. + 18 σελ.

3 φαρδ.

512 ) Νὰ ὑπολογισθοῦν τὰ κάτωθι ἀθροίσματα :

1ον. 3 στατ. 18 ὀκ. 340 δρ. + 15  $\frac{5}{8}$  στατ. + 12  $\frac{2}{5}$  στατ.

2ον. 15 λίραι 10 σελ. 8 πέν. + 24  $\frac{5}{8}$  λίραι + 16  $\frac{3}{4}$  σελ.

Β' 'Ο μ ά ς. 513 ) Μία οικογένεια ἐξώδευε πρὸς θέρμανσίν της κατὰ τοὺς τρεῖς μῆνας τοῦ χειμῶνος τὰ ἐξῆς ποσὰ ξυλάνθρακων : Τὸν α' μῆνα 1 στ. 10 ὀκ. 200 δράμια, τὸν β' μῆνα 1 στ. 25 ὀκ. 300 δράμια καὶ τὸν γ' μῆνα 1 στ. 30 ὀκ. 100 δράμ. Πόσους ξυλάνθρακας ἐξώδευσεν ἐν ὄλω ;

514 ) Ἐνας μαθητῆς εἶναι 12 ἐτῶν 3 μηνῶν 20 ἡμερῶν. Ἐνας συμμαθητῆς του εἶναι μεγαλύτερος αὐτοῦ κατὰ 1 ἔτος 8 μῆνας 15 ἡμέρας. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἡλικία τοῦ δευτέρου μαθητοῦ.

515 ) Μία κυρία εἶναι 28 ἐτῶν 5 μηνῶν 15 ἡμερῶν. Ὁ δὲ σύζυγός της εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ αὐτὴν κατὰ 6 ἔτη 4 μῆνας 10 ἡμέρας. Νὰ εὐρεθῆ ἡ ἡλικία τοῦ συζύγου.

Γ' 'Ο μ ά ς. 516 ) Ἐν τόξον ὠρισμένης περιφερείας ἔχει μέτρον 35° 20' 12". Ἄλλο τόξον τῆς ἰδίας περιφερείας εἶναι 42° 48' 50" καὶ τρίτον τόξον εἶναι 56° 28' 35". Πόσον εἶναι τὸ μέτρον τοῦ ἀθροίσματος τῶν τῶν τῶν αὐτῶν ;

517 ) Ἐν τόξον εἶναι  $\frac{7}{25}$  τῆς περιφερείας του· ἄλλο τόξον τῆς αὐτῆς περιφερείας εἶναι  $\frac{7}{8}$  τῆς μοίρας καὶ τρίτον τόξον ἔχει μέτρον 25° 40' 10". Πόσον εἶναι τὸ μέτρον τοῦ ἀθροίσματος τῶν τῶν τῶν αὐτῶν ;

#### 4. ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

264. Πρόβλημα. Ἐνα βαρέλιον μὲ τυρὸν ἔχει βάρος 28 ὀκ. 350 δράμια. Τὸ ἀπόβαρον εἶναι 3 ὀκ. 120 δρμ. Νὰ εὐρεθῆ τὸ βάρος τοῦ τυροῦ, τὸν ὁποῖον περιέχει.

Λύσις. Εἶναι φανερόν ὅτι τὸ ζητούμενον βάρος εἶναι  
( 28 ὀκ. 350 δράμ. ) - ( 3 ὀκ. 120 δράμ. )

Ἐάν ἀφαιρέσωμεν μόνον τὰ 120 δράμια, θὰ μείνουν 28 ὀκ. 230 δράμ. Ἐάν δὲ ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆρος ἀφαιρέσωμεν καὶ τὰς ὀκάδας, μένουν 25 ὀκάδες 230 δράμια.

ἘΑφαιροῦμεν δηλ. ἕκαστον μέρος  $\Delta$ ιάταξις τῆς πράξεως  
 τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὸ ὁμοειδὲς μέρος 28 ὀκάδες 350 δράμια  
 τοῦ μειωτέου, ὅπως φαίνεται εἰς τὴν 3 ὀκάδες 120 δράμια  
 παραπλεύρως διάταξιν.  $\frac{28 \text{ ὀκάδες } 350 \text{ δράμια}}{3 \text{ ὀκάδες } 120 \text{ δράμια}}$   
 25 ὀκάδες 230 δράμια

*Παρατήρησις.* Ἐάν ὁ μειωτέος εἶναι 28 ὀκάδες 100 δράμια, τὰ 120 δράμια δὲν ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὰ 100. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην προσθέτομεν εἰς τὰ δράμια τοῦ μειωτέου 400 δράμια καὶ εἰς τὰς ὀκάδας τοῦ ἀφαιρετέου 1 ὀκᾶν.

Ἐπειτα ἐκτελοῦμεν τὴν ἀφαίρεσιν  
 (28 ὀκ. 500 δράμ.) – (4 ὀκ. 120 δράμ.)  $\Delta$ ιάταξις τῆς πράξεως  
 ὅπως προηγουμένως.

Αὐτὴν τὴν ἀφαίρεσιν ἐκτελοῦμεν 28 ὀκ. 100 δράμ.  
 καὶ ὡς ἑξῆς : 4 ὀκ. 120 δράμ.  
 $\frac{28 \text{ ὀκ. } 100 \text{ δράμ.}}{4 \text{ ὀκ. } 120 \text{ δράμ.}}$   
 24 ὀκ. 380 δράμ.

ἘΑπὸ τὰς 28 ὀκ. λαμβάνομεν μίαν 27 ὀκ. 500 δράμ.  
 ὀκᾶν ἢ 400 δράμια, τὰ ὅποια προσθέ- 3 ὀκ. 120 δράμ.  
 τομεν μὲ τὰ 100 δράμ. Ἐπειτα ἐκτε-  $\frac{27 \text{ ὀκ. } 500 \text{ δράμ.}}{3 \text{ ὀκ. } 120 \text{ δράμ.}}$   
 λοῦμεν τὴν ἀφαίρεσιν 24 ὀκ. 380 δράμ.  
 (27 ὀκ. 500 δρ.) – (3 ὀκ. 120 δράμ.)

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον εἶναι π.χ.  
 (5 ὄρ. 0<sup>π</sup> 15<sup>δ</sup>) – (2 ὄρ. 20<sup>π</sup> 8<sup>δ</sup>) =  $\Delta$ ιάταξις τῆς πράξεως  
 (4 ὄρ. 60<sup>π</sup> 15<sup>δ</sup>) – (2 ὄρ. 20<sup>π</sup> 8<sup>δ</sup>) = 180° = 179° 59' 60''  
 2 ὄρ. 40<sup>π</sup> 7<sup>δ</sup>. 63° 42' 25''  
 180° – (63° 42' 25'') = 63° 42' 25''  
 (179° 59' 60'') – (63° 42' 25'') =  $\frac{179^\circ 59' 60''}{63^\circ 42' 25''}$   
 116° 17' 35''

### ἘΑσκήσεις

ἘΑ' Ὀμάς. 518) Νὰ γίνουσι αἱ κάτωθι ἀφαιρέσεις :

1. (5 ὄρ. 25<sup>π</sup> 40<sup>δ</sup>) – (3 ὄρ. 40<sup>π</sup> 50<sup>δ</sup>).
2. 13 ὄρ. – (8 ὄρ. 25<sup>π</sup> 48<sup>δ</sup>).
3. 180° – (149° 30' 58'').
4. (3 στατ. 25 ὀκ.) – (2 στατ. 38 ὀκ. 250 δράμ.).

519 ) Νά γίνουν αί κάτωθι αφαιρέσεις :

1.  $8\frac{3}{5}$  στατηήρες — ( 3 στατ. 40 όκ. 200 δράμ. ).

2. ( 15 λίρ. 18 σελ. ) —  $8\frac{7}{8}$  λίρ.

Β' Ό μ ά ς. 520 ) Πόσος χρόνος παρηήλθε μέχρι σήμερα από τής 28ης Όκτωβρίου 1940 ;

521 ) Ένας παντοπώλης ήγόρασεν από χωρικόν 15 στατηήρ. 1 όκ. 250 δράμ. έλαιας. Μέχρι τής εισαγωγής εις τό παντοπωλείον υπέστησαν φύραν 20 όκ. 300 δράμ. Νά εύρεθί τό έναπομείναν βάρος τών έλαιών.

522 ) Έγεννήθη τις τήν 16ην Μαρτίου 1937. Πόσην ήλικίαν έχει σήμερα ;

523 ) Ένα τόξον έχει μέτρον  $35^{\circ} 24' 40''$ . Πόσον είναι τό μέτρον τοῦ συμπληρωματικοῦ του τόξου ;

524 ) Ένα τόξον έχει μέτρον  $75^{\circ} 15' 48''$ . Πόσον είναι τό μέτρον τοῦ παραπληρωματικοῦ του τόξου ;

525 ) Ένας κτηματίας είχε δανεισθί από τήν Κτηματικήν Τράπεζαν 850 λίρας· επλήρωσε δέ 355 λίρ. 15 σελ. 8 πέν. 2 φαρδ. Πόσα χρεωστει άκόμη ;

Γ' Ό μ ά ς. 526 ) Ένας οίκοδεσπότης έχρεώστει εις τήν Κτηματικήν Τράπεζαν 25 λίρ. 14 σελ. 6 πέν. Έπλήρωσε δέ 2856 δρχ. με τιμήν τής λίρας 280 δραχ. Πόσα χρεωστει άκόμη ;

527 ) Έγόρασέ τις 20 στατ. 35 όκ. ξυλανθράκων δια τόν χειμώνα. Κατά τόν πρώτον μήνα εξώδευσε 3 στατ. 20 όκ. και κατά τόν δεύτερον  $4\frac{3}{5}$  στατ. Πόσοι ξυλάνθρακες έμειναν ;

528 ) Γνωρίζομεν εκ τής Γεωμετρίας ότι τό άθροισμα τών τριών γωνιών Α, Β, Γ ένός τριγώνου ΑΒΓ είναι ίσον με  $180^{\circ}$ . Έάν είναι  $A = 48^{\circ} 35' 40''$ ,  $B = 69^{\circ} 56' 30''$ , πόση είναι ή Γ ;

529 ) Τα μέτρα δύο τόξων είναι  $60^{\circ} 35'$  και  $58^{\circ} 45''$ . Κατά πόσον τό άθροισμά των υπερβαίνει τό  $\frac{1}{8}$  τής περιφερείας ;

530 ) Από τόν κρουόν ένός βαρελίου οίνου χύνονται 3 σταγόνες κατά δευτερόλεπτον. Πόσαι λίτραι οίνου θα χυθούν μεταξύ 8 ώρ. 24π τής πρωίας και 6 ώρ. 45π τής έσπέρας, αν γνωρίζωμεν ότι 25 σταγόνες έχουν όγκον ένα κυβ. έκατοστόμετρον ;

531 ) Ἡ ἀνοιξίς διαρκεῖ 92 ἡμ. 21 ὥρ., τὸ θέρος 93 ἡμ. 14 ὥρ., τὸ φθινόπωρον 89 ἡμ. 19 ὥρας καὶ ὁ χειμῶν 89 ἡμ. Κατὰ πόσον εἶναι μεγαλύτερον : 1ον ) τὸ θέρος τῆς ἀνοιξέως ; 2ον ) τὸ φθινόπωρον τοῦ χειμῶνος ; 3ον ) ἡ ἀνοιξίς καὶ τὸ θέρος ἀπὸ τὸ φθινόπωρον καὶ τὸν χειμῶνα ;

##### 5. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 265. Πῶς πολλαπλασιάζεται συμμιγῆς ἐπὶ ἀκέριον. *Πρόβλημα.* Μία ἀτμομηχανὴ καίει 3 στατήρας 10 ὀκάδας 250 δράμια ἀνθράκων τὴν ὥραν. Νὰ εὐρεθῆ τὸ βᾶρος τῶν ἀνθράκων, τοὺς ὁποίους καίει εἰς τρεῖς ὥρας.

*Λύσις.* Ἀφοῦ εἰς 1 ὥρ. καίει 3 στατ. 10 ὀκ. 250 δράμ., εἰς 3 ὥρας θὰ κάψῃ τριπλάσιον ποσόν, ἦτοι :

$$(3 \text{ στατ. } 10 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times 3 = (3 \text{ στατ. } 10 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) + (3 \text{ στατ. } 10 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) + (3 \text{ στατ. } 10 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}).$$

Κατὰ δὲ τὸν τρόπον τῆς προσθέσεως συμμιγῶν ἀριθμῶν εἶναι :

$$(3 \text{ στατ. } 10 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times 3 = (3 \text{ στ.} \times 3) + (10 \text{ ὀκ.} \times 3) + (250 \text{ δρ.} \times 3) = 9 \text{ στατ. } 30 \text{ ὀκ. } 750 \text{ δράμ.}$$

Ἐπειδὴ δὲ 750 δράμ. = 1 ὀκ. 350 δρ., Διάταξις τῆς πράξεως αἱ 30 ὀκάδ. γίνονται 31 ὀκάδ. τὸ ὄλον δὲ 3 στ. 10 ὀκ. 250 δράμ. βᾶρος γίνεται 9 στατ. 31 ὀκ. 350 δράμ.

	3
Ἄπὸ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος	9 στ. 30 ὀκ. 750 δράμ.
αὐτοῦ συνάγομεν ὅτι :	9 στ. 31 ὀκ. 350 δράμ.

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ ἀκέριον, πολλαπλασιάζομεν ἕκαστον μέρος τοῦ συμμιγοῦς ἐπὶ τὸν ἀκέριον ἀρχόμενοι ἀπὸ τὴν κατωτέραν τάξιν.

Ἐὰν δὲ ἓνα ἀπὸ τὰ μερικὰ γινόμενα περιέχῃ μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, ἐξάγομεν αὐτάς καὶ τὰς προσθέτομεν εἰς τὸ ἐπόμενο μερικὸν γινόμενον.

##### Ἀσκήσεις

532 ) Διὰ μίαν παιδικὴν ἐνδυμασίαν χρειάζονται 2 πηχ. 5 ρούπια ἀπὸ ἓνα ὕφασμα. Πόσον ὕφασμα ἀπὸ αὐτὸ πρέπει νὰ προμηθευθῆ ἓνας ράπτῃς, διὰ νὰ κάμῃ 10 τοιαύτας ἐνδυμασίας ;

533 ) Ἐνα κινητὸν σημεῖον διατρέχει ἐπὶ μιᾷ περιφερείᾳ τόξον  $3^{\circ} 25' 30''$  εἰς 1 πρῶτον λεπτόν. Πόσον τόξον διατρέχει εἰς 5 πρῶτα λεπτά ;

534 ) Μία οἰκογένεια ἔκαίε τὸν παρελθόντα Ἰανουάριον 5 ὀκ. 250 δράμ. ἀνθράκων τὴν ἡμέραν. Πόσους ἀνθρακας ἔκαυσε τὸν μῆνα ἐκεῖνον ;

535 ) Ἐνας οἰκογενειάρχης ἠγόρασε 5 σάκκους ἀνθράκων. Κάθε σάκκος εἶχε βάρος 38 ὀκ. 250 δράμια, κενὸς δὲ 350 δράμια. Πόσους ἀνθρακας ἠγόρασεν ;

§ 266. Πῶς διαιρεῖται συμμιγῆς δι' ἀκεραίου. *Πρόβλημα.*  
Εἰς 8 πτωχὰς οἰκογενεῖας διενεμήθησαν ἐξ ἴσου 13 στατῆρες 5 ὀκάδες 320 δράμια ἀλεύρου. Νὰ εὑρεθῇ πόσον ἄλευρον ἔλαβε κάθε οἰκογένεια.

Λύσις. Εἶναι φανερὸν ὅτι κάθε οἰκογένεια ἔλαβε :

$$(13 \text{ στ. } 5 \text{ ὀκ. } 320 \text{ δράμ.}) : 8.$$

Ἀπὸ τοὺς 13 στατῆρας ἔλαβε κάθε οἰκογένεια 1 στ. καὶ ἐπερίσσευσαν 5 στατ. ἢ  $44 \times 5 = 220$  ὀκ. Αὐταὶ μὲ τὰς 5 ὀκ. τοῦ συμμιγοῦς ἀποτελοῦν 225 ὀκάδ.

Διὰ τὰ ξίς τῆς πράξεως

$$\begin{array}{r} 13 \text{ στ. } 5 \text{ ὀκ. } 320 \text{ δρ. } | 8 \\ 5 \text{ στ.} \\ \hline 1 \text{ στ. } 28 \text{ ὀκ. } 90 \text{ δρ.} \end{array}$$

Ἀπὸ αὐτὰς ἔλαβε κάθε οἰκογένεια  $225 : 8$ , ἦτοι 28 ὀκ. καὶ ἐπερίσσευσε 1 ὀκά, ἦτοι 400 δράμια.

$$\begin{array}{r} \times 44 \\ \hline 220 \text{ ὀκ.} \end{array}$$

Ἐμοίρασαν λοιπὸν ἀκόμη  $400 + 320 = 720$  δράμια καὶ ἔλαβε κάθε οἰκογένεια  $720 : 8 = 90$  δράμ.

$$\begin{array}{r} + 5 \\ \hline 225 \text{ ὀκ.} \end{array}$$

Ἔστω : (13στ. 5ὀκ. 320δράμ.) : 8 = 1 στ. 28 ὀκ. 90 δράμ.

$$\begin{array}{r} 65 \\ 1 \text{ ὀκ.} \\ \times 400 \\ \hline 400 \text{ δράμ.} \end{array}$$

Ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος αὐτοῦ συναγομεν ὅτι :

$$\begin{array}{r} + 320 \\ \hline 720 \text{ δράμ.} \\ 00 \end{array}$$

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν συμμιγῆ δι' ἀκεραίου, διαιροῦμεν ἕκαστον μέρος τοῦ συμμιγοῦς διὰ τοῦ ἀκεραίου ἀρχόμενοι ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς ἀνωτέρας τάξεως. Ἐὰν ἀπὸ μίαν μερικὴν διαίρεσιν μεῖνῃ ὑπόλοιπον, τρέπομεν αὐτὸ εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατω-

τέρας τάξεως καὶ εἰς τὸ γινόμενον προσθέτομεν καὶ τὰς ὁμοειδεῖς μονάδας τοῦ συμμιγοῦς (ἂν ἔχη), τὸ δὲ ἄθροισμα διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀκεραίου. Οὕτω δὲ ἐξακολουθοῦμεν, μέχρις ὅτου διαιρέσωμεν ὅλα τὰ μέρη τοῦ συμμιγοῦς.

### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

536 ) Ἐνα ὥρολόγιον μένει ὀπίσω  $8^{\pi} 30^{\delta}$  εἰς 6 ὥρας. Πόσον μένει ὀπίσω εἰς μίαν ὥραν ;

537 ) Ἐνα ὥρολόγιον ἔκανονίσθη τὴν μεσημβρίαν μιᾶς ἡμέρας νὰ δεικνύη ἀκριβῶς 12 ὥρ. Τὴν ἐπομένην μεσημβρίαν ἐδείκνυε 11 ὥρ.  $50^{\pi} 30^{\delta}$ . Πόσον ἔμεινε ὀπίσω τὴν ὥραν ;

538 ) Ἐνας ταξιδιώτης ἠγόρασεν ἀπὸ τὸ Λονδίνον 5 ὑάρδας ὑφάσματος καὶ ἔδωκε 13 λίρας 18 σελ. 6 πέν. 2 φαρ. Πρὸς πόσον ἠγόρασε τὴν ὑάρδα ;

539 ) Ἐνας Ἕλληνα ἐργαζόμενος εἰς τὴν Νότιον Ἀφρικὴν ἀπέστειλεν εἰς 3 ἀδελφούς του 17 λίρας 9 σελλίνια. Πόσα χρήματα ἔλαβε καθε ἀδελφός ;

§ 267. Πῶς πολλαπλασιάζεται συμμιγῆς ἐπὶ κλάσμα. *Πρόβλημα.* Μία οἰκογένεια ἐξοδεύει 4 ὀκ. 300 δρᾶμ. ζάκχαριν τὸν μῆνα. Νὰ εὐρεθῇ τὸ βάρος τῆς ζακχάρεως, τὴν ὁποίαν ἐξοδεύει εἰς τὰ  $\frac{2}{5}$  τοῦ μηνός.

*Λύσις.* Εἶναι φανερόν ὅτι εἰς τὸ  $\frac{1}{5}$  τοῦ μηνός ἐξοδεύει τὸ  $\frac{1}{5}$  τῶν 4 ὀκ. 300 δρᾶμ., ἥτοι  $\frac{4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δρμ.}}{5}$ .

Ἐπομένως εἰς τὰ  $\frac{2}{5}$  τοῦ μηνός ἐξοδεύει 2 φορές περισσότερον, ἥτοι :  $\frac{4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δρμ.}}{5} \times 2 = 380 \text{ δρᾶμια} \times 2 = 1 \text{ ὀκᾶ } 360 \text{ δρᾶμια.}$

Ὅπως δὲ τὸ γινόμενον  $\frac{\alpha}{\gamma} \times \beta$  ὠνομάσαμεν (§ 190) γινόμενον τοῦ α ἐπὶ  $\frac{\beta}{\gamma}$ , οὕτω καὶ τὸ προηγούμενον γινόμενον ὠνομάζομεν γινόμενον τοῦ συμμιγοῦς 4 ὀκ. 300 δρᾶμ. ἐπὶ  $\frac{2}{5}$ .

Εἶναι λοιπὸν  $(4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δρᾶμ.}) \times \frac{2}{5} = \frac{4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δρμ.}}{5} \times 2$  (1)

Ἐπειδὴ δὲ  $\frac{4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.}}{5} \times 2 = \frac{4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.}}{5} + \frac{4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.}}{5}$ ,  
 εὐκόλως ἐννοοῦμεν ὅτι :  $\frac{4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.}}{5} \times 2 = \frac{(4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.}) \times 2}{5}$ .

Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἰσότητα καὶ ἀπὸ τὴν (1) συμπεραίνομεν ὅτι :  
 $(4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.}) \times \frac{2}{5} = \frac{(4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.}) \times 2}{5}$ .

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι πολλαπλασιάζομεν ἓνα συμμιγῆ ἐπὶ κλάσμα, ὅπως πολλαπλασιάζομεν καὶ κάθε ἄλλον ἀριθμὸν ἐπὶ κλάσμα.  
 Ὡστε :

**Διὰ τὸ πολλαπλασιάζομεν ἓνα συμμιγῆ ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν τὸν συμμιγῆ ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του.**

Εὐρίσκομεν δὲ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὅτι :

$4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δρμ.} \times \frac{2}{5} = \frac{(4 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.}) \times 2}{5} = \frac{8 \text{ ὀκ. } 600 \text{ δράμ.}}{5} = 1 \text{ ὀκ. } 360 \text{ δράμ.}$

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

540 ) Μία σιταποθήκη χωρεῖ 20 στ. 25 ὀκ. καὶ ἔχει σῖτον μέχρι τῶν  $\frac{3}{4}$  αὐτῆς. Πόσον σῖτον ἔχει ;

541 ) Ἐνας οἰκογενειάρχης ἠγόρασε 5 στατ. 18 ὀκ. ἀνθράκων. Τὸ  $\frac{1}{9}$  ὅμως τοῦ βάρους των ἦτο κόνις. Πόσον καθαρὸν βᾶρος ἀνθράκων ἠγόρασεν ;

542 ) Διὰ μίαν ἀνδρικήν ἐνδυμασίαν χρειάζονται 4 πῆχ. 2 ρούπ. Διὰ μίαν δὲ παιδικὴν χρειάζονται τὰ  $\frac{5}{8}$  τοῦ ὑφάσματος τῆς ἀνδρικής. Πόσον ὑφασμα χρειάζεται διὰ μίαν παιδικὴν ἐνδυμασίαν ;

543 ) Ἐνας ἔμπορος ὑφασμάτων εἶχεν ἓνα τεμάχιον ὑφάσματος, τὸ ὁποῖον ἦτο 48 πῆχεις καὶ 6 ρούπια. Ἐπώλησε δὲ τὰ  $\frac{5}{8}$  αὐτοῦ. Πόσον ὑφασμα τοῦ ἔμεινεν ;

§ 268. Πῶς πολλαπλασιάζεται συμμιγῆς ἐπὶ μεικτόν. *Πρόβλημα.* Μία οἰκογένεια ἐξοδεύει 14 ὀκάδας 250 δράμια ἐλαίου τὸν μῆνα. Πόσον ἔλαιον δαπανᾷ εἰς  $2\frac{3}{4}$  μῆνας ;

*Λύσις. Α' τρόπος.* Ἀφοῦ τὸν 1 μῆνα ἐξοδεύει 14 ὀκ. 250 δράμια, τοὺς  $2\frac{3}{4}$  μῆνας θὰ δαπανᾷ  $(14 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times 2\frac{3}{4}$ .

Ἐπειδὴ δὲ  $2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$  θὰ εἶναι :  $(14 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times 2\frac{3}{4} = (14 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times \frac{11}{4} = \frac{(14 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times 11}{4} = \frac{160 \text{ ὀκ. } 350 \text{ δράμ.}}{4} = 40 \text{ ὀκ. } 87,5 \text{ δράμ.}$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Διὰ τὴν ἀπλοκρασίαν τῆς συμμιγῆς ἐπὶ μεικτὸν, τρέπομεν τὸν μεικτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἐπὶ αὐτὸ ἀπλοκρασίνομεν τὸν συμμιγῆ.

*Β' τρόπος.* Εἰς 2 μῆνας δαπανᾷ :

$$(14 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times 2 = 29 \text{ ὀκ. } 100 \text{ δράμ.}$$

Εἰς τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ μηνὸς δαπανᾷ :

$$(14 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times \frac{3}{4} = 10 \text{ ὀκ. } 387,5 \text{ δράμ.}$$

Ἐπομένως εἰς  $2\frac{3}{4}$  μῆνας ἐξοδεύει :

$$(29 \text{ ὀκ. } 100 \text{ δράμ.}) + (10 \text{ ὀκ. } 387,5 \text{ δράμ.}) = 40 \text{ ὀκ. } 87,5 \text{ δράμ.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :  $(14 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times 2\frac{3}{4} =$

$$(14 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times 2 + (14 \text{ ὀκ. } 250 \text{ δράμ.}) \times \frac{3}{4}. \quad \text{Ἔστω :$$

Διὰ τὴν ἀπλοκρασίαν τῆς συμμιγῆς ἐπὶ μεικτὸν, δυνάμεθα τὴν ἀπλοκρασίαν τῆς συμμιγῆς χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ ἐπὶ τὸ κλάσμα καὶ τὰ προσθέσωμεν τὰ γινόμενα.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

544 ) Μία μικρὰ ὁμάς ἐργατῶν χρειάζεται 2 ἡμ. καὶ 5 ὥρας διὰ τὴν ἀπλοκρασίαν 1 στρέμμα ἀμπέλου. Εἰς πόσον χρόνον ἀπλοκραγεῖ  $6\frac{3}{5}$  στρέμματα τοιαύτης ἀμπέλου, ὅταν ἡ ἐργασία ἡμέρα εἶναι 8 ὥραι ;

545 ) Ἐνα αὐτοκίνητον διατρέχει 1 χιλιόμετρον εἰς 2π καὶ 30δ. Εἰς πόσον χρόνον διανύει  $20\frac{5}{8}$  χιλιόμετρα ;

546 ) Μία κρήνη γεμίζει μίαν έδαφικήν κοιλότητα εις  $3\frac{4}{5}$  ώρας. Πόσον ύδωρ χωρεί αύτη ή κοιλότης, αν εις 1 ώραν τρέχη από την κρήνην ύδωρ 2 στατ. 24 όκ. 150 δράμ. ;

547 ) Άπό τον κρουνον μιās οικιακής ύδαταποθήκης χύνονται 12 όκ. 340 δράμ. την ώραν. Άν αύτη είναι γεμάτη και άνοιχθη ό κρουνος άδειάζει εις  $6\frac{2}{5}$  ώρας. Πόσον ύδωρ χωρεί ή ύδαταποθήκη ;

§ 269. Πώς διαιρείται συμμιγής δια κλάσματος ή μεικτου (μερισμός). *Πρόβλημα Ιον.* Μία όμάς εργατών έκαλλιέργησε τὰ  $\frac{3}{5}$  ένός κτήματος εις 5 ήμ. 6 ώρ. 30<sup>τ</sup>. Νά εύρεθη ό χρόνος, τον όποιον χρειάζεται αύτη, δια να καλλιεργήση όλον τὸ κτήμα ( 1 έργάσιμος ήμέρα = 8 ώραι ).

<p>Λύσις. Άφοϋ δια τὰ <math>\frac{3}{5}</math> του κτήματος έχρειάσθησαν 5 ήμ. 6 ώρ. 30π, δι' όλον τὸ κτήμα θα έχρειάσθησαν ( 5 ήμ. 6 ώρ. 30π ) : <math>\frac{3}{5}</math>.</p>	<p>Διάταξις τῆς πράξεως</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">5 ήμ. 6 ώρ. 30<sup>τ</sup></td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">25 ήμ. 30 ώρ. 150<sup>π</sup></td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; border-top: 1px solid black;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">η 29 ήμ. 0 ώρ. 30<sup>π</sup></td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">9 ήμ. 5 ώρ. 30<sup>τ</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 ήμ.</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">× 8</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">16 ώρ.</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 ώρ.</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">× 60</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">60<sup>π</sup></td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+ 30</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">90<sup>π</sup></td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"></td> </tr> </table>	5 ήμ. 6 ώρ. 30 <sup>τ</sup>		5		25 ήμ. 30 ώρ. 150 <sup>π</sup>	3	η 29 ήμ. 0 ώρ. 30 <sup>π</sup>	9 ήμ. 5 ώρ. 30 <sup>τ</sup>	2 ήμ.		× 8		16 ώρ.		1 ώρ.		× 60		60 <sup>π</sup>		+ 30		90 <sup>π</sup>		0	
5 ήμ. 6 ώρ. 30 <sup>τ</sup>																											
5																											
25 ήμ. 30 ώρ. 150 <sup>π</sup>	3																										
η 29 ήμ. 0 ώρ. 30 <sup>π</sup>	9 ήμ. 5 ώρ. 30 <sup>τ</sup>																										
2 ήμ.																											
× 8																											
16 ώρ.																											
1 ώρ.																											
× 60																											
60 <sup>π</sup>																											
+ 30																											
90 <sup>π</sup>																											
0																											

Άφοϋ δια τὰ  $\frac{3}{5}$  έχρειάσθησαν 5 ήμ. 6 ώρ. 30<sup>τ</sup>, δια τὸ  $\frac{1}{5}$  έχρειάσθησαν 3 φορές όλιγώτερον, ήτοι  $\frac{5\ ήμ. 6\ ώρ. 30\pi}{3}$ , και δι' όλον τὸ κτήμα, δηλ. δια τὰ  $\frac{5}{5}$  αύτου έχρειάσθησαν 5 φορές περισσότερον από τον προηγούμενον χρόνον, ήτοι :

$$\frac{5\ ήμ. 6\ ώρ. 30\pi}{3} \times 5 = (5\ ήμ. 6\ ώρ. 30\pi) \times \frac{5}{3} =$$

(29 ἡμ. 0 ὥρ. 30<sup>π</sup>): 3 = 9 ἡμ. 5 ὥρ. 30π.

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

(5 ἡμ. 6 ὥρ. 30π) :  $\frac{3}{5}$  = (5 ἡμ. 6 ὥρ. 30<sup>π</sup>) ×  $\frac{5}{3}$ . Ὡστε :

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν συμμιγῆ ἀριθμὸν διὰ κλάσματος, πολλαπλασιάζομεν τὸν συμμιγῆ ἐπὶ τὸ κλάσμα ἀντεστραμμένον.

Ἡ ἰσότης λοιπὸν  $\alpha : \frac{\mu}{\nu}$  =  $\alpha \times \frac{\nu}{\mu}$  εἶναι ἀληθῆς καὶ ὅταν ὁ  $\alpha$  εἶναι συμμιγῆς ἀριθμὸς.

§ 270. Πρόβλημα 2ον. Ἐνας ταξιδιώτης ἠγόρασεν ἀπὸ τὸ Λονδῖνον 5  $\frac{1}{2}$  ὑάρδας ὑφάσματος καὶ ἔδωκεν 8 λίρ. 18 σελ. 9 πέν. Νὰ εὑρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς ὑάρδας.

Λύσις. Ἀφοῦ διὰ 5  $\frac{1}{2}$  ὑάρδας ἔδωκεν 8 λίρας 18 σελ. 9 πέν., διὰ τὴν 1 ὑάρδα ἔδωκε 5  $\frac{1}{2}$  φορὰς ὀλιγώτερον, ἦτοι :

(8 λίρ. 18 σελ. 9 πέν.) : 5  $\frac{1}{2}$  .

Ἐπειδὴ δὲ 5  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{11}{2}$ , συμπεραίνομεν ὅτι :

(8 λίρ. 18 σελ. 9 πέν.) : 5  $\frac{1}{2}$

= (8 λίρ. 18 σελ. 9 πέν.) :  $\frac{11}{2}$

= (8 λίρ. 18 σελ. 9 πέν.) ×  $\frac{2}{11}$

= 1 λίρ. 12 σελ. 6 πέν.

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν συμμιγῆ ἀριθμὸν διὰ μεικτοῦ, τρέπομεν τὸν μεικτὸν εἰς κλάσμα καὶ διαιροῦμεν τὸν συμμιγῆ δι' αὐτοῦ τοῦ κλάσματος.

Ὡστε ὁ γνωστὸς κανὼν τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ  $\alpha$  διὰ μεικτοῦ ἀληθεύει καὶ ὅταν ὁ  $\alpha$  εἶναι συμμιγῆς ἀριθμὸς.

Γενικὸν συμπέρασμα. Ἀπὸ τὰ προηγούμενα ἐμάθομεν ὅτι ἕνας

Διὰ τὰ ξίς τῆς πράξεως	
8 λίρ. 18 σελ. 9 πέν.	
	2
16 » 36 » 18 »	
ἢ 17 » 17 » 6 »	11
6 λίρ.	1 λίρ. 12 σελ. 6 πέν.
× 20	
120 σελ.	
+ 17	
137 σελ.	
27	
5 σελ.	
× 12	
60 πέν.	
+ 6	
66 πέν.	
0	

συμμιγής αριθμός πολλαπλασιάζεται ή διαιρείται διὰ κλάσματος ἢ μεικτοῦ ἀκριβῶς ὅπως καὶ ἕνας ἀπλοῦς ἀριθμός.

### Ἄσκησεις

548 ) Τὰ  $\frac{5}{8}$  ἐνὸς τεμαχίου ὑφάσματος ἔχουν 45 πηχ. 5 ρούπ.

Πόσον εἶναι ὅλον τὸ τεμάχιον ;

549 )  $3\frac{2}{5}$  ὁμοια τεμάχια ὑφάσματος ἔχουν 116 πηχ. 7 ρούπ.

Πόσον ὑφασμα ἔχει ἕνα ἀκέραιον τεμάχιον ἀπὸ αὐτά ;

550 ) Ἐνας παντοπώλης ἠγόρασεν ἀπὸ ἕνα σαπωνοποιεῖον 4 στατ. 15 ὀκ. σάπωνος. Ἐγέμισε δὲ μὲ αὐτὸν  $5\frac{3}{4}$  ὁμοια κιβώτια. Πόσον σάπωνα ἐχώρει κάθε κιβώτιον ;

551 ) Τὰ  $\frac{5}{8}$  ἐνὸς τόξου ἔχουν μέτρον  $50^{\circ} 12' 55''$ . Πόσον εἶναι τὸ μέτρον τοῦ τόξου τούτου ;

552 ) Ἐνας ποδηλάτης εἰς  $5\frac{2}{3}$  πρῶτα λεπτὰ διέτρεξεν  $72^{\circ} 40' 30''$  ἐπὶ τῆς περιφερείας ἐνὸς κυκλικοῦ ποδηλατοδρομίου. Πόσον εἶναι τὸ μέτρον τοῦ τόξου, τὸ ὁποῖον διέτρεξεν εἰς 1 πρῶτον λεπτόν ;

**§ 271. Μέθοδος τῶν ἀπλῶν μερῶν. Πρόβλημα Ιον.** Ἐνα μικρὸν πετρελαιοκίνητον ἀτμόπλοιον καίει 4 στατ. 33 ὀκ. 300 δράμια πετρελαίου τὴν ἡμέραν. Πόσον πετρέλαιον θὰ καύσῃ εἰς 24 ἡμέρας ;

*Λύσις.* Εἶναι φανερόν ὅτι εἰς 24 ἡμέρας καίει

( 4 στατ. 33 ὀκ. 300 δρ. )  $\times 24$ .

Εἰς τὰ προηγούμενα ἐμάθομεν πῶς εὐρίσκομεν τὸ γινόμενον αὐτό. Τώρα θὰ μάθωμεν καὶ τὸν ἐξῆς ἀκόμη τρόπον :

\* Ἄν ἔκαίει 4 στατ. τὴν ἡμέραν, εἰς 24 ἡμ. θὰ ἔκαίει  $4 \times 24 = 96$  στατ.

\* Ἐπειτα χωρίζομεν τὰς 33 ὀκ. εἰς 22 ὀκ.  $= \frac{1}{2}$  στατ. καὶ εἰς

11 ὀκ.  $= \frac{1}{2}$  τῶν 22 ὀκ. Σκεπτόμεθα δὲ ὡς ἐξῆς :

\* Ἄν ἔκαίει 1 στατῆρα τὴν ἡμέραν, εἰς τὰς 24 ἡμέρας θὰ ἔκαίεν 1 στατ.  $\times 24 = 24$  στατ. Ἐπομένως πρὸς 22 ὀκ.  $= \frac{1}{2}$  στατ. τὴν ἡμέραν καίει 24 στατ. : 2 = 12 στατ. καὶ πρὸς 11 ὀκ. θὰ καίῃ 12 : 2 = 6 στατ.

Τέλος χωρίζομεν καὶ τὰ 300 δράμια εἰς 200 δράμ.  $= \frac{1}{2}$  ὀκ. καὶ εἰς 100 δράμ.  $= \frac{1}{2}$  τῶν 200 δραμ. καὶ σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς :

Ἐκ τῆς 1 ὀκᾶν τὴν ἡμέραν, εἰς 24 ἡμέρας καίει 1 ὀκ.  $\times 24 = 24$  ὀκ.  
Ἐπομένως ἀπὸ 200 δράμια τὴν ἡμέραν καίει 24 ὀκ. : 2 = 12 ὀκ.  
καὶ ἀπὸ 100 δράμια τὴν ἡμέραν καίει 12 ὀκ. : 2 = 6 ὀκ.

Προσθέτομεν δὲ ὅλα τὰ εὐρεθέντα ποσὰ καὶ εὐρίσκομεν ὅτι εἰς 24 ἡμέρας καίει 114 στατ. 18 ὀκ.

Ὅπως βλέπομεν τὰ μέρη τοῦ πολλαπλασιαστέου χωρίζονται εἰς ἀπλᾶ μέρη ( $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  κ.τ.λ.) προηγουμένων μερῶν.

Δι' αὐτὸ δὲ ἡ μέθοδος αὕτη λέγεται **μέθοδος τῶν ἀπλῶν μερῶν**.

Εἶναι δὲ προτιμότερα ἡ μέθοδος αὕτη, ὅταν ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι μεγάλος ἀριθμὸς.

Διατάσσεται δὲ ἡ πράξις ὡς ἀκολουθῶς :

	4 στατ. 33 ὀκ. 300 δρμ.
	24
Ἐκ τῆς 4 στατῆρας ἡμερησίως	96 στατ.
ἀπὸ 33 ὀκάδας	12 στατ.
ἡμερησίως $\left\{ \begin{array}{l} 22 \text{ ὀκ.} = \frac{1}{2} \text{ στατ.} \\ 11 \text{ ὀκ.} = \frac{1}{2} \text{ τῶν } 22 \text{ ὀκ.} \end{array} \right.$	6 στατ.
ἀπὸ 300 δράμ.	0 στατ. 12 ὀκ.
ἡμερησίως $\left\{ \begin{array}{l} 200 \text{ δρ.} = \frac{1}{2} \text{ ὀκ.} \\ 100 \text{ δρ.} = \frac{1}{2} \text{ τῶν } 200 \text{ δρ.} \end{array} \right.$	0 στατ. 6 ὀκ.
	114 στατ. 18 ὀκ.

§ 272. *Πρόβλημα. 2ον.* Ἐνα αὐτοκίνητον εἰς μίαν ὥραν διανύει 24 χιλιόμε. καὶ 750 μ. Νὰ εὐρεθῇ τὸ διάστημα, τὸ ὁποῖον διανύει εἰς 5 ὥρ. 40<sup>π</sup>.

*Λύσις. Α' τρόπος.* Ἐπειδὴ 5 ὥρ. 40<sup>π</sup>  $= 5\frac{40}{60} = 5\frac{2}{3}$  ὥραι, τὸ ζητούμενον εἶναι  $(24 \text{ χλμ. } 750 \text{ μέτρ.}) \times 5\frac{2}{3} = 140 \text{ χλμ. } 250 \text{ μέτρα.}$   
Δηλαδὴ ἐτρέψαμεν τὸν συμμιγῆ 5 ὥρ. 40<sup>π</sup> εἰς ἀπλοῦν ἀριθμὸν ὠρῶν καὶ ἐνόησαμεν ὅτι πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν 24 χλμ. 750 μέτρα ἐπὶ τὸν εὐρεθέντα ἀπλοῦν ἀριθμὸν τῶν ὠρῶν.

**Σημείωσις.** Ἄν τὰ 24 χιλμ. 750 μέτ. διανύωνται εἰς 1 πρῶτον λεπτόν, τρέπομεν τὰς 5 ὥρας 40<sup>π</sup> εἰς ἀπλοῦν ἀριθμὸν πρῶτων λεπτῶν.

**Β' τρόπος.** Εὐρίσκομεν πρῶτον, κατὰ τὸν προηγούμενον τρόπον, πόσον διάστημα διανύει εἰς 5 ὥρας. Ἐπειτα χωρίζομεν τὰ 40<sup>π</sup> εἰς 30<sup>π</sup> =  $\frac{1}{2}$  ὥρας καὶ εἰς 10<sup>π</sup> =  $\frac{1}{3}$  τῶν 30<sup>π</sup>.

Σκεπτόμεθα δὲ ὡς ἑξῆς :

Ἄφοῦ εἰς μίαν ὥραν διανύει 24 χιλ. 750 μέτρα, εἰς  $\frac{1}{2}$  ὥρας διανύει ( 24 χιλ. 750 μέτ. ) : 2 = 12 χιλ. 375 μέτρα, καὶ εἰς 10<sup>π</sup> διανύει τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ προηγούμενου, ἦτοι : ( 12 χιλμ. 375 μέτ. ) : 3 = 4 χιλμ. 125 μέτρα.

Προσθέτομεν ἔπειτα ὅλα τὰ ἐξαγόμενα καὶ εὐρίσκομεν 140 χιλμ. 250 μέτρα.

#### Δ ι ἄ τ α ξ ι ς τ ῆ ς π ρ ἄ ξ ε ω ς

	24 χιλμ. 750 μέτρ.
	5 ὥρ. 40 <sup>π</sup>

Εἰς 5 ὥρας	{	Ἄπο 24 χιλμ. τὴν ὥραν.....	120 χιλμ.				
		Ἄπο 750 μέτρ. τὴν ὥραν	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">500 μέτ. = <math>\frac{1}{2}</math> χιλ. ....</td> <td style="text-align: right;">2 χιλμ. 500 μέτρ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 5px;">250 μέτ. = <math>\frac{1}{2}</math> τῶν 500μ.</td> <td style="text-align: right;">1 χιλμ. 250 μέτρ.</td> </tr> </table>	{	500 μέτ. = $\frac{1}{2}$ χιλ. ....	2 χιλμ. 500 μέτρ.	
{	500 μέτ. = $\frac{1}{2}$ χιλ. ....	2 χιλμ. 500 μέτρ.					
	250 μέτ. = $\frac{1}{2}$ τῶν 500μ.	1 χιλμ. 250 μέτρ.					
Εἰς 40 <sup>π</sup>	{	30 <sup>π</sup> = $\frac{1}{2}$ ὥρ. ....	12 χιλμ. 375 μέτρ.				
		10 <sup>π</sup> = $\frac{1}{3}$ τῶν 30 <sup>π</sup> .....	4 χιλμ. 125 μέτρ.				
			140 χιλμ. 250 μέτρ.				

Καὶ ἡ μέθοδος αὕτη λέγεται **μέθοδος τῶν ἀπλῶν μερῶν.**

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

**Α' Ὁ μά ς.** Τὰ προβλήματα τῆς ομάδος αὐτῆς νὰ λυθοῦν πρῶτον ἀπὸ μνήμης καὶ ἔπειτα νὰ γίνη καὶ ἡ διάταξις τῶν πράξεων.

553 ) Μία οἰκοκυρὰ ἠγόρασε 150 δράμια βούτυρον πρὸς 40 δρχ. τὴν ὀκᾶν. Πόσα χρήματα ἔδωκεν ;

554 ) Ἐνας οἰκογενειάρχης ἠγόρασε 300 δράμια κρέατος πρὸς 36 δραχμὰς τὴν ὀκᾶν. Πόσα χρήματα ἔδωκεν ;

555) Ένας οίκογενειάρχης ήγόρασε 2 όκ. 150 δράμ. έλαιον πρὸς 24 δραχ. τήν όκάν. Πόσα χρήματα έδωκεν ;

Β' Όμάς. 556) Ένας γεωργικός συνεταιρισμός είχεν 120 μέλη καί έμοίρασε 5 στατ. 24 όκ. 250 δράμ. λίπασμα είς κάθε μέλος. Πόσον ήτο τὸ λίπασμα, τὸ όποιον έμοίρασαν ;

557) Ένας γεωργός έφύτευσε  $12\frac{3}{4}$  στρέμματα με καπνόν. Ἐπέδωκε δέ κάθε στρέμμα 2 στατ. 30 όκ. 200 δράμ. καπνοῦ. Πόσον καπνόν συνεκόμισεν ό γεωργός αυτός ;

§ 273. Διαίρεσις δια συμμιγοῦς. α') Μερισμός. *Πρόβλημα.* Μία κυρία εύρισκομένη είς Ἄγγλίαν ήγόρασεν 6 πήχ. 5 ρούπ. ύφάσματος καί έδωκε 18 λίρ. 7 σελ. 8 πέν. 1 φαρδ. Νά εύρεθῆ 1ον ή τιμή τοῦ πήχεως καί 2ον ή τιμή τοῦ ένός ρουπιού.

*Λύσις.* 1ον. Οί 6 πήχεις 5 ρούπια =  $6\frac{5}{8}$  πήχ. Αὐτή ή κυρία δια  $6\frac{5}{8}$  πήχεις έδωκε 18 λίρας 7 σελ. 8 πέν. 1 φαρδ. Ἐπομένως δια 1 πήχυν έδωκε (18 λίρ. 7 σελ. 8 πέν. 1 φαρδ. ) :  $6\frac{5}{8}$ .

Ἐν έκτελέσωμεν τήν διαίρεσιν αὐτήν κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον (§ 270), εύρίσκομεν ότι ή τιμή τοῦ πήχεως ήτο 2 λίρ. 15 σελ. 6 πέν.

2ον. Ἐν θέλωμεν νά μάθωμεν πόσον ήγόρασε τὸ 1 ρούπι, εύρίσκομεν ότι 6 πήχ. 5 ρούπ. = 53 ρούπια. Ἐπειδή δέ δια 53 ρούπ. έδωκε 18 λίρ. 7 σελ. 8 πέν. 1 φαρδ., συμπεραίνομεν ότι δια τὸ 1 ρούπι έδωκε :

(18 λίρ. 7 σελ. 8 πέν. 1 φαρδ. ) : 53 = 6 σελ. 11 πέν. 1 φαρδ.

Είς τὰ δύο αὐτὰ προβλήματα δίδεται ή τιμή ένός ποσοῦ, τοῦ όποίου τὸ μέτρον είναι συμμιγῆς ἀριθμός καί ζητεῖται ή τιμή μιᾶς ἀπὸ τὰς μονάδας τῶν μερῶν τοῦ συμμιγοῦς αὐτοῦ.

Διά νά τήν εύρωμεν δέ τρέπομεν τὸν συμμιγῆ αὐτὸν είς ἀπλοῦν ἀριθμὸν καί όμοειδῆ πρὸς τήν μονάδα, τῆς όποίας ζητοῦμεν τήν τιμήν. Ἐπειτα δια τοῦ ἀπλοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ διαιροῦμεν τήν δοθεῖσαν τιμήν τοῦ ποσοῦ.

Είς τὰ παραδείγματα αὐτὰ ή δοθεῖσα τιμή 18 λίρ. 7 σελ. 8 πέν. 1 φαρδ. είναι συμμιγῆς ἀριθμός.

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἐργαζόμεθα καὶ ἂν ἡ τιμὴ αὐτὴ εἶναι οἴσοσδήποτε ἀριθμὸς· π.χ. 18 λίραι ἢ  $10\frac{3}{4}$  λίραι κ.τ.λ.

### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

558 ) Μία κυρία ἠγόρασεν 7 πήχεις καὶ 2 ρούπια ὑφάσματος καὶ ἔδωκε 362,50 δρχ. Πρὸς πόσον ἠγόρασε τὸν πῆχυν ;

559 ) Μία δεσποινὶς ἠγόρασε 2 πήχ. 3 ρούπια μεταξωτῆς κορδέλλας καὶ ἔδωκεν 11,40 δρχ. Πρὸς πόσον ἠγόρασε τὸ ρούπι ;

560 ) Μία ἀμαξοστοιχία εἰς 4 ὥρ.  $40^{\circ}$   $30^{\circ}$  διανύει 94 χιλ. καὶ 175 μέτρα. Νὰ εὔρεθῇ ἡ ταχύτης αὐτῆς καθ' ὥραν.

§ 274. β') Μέτρησις. *Πρόβλημα.* Μία πλύντρια ἐξοδεύει 2 ὀκ. 120 δράμια σάπωνος τὴν ἡμέραν. Ἄν κάμη μίαν προμήθειαν ἀπὸ 27 ὀκ. 240 δράμια, πόσας ἡμέρας θὰ περάσῃ ;

*Λύσις.* Μὲ τὸν γνωστὸν συλλογισμὸν ἐννοοῦμεν ὅτι θὰ περάσῃ τόσας ἡμέρας, ὅσας φορὰς χωροῦν αἱ 2 ὀκ. 120 δράμ. εἰς τὰς 27 ὀκ. 240 δράμ., ἤτοι :  $(27 \text{ ὀκ. } 240 \text{ δράμ.}) : (2 \text{ ὀκ. } 120 \text{ δράμ.})$ .

Αὐτὴν τὴν μέτρησιν δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν κατὰ τοὺς ἐξῆς δύο τρόπους :

*Α' τρόπος.* Ἐπειδὴ

$$27 \text{ ὀκ. } 240 \text{ δράμ.} = 27 \frac{240}{400} \text{ ὀκ.} = 27 \frac{6}{10} \text{ ὀκ. καὶ } 2 \text{ ὀκ. } 120 \text{ δράμ.} = 2 \frac{3}{10} \text{ ὀκ.}$$

συμπεραίνομεν ὅτι θὰ περάσῃ  $27 \frac{6}{10} : 2 \frac{3}{10} = 12$  ἡμέρας.

*Β' τρόπος* Ἐπειδὴ

$$27 \text{ ὀκ. } 240 \text{ δράμ.} = 11 \text{ } 040 \text{ δράμ. καὶ } 2 \text{ ὀκ. } 120 \text{ δράμ.} = 920 \text{ δράμ.}$$

ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι  $11 \text{ } 040 : 920 = 12$  ἡμέρας.

*Σημείωσις.* Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἐργαζόμεθα καὶ ὅταν ὁ διαιρετέος εἶναι ἀπλοῦς ἀριθμὸς. Π.χ. εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἡδύνατο ἢ προμήθεια νὰ εἶναι : 4 στατ. ἢ 150 ὀκ. ἢ 600 δράμια.

Εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης τρέπονται εἰς ὁμοειδεῖς ἀπλοῦς ἀριθμοὺς καὶ ἡ διαίρεσις γίνεται κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον.

## Ἀσκήσεις

561 ) Ἐνας νέος σπουδάζων εἰς τὴν Ἀγγλίαν ἠγόρασεν ὕφασμα ἀντὶ 5 λίρ. 15 σελ. Ὑπελόγησε δὲ ὅτι τοῦ ἤρχετο πρὸς 2 λίρ. 6 σελ. τὸν πῆχυν. Πόσον ὕφασμα ἠγόρασεν ;

562 ) Μία κυρία ἠγόρασεν 9 πῆχ. 6 ρούπ. ὕφασματος διὰ νὰ κάμη παραπετάσματα. Ὑπελόγησε δὲ ὅτι διὰ κάθε παράθυρον ἐχρειάζοντο 3 πῆχ. καὶ 2 ρούπ. Διὰ πόσα παράθυρα ἔφθασε τὸ ἀγορασθὲν ὕφασμα ;

563 ) Κατὰ μίαν διανομὴν μὲ τὸ δελτίον ἐδίδοντο 350 δράμια ὀσπρίων κατὰ δελτίον. Ἐνας δὲ οἰκογενειάρχης ἔλαβε 4 ὀκ. 150 δράμ. Πόσα δελτία εἶχεν ;

564 ) Ἐνας παντοπώλης ἔκαμε προμήθειαν ἀπὸ 281 ὀκ. 350 δράμ. ζάχαριν. Ὅταν τὴν ἐπώλησεν ὅλην, ὑπελόγησεν ὅτι ἡ ἡμερησία κατανάλωσις ἀνήρχετο εἰς 25 ὀκ. 250 δράμ. Εἰς πόσας ἡμέρας ἐπώλησεν αὐτήν ;

## Διάφορα προβλήματα ἐπὶ ἀπλῶν καὶ συμμιγῶν ἀριθμῶν.

565 ) Ἐχει τις μίαν φιάλην, ἡ ὁποία κενὴ ἔχει βάρους 320 δράμ., γεμάτη δὲ μὲ ἔλαιον ἔχει βάρους 2 ὀκ. 370 δράμ. Μίαν ἡμέραν τὴν ἐγέμισε μὲ ἔλαιον, διὰ τὸ ὁποῖον ἐπλήρωσε 51 δρχ. Πρὸς πόσον ἠγόρασε τὴν ὀκᾶν τὸ ἔλαιον ;

566 ) Δύο βαρέλια ἔχουν οἶνον ὁμοῦ 22 στατ. 12 ὀκ. 280 δράμ. Τὸ δεύτερον ἔχει τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ α'. Πόσον οἶνον ἔχει τὸ καθέν ;

567 ) Ἐνας ἔμπορος εἶχεν ἓνα τεμάχιον ὕφασματος. Ἀφοῦ ἐπώλησε τὰ  $\frac{2}{5}$  καὶ τὸ  $\frac{1}{4}$  αὐτοῦ, ἔμειναν 39 πῆχ. 6 ρούπ. Πόσους πῆχους εἶχε κατ' ἀρχὰς αὐτὸ τὸ τεμάχιον ;

568 ) Μία κυρία ἠγόρασε δύο εἰδῶν ὕφασματα, διὰ τὰ ὁποῖα ἐπλήρωσεν 770 δρ. Ἀπὸ τὸ α' ἠγόρασεν 6 πῆχ. 4 ρούπ. πρὸς 60 δρχ. τὸν πῆχυν, τὸ δὲ β' ἤξιζεν 20 δρχ. τὸν πῆχυν ἀκριβώτερον. Πόσον ὕφασμα ἠγόρασεν ἀπὸ τὸ β' εἶδος ;

569 ) Τὸ μήκος τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Κορίνθου—Πατρῶν εἶναι 131 χιλιόμε. Μία αὐτοκινητάμαξα ἀναχωρεῖ ἐκ Κορίνθου εἰς τὰς

3 ὥρ.  $19^{\pi}$  μ.μ. καὶ φθάνει εἰς τὰς Πάτρας εἰς τὰς 6 ὥρ.  $10^{\pi}$  μὲ παραμονὴν  $8^{\pi}$  εἰς τοὺς ἐνδιαμέσους σταθμούς. Πόση εἶναι ἡ ταχύτης αὐτῆς καθ' ὥραν ;

570 ) Ἐνα ὕφασμα πωλεῖται εἰς τὸ Λονδῖνον 2 λίρ. 8 σελ. τὴν ὑάρδαν. Πόσον πωλεῖται τὸ μέτρον ;

571 ) Ἀεροπόρος ἀναχωρεῖ τὴν 6 ὥρ.  $15^{\pi}$  ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου του πρὸς ἀναγνώρισιν τῶν θέσεων τοῦ ἐχθροῦ. Ἐπειδὴ ὁ ἄνεμος εἶναι ἀντίθετος, κινεῖται μὲ 90 χλμ. τὴν ὥραν καὶ φθάνει ἄνω τῶν ἐχθρικῶν θέσεων μετὰ  $45^{\pi}$ . Παραμένει δὲ ὑπεράνω τῶν θέσεων τοῦ ἐχθροῦ ἐπὶ  $12^{\pi}$ . Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν του διανύει 120 χλμ. τὴν ὥραν. Πόσον διήρκεσεν ἡ πτήσις του καὶ πότε ἐπέστρεψεν εἰς τὸ ἀεροδρόμιον ;

572 ) Διανύει τις τὰ  $\frac{2}{3}$  μιᾶς ἀποστάσεως 150 χλμ. σιδηδρομικῶς μὲ ταχύτητα 40 χλμ. τὴν ὥραν καὶ τὸ ὑπόλοιπον μὲ ἄμαξαν μὲ ταχύτητα 10 χλμ. τὴν ὥραν. Αὐτοκίνητον ἀναχωρεῖ ταυτοχρόνως μὲ ταχύτητα 30 χλμ. τὴν ὥραν καὶ διευθύνεται πρὸς τὴν αὐτὴν διευθύνσιν. Ποῖος θὰ φθάσῃ πρῶτος καὶ πρὸ πόσου χρόνου ;

573 ) Δύο ἀδελφοὶ ἔχουν νὰ διανύσουν ἀπόστασιν 54 χλμ. διὰ νὰ μεταβοῦν πλησίον ἐνὸς θείου των. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν χρησιμοποιεῖ ποδήλατον καὶ τρέχει μὲ ταχύτητα 16 χλμ. τὴν ὥραν, ὁ δὲ ἄλλος μοτοσυκλέτταν μὲ ταχύτητα 36 χλμ. τὴν ὥραν. Ἐὰν ὁ πρῶτος ἀναχωρήσῃ τὴν 8ην πρωϊνὴν ὥραν, ποίαν ὥραν πρέπει νὰ ἐκκινήσῃ ὁ δεύτερος, διὰ νὰ φθάσουν καὶ οἱ δύο ταυτοχρόνως εἰς τὸν προορισμόν των ;

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ  
ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ—ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΠΟΣΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ

§ 275. Λόγος ἑνὸς ἀριθμοῦ πρὸς ἄλλον. Τὸ πηλίκον  $8 : 2$ , δηλ. ὁ 4, λέγεται καὶ λόγος τοῦ 8 πρὸς τὸν 2. Ὁμοίως ἐπειδὴ  $15 : 5 = 3$ , ὁ 3 λέγεται λόγος τοῦ 15 πρὸς τὸν 5. Γενικῶς :

Λόγος ἑνὸς ἀριθμοῦ πρὸς ἄλλον λέγεται τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ πρώτου διὰ τοῦ δευτέρου.

Οἱ ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι παρουσιάζονται εἰς ἕνα λόγον, λέγονται ὄροι αὐτοῦ. Ὁ πρῶτος λέγεται ἰδιαίτερος προηγούμενος, ὁ δὲ δεύτερος ἐπόμενος.

Οἱ ὄροι ἑνὸς λόγου δύνανται νὰ εἶναι ἀφηρημένοι ἀριθμοὶ ἢ συγκεκριμένοι ἀριθμοί. Εἰς τὴν β' περίπτωσιν πρέπει νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς. Ὁ δὲ λόγος εἶναι πάντοτε ἀφηρημένος ἀριθμός.

Π.χ.  $20$  πῆχ. :  $4$  πῆχ. =  $5$ .

Οἱ λόγοι  $2 : 3$  ἢ  $\frac{2}{3}$  καὶ  $3 : 2$  ἢ  $\frac{3}{2}$  ἔχουν τοὺς αὐτοὺς ὄρους κατ' ἀντίστροφον τάξιν. Διὰ τοῦτο δὲ οὗτοι λέγονται ἀντίστροφοι λόγοι. Εἶναι δὲ φανερόν ὅτι οἱ λόγοι αὐτοὶ εἶναι ἀντίστροφοι ἀριθμοί. Ὡστε :

Δύο λόγοι λέγονται ἀντίστροφοι, ἂν εἶναι ἀντίστροφοι ἀριθμοί.

§ 276. Ἀναλογία. Ἐπειδὴ  $\frac{15}{3} = 5$  καὶ  $\frac{20}{4} = 5$ , ἐπεται ὅτι  $\frac{15}{3} = \frac{20}{4}$ .

Ἡ ἰσότης αὐτῆ τῶν δύο λόγων λέγεται ἀναλογία. Ὡστε :  
Ἀναλογία λέγεται ἡ ἰσότης δύο λόγων.

Ἡ ἀναλογία  $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$  γράφεται καὶ  $3 : 4 = 6 : 8$  καὶ ἀπαγγέλλεται : 3 πρὸς 4 καθὼς 6 πρὸς 8.

Γενικῶς, ἂν οἱ λόγοι  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  εἶναι ἴσοι, ἀποτελοῦν τὴν ἀναλογίαν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  ἢ  $\alpha : \beta = \gamma : \delta$ .

Οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , λέγονται **ὄροι** τῆς ἀναλογίας· καὶ οἱ μὲν  $\alpha$  καὶ  $\delta$  λέγονται **ἄκροι** ὄροι τῆς ἀναλογίας, οἱ δὲ  $\beta$  καὶ  $\gamma$  **μέσοι** ὄροι τῆς ἀναλογίας. Οἱ  $\alpha$  καὶ  $\gamma$  λέγονται **προηγούμενοι** ὄροι, οἱ δὲ  $\beta$  καὶ  $\delta$  **ἐπόμενοι** ὄροι.

Ὁ τέταρτος ὄρος μιᾶς ἀναλογίας λέγεται **τέταρτος ἀνάλογος** τῶν τριῶν ἄλλων.

Εἰς τὴν ἀναλογίαν  $\frac{8}{4} = \frac{4}{2}$  οἱ μέσοι ὄροι εἶναι ἴσοι. Αὕτῃ ἡ ἀναλογία λέγεται **συνεχῆς** ἀναλογία. Καὶ ἡ ἀναλογία  $\frac{4}{6} = \frac{6}{9}$  εἶναι συνεχῆς. Γενικῶς :

**Μία ἀναλογία λέγεται συνεχῆς, ἂν οἱ μέσοι ὄροι αὐτῆς εἶναι ἴσοι.**

Ὁ μέσος ὄρος μιᾶς συνεχοῦς ἀναλογίας λέγεται **μέσος ἀνάλογος τῶν ἄκρων**.

Π.χ. εἰς τὰς ἀνωτέρω ἀναλογίας  $\frac{8}{4} = \frac{4}{2}$  καὶ  $\frac{4}{6} = \frac{6}{9}$  ὁ 4 εἶναι μέσος ἀνάλογος τῶν 8 καὶ 2, ὁ δὲ 6 μέσος ἀνάλογος τῶν 4 καὶ 9.

§ 277. Ἰδιότητες ἀναλογιῶν: Ἐστω ἡ ἀναλογία

$$3 : 5 = 6 : 10 \quad \text{ἢ} \quad \frac{3}{5} = \frac{6}{10}.$$

Τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων ὄρων τῆς εἶναι  $3 \times 10 = 30$ .

Ἐπίσης τὸ γινόμενον τῶν μέσων ὄρων τῆς εἶναι  $5 \times 6 = 30$ .

Παρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων ὄρων τῆς εἶναι ἴσον μὲ τὸ γινόμενον τῶν μέσων ὄρων τῆς.

Ἐστω τώρα καὶ ἡ ἀναλογία  $2 : 7 = 6 : 21$ .

Παρατηροῦμεν ἐπίσης ὅτι καὶ εἰς τὴν ἀναλογίαν αὐτὴν τὸ γινόμενον  $2 \times 21$  τῶν ἄκρων ὄρων τῆς εἶναι ἴσον μὲ τὸ γινόμενον  $7 \times 6$  τῶν μέσων ὄρων τῆς.

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα συνάγομεν τὴν ἐξῆς ιδιότητα τῶν ἀναλογιῶν :

Εἰς κάθε ἀναλογίαν τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων ὄρων τῆς εἶναι ἴσον μὲ τὸ γινόμενον τῶν μέσων ὄρων τῆς.

Κατὰ τὴν ιδιότητα αὐτὴν γενικῶς :

$$\text{Ἐὰν εἶναι } \boxed{\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}}, \text{ θὰ εἶναι καὶ } \boxed{\alpha \times \delta = \beta \times \gamma}$$

§ 278. Ἐφαρμογαί. Στηριζόμενοι εἰς τὴν ιδιότητα αὐτὴν δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν ἓνα ὄρον μιᾶς ἀναλογίας, ὅταν μᾶς δοθοῦν οἱ ἄλλοι τρεῖς ὄροι τῆς.

*Παράδειγμα 1ον.* Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν ἄγνωστον ὄρον  $\chi$  τῆς ἀναλογίας  $6 : 5 = 12 : \chi$ .

Κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα, τὸ γινόμενον  $6 \cdot \chi$  τῶν ἄκρων ὄρων τῆς θὰ εἶναι ἴσον μὲ τὸ γινόμενον  $5 \cdot 12$  τῶν μέσων, δηλαδὴ 60. Ὁ ἄγνωστος ὄρος  $\chi$  πρέπει νὰ εἶναι ἓνας ἀριθμὸς, ὁ ὅποῖος πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν 6 νὰ δίδῃ τὸν 60. Αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς εἶναι ὁ 10.

Ὁ 10 δύναται νὰ εὐρεθῆ, ἂν διαιρεθῆ τὸ γινόμενον  $5 \times 12$  τῶν μέσων ὄρων διὰ τοῦ γνωστοῦ ἄκρου 6.

Ἀπὸ τὸ παράδειγμα αὐτὸ συνάγομεν τὸν κάτωθι κανόνα :

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν ἄγνωστον ἄκρον ὄρον μιᾶς ἀναλογίας, πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο μέσους ὄρους τῆς καὶ τὸ προκύπτον γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γνωστοῦ ἄκρου.

*Παράδειγμα 2ον.* Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν ἄγνωστον ὄρον  $\chi$  τῆς ἀναλογίας  $4 : 7 = \chi : 56$ .

Σκεπτόμενοι ὅπως εἰς τὸ προηγουμένον παράδειγμα, εὐρίσκομεν ὅτι ὁ ζητούμενος ἄγνωστος εἶναι  $\frac{4 \times 56}{7}$  ἢ 32.

Ἀπὸ τὸ παράδειγμα αὐτὸ συνάγομεν τὸν κάτωθι κανόνα :

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν ἄγνωστον μέσον ὄρον μιᾶς ἀναλογίας, πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο ἄκρους ὄρους τῆς καὶ τὸ προκύπτον γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γνωστοῦ μέσου.

*Παράδειγμα 3ον.* Ἀπὸ τὴν συνεχῆ ἀναλογίαν  $\frac{4,5}{3} = \frac{3}{2}$  προκύπτει ἡ ἰσότης  $3^2 = 2 \times 4,5$  καὶ γενικῶς ἀπὸ τὴν  $\frac{\alpha}{\chi} = \frac{\chi}{\beta}$  ἔπεται ὅτι  $\chi^2 = \alpha \cdot \beta$ . Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Τὸ τετράγωνον τοῦ μέσου ἀναλόγου δύο ἀριθμῶν εἶναι ἴσον πρὸς τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν τούτων.

*Εφαρμογή.* Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν μέσον ἀνάλογον δύο ἀριθμῶν, ἀρκεῖ νὰ ἐξαγάγωμεν τὴν τετρ. ρίζαν τοῦ γινομένου αὐτῶν.

Π.χ. μέσος ἀνάλογος τῶν ἀριθμῶν 16 καὶ 9 εἶναι :

$$\sqrt{16 \times 9} = \sqrt{144} = 12.$$

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

574) Νὰ εὐρεθῇ ὁ ἄγνωστος ὅρος ἐκάστης τῶν ἀκολουθῶν ἀναλογιῶν :

$$\begin{array}{l} 1. \quad \frac{27}{7} = \frac{12}{x}, \quad \frac{16}{4} = \frac{x}{2}, \quad \frac{x}{12} = \frac{16}{8}. \\ 2. \quad \frac{8}{x} = \frac{x}{2}, \quad \frac{x}{15} = \frac{5}{25}, \quad \frac{x}{27} = \frac{9}{8,1}. \end{array}$$

### 2. ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

§ 279. Ἀνάλογα ποσά. *Πρόβλημα.* Ἐργάτης λαμβάνει 8 δρχ. καθ' ὥραν ἐργασίας. Πόσον λαμβάνει εἰς 2 ὥρας, εἰς 3 ὥρας, εἰς 4 ὥρας, ... εἰς ἡμίσειαν ὥραν, εἰς ἓν τέταρτον ὥρας ;

Ὁ κάτωθι πίναξ δεικνύει τὴν ἀντιστοιχίαν μεταξύ τοῦ χρόνου ἐργασίας καὶ τῆς ἀμοιβῆς του :

Ὑῶραι ἐργασίας	1	2	3	4	...	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	...
Ἀμοιβὴ εἰς δραχμὰς	8	16	24	32	...	4	2	...

Οἱ ἀριθμοὶ τῆς πρώτης σειρᾶς 1, 2, 3, ... παριστάνουν διαφόρους τιμὰς τοῦ χρόνου ἐργασίας εἰς ὥρας.

Οἱ ἀριθμοὶ τῆς δευτέρας σειρᾶς 8, 16, 24, ... παριστάνουν τὰς ἀντιστοιχοῦς τιμὰς τῆς ἀμοιβῆς εἰς δραχμὰς.

Ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω πίνακα βλέπομεν ὅτι τὰ ποσὰ « ὥραι ἐργασίας » καὶ « ἀμοιβὴ εἰς δραχμὰς » ἔχουν τοιαύτην σχέσιν μεταξύ των, ὥστε, ὅταν ἡ τιμὴ 1 τοῦ ποσοῦ τῶν ὥρῶν διπλασιασθῇ, τριπλασιασθῇ κ.τ.λ. καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 8 δραχμὰι τῆς ἀμοιβῆς διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κ.τ.λ.

Ὅμοιως βλέπομεν ὅτι, ὅταν ἡ τιμὴ 1 ὥρα τοῦ ποσοῦ τῶν ὥρῶν γίνῃ τὸ ἡμισυ, τὸ τέταρτον κ.τ.λ. καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 8 δρχ. τῆς

ἀμοιβῆς γίνεται τὸ ἥμισυ, τὸ τέταρτον κ.τ.λ. Τὰ τοιαῦτα ποσὰ λέγονται **ἀνάλογα ποσά**.

Ἔστω ἡ ἀμοιβὴ καὶ αἱ ὥραι ἐργασίας εἶναι ἀνάλογα ποσά.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Δύο ποσὰ λέγονται **ἀνάλογα**, ὅταν, πολλαπλασιαζομένης μιᾶς τιμῆς τοῦ ἐνὸς ποσοῦ ἐπὶ τυχόντα ἀριθμὸν, πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ ἢ, διαιρουμένης μιᾶς τιμῆς τοῦ ἐνὸς ποσοῦ διὰ τυχόντος ἀριθμοῦ, διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ.

Ποσὰ ἀνάλογα εἶναι :

Ἡ τιμὴ ἐνὸς ἐμπορεύματος καὶ τὸ βάρος του.

Τὸ διάστημα, τὸ ὁποῖον διανύει ἓνα κινητὸν, ἂν κινῆται ἰσοταχῶς, καὶ ὁ χρόνος, κατὰ τὸν ὁποῖον κινεῖται τοῦτο.

Τὸ ἔργον ποῦ ἐκτελοῦν ἐργάται καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργατῶν.

Ἡ περίμετρος ἐνὸς τετραγώνου καὶ ἡ πλευρὰ του.

Τὸ μῆκος τῆς περιφέρειας ἐνὸς κύκλου καὶ ἡ ἀκτίς του κ.τ.λ.

**Σημείωσις.** Ὄταν δύο ποσὰ συναυξάνωνται, δὲν ἔχουν ὁμῶς μεταξύ των τὴν ἀνωτέρω σχέσιν, δὲν λέγονται **ἀνάλογα**. Π.χ. ὅταν αὐξάνηται ἡ ἡλικία ἐνὸς παιδιοῦ, αὐξάνεται καὶ τὸ ἀνάστημα, ἀλλὰ τὰ ποσὰ **ἡλικία** καὶ **ἀνάστημα** δὲν εἶναι ἀνάλογα· διότι, ὅταν διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κ.τ.λ. ἡ ἡλικία τοῦ παιδιοῦ, δὲν διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κ.τ.λ. καὶ τὸ ἀνάστημα αὐτοῦ.

**Παρατήρησις :** Ἀπὸ τὸν πίνακα τῆς § 279 βλέπομεν ὅτι δύο τυχοῦσαι τιμαὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ὥρῶν, π.χ. 2 ὥρ. καὶ 4 ὥρ. ἔχουν λόγον  $\frac{2}{4}$  ἢ  $\frac{1}{2}$ . Αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ 16 καὶ 32 τοῦ ἄλλου ποσοῦ ἔχουν λόγον  $\frac{16}{32}$  ἢ  $\frac{1}{2}$ . Παρατηροῦμεν ὅτι δύο οἰαδιῆποτε τιμαὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ὥρῶν ἐργασίας ἔχουν τὸν αὐτὸν λόγον, τὸν ὁποῖον ἔχουν καὶ αἱ ἀντίστοιχοι πρὸς αὐτὰς τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ :

Γενικῶς :

Ἐὰν δύο ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἐνὸς ποσοῦ εἶναι ἴσος μὲ τὸν λόγον τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν τοῦ ἄλλου ποσοῦ.

§ 280. Ποσὰ ἀντίστροφα. Πρόβλημα. Ἐνας ἐργάτης ἐκτελεῖ ἓνα ἔργον εἰς 12 ἡμέρας. Εἰς πόσας ἡμέρας θὰ ἐκτελέσουν τὸ ἔργον 2 ἐργάται, 3 ἐργάται, 4 ἐργάται κ.τ.λ.

Ὁ κάτωθι πίναξ δεικνύει τὴν ἀντιστοιχίαν μεταξὺ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργατῶν καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡμερῶν :

Ἀριθμὸς ἐργατῶν	1	2	3	4	.....
Χρόνος εἰς ἡμέρας	12	6	4	3	.....

Παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν ἡ τιμὴ 1 τοῦ ποσοῦ τῶν ἐργατῶν πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ 2, 3, 4,... ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 12 τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν διαιρεῖται διὰ 2, 3, 4... Καὶ ταυάπαλιν, ὅταν ἡ τιμὴ τοῦ ποσοῦ τῶν ἐργατῶν διαιρεθῇ διὰ 2, 3, 4,... ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 2, 3, 4,... Τὰ τοιαῦτα ποσὰ λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα ἢ ἀντίστροφα ποσὰ.

Ὡστε τὰ ποσὰ ἐργάται καὶ ἡμέραι ἐργασίας εἶναι ποσὰ ἀντίστροφα. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Δύο ποσὰ λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα ἢ ἀντίστροφα, ὅταν, πολλαπλασιαζομένης μιᾶς τιμῆς τοῦ ἑνὸς ποσοῦ ἐπὶ ἓνα τυχόντα ἀριθμὸν, διαιρεῖται ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ· ἢ, διαιρουμένης μιᾶς τιμῆς τοῦ ἑνὸς ποσοῦ διὰ τυχόντος ἀριθμοῦ, πολλαπλασιάζεται ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Ποσὰ ἀντίστροφα εἶναι : ἡ ταχύτης ἑνὸς κινητοῦ, τὸ ὅποιον κινεῖται ἰσοταχῶς, καὶ ὁ χρόνος, πού χρειάζεται τὸ κινητὸν διὰ νὰ διανύσῃ ὠρισμένην ἀπόστασιν. Τὸ βάρος ἑνὸς ἔμπορεύματος, τὸ ὅποιον δυνάμεθα νὰ ἀγοράσωμεν μὲ ὠρισμένον ποσὸν χρημάτων, εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογον πρὸς τὴν τιμὴν τῆς μονάδος βάρους τοῦ ἔμπορεύματος.

§ 281. Παρατηρήσεις. 1η. Ἐὰν λάβωμεν δύο τυχούσας τιμὰς τοῦ ποσοῦ τῶν ἐργατῶν, πού περιέχονται εἰς τὸν πίνακα τῆς § 280, π.χ. τὰς 2 καὶ 4, βλέπομεν ὅτι ὁ λόγος των εἶναι  $\frac{2}{4}$  ἢ  $\frac{1}{2}$ . Αἱ πρὸς αὐτὰς ἀντίστοιχοι τιμαὶ 6 καὶ 3 τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν

έχουν λόγον  $\frac{6}{3}$  ἢ  $\frac{2}{1}$ . Παρατηροῦμεν ὅτι δύο οἰαδήποτε τιμαὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ἐργατῶν ἔχουν λόγον ἀντίστροφον τοῦ λόγου, τὸν ὅποιον ἔχουν αἱ πρὸς αὐτὰς ἀντίστοιχοι τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Ἐὰν δύο ποσὰ εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ὁ λόγος δύο τιμῶν τοῦ ἐνὸς ποσοῦ εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀντίστροφον λόγον τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν τοῦ ἄλλου ποσοῦ.

2α. Ὄταν δύο ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα, τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὅποιοι μετροῦν τὰς δύο ἀντιστοιχοῦσας τιμὰς, εἶναι σταθερόν, δηλαδὴ εἶναι πάντοτε τὸ αὐτό.

Πράγματι εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα εἶναι

$$1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4 = 4 \times 3 = 12.$$

3η. Πολλάκις συμβαίνει εἰς ἓνα πρόβλημα νὰ εἶναι ἓνα ποσοὺν ἀνάλογον μὲν πρὸς ἓνα ἢ περισσότερα ποσὰ, ἀντιστρόφως δὲ ἀνάλογον πρὸς ἄλλα ποσὰ.

Οὕτως ὁ χρόνος, τὸν ὅποιον δαπανῶμεν διὰ νὰ ἐκτελέσωμεν ἓνα ἔργον, εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὸ ἔργον αὐτὸ καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογος πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐργατῶν, τοὺς ὁποίους θὰ χρησιμοποιήσωμεν.

4η. Εἶναι δυνατὸν δύο ποσὰ νὰ μεταβάλλωνται μαζί, χωρὶς νὰ εἶναι ἀντίστροφα.

Π.χ. Ἐστὼ ὅτι μίᾳ μόνιππος ἄμαξα διανύει τὴν ἀπόστασιν μεταξὺ δύο πόλεων εἰς 1 ὥραν· εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ αὐτὴ ἄμαξα συρομένη ἀπὸ 4 ἵππους, δὲν θὰ διανύσῃ τὴν ἀπόστασιν εἰς ἓνα τέταρτον τῆς ὥρας.

### 3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΠΟΣΑ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ

§ 282. Μεταβλητὰ ποσὰ. Πρόβλημα. Τὸ 1 μέτρον ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 20 δραχμάς. Πόσον τιμῶνται τὰ 2 μέτρα, τὰ 3 μέτρα, τὰ 4 μέτρα, ... τὸ  $\frac{1}{2}$  μέτρον, τὸ  $\frac{1}{4}$  μέτρον ;

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω πίναξ δεικνύει τὴν ἀντιστοιχίαν, ἡ ὁποία ὑπάρχει μετὰ τοῦ μήκους τοῦ ὑφάσματος καὶ τῆς ἀξίας του :

Μήκος ύφασματος	1	2	3	4	..	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	....
Ύξία εις δραχμάς	20	40	60	80	..	10	5	....

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἐὰν τὸ μήκος τοῦ ὑφάσματος μεταβληθῆ, μεταβάλλεται καὶ ἡ ἀξία αὐτοῦ. Τὰ δύο ποσά, δηλ. τὸ **μήκος** τοῦ ὑφάσματος καὶ ἡ **ἀξία** αὐτοῦ, λέγονται **μεταβλητὰ ποσά** (ἢ **συμμεταβλητὰ ποσά**).

Ἐπίσης παρατηροῦμεν ὅτι ἡ **ἀξία** τοῦ ὑφάσματος ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ **μήκους** αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ὑφάσματος εἶναι **συνάρτησις** τοῦ μήκους αὐτοῦ.

Τὸ μήκος ἢ οἰονδήποτε ἄλλο ποσόν, εἰς τὸ ὁποῖον δίδομεν αὐθαιρέτους τιμὰς, λέγεται **ἀνεξάρτητος μεταβλητή**.

Εἰς τὸ πρόβλημα τῆς § 279 εἶδομεν ὅτι ἡ ἀμοιβὴ τοῦ ἐργάτου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὥρων τῆς ἐργασίας του· διότι, ὅσας περισσοτέρας ὥρας θὰ ἐργασθῆ, τόσας περισσοτέρας δραχμὰς θὰ λάβῃ. Ἡ ἀμοιβὴ λοιπὸν τοῦ ἐργάτου καὶ αἱ ὥραι ἐργασίας του εἶναι **ποσά μεταβλητά**. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀμοιβὴ τοῦ ἐργάτου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὥρων ἐργασίας του, διὰ τοῦτο λέγομεν ὅτι ἡ ἀμοιβὴ τοῦ ἐργάτου εἶναι **συνάρτησις** τοῦ χρόνου ἐργασίας του.


Μεταβλητὰ ποσά εἶναι ἡ πλευρὰ ἐνὸς τετραγώνου καὶ ἡ περίμετρος του. Ἡ περίμετρος τοῦ τετραγώνου, ἐξαρτωμένη ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ, εἶναι **συνάρτησις** τῆς πλευρᾶς του.

Ἡ περιφέρεια ἐνὸς κύκλου εἶναι **συνάρτησις** τῆς ἀκτίνος του. Ἐπίσης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εἶναι **συνάρτησις** τῆς ἀκτίνος του. Τὸ διάστημα, τὸ ὁποῖον διανύει ἓνα αὐτοκίνητον, εἶναι **συνάρτησις** τῆς ταχύτητος αὐτοῦ καὶ τοῦ χρόνου, κατὰ τὸν ὁποῖον κινεῖται.

**§ 283. Γραφικὴ παράστασις.** Τὴν ἀντιστοιχίαν, ἡ ὁποία ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ μήκους τοῦ ὑφάσματος καὶ τῆς ἀξίας του (πρόβλημα § 282), δυνάμεθα νὰ παραστήσωμεν ὡς ἑξῆς:

Γράφομεν μίαν ὀρθὴν γωνίαν  $\chi O\psi$  (σχ. 11). Ἐπὶ τῆς  $O\chi$  λαμβάνομεν τμήματα ἴσα. Εἰς τὰ ἄκρα τῶν τμημάτων τούτων ἀναγράφομεν τοὺς ἀριθμοὺς 1, 2, 3, 4,.... ἕκαστος τῶν ὁποίων παριστάνει μήκος εἰς μέτρα.

Ἐπί τῆς  $O\psi$  λαμβάνομεν ἐπίσης τμήματα ἴσα. Εἰς τὰ ἄκρα τῶν τμημάτων τούτων ἀναγράφομεν τοὺς ἀριθμοὺς 20, 40, 60, 80, 100, ... ἕκαστος τῶν ὁποίων παριστάνει δραχμᾶς.



Σχ. 11

Τὸ 1 μ. (σημεῖον  $\Pi$ ) τιμᾶται 20 δρχ. (σημ.  $P$ ). Ἐκ τοῦ  $\Pi$  ὑψοῦμεν κάθετον ἐπὶ τὴν  $O\chi$  καὶ ἐκ τοῦ  $P$  κάθετον ἐπὶ τὴν  $O\psi$ . Αἱ κάθετοι αὗται τέμνονται εἰς τὸ σημεῖον  $A$ , τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς μῆκος ὑφάσματος 1 μέτρου καὶ εἰς ἀξίαν 20 δραχμῶν. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον προσδιορίζομεν καὶ τὰ

σημεῖα  $B, \Gamma, \Delta, \dots$  Τὰ σημεῖα  $O, A, B, \Gamma, \dots$  κείνται ἐπ' εὐθείας.


§ 284. Χρησιμοποίησις τῆς γραφικῆς παραστάσεως. Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὕρωμεν πόσον ἀξίζουν τὰ  $3\frac{1}{4}$  μέτρα τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς:

Ἐπί τῆς  $O\chi$  (σχ. 11) εὕρισκομεν τὸ σημεῖον  $\Pi'$  τοιοῦτον, ὥστε  $O\Pi'$  νὰ παριστάνῃ  $3\frac{1}{4}$  μ. Ἐκ τοῦ  $\Pi'$  ὑψοῦμεν κάθετον ἐπὶ τὴν  $O\chi$ , ἡ ὁποία συναντᾷ τὴν  $OA$  εἰς ἓνα σημεῖον  $M$ . Ἐκ τοῦ  $M$  φέρομεν παράλληλον τῆς  $O\chi$ , ἡ ὁποία συναντᾷ τὴν  $O\psi$  εἰς τὸ σημεῖον  $P'$ . Ἐπί τῆς  $O\psi$  παρατηροῦμεν ὅτι  $OP' = 65$  δρχ. Ὡστε  $3\frac{1}{4}$  μ. ἀξίζουν 65 δραχμᾶς.

Διὰ τῶν κάτωθι παραδειγμάτων θὰ λάβωμεν γενικωτέραν ἰδέαν τῆς γραφικῆς παραστάσεως τῶν μεταβολῶν ἑνὸς ποσοῦ

καί τῆς χρησιμότητος αὐτῆς εἰς τὰς διαφόρους ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς.

*Παράδειγμα Ιον.* Εἰς τὰ νοσοκομεῖα λαμβάνουν τὴν θερμοκρασίαν κάθε ἀσθενοῦς τὴν 9ην ὥραν π.μ. καὶ τὴν 9ην ὥραν μ.μ. Σημειώ-



Σχ. 12

νουν δὲ τὴν θερμοκρασίαν εἰς ἓνα φύλλον χάρτου, ὁ ὁποῖος εἶναι διηρημένος εἰς ἰσομεγέθη ὀρθογώνια, ὅπως δεικνύει τὸ σχῆμα 12.

Τοιουτοτρόπως ὁ ἱατρὸς μὲ ἓνα βλέμμα εἰς τὸ φύλλον τοῦ χάρτου ἐννοεῖ ἀμέσως, πῶς μεταβάλλεται ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀσθενοῦς.

*Παράδειγμα 2ον.* Εἰς τοὺς μετεωρολογικοὺς σταθμοὺς καὶ εἰς τὰ ἀστεροσκοπεῖα παριστάνουν μὲ πολλήν ἀκρίβειαν τὰς μεταβολὰς τῆς θερμοκρασίας τῆς ἀτμοσφαίρας μὲ τὴν βοήθειαν τῶν **αὐτογραφικῶν θερμομέτρων**. Εἰς αὐτὰ μία γραφίς κινουμένη μὲ ἓνα μηχανισμόν γράφει μίαν καμπύλην γραμμὴν εἰς ἓνα φύλλον χάρτου, ὃ ὁποῖος εἶναι καταλλήλως διηρημένος. Τὸ σχῆμα 13 δεικνύει πῶς εἶναι διηρημένος ὁ χάρτης. Ἡ δὲ ἐπ' αὐτοῦ γραμμὴ δεικνύει τὰς μεταβολὰς τῆς θερμοκρασίας μιᾶς ἑβδομάδος, ὅπως ἐγράφη ὑπὸ αὐτογραφικοῦ θερμομέτρου.

§ 285. "Ἄλλοι τρόποι παραστάσεως. Πολλάκις, διὰ νὰ κάμουν περισσότερον νοητὰ τὰ πορίσματα τῆς στατιστικῆς, παριστάνουν αὐτὰ μὲ εἰκόνας ἀναλόγου μεγέθους. Τὸ σχῆμα 14 παριστάνει μὲ ὀρθογώνια τὴν μεταλλευτικὴν παραγωγὴν τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὰ ἔτη 1945 - 1948.

Ἡ Ἀνωτάτη Σχολὴ Οἰκονομικῶν καὶ Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν ὑπὸ τὸν τίτλον « ΕΛΛΑΣ » ἐδημοσίευσε σειρὰν γραφικῶν παραστάσεων τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἐξελίξεως τῆς Ἑλλάδος, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὰς κάτωθι :

Τὸ σχῆμα 15 παριστάνει μὲ εἰκόνας τὰς μεταβολὰς τῶν δασικῶν προϊόντων τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὰ ἔτη 1925 - 1930.


Τὸ σχῆμα 16 αἰσθητοποιεῖ τὴν μεταβολὴν τῆς παραγωγῆς τοῦ γλεύκου καὶ ἐξαγωγῆς γλεύκου καὶ οἴνου κατὰ χιλιάδας τόννων.

Ἡ εἰκὼν 17 παριστάνει γραφικῶς τὴν ἐξέλιξιν τοῦ ἐμπορικοῦ στόλου τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὰ ἔτη 1915 - 1931 εἰς χιλιάδας τόννων.


Ἡ εἰκὼν 18 παριστάνει διὰ κυκλικῶν τομέων τὴν καλλιεργουμένην ἔκτασιν τῆς Ἑλλάδος ἐν σχέσει πρὸς τὴν ὅλην ἔκτασιν αὐτῆς.

Ἡ εἰκὼν 19 παριστάνει ἐπίσης διὰ κυκλικῶν τομέων τὴν ἀναλογίαν τῶν καλλιεργουμένων εἰδῶν, ὡς πρὸς τὴν καλλιεργουμένην ἔκτασιν τῆς Ἑλλάδος.


Ἡ εἰκὼν 20 παριστάνει γραφικῶς τὴν μεταβολὴν τῆς παραγωγῆς τοῦ σίτου κατὰ τὰ ἔτη 1914 - 1931 εἰς χιλιάδας τόννων.



Σχ. 13




Σχ. 14



Σχ. 15


## ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ



Σχ. 16

## Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΗ 1915 - 1931




Σχ. 17

## ΓΕΩΡΓΙΑ


ΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

(Μέσος όρος 1922 - 1928)




ΕΠΙΘΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 120.699 Τ. ΧΜ.

Σχ. 18



ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΕΚΤΑΣΙΣ 14.554 Τ. ΧΜ. (ΧΙΛ. ΣΤΡΩΜ.)

Σχ. 19



Σχ. 20

### Άσκήσεις

575 ) Μελετήσατε τὰς εἰκόνας 14-20 καὶ συναγάγετε τὰ ἀνάλογα συμπεράσματα.

Διὰ τὰς κάτωθι ἀσκήσεις χρησιμοποίησατε τετραγωνισμένον χάρτην.

576 ) Παραστήσατε γραφικῶς τὴν θερμοκρασίαν τοῦ τόπου σας κατὰ μίαν ἑβδομάδα. ( Παρατηρεῖτε τὸ θερμοόμετρον καθ' ἑκάστην καὶ τὴν αὐτὴν ὥραν. Σημειώσατε τὰς ἡμέρας ἐπὶ τῆς Οχ καὶ τὰς θερμοκρασίας ἐπὶ τῆς Οψ ).

577 ) Παραστήσατε γραφικῶς τὴν ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν τοῦ τόπου σας κατὰ ἓνα δεκαήμερον. ( Παρατηρεῖτε τὸ βαρόμετρον καθ' ἑκάστην καὶ τὴν αὐτὴν ὥραν ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

1. ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

§ 286. *Πρόβλημα 1ον.* Τὰ 15 μέτρα ἑνὸς ὑφάσματος τιμῶνται 360 δραχ. Πόσον τιμῶνται τὰ 8 μέτρα τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ;

Κατάταξις : Τὰ 15 μ. τιμῶνται 360 δραχ.  
 » 8 μ. » χ »

*Α' Λύσις.* Θὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα μὲ ἀναγωγὴν εἰς τὴν μονάδα σκεπτόμενοι ὡς ἑξῆς :

Ἐφοῦ τὰ 15 μέτρ. τιμῶνται 360 δραχ.

τὸ 1 » τιμᾶται  $\frac{360}{15}$  »

καὶ τὰ 8 » τιμῶνται  $\frac{360}{15} \times 8 = 192$  δραχ.

Ἔστω τὰ 8 » τιμῶνται

$$\frac{360}{15} \times 8 \text{ δραχ. ἢ } 360 \times \frac{8}{15} = 192 \text{ δραχ.}$$

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ παρατηροῦμεν ὅτι τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος καὶ ἡ τιμὴ του εἶναι ποσὰ ἀνάλογα καὶ ὅτι, διὰ νὰ εὐρωμεν πόσον τιμῶνται τὰ 8 μέτρα, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸν ὑπεράνω τοῦ χ ἀριθμὸν 360 ἐπὶ τὸν λόγον  $\frac{15}{8}$ , τὸν ὁποῖον σχηματίζουν αἱ δύο τιμαὶ 15 καὶ 8 τοῦ ἄλλου ποσοῦ, ἀντεστραμμένον.

*Β' Λύσις.* Τὰ ποσὰ μέτρα καὶ δραχμαὶ εἶναι ἀνάλογα, διότι διπλασιαζομένου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μέτρων, διπλασιάζεται καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν δραχμῶν.

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ αὐτὰ εἶναι ἀνάλογα, ὁ λόγος  $\frac{15}{8}$  τῶν δύο τιμῶν 15 καὶ 8 τοῦ ποσοῦ τῶν μέτρων εἶναι ἴσος μὲ τὸν λόγον τῶν ἀντιστοίχων πρὸς αὐτὰς τιμῶν 360 καὶ χ τοῦ ἄλλου ποσοῦ (§ 279). Δηλαδή θὰ εἶναι :  $\frac{15}{8} = \frac{360}{\chi}$ .

Εἰς τὴν ἀναλογίαν αὐτὴν εἶναι ἄγνωστος ἓνας ἄκρος ὄρος τῆς, ὁ χ. Ἄλλὰ γνωρίζομεν ( § 278, 1ον ) ὅτι διὰ νὰ εὗρωμεν ἓνα ἄκρον ὄρον μιᾶς ἀναλογίας, πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο μέσους ὄρους τῆς καὶ τὸ γινόμενόν των διαιροῦμεν διὰ τοῦ γνωστοῦ ἄκρου ὄρου.

$$\Theta\acute{\alpha} \text{ εἶναι λοιπὸν } \chi = \frac{360 \times 8}{15} = 192.$$

Παρατηροῦμεν ὅτι εὗρήκαμεν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον 192 δρχ., τὸ ὁποῖον εὗρήκαμεν ἀνωτέρω μὲ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

**§ 287. Πρόβλημα 2ον.** 20 ἐργάται χρειάζονται 36 ἡμέρας, διὰ νὰ τελειώσουν ἓνα ἔργον. Πόσας ἡμέρας θὰ χρειασθοῦν 12 ἐργάται τῆς αὐτῆς δυνάμεως, διὰ νὰ τελειώσουν τὸ αὐτὸ ἔργον ;

*Κατάταξις :* Οἱ 20 ἐργάται τελειώνουν ἓνα ἔργον εἰς 36 ἡμέρας  
 » 12 » » » » » χ »

*Α' Λύσις.* Διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα. Ἀφοῦ οἱ 20 ἐργάται χρειάζονται 36 ἡμ. διὰ νὰ τελειώσουν τὸ ἔργον, ὁ 1 ἐργάτης θὰ χρειασθῆ 20 φορές περισσότερο χρόνο, δηλ. 36 ἡμ.  $\times$  20, διὰ νὰ τελειώσῃ τὸ ἔργον καὶ οἱ 12 ἐργ. θὰ χρειασθοῦν 12 φορές ὀλιγώτερον χρόνο, δηλ.  $\frac{36 \times 20}{12} = 60$  ἡμέρας, διὰ νὰ τελειώσουν τὸ ἔργον. Ὡστε οἱ 12 ἐργάται θὰ χρειασθοῦν :

$$\frac{36 \times 20}{12} \text{ ἡμ. ἢ } 36 \times \frac{20}{12} = 60 \text{ ἡμ.}$$

Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ παρατηροῦμεν ὅτι οἱ ἐργάται καὶ ὁ χρόνος, κατὰ τὸν ὁποῖον ἐκτελοῦν ἓνα ἔργον, εἶναι ποσὰ ἀντίστροφα καὶ ὅτι, διὰ νὰ εὗρωμεν τὸ ζητούμενον, ἐπολλαπλασιάσαμεν τὸν ὑπεράνω τοῦ ἀγνώστου χ ἀριθμὸν 36 ἐπὶ τὸν λόγον  $\frac{20}{12}$ , τὸν ὁποῖον σχηματίζουν αἱ δύο τιμαὶ 20 καὶ 12 τοῦ ἄλλου ποσοῦ, ὅπως ἔχει.

*Β' Λύσις.* Τὰ ποσὰ ἐργάται καὶ χρόνος εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα, διότι διπλασιαζομένου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργατῶν, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν διαιρεῖται διὰ 2.

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ αὐτὰ εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα, ὁ λόγος  $\frac{20}{12}$  τῶν δύο τιμῶν 20 καὶ 12 τοῦ ποσοῦ τῶν ἐργατῶν εἶναι ἴσος μὲ

τὸν ἀντίστροφον λόγον τῶν ἀντιστοιχῶν πρὸς αὐτὰς τιμῶν 36 καὶ  $\chi$  τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν (§ 281, 1η). Δηλ. θὰ εἶναι  $\frac{20}{12} = \frac{\chi}{36}$ .

Εἰς τὴν ἀναλογίαν αὐτὴν εἶναι ἄγνωστος ἓνας μέσος ὄρος τῆς,  $\chi$ . Ἄλλὰ γνωρίζομεν (§ 278, 2α) ὅτι, διὰ νὰ εὕρωμεν ἓνα ἄγνωστον μέσον ὄρον μιᾶς ἀναλογίας, πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο ἄκρους ὄρους τῆς καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γνωστοῦ μέσου ὄρου τῆς.

$$\Theta\acute{\alpha} \text{ εἶναι λοιπὸν } \chi = \frac{36 \times 20}{12} = 60 \text{ ἡμέραι.}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι εὕρήκαμεν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον (60 ἡμέραι), τὸ ὁποῖον εὕρήκαμεν καὶ μὲ τὴν προηγουμένην λύσιν.

§ 288. **Συμπέρασμα.** Εἰς ἕκαστον ἐκ τῶν δύο προηγουμένων προβλημάτων παρατηροῦμεν ὅτι δίδονται δύο ἀντίστοιχοι τιμαὶ δύο ποσῶν ἀναλόγων ἢ ἀντιστρόφων (15 μέτρ. ὑφ. καὶ 360 δρχ. εἰς τὸ 1ον πρόβλημα καὶ 20 ἔργ. καὶ 36 ἡμ. εἰς τὸ 2ον πρόβλημα) καὶ μία ἄλλη τιμὴ τοῦ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν τῶν ποσῶν (8 μ. εἰς τὸ 1ον πρόβλημα καὶ 12 ἔργ. εἰς τὸ 2ον πρόβλημα) καὶ ζητεῖται ἡ πρὸς αὐτὴν ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ. Ἐπειδὴ εἰς τὰ ἀνωτέρω προβλήματα καὶ εἰς τὰ ὁμοια πρὸς αὐτὰ δίδονται **τρεῖς ἀριθμοὶ** καὶ ζητεῖται τέταρτος, διὰ τοῦτο ἡ μέθοδος, δηλ. ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον λύομεν τὰ προβλήματα αὐτά, λέγεται **ἀπλῆ μέθοδος τῶν τριῶν**.

Τὰ προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν λύονται ἢ διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα ἢ καὶ διὰ τοῦ κάτωθι κανόνος, ὁ ὁποῖος προκύπτει, ἐξ ὧσων εἶδομεν κατὰ τὴν λύσιν τῶν δύο ἀνωτέρω προβλημάτων :

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν ἄγνωστον τιμὴν εἰς ἓνα πρόβλημα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν, πολλαπλασιάζομεν τὸν ὑπεράνω τοῦ ἀγνώστου  $\chi$  ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα, τὸ ὁποῖον σχηματίζουν αἱ δοθεῖσαι δύο τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ, ἀντεστραμμένον μὲν, ἂν τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ὅπως ἔχει δέ, ἂν τὰ ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα.

§ 289. Ἐφαρμογὴ τοῦ κανόνος. *Πρόβλημα.* Οἱ 2 πήχεις 6 ρούπια ἑνὸς ὑφάσματος ἀξίζουν 220 δραχμάς. Πόσον ἀξίζουν οἱ 15 πήχ. 4 ρούπια ;

Κατάταξις: Οί 2 π. 6 ρ. ἢ 22 ρ. ἀξίζουσι 220 δρχ.  
 » 15 π. 4 ρ. ἢ 124 ρ. » χ »

Λύσις. Ἐφοῦ τὰ 22 ρούπια ὑφάσματος ἀξίζουσι 220 δρχ., τὰ διπλάσια ρούπια θὰ ἀξίζουσι καὶ διπλασίας δραχμάς. Ἐπομένως τὰ ποσὰ ρούπια καὶ δραχμαὶ εἶναι ἀνάλογα. Ἐπομένως θὰ εἶναι :

$$\chi = 220 \times \frac{124}{22} = 1\,240 \text{ δρχ.}$$

Ἐπομένως οἱ 15 πηχ. 4 ρούπια ἀξίζουσι 1\,240 δρχ.

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

Α' Ὁ μ ἄ ς. 578 ) Μὲ 100 χλγ. ἐλαιῶν κάμωμεν 25 χλγ. ἐλαίου. Πόσα χλγ. ἐλαίου θὰ κάμωμεν μὲ 1\,300 χλγ. ἐλαιῶν ;

579 ) Τὰ 100 χλγ. ἀλεύρου δίδουσι 140 χλγ. ἄρτου. Πόσα χλγ. ἄρτου θὰ δώσουσι 35 χλγ. ἀλεύρου ;

580 ) Γνωρίζομεν ὅτι 100° Κελσίου ἰσοδυναμοῦν μὲ 80° Ρεωμόρου· 35 Ρεωμόρου μὲ πόσους βαθμοὺς Κελσίου ἰσοδυναμοῦν ;

581 ) Μία ράβδος μήκους 1,20 μέτρων, ἂν στηθῇ κατακορυφῶς ρίπτει κατὰ τινα στιγμήν σκιάν μήκους 1,80 μέτρ. Πόσον εἶναι τὸ ὕψος δένδρου, τὸ ὁποῖον κατὰ τὴν αὐτὴν στιγμήν ρίπτει σκιάν μήκους 15 μέτρων ;

582 ) Μία κυρία ἠγόρασεν 8,25 μέτρα ἀπὸ ἑνα ὕφασμα καὶ ἔδωσεν 990 δρχ. Ὁ ἔμπορος ὁμοίως κατὰ λάθος τῆς ἔδωσεν 0,25 μέτρα ὀλιγώτερον. Πόσα χρήματα πρέπει νὰ τῆς ἐπιστρέψῃ ;

583 ) Γεωγραφικὸς χάρτης ἔχει κατασκευασθῆ μὲ κλίμακα 1:100\,000 (δηλ. μήκος 1 μέτρου εἰς τὸν χάρτην ἀντιπροσωπεύει μήκος 100\,000 μέτρ. εἰς τὸ ἔδαφος). Δύο πόλεις ἀπέχουσι εἰς τὸν χάρτην 25 χιλιοστὰ τοῦ μέτρου. Πόσον ἀπέχουσι εἰς τὴν πραγματικότητα ;

Β' Ὁ μ ἄ ς. 584 ) Μία κρήνη, ἣ ὁποία παρέχει 45 χλγ. ὕδατος εἰς ἕνα λεπτόν τῆς ὥρας, χρειάζεται 12 ὥρας, διὰ νὰ γεμίσῃ μίαν δεξαμενὴν. Πόσας ὥρας θὰ χρειασθῇ μία ἄλλη κρήνη, διὰ νὰ γεμίσῃ τὴν αὐτὴν δεξαμενὴν, ἂν παρέχῃ 54 χλγ. ὕδατος εἰς ἕνα λεπτόν τῆς ὥρας ;

585 ) Μία φρουρὰ ἀπὸ 400 στρατιώτας ἔχει τροφὰς δι' 6 μῆνας. Πόσους στρατιώτας ἔπρεπε νὰ ἔχη ἡ φρουρὰ, διὰ νὰ περάσῃ 8 μῆνας μὲ τὰς αὐτὰς τροφὰς ;

586 ) Πεζοπόρος, ό όποίος διανύει 4,6 χιλιόμετρα τήν ώραν, χρειάζεται  $5\frac{3}{4}$  ώρας, διά νά διανύση μίαν απόστασιν. Πόσον χρόνον θά χρειασθῆ, διά νά διανύση τήν αὐτήν απόστασιν ένας ποδηλάτης, ό όποίος εἰς 1 ώραν διανύει 9,2 χλμ. ἐπί πλέον τοῦ όδοιπόρου ;

587 ) Εἰς 20 ἡμέρας 15 ἐργάται ξετέλεσαν τό ἥμισυ ἐνός ἔργου. Τήν στιγμὴν αὐτὴν ἀποχωροῦν τῆς ἐργασίας 3 ἐργάται λόγω ἀσθενείας. Εἰς πόσας ἡμέρας οἱ ὑπόλοιποι ἐργάται θά ἐκτελέσουν τό ἄλλο ἥμισυ τοῦ ἔργου ;

588 ) Ἐργολάβος ἔπρεπε νά στρώσῃ μίαν ὁδόν εἰς 14 ἡμ. Πρὸς τοῦτο χρησιμοποιεῖ 44 ἐργάτας. Ἐὰν θέλῃ νά τήν στρώσῃ εἰς 11 ἡμέρας, πόσους ἐργάτας πρέπει νά προσλάβῃ ἀκόμη ;

Γ' Ὁ μ ἄ σ. 589 ) Οἱ 8 πῆχεις ἐνός ὑφάσματος κοστίζουν 1 728 δραχμάς. Πόσον κοστίζουν οἱ 15 πῆχ. καὶ 3 ρούπια τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ;

590 ) Μὲ 1 λίραν καὶ 6 σελλίνια ἀγοράζομεν 3,90 μέτρα ἐξ ἐνός ὑφάσματος. Πόσα μέτρα τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος θά ἀγοράσωμεν μὲ 15 λίρας 10 σελ. 8 πέννας ;

591 ) Αἱ 7 ὀκ. 200 δράμ. ἐνός ἐμπορεύματος κοστίζουν 129 δρχ. Πόσον κοστίζουν οἱ 3 στατῆρες 33 ὀκ. καὶ 300 δράμια τοῦ αὐτοῦ ἐμπορεύματος ;

592 ) Μία μαθήτρια, διά νά κατασκευάσῃ ἓνα φόρεμα, χρειάζεται 6 πῆχεις ἐξ ἐνός ὑφάσματος, ἐὰν τό πλάτος του εἶναι 1 πῆχ. 2 ρούπια. Πόσους πῆχεις θά χρειασθῆ ἐξ ἄλλου ὑφάσματος, τοῦ όποίου τό πλάτος εἶναι 1 πῆχ. 4 ρούπια ;

593 ) Διὰ νά στρώσουν τό πάτωμα μιᾶς σάλας, χρειάζονται 24 μέτρα τάπητος, ὅταν ὁ τάπης ἔχη πλάτος 1,50 μέτρα. Πόσα μέτρα τάπητος θά χρειασθοῦν, ἂν τό πλάτος του εἶναι 1,20 μέτρα ;

## 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

§ 290. Ὁρισμοί. Ὅταν λέγωμεν ὅτι τό Κράτος ηὔξησε τὰ ἡμερομίσθια τῶν ἐργατῶν κατὰ 25 τοῖς 100 (25%), ἐννοοῦμεν ὅτι ἡ αὔξησης εἶναι ἴση πρὸς τὰ  $\frac{25}{100}$  τοῦ ἡμερομισθίου. Ἐπομένως εἰς κάθε 100 δρχ. γίνεται αὔξησης 25 δρχ. καὶ ὁ ἐργάτης θά λαμβάνῃ 125 δρχ. ἀντὶ τῶν 100 δρχ.

Όταν 100 χλγ. σίτου δίδουν 85 χλγ. άλευρον, παρατηρούμεν ότι τὸ άλευρον εἶναι ἴσον πρὸς τὰ  $\frac{85}{100}$  τοῦ σίτου καὶ λέγομεν ὅτι ὁ σίτος δίδει 85 τοῖς ἑκατὸν άλευρον, παριστῶμεν δὲ τοῦτο : 85 %.

Όταν λέγωμεν ὅτι ἓνας ἔμπορος πωλεῖ τὰ ἔμπορεύματά του μὲ κέρδος 25 τοῖς ἑκατὸν ( 25 % ), ἔννοοῦμεν ὅτι τὸ κέρδος εἶναι ἴσον πρὸς τὰ  $\frac{25}{100}$  τῆς ἀξίας τοῦ ἔμπορεύματος καὶ οὕτω δι' ἔμπορεύματα ἀξίας 100 δραχμῶν ἔχει κέρδος 25 δρχ. καὶ ἔπομένως εἰσπράττει 125 δραχμάς.

Όταν λέγωμεν ὅτι τὸ ἀπόβαρον ἑνὸς ἔμπορεύματος εἶναι 5 %, ἔννοοῦμεν ὅτι τὸ ἀπόβαρον εἶναι ἴσον πρὸς τὰ  $\frac{5}{100}$  τοῦ μεικτοῦ βάρους καὶ οὕτω ἐπὶ μεικτοῦ βάρους 100 χλγ. τὰ 5 χλγ. εἶναι ἀπόβαρον καὶ τὰ λοιπὰ 95 χλγ. εἶναι τὸ καθαρὸν βάρος τοῦ ἔμπορεύματος.

Ἡ ἔκφρασις τοῦ τόσον τοῖς ἑκατὸν ( % ) χρησιμοποιεῖται εἰς πολλὰς περιπτώσεις. Π.χ.

Εἰς τὰς **ἐκπτώσεις** τῶν τιμῶν τῶν ἔμπορευμάτων.

Εἰς τὰς **προμηθείας**, τὰς ὁποίας δικαιοῦνται οἱ εἰσπράκτορες, οἱ παραγγελιοδόχοι, οἱ μεσίται, οἱ ἔργολάβοι, αἱ Τράπεζαι κ.τ.λ.

Εἰς τὰ **ἀσφάλιστρα** τῶν οἰκιῶν, καταστημάτων, πλοίων, ἔμπορευμάτων, τὰ ὁποῖα πληρώνονται εἰς τὰς ἀσφαλιστικὰς Ἑταιρείας. Συνήθως τὰ ἀσφάλιστρα ὑπολογίζονται ἐπὶ τῶν 1 000 δραχ. Οὕτω λέγομεν ὅτι πληρώνομεν ἀσφάλιστρα 2 τοῖς χιλίοις καὶ τὸ σημειοῦμεν : 2<sup>ο</sup>/100.

Τὸ ποσόν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ὑπολογίζεται τὸ κέρδος ἢ ἡ ἔκπτωσης, λέγεται **ἀρχικὸν ποσόν**.

Ὁ λόγος τοῦ κέρδους ἢ τῆς ἐκπτώσεως πρὸς τὸ ἀρχικὸν ποσόν, λέγεται **ποσοστὸν** τοῦ κέρδους ἢ τῆς ἐκπτώσεως.

Τὰ προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα ἀναφέρεται τὸ ποσοστὸν εἰς ἑκατοστὰ δηλ. τοῖς ἑκατὸν ἢ εἰς χιλιοστὰ δηλ. τοῖς χιλίοις, λέγονται **προβλήματα ποσοστῶν**.

Τὰ προβλήματα τῶν ποσοστῶν δύνανται νὰ λυθοῦν ὅπως καὶ τὰ προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν, ὡς δεικνύεται εἰς τὰ κάτωθι παραδείγματα. Πρέπει ὁμως νὰ προσέχωμεν κατὰ τὴν κατάταξιν τοῦ προβλήματος νὰ θέτωμεν τὰ ὁμοειδῆ ποσὰ εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην.



598 ) 'Εάν ἀλέσωμεν σίτον, λαμβάνομεν 75 % ἄλευρον καὶ 25 % πίτυρον. Πόσα χλγ. ἀλεύρου θὰ λάβωμεν, ἂν ἀλέσωμεν 380 χλγ. σίτου;

599 ) \*Ἐμπορος πωλεῖ τὰ ἐμπορεύματά του μὲ ἔκπτωσησιν 18 %. Πόσῃν ἔκπτωσησιν θὰ κάμῃ καὶ πόσα θὰ εἰσπράξῃ, ἔαν πωλήσῃ ἐμπορεύματα ἀξίας 12 500 δραχ. ;

600 ) Τὸ μεικτὸν βάρους ἑνὸς ἐμπορεύματος εἶναι 240 χλγ. 'Εάν τὸ ἀπόβαρον εἶναι 3 %, πόσον εἶναι τὸ καθαρὸν βάρους του ;

601 ) 'Η ἔκτασις τῆς Ἑλλάδος εἶναι 130 199 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τὰ 20 % τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς καλλιεργοῦνται ὑπὸ τῶν κατοίκων, τὰ 18 % εἶναι δάση καὶ λόχμαι, τὰ 35 % εἶναι λειμῶνες καὶ βοσκαί, τὰ δὲ 27 % εἶναι ἀκαλλιεργήτα ἢ λίμναι ἢ ἔλη. Νὰ ἐκφραθοῦν αἱ ἐκτάσεις αὐταὶ εἰς τετραγωνικά χιλιόμετρα.

§ 292. Εὐρεσις τοῦ ἀρχικοῦ ποσοῦ. *Πρόβλημα 1ον.* \*Ἐμπορος πωλῶν τὰ ἐμπορεύματά του μὲ κέρδος 20 % εἰσέπραξεν ἐκ τῆς πωλήσεως μέρους αὐτῶν 29 640. Πόση ἦτο ἡ ἀξία τῶν πωληθέντων ἐμπορευμάτων ;

*Κατάταξις :*

Ὅταν εἰσπράττῃ 120 δραχ., τὸ ἐμπόρευμα ἀξίζει 100 δραχ.  
 » » 29 640 » » » » χ »

*Λύσις.* 'Επειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ἔχομεν :

$\chi = 100 \text{ δραχ.} \times \frac{29\,640}{120} = 24\,700 \text{ δραχ.}$  Ὡστε ἡ ἀξία τῶν πωληθέντων ἐμπορευμάτων ἦτο 24 700 δραχ.

ἀξία	=	100
κέρδ.	=	20
πωλ.	=	120

*Πρόβλημα 2ον.* \*Ἐνα ἐμπόρευμα ἐπωλήθη μὲ ζημίαν 12 % ἀντὶ 4 400 δραχ. Πόση ἦτο ἡ ἀξία τοῦ ἐμπορεύματος ;

*Κατάταξις :*

Ὅταν πωλῆται 88 δραχ. τὸ ἐμπόρευμα, ἀξίζει 100 δραχ.  
 » » 4 400 » » » » χ »

*Λύσις.* 'Επειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ἔχομεν :

$\chi = 100 \text{ δραχ.} \times \frac{4\,400}{88} = 5\,000 \text{ δραχ.}$  Ὡστε ἡ ἀξία τοῦ ἐμπορεύματος ἦτο 5 000 δραχ.

ἀξία	=	100
ζημία	=	12
πωλ.	=	88

**\* Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς**

Α' Ὁ μ ἄ ς. 602 ) \*Ἐμπορος πτωχεύσας δίδει τὰ 34%, τῶν ὄσων

ὀφείλει εἰς τοὺς πιστωτὰς του. Πόσον ὠφείλει εἰς ἓνα ἐξ αὐτῶν, ὁ ὁποῖος ἔλαβε 5 780 δραχ. ;

603 ) Μεσίτης λαμβάνει μεσιτείαν 2 %. Διὰ τὴν πώλησιν μιᾶς οἰκίας ἔλαβεν 750 δραχ. ὡς μεσιτείαν. Πόσον ἐπωλήθη ἡ οἰκία ;

604 ) \*Ἐμπορος πωλήσας ἐμπόρευμά τι μὲ ζημίαν 15 % ἐζημιώθη ἐκ τῆς πωλήσεως αὐτοῦ 105 δραχ. Πόσον εἶχεν ἀγοράσει τὸ ἐμπόρευμα καὶ πόσον τὸ ἐπώλησεν ;

605 ) \*Ἀρχιτέκτων ἔλαβε 4 230 δραχ. ὡς ἀμοιβὴν διὰ τὴν ἐκπόνησιν σχεδίου μιᾶς οἰκίας. Ἐὰν ἡ ἀμοιβή του ὑπελογίσθη πρὸς 1,5 % ἐπὶ τῆς συνολικῆς δαπάνης τῆς οἰκίας, νὰ εὑρεθῇ πόσον θὰ στοιχίσῃ ἡ οἰκία.

606 ) Τὸ θαλάσσιον ὕδωρ περιέχει 2,5 % τοῦ βάρους του ἄλας. Πόσα χλγ. θαλασσίου ὕδατος περιέχουν 1 χλγ. ἄλατος ;

B' Ὁ μ ἄ ς. 607 ) \*Ἐμπορος πωλῶν τὰ ἐμπορεύματά του μὲ κέρδος 30 % εἰσπράττει ἐκ τῆς πωλήσεως αὐτῶν 910 δραχ. Πόση ἦτο ἡ τιμὴ τῆς ἀγορᾶς των ;

608 ) Ὁ καφῆς, ὅταν καβουρδίζεται, χάνει 22 % τοῦ βάρους του. Πόσα χλγ. καφῆ πρέπει νὰ ἀγοράσωμεν, διὰ νὰ ἔχωμεν 39 χλγ. καβουρδισμένου ;

§ 293. Εὐθεσις τοῦ %. *Πρόβλημα.* Δι' ἐμπόρευμα ἀξίας 1 800 δραχ. ἐπληρώσαμεν 1 728 δραχ. Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν ὑπελογίσθη ἡ ἔκπτωσις ;

*Λύσις.* Ἡ ὅλική ἔκπτωσις εἶναι :

$$1\ 800 \text{ δραχ.} - 1\ 728 \text{ δραχ.} = 72 \text{ δραχ.}$$

*Κατάταξις :* Δι' ἐμπόρ. ἀξίας 1 800 δρχ. ἔχομεν ἔκπτ. 72 δρχ.

» » » 100 » » » χ »

\*Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, ἔχομεν :

$$\chi = 72 \text{ δραχ.} \times \frac{100}{1\ 800} = 4 \text{ δραχ.}$$

\*Ὡστε ἡ ἔκπτωσις ὑπελογίσθη πρὸς 4%

#### Ἄ σ κ ἡ σ ε ι ς

A' Ὁ μ ἄ ς. *Προφορικῶς.* 609 ) Πόσον % εἶναι ἡ ἔκπτωσις ἐνὸς ἐμπορεύματος, τὸ ὁποῖον πληρώνεται 90 δραχ. ἀντὶ 100 ; 180 δραχ. ἀντὶ 200 δραχ. ; 210 δραχ. ἀντὶ 300 δραχ. ;

610 ) Πόσον % είναι τὸ ἀπόβαρον ἐπὶ τῶν κάτωθι ἐμπορευμάτων ;

α ) καφές : μεικτὸν βάρους 200 χλγ., βάρους συσκευασίας 18 χλγ.

β ) τέϊον : » » 150 » » » 12 »

Β' Ὁ μ ά ς. Γραπτῶς. 611 ) \*Ἐμπορος ἠγόρασεν ἐμπορεύματα ἀξίας 17 280 δραχ. καὶ τὰ ἐπώλησεν ἀντὶ 20 736. Πόσον % ἐκέρδισεν ;

612 ) \*Ἐνα ἔργον ὑπελογίσθη ὅτι θὰ στοιχίσῃ 36 215 000 δραχ. Ἔργολάβος ἀναλαμβάνει νὰ ἐκτελέσῃ τὸ ἔργον αὐτὸ ἀντὶ 32 412 425 δραχ. Εἰς πόσον % ἀνῆλθεν ἡ ἔκπτωσης ;

613 ) \*Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε χονδρικῶς 84 χλγ. ζακχάρεως πρὸς 7,5 δραχ. τὸ χλγ. καὶ 45 χλγ. σάπωνος πρὸς 7,20 δραχ. τὸ χλγ. καὶ ἐπλήρωσε μόνον 810,9 δραχ. Πόσον % ἦτο ἡ ἔκπτωσης ;

614 ) Μία φτυαριὰ χώματος, τὸ ὅποιον ἐλήφθη ἀπὸ ἓνα κῆπον ζυγίζει 450 γραμ. Κατὰ τὴν ἀνάλυσιν εὐρέθησαν 270 γραμ. ἄμμου, 150 γραμ. ἀργίλου, τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ ὑπολοίπου ἀσβεστόλιθος καὶ τὰ  $\frac{2}{3}$  αὐτοῦ γόνιμον. Ἀπὸ πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐξ ἐκάστης ὕλης ἀπετελεῖτο τὸ ἔδαφος τοῦτο ;

Γ' Ὁ μ ά ς. 615 ) \*Ἐμπορος ἠγόρασε 325 μ. ὑφάσματος πρὸς 45,6 δραχ. τὸ μέτρον. Πωλεῖ τὸ  $\frac{1}{5}$  αὐτοῦ πρὸς 50 δραχ. τὸ μέτρον. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ ἕκαστον μέτρον τοῦ ὑπολοίπου ὑφάσματος, διὰ νὰ κερδίσῃ συνολικῶς 20 % ;

616 ) \*Ἐμπορος ἠγόρασεν 120 μέτρα ὑφάσματος πρὸς 32,50 δρχ. τὸ μέτρον. Πωλεῖ τὸ  $\frac{1}{3}$  αὐτοῦ πρὸς 35 δραχ. τὸ μέτρον, τὸ  $\frac{1}{4}$  αὐτοῦ πρὸς 37,50 δραχ. τὸ μέτρον καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 34,50 δραχ. τὸ μέτρον. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισεν ;

617 ) \*Ἐμπορος ἠγόρασε 1 260 ποτήρια πρὸς 1 900 δρχ. τὴν χιλιάδα. Κατὰ τὴν μεταφορὰν ἔσπασαν 63. Τὰ ὑπόλοιπα ἐπώλησεν μὲ κέρδος 20 % ἐπὶ τῆς τιμῆς τῆς ἀγορᾶς. Πόσον ἐπώλησεν ἕκαστον ποτήριον ;

618 ) Παραγγελιοδόχος λαμβάνει 120 δρχ. ἡμερησίως δι' ἕξοδα κινήσεως καὶ 2,5 % ὡς προμήθειαν ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ὑπ' αὐτοῦ πωλουμένων εἰδῶν. Μετὰ ταξίδιον 18 ἡμερῶν λαμβάνει συνο-

λικῶς διὰ ἔξοδα κινήσεως καὶ προμήθειαν 16 200 δραχ. Πόσης ἀξίας εἶδη ἐπώλησεν ;

### 3. ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

§ 294. *Πρόβλημα 1ον.* Δι' ἐργασίαν 4 ἡμερῶν 5 ἐργάται ἔλαβον 2 600 δραχ. Πόσον θὰ λάβουν 8 ἐργάται, ἐὰν ἐργασθοῦν 10 ἡμέρας ;

*Κατάταξις :* 5 ἐργάται εἰς 4 ἡμ. λαμβάνουν 2 600 δραχ.  
 8 » » 10 » » χ »

Ἐν πρώτοις εὐρίσκομεν πόσας δραχμὰς θὰ λάβουν οἱ 8 ἐργάται, ἂν ἐργασθοῦν 4 ἡμέρας. Πρὸς τοῦτο λύομεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν :

Οἱ 5 ἐργάται, ἂν ἐργασθοῦν 4 ἡμέρας, λαμβάνουν 2 600 δραχ. Οἱ 8 ἐργάται πόσα θὰ λάβουν ;

*Κατάταξις :* 5 ἐργάται λαμβάνουν 2 600 δραχ.  
 8 » » χ »

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ ἐργάται καὶ δραχμαὶ εἶναι ἀνάλογα, θὰ εἶναι :

$$\chi = 2\,600 \times \frac{8}{5} \text{ δραχ.}$$

Ὡστε οἱ 8 ἐργάται θὰ λάβουν  $2\,600 \times \frac{8}{5}$  δραχ., ἐὰν ἐργασθοῦν ἐπὶ 4 ἡμέρας.

Ἄλλ' ἐπειδὴ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσον θὰ λάβουν οἱ 8 ἐργάται, ἂν ἐργασθοῦν 10 ἡμέρας (καὶ ὄχι 4 ἡμέρας), πρέπει νὰ λύσωμεν τώρα τὸ ἐξῆς πρόβλημα :

Ἄν ἐργασθοῦν ἐπὶ 4 ἡμέρας (οἱ 8 ἐργάται), θὰ λάβουν  $2\,600 \times \frac{8}{5}$  δραχ. Πόσον θὰ λάβουν, ἐὰν ἐργασθοῦν ἐπὶ 10 ἡμέρας ;

*Κατάταξις :* Ἄν ἐργασθοῦν 4 ἡμ. λαμβ.  $2\,600 \times \frac{8}{5}$  δραχ.  
 » » 10 » » χ »

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ ἡμέραι καὶ δραχμαὶ εἶναι ἀνάλογα, θὰ εἶναι :

$$\chi = 2\,600 \times \frac{8}{5} \times \frac{10}{4} = 10\,400 \text{ δραχ.}$$

Ὡστε οἱ 8 ἐργάται θὰ λάβουν 10 400 δραχ., ἂν ἐργασθοῦν 10 ἡμέρας.

§ 295. Πρόβλημα 2ον. 8 ἐργάται εἰς 6 ἡμέρας σκάπτουν ἀγρὸν 12 στρεμμάτων. Εἰς πόσας ἡμέρας 10 ἐργάται θὰ σκάψουν ἀγρὸν 5 στρεμμάτων ;

Κατάταξις :

8 ἐργ.	6 ἡμ.	12 στρ.
10 »	χ »	5 »

Λύσις. Εὐρίσκομεν πρῶτον εἰς πόσας ἡμέρας οἱ 10 ἐργάται σκάπτουν ἀγρὸν 12 στρεμμάτων. Πρὸς τοῦτο λύομεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν :

Οἱ 8 ἐργάται σκάπτουν ἓνα ἀγρὸν ( 12 στρεμ. ) εἰς 6 ἡμέρας. Οἱ 10 ἐργάται εἰς πόσας ἡμέρας θὰ σκάψουν τὸν ἀγρὸν αὐτόν ;

Κατάταξις :

8 ἐργάται	σκάπτουν	ἀγρὸν	εἰς	6 ἡμέρας
10 »	»	»	»	χ »

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ ἐργάται καὶ ἡμέραι εἶναι ἀντίστροφα, θὰ εἶναι :

$$χ = 6 \times \frac{8}{10} \text{ ἡμ.}$$

Ὡστε οἱ 10 ἐργάται θὰ χρειαθοῦν  $6 \times \frac{8}{10}$  ἡμ. διὰ νὰ σκάψουν ἀγρὸν 12 στρεμμάτων.

Ἄλλ' ἡμεῖς δὲν θέλομεν νὰ μάθωμεν εἰς πόσας ἡμέρας οἱ 10 ἐργάται θὰ σκάψουν ἀγρὸν 12 στρεμμάτων, ἀλλὰ 5 στρεμμάτων. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ λύσωμεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα :

Διὰ νὰ σκάψουν ἀγρὸν 12 στρεμ. ( οἱ 10 ἐργάται ), χρειάζονται  $6 \times \frac{8}{10}$  ἡμ. Πόσας ἡμέρας θὰ χρειαθοῦν διὰ νὰ σκάψουν ἀγρὸν 5 στρεμμάτων ;

Κατάταξις :

Διὰ 12 στρέμ.	χρειάζ.	$6 \times \frac{8}{10}$ ἡμ.
» 5 »	»	χ »

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ στρέμματα καὶ ἡμέραι εἶναι ἀνάλογα, θὰ εἶναι :

$$χ = 6 \text{ ἡμ.} \times \frac{8}{10} \times \frac{5}{12} = 2 \text{ ἡμ.}$$

Ὡστε οἱ 10 ἐργάται θὰ χρειαθοῦν 2 ἡμ., διὰ νὰ σκάψουν ἀγρὸν 5 στρεμμάτων.

Συμπέρασμα. Διὰ νὰ λύσωμεν τὰ 2 ἀνωτέρω προβλήματα, ἀνελύσαμεν αὐτὰ εἰς δύο προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν ( δηλ. εἰς τόσα προβλήματα, ὅσα εἶναι τὰ δοθέντα ποσὰ, πλὴν ἑνός ).

Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν τὰ προβλήματα τῆς μορφῆς αὐτῆς λέγονται προβλήματα τῆς **συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν**.

Ἐκ τῆς προσεκτικῆς παρατηρήσεως τοῦ τελικοῦ ἐξαγομένου συνάγομεν τὸν κάτωθι κανόνα :

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν τιμὴν τοῦ ἀγνώστου  $\chi$  εἰς ἓνα πρόβλημα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, πολλαπλασιάζομεν τὸν ὑπεράνω τοῦ  $\chi$  ἀριθμὸν ἐπὶ ἕκαστον τῶν κλασμάτων, πὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὰς δύο τιμὰς ἐκάστου ποσοῦ, ὅπως ἔχει μὲν, ἂν τὸ ποσὸν τοῦτο εἶναι ἀντίστροφον πρὸς τὸ ποσὸν τοῦ ἀγνώστου, ἀντεστραμμένον δέ, ἂν εἶναι ἀνάλογον πρὸς αὐτό.

§ 296. Ἐφαρμογὴ τοῦ κανόνου. *Πρόβλημα*. Μὲ 15 χλγ. νῆμα κατασκευάζομεν ὕφασμα 25 μέτρ. μήκους καὶ 0,64 μέτρ. πλάτους. Μὲ 21 χλγ. νῆμα πόσον ὕφασμα θὰ κατασκευάσωμεν, ἐὰν τὸ πλάτος του εἶναι 0,80 μέτρα ;

*Κατάταξις*. 15 χλγ. νῆμ. 25 μ. μήκ. 0,64 μ. πλ.  
21 » » χ » » 0,80 » »

*Λύσις*. Συγκρίνομεν κάθε ποσὸν μὲ τὸ ποσόν, τοῦ ὁποίου ζητεῖται νὰ εὕρεθῇ ἡ τιμὴ :

1ον. *Χιλιόγρα. καὶ μῆκος*. Ἀφοῦ μὲ 15 χλγ. νῆμα κατασκευάζομεν ὕφασμα 25 μ. μήκους, μὲ διπλάσια χλγ. νήματος θὰ κατασκευάσωμεν καὶ διπλάσιον μῆκος ὕφασματος· ἄρα τὰ ποσὰ χλγ. καὶ μῆκος εἶναι ἀνάλογα.

2ον. *Πλάτος καὶ μῆκος ὕφασματος*. Ὄταν τὸ πλάτος τοῦ ὕφασματος εἶναι 0,64 μ., κατασκευάζομεν ὕφασμα 25 μ. μήκους, μὲ ὠρισμένον νῆμα. Ὄταν τὸ πλάτος τοῦ ὕφασματος εἶναι διπλάσιον, μὲ τὸ ἴδιον νῆμα θὰ κατασκευάσωμεν ὕφασμα, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος θὰ εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἡμισυ τοῦ προηγουμένου. Ἄρα τὰ ποσὰ πλάτους καὶ μῆκος ὕφασματος εἶναι ἀντίστροφα.

Κατὰ τὸν κανόνα λοιπὸν θὰ εἶναι :

$$\chi = 25 \times \frac{21}{15} \times \frac{0,64}{0,80} = \frac{25 \times 21 \times 64}{15 \times 80} = 28 \mu.$$

Ὄστε μὲ 21 χλγ. νῆμα θὰ κατασκευάσωμεν ὕφασμα 28 μ. μήκους.

*Σημείωσις*. Κατὰ τὴν σύγκρισιν κάθε ποσοῦ πρὸς τὸ ποσόν, τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ τιμὴ, πρέπει νὰ θεωρῶμεν τὰ ἄλλα ποσὰ ὡς μένοντα ἀμετάβλητα.

## Άσκησης

Α' Όμας. 619 ) Διὰ νὰ μεταφέρῃ ἕνας ἰδιοκτῆτης φορτηγοῦ αὐτοκινήτου 300 χλγ. σίτου εἰς ἀπόστασιν 15 χλμ. ζητεῖ 67,5 δρχ. Πόσον θὰ ζητήσῃ, ἐὰν μεταφέρῃ 1 500 χλγ. σίτου εἰς ἀπόστασιν 25 χιλιομέτρων ;

620 ) Διὰ νὰ λιθοστρώσουν μίαν ὁδὸν 360 μέτρων μήκους καὶ 12 μ. πλάτους, ἐχρησιμοποίησαν 450 κυβικὰ μέτρα χαλικίων. Πόσα κ.μ. χαλικίων θὰ χρειασθῶμεν, διὰ νὰ λιθοστρώσωμεν ὁδὸν μήκους 560 μέτρ. καὶ πλάτους 10 μέτρων ;

621 ) Ὑπελόγισέ τις ὅτι μία κρήνη ρέουσα ἐπὶ 7 ἡμ. καὶ ἐπὶ 12 ὥρας τὴν ἡμέραν ἔδωκεν 7 560 χλγ. ὕδατος. Πόσον ὕδωρ θὰ δώσῃ, ἐὰν τρέχῃ ἐπὶ 9 ἡμ. καὶ ἐπὶ 8 ὥρας τὴν ἡμέραν ;

622 ) Μία βρύσις εἰς 6 ὥρας γεμίζει μίαν δεξαμενὴν, ἡ ὁποία ἔχει 4 μέτρα μῆκος, 3 μέτρα πλάτος καὶ 3,50 μ. βάθος. Πόσον χρόνον θὰ ἐχρειάζετο ἡ βρύσις, διὰ νὰ γεμίσῃ μίαν ἄλλην δεξαμενὴν, ἡ ὁποία ἔχει μῆκος 5,6 μέτρα, πλάτος 2,50 μέτρα καὶ βάθος 2 μέτρα ;

Β' Όμας. 623 ) Διὰ νὰ κτίσωμεν ἕνα τοῖχος, ποῦ ἔχει 15 μέτρα μῆκος, 0,80 μέτρα πάχος καὶ 2 μέτρα ὕψος, ἐπληρώσαμεν 1 200 δρχ. Πόσον ἔπρεπε νὰ πληρώσωμεν, ἂν ὁ τοῖχος εἶχε 10 μέτρ. μῆκος, 1,20 μέτρ. πάχος καὶ 3 μ. ὕψος ;

624 ) Ἐνας ράπτης ἐτοιμῶν ἐνδυμάτων ἔκαμε 10 ἐνδυμασίας μὲ 42 πῆχ. 4 ρούπ. ἀπὸ ὕφασμα πλάτους 1,2 μέτρ. Πόσας ὁμοίας ἐνδυμασίας δύναται νὰ κάμῃ μὲ 51 πῆχεις ἀπὸ ὕφασμα πλάτους 1,5 μ ;

625 ) Μία σιδηρᾶ πλᾶξ ἔχει μῆκος 0,20 μέτρα, πλάτος 0,04 μέτρα, πάχος 0,02 μέτρα καὶ βάρος 1 248 γραμμάρια. Μία σιδηρᾶ θύρα ἔχει μῆκος 1,5 μέτρα, πλάτος 0,80 μέτρα καὶ πάχος 0,01 μέτρα. Νὰ εὔρεθῇ τὸ βάρος τῆς θύρας.

626 ) Δύο ἐργάται ἐργαζόμενοι 5 ὥρας τὴν ἡμέραν θερίζουν ἄγρον 7,5 στρεμ. εἰς 3 ἡμέρας. Πόσοι ἐργάται τῆς αὐτῆς δυνάμεως, ἐργαζόμενοι 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, θὰ θερίσουν ἄγρον 12 στρεμ. εἰς 2 ἡμέρας ;

Γ' Όμας. 627 ) Πεζοπόρος βαδίζων 8 ὥρας τὴν ἡμέραν χρειάζεται 3 ἡμέρας, διὰ νὰ διανύσῃ ἀπόστασιν 120 χιλιομέτρων. Εἰς πόσας ἡμέρας θὰ διανύσῃ ἀπόστασιν 180 χιλιομέτρων, ἐὰν βαδίξῃ 6 ὥρας τὴν ἡμέραν ;

628 ) Τὰ  $\frac{3}{4}$  τῆς ἀποστάσεως δύο πόλεων διήνυσέ τις δι' αὐτοκινήτου μέ ταχύτητα 30 χλμ. τὴν ὥραν καὶ τὸ ὑπόλοιπον πεζῆ διανύων 5 χλμ. τὴν ὥραν. Ἐὰν διὰ τὸ πρῶτον διάστημα ἐχρηιάσθη 25", πόσον θὰ χρειασθῆ διὰ τὸ δεύτερον μέρος τοῦ διαστήματος ;

629 ) Μία ἀμαξοστοιχία, ἡ ὁποία κινεῖται μέ ταχύτητα 42 χλμ. τὴν ὥραν, πρέπει νὰ διανύσῃ μίαν ἀπόστασιν εἰς 9 ὥρας. Μετὰ πορείαν 126 χιλιομ. ὑποχρεοῦται νὰ σταματήσῃ ἐπὶ  $\frac{3}{4}$  τῆς ὥρας. Μὲ ποίαν ταχύτητα πρέπει νὰ συνεχίσῃ τὴν πορείαν τῆς, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν προορισμὸν τῆς κατὰ τὴν ὠρισμένην ὥραν ;

#### 4. ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

§ 297. *Πρόβλημα.* "Ενας ταξιδιώτης ἠγόρασεν εἰς τὸ Λονδῖνον ὕφασμα πρὸς 9,5 σελλίνια τὴν ὑάρδα. Πρὸς πόσας δραχμὰς ἠγόρασε τὸν πῆχυν, ἂν ἡ χρυσῆ λίρα Ἀγγλίας ἐτιμᾶτο εἰς τὴν ἐλευθέραν ἀγορὰν πρὸς 280 δραχμὰς ;

*Λύσις.* Γνωρίζομεν (§ 250) ὅτι :

$$1 \text{ ὑάρδα} = 0,914 \text{ μέτρα καὶ } 1 \text{ πῆχυς} = 0,648 \text{ μέτρα.}$$

Σκεπτόμεθα λοιπὸν ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{r} \text{Ἄφοῦ } 0,914 \text{ μέτρ. τιμῶνται } 9,5 \text{ σελλίνια} \\ \text{τὰ } 0,648 \text{ μέτρ.} \quad \text{»} \quad \psi \quad \text{»} \end{array}$$

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα θὰ εἶναι :

$$\psi = 9,5 \times \frac{0,648}{0,914} \text{ σελλίνια.}$$

Διὰ νὰ τρέψωμεν τὰ σελλίνια αὐτὰ εἰς δραχμὰς, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Ἡ μία χρυσῆ λίρα Ἀγγλίας, ἧτοι 20 σελλίνια, ἔχουν 280 δρχ.

$$\text{τὰ } 9,5 \times \frac{0,648}{0,914} \quad \text{»} \quad \text{»} \quad \chi \quad \text{»}$$

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, θὰ εἶναι :

$$\chi = \frac{280 \times 9,5 \times 0,648}{20 \times 0,914} = 94,3 \text{ δραχ. περίπου.}$$

Ὡστε ἠγόρασε τὸν πῆχυν 94,3 δρχ. περίπου.

*Συμπέρασμα.* Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα αὐτό, τὸ ἐχωρίσαμεν εἰς προβλήματα ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν, εἰς τὰ ὁποῖα εἰσέρχονται ποσὰ ἀνάλογα.

Πρὸς τοῦτο εἶχομεν ὑπ' ὄψιν ὅτι 1 ὑάρδα = 0,914 μέτρα, 1 πήχους = 0,648 μέτρα καὶ ὅτι συμφώνως πρὸς τὸ πρόβλημα 1 χρυσὴ λίρα Ἀγγλίας = 280 δραχ.

Δὲν εἶναι ὁμως τοῦτο πρόβλημα συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, διότι ἡ νέα τιμὴ ( ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ἄγνωστος ) ἐκάστου ποσοῦ δὲν εἶναι ὁμοειδῆς πρὸς τὴν πρώτην τιμὴν αὐτοῦ.

Π.χ. μία τιμὴ τοῦ πήχεως εἶναι  $\chi$  δραχ. καὶ ἄλλη τιμὴ τοῦ πήχεως εἶναι 0,648 μέτρ.

Καὶ ἡ διάταξις λοιπὸν τῆς πράξεως ταύτης ἔχει διάφορον μορφήν ἀπὸ τὴν διάταξιν τῶν προβλημάτων τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, ὡς παραπλεύρως φαίνεται.

Κατὰ τὴν διάταξιν αὐτὴν τὰ ζεύγη τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν δύο ποσῶν γράφονται τὸ ἓνα κάτω ἀπὸ τὸ ἄλλο. Τὸ πρῶτον ζεῦγος ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ζητουμένην τιμὴν. Τὸ δὲ α' μέλος ἐκάστης τῶν ἄλλων ἰσοτήτων εἶναι ὁμοειδῆς πρὸς τὸ β' μέλος τῆς προηγουμένης ἰσότητος. Οὕτω δέ, ἂν τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος καὶ ἄλλαι γνωσταὶ σχέσεις εἶναι ἐπαρκεῖς, πρέπει τὸ β' μέλος τῆς τελευταίας ἰσότητος νὰ εἶναι ὁμοειδῆς πρὸς τὴν ἄγνωστον τιμὴν.

Διάταξις τῆς πράξεως

$$\begin{array}{rcl} \chi \text{ δραχ.} & = & 1 \text{ πήχ.} \\ 1 \text{ πήχ.} & = & 0,648 \text{ μέτ.} \\ 0,914 \text{ μέτ.} & = & 1 \text{ ὑάρ.} \\ 1 \text{ ὑάρ.} & = & 9,5 \text{ σελ.} \\ 20 \text{ σελ.} & = & 280 \text{ δραχ.} \end{array}$$

$$\chi = \frac{0,648 \times 9,5 \times 280}{0,914 \times 20} = 94,3 \text{ δραχ.}$$

Εὐκόλως δὲ βλέπομεν ὅτι ἡ εὑρεθεῖσα τιμὴ τοῦ  $\chi$ , μετὰ τὴν διάταξιν αὐτὴν, εὐρίσκεται ὡς ἑξῆς :

**Διαιροῦμεν τὸ γινόμενον τῶν δευτέρων μελῶν διὰ τοῦ γινομένου τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι κάτω ἀπὸ τὸν  $\chi$ .**

Ἔνεκα τῆς τοιαύτης συζεύξεως τῶν τιμῶν τῶν ποσῶν, τὰ ὁποῖα εἰσέρχονται εἰς τὰ τοιαῦτα προβλήματα, ταῦτα λέγονται προβλήματα τῆς **συνεζευγμένης μεθόδου**.

**Παρατήρησις.** Εἶναι ἀξιοπαρατήρητον ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν καὶ δύο μόνον ζεύγη τιμῶν, ὅπως συμβαίνει εἰς τὰ προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου. Ἐπομένως, ἂν εἰς ἓνα τοιοῦτον πρόβλημα εἰσέρχονται ἀνάλογα ποσά, ἡ διάταξις τούτου δύναται νὰ λάβῃ τὴν προηγουμένην μορφήν.

\*Ἐστω π.χ. τὸ ἀκόλουθον πρόβλημα :

Διὰ 5 χλγ. ζακχάρως δίδομεν 52,50 δραχ. Πόσα χλγ. αγοράζομεν μὲ 84 δραχμάς ;

Ἡ γνωστὴ διάταξις  
 Μὲ 52,50 δραχ. αγοράζ. 5 χλγ.  
 » 84 » » χ »

$$\chi = 5 \times \frac{84}{52,50} = 8 \text{ χλγ.}$$

Νέα διάταξις  
 χ χλγ. = 84 δραχ.  
 52,50 δραχ. = 5 χλγ.

$$\chi = \frac{84 \times 5}{52,50} = 8 \text{ χλγ.}$$

### Ἀσκήσεις

630 ) Τὸ χιλιόγραμμον τοῦ καφέ τιμᾶται ἐν Λονδίῳ 3 σελλίνια. Πόσας δραχμάς ἀξίζει ὁ στατήρ τοῦ καφέ μὲ τιμὴν τῆς χρυσῆς λίρας Ἀγγλίας 280 δραχμάς ;

631 ) Ὁ τόννος τῆς ζακχάρως τιμᾶται ἐν Ἀγγλίᾳ 35 χαρτίνας λίρας καὶ ἐπιβαρύνεται μέχρι Πειραιῶς μὲ ἔξοδα κατὰ 12 %. Πόσας δραχμάς κοστίζει τὸ χλγ. ἐν Πειραιεῖ ;

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ'

### ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΥ

§ 298. **Όρισμοί.** "Όταν δανείζη τις εις άλλον χρήματα, είναι δίκαιον νά λαμβάνη μετά τινα χρόνον πλήν τῶν χρημάτων του καί ένα κέρδος. Τò κέρδος αὐτό, πρὸ προέρχεται ἀπὸ τὰ δανειζόμενα χρήματα, λέγεται **τόκος**. "Ωστε :

**Τόκος λέγεται τὸ κέρδος, τὸ ὁποῖον λαμβάνει ὁ δανειζόμενος χρήματα.**

Τὸ δανειζόμενον ποσὸν λέγεται **Κεφάλαιον (Κ)**.

Ἡ χρονικὴ διάρκεια τοῦ δανείου λέγεται **Χρόνος (Χ)**.

Ἐὰν δὲ τόκος τῶν 100 δραχ. εἰς 1 ἔτος λέγεται **Ἐπιτόκιον (Ε)**. Τὸ ἐπιτόκιον ὀρίζεται δι' ἰδιαιτέρας συμφωνίας μεταξὺ τοῦ δανειζόντος καὶ τοῦ δανειζομένου. Σημειοῦται δὲ διὰ τοῦ συμβόλου %.

Εἰς τὰ προβλήματα τοῦ τόκου παρουσιάζονται τέσσαρα ποσά, ἥτοι ὁ **τόκος**, τὸ **κεφάλαιον**, ὁ **χρόνος** καὶ τὸ **ἐπιτόκιον**. Ἐπειδὴ δὲ συνήθως δίδονται τὰ τρία ποσά καὶ ζητεῖται τὸ τέταρτον, διὰ τοῦτο τὰ προβλήματα τοῦ τόκου διακρίνονται εἰς 4 εἶδη.

**Σημείωσις.** Ὁ τόκος εἶναι **ἀπλοῦς** ἢ **σύνθετος**. Ἀπλοῦς μὲν λέγεται, ὅταν τὸ κεφάλαιον μὲν τὸ αὐτὸ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ δανείου. Σύνθετος δέ, ὅταν εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἔτους (συνήθως) προστίθεται εἰς τὸ κεφάλαιον καὶ ὁ τόκος αὐτοῦ καὶ ἀποτελεῖται οὕτω νέον κεφάλαιον διὰ τὸ ἐπόμενον ἔτος. Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν λέγομεν ὅτι τὸ κεφάλαιον **ἀνατοκίζεται**.

Κατωτέρω θὰ κάμωμεν λόγον μόνον περὶ ἀπλοῦ τόκου.

#### 1. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ

§ 299. *Πρόβλημα 1ον.* Πόσον τόκον φέρουν 365 000 δραχ. εἰς 3 ἔτη πρὸς 6 %;

**Κατάταξις :**

Αί 100 δρχ. κεφ. εις 1 έτος φέρουν 6 δρχ. τόκον  
» 365 000 » » » 3 έτη » Χ » »

**Λύσις.** Έπειδή ό τόκος είναι ανάλογος πρòς τò κεφάλαιον και πρòς τòn χρόνον, έχομεν :

$$\chi = 6 \text{ δρχ.} \times \frac{365\,000}{100} \times \frac{3}{1} = \frac{6 \times 365\,000 \times 3}{100} = 65\,700 \text{ δρχ. τόκον.}$$

Ώστε αί 365 000 δραχ. φέρουν 65 700 δραχ. τόκον εις 3 έτη.

**Πρόβλημα 2ον.** Πόσον τόκον φέρουν 650 000 δραχμαί εις 8 μήνας πρòς 4,5 % ;

**Κατάταξις :**

Αί 100 δρχ. κεφ. εις 12 μñν. φέρουν 4,5 δρ. τόκον  
» 650 000 » » » 8 » » Χ » »

**Λύσις.** Έπειδή ό τόκος είναι ανάλογος πρòς τò κεφάλαιον και πρòς τòn χρόνον, έχομεν :

$$\chi = 4,5 \text{ δρχ.} \times \frac{650\,000}{100} \times \frac{8}{12} = \frac{4,5 \times 650\,000 \times 8}{1\,200} = 19\,500 \text{ δρχ. τόκον.}$$

Ώστε αί 650 000 δραχ. φέρουν 19 500 δραχ. τόκον εις 8 μήνας.

**Πρόβλημα 3ον.** Πόσον τόκον φέρουν 450 000 δρχ. εις 3 μήνας και 15 ήμέρας πρòς 9 % ;

**Κατάταξις :**

Αί 100 δρχ. κεφ. εις 360 ήμ. φέρουν 9 δρχ. τόκον  
» 450 000 » » » 105 » » Χ » »

**Λύσις.** Έπειδή ό τόκος είναι ανάλογος πρòς τò κεφάλαιον και πρòς τòn χρόνον, έχομεν :

$$\chi = 9 \text{ δρχ.} \times \frac{450\,000}{100} \times \frac{105}{360} = \frac{9 \times 450\,000 \times 105}{36\,000} = 11\,812,5 \text{ δρχ. τόκον.}$$

Ώστε αί 450 000 δραχ. φέρουν 11 812,5 δραχ. τόκον εις 3 μñν. και 15 ήμέρας.

**Συμπέρασμα.** Έκ τής λύσεως τών άνωτέρω τριών προβλημάτων συνάγομεν ότι :

Διά νά εύρωμεν τòn τόκον πολλαπλασιάζομεν τās τιμάς τών τριών δεδομένων ποσών, δηλ. του Κεφαλαίου, Έπιτοκίου, Χρόνου και τò γινόμενον διαιρούμεν διά του 100 ή 1 200 ή 36 000, καθ' όσον ό χρόνος έκφράζεται εις έτη ή εις μήνας ή εις ήμέρας.

$$\begin{aligned} K &= 365\,000 \text{ δρ.} \\ E &= 6\% \\ X &= 3 \text{ έτη} \\ T &= ; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K &= 650\,000 \text{ δρ.} \\ E &= 4,5\% \\ X &= 8 \text{ μήνες} \\ T &= ; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K &= 450\,000 \text{ δρ.} \\ E &= 9\% \\ X &= 3 \text{ μñν. } 15 \text{ ήμ.} \\ T &= ; \end{aligned}$$

**§ 300. Τύπος του τόκου.** Ἐάν παραστήσωμεν με  $K$  τὸ κεφάλαιον, με  $X$  τὸν χρόνον, με  $E$  τὸ ἐπιτόκιον καὶ με  $T$  τὸν τόκον, ὁ προηγούμενος κανὼν ἐκφράζεται διὰ τῶν ἰσοτήτων :

$$T = \frac{K \cdot E \cdot X}{100}, \quad \text{ἂν ὁ χρόνος } X \text{ εἶναι ἔτη}$$

$$T = \frac{K \cdot E \cdot X}{1200}, \quad \text{ἂν ὁ χρόνος } X \text{ εἶναι μῆνες}$$

καὶ  $T = \frac{K \cdot E \cdot X}{36000}, \quad \text{ἂν ὁ χρόνος } X \text{ εἶναι ἡμέραι.}$

Καθεμία ἀπὸ τὰς ἰσοτήτας αὐτὰς λέγεται **τύπος τοῦ τόκου**. Με τὸν τύπον τοῦ τόκου λύομεν κάθε πρόβλημα, εἰς τὸ ὁποῖον ζητεῖται ὁ τόκος, ἄρκει νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὰ γράμματα  $K$ ,  $E$ ,  $X$  με τὰς τιμὰς τῶν.

**Ἐφαρμογὴ 1η.** Πόσον τόκον φέρουν 560 000 δραχμαὶ εἰς 4 μῆνας πρὸς 6 % ;

Εἰς τὸν τύπον  $T = \frac{K \cdot E \cdot X}{1200}$  θέτομεν  $K = 560\,000$ ,  
 $E = 6$ ,  $X = 4$  καὶ ἔχομεν :

$$T = \frac{560\,000 \times 6 \times 4}{1200} = 11\,200 \text{ δραχ.}$$

$K = 560\,000$ δρ.
$E = 6\%$
$X = 4$ μῆνες
$T = ;$

Ὡστε αἱ 560 000 δρχ. εἰς 4 μῆν. φέρουν τόκον 11 200 δραχ.

**Ἐφαρμογὴ 2α.** Πόσον τόκον φέρουν 240 000 δραχμαὶ εἰς 1 ἔτος 1 μῆνα 10 ἡμέρας πρὸς 9 % ;

Εἰς τὸν τύπον  $T = \frac{K \cdot E \cdot X}{36000}$  θέτομεν  $K = 240\,000$ ,  $E = 9$ ,  
 $X = 1$  ἔτος 1 μῆν 10 ἡμέραι = 400 ἡμ. καὶ ἔχομεν :

$$T = \frac{240\,000 \times 9 \times 400}{36000} = 24\,000 \text{ δραχ.}$$

**§ 301. Εὐρεσις τοῦ τόκου διὰ τῶν τοκαριθμῶν. Πρόβλημα.**  
 Πόσον τόκον φέρουν 560 000 δραχμ. εἰς 75 ἡμ. πρὸς 9 % ;

*Λύσις.* Γνωρίζομεν ὅτι :

$$T = \frac{K \cdot E \cdot X}{36000} = \frac{560\,000 \times 9 \times 75}{36000} = \frac{560\,000 \times 75}{4000}$$

Τὸ γινόμενον  $560\,000 \times 75$  τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὰς ἡμέρας ὀνομάζομεν **τοκαριθμῶν**, τὸν δὲ διαιρέτην 4 000, ὁ ὁποῖος εἶναι πηλίκον τοῦ 36 000 διὰ τοῦ ἐπιτοκίου 9, ὀνομάζομεν **σταθερὸν διαιρέτην**.

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν τόκον ἑνὸς κεφαλαίου εἰς χρόνον ἐκφραζόμενον εἰς ἡμέρας, διαιροῦμεν τὸν τοκάριθμον διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου.

Κατὰ τὸν κανόνα αὐτὸν θὰ εἶναι :

$$\text{Τόκος} = \frac{\text{Τοκάριθμος}}{\text{σταθεροῦ διαιρέτου}}$$

Ἐφαρμογή. Πόσον τόκον φέρουν 420 000 δραχ. εἰς 75 ἡμέρας πρὸς 6 % ;

$$\text{Λύσις. } T = \frac{\text{Τοκάριθμος}}{\text{σταθεροῦ διαιρέτου}} = \frac{420\,000 \times 75}{6\,000} = 5\,250 \text{ δραχ.}$$

Ὡστε αἱ 420 000 δραχμαὶ φέρουν τόκον 5 250 δραχμάς.

§ 302. Εὐρεσις τοῦ τόκου ἀπὸ μνήμης. Δυνάμεθα πολλάκις νὰ εὐρωμεν τὸν τόκον ἀπὸ μνήμης. Πρὸς τοῦτο εὐρίσκομεν πρῶτον τὸν ἐτήσιον τόκον τοῦ κεφαλαίου καὶ πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν. Ὁ ἐτήσιος τόκος ἑνὸς κεφαλαίου εὐρίσκεται, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἑκατοστὸν τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον.

Οὕτως, ἂν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν πόσον τόκον φέρουν 800 δραχ. εἰς 4 ἔτη πρὸς 5%, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Ὁ ἐτήσιος τόκος εἶναι  $8 \times 5 = 40$  δραχμαὶ. Ἐπομένως εἰς 4 ἔτη θὰ φέρουν τόκον  $40 \times 4 = 160$  δραχμάς.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

Α' Ὁ μ ά ς. Προφορικῶς. 632 ) Πόσος εἶναι ὁ ἐτήσιος τόκος :

1. Πρὸς 1% τῶν 8 000 δρχ., τῶν 90 000 δρχ., τῶν 1 600 000 δρ.;
2. » 4% » 5 000 » » 60 000 » » 1 200 000 δρ.;
3. » 5% » 4 000 » » 120 000 » » 3 000 000 δρ.;

Γραπτῶς. 633 ) Πόσον τόκον φέρουν :

1. 1 575 000 δραχ. εἰς 5 ἔτη πρὸς 4,5% ;
2. 180 000 δραχ. εἰς 3 ἔτη καὶ 4 μῆν. πρὸς 5% ;
3. 1 863 000 δραχ. εἰς 3 ἔτη 2 μῆν. 20 ἡμ. πρὸς 8% ;

Β' Ὁ μ ά ς. 634 ) Ἐχει τις 2 434 500 δραχ. Καταθέτει τὰ  $\frac{9}{15}$

αυτῶν πρὸς 5% καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 4,5%. Πόσον τόκον θὰ λαμβάνη κατ' ἔτος;

635 ) Ἐπώλησέ τις μίαν οἰκίαν ἀντὶ 350 000 δραχ. Ἀπὸ αὐτὴν ἐλάμβανε κατ' ἔτος ἐνοίκιον 18 000 δρχ. Τὸ ποσόν, ποῦ ἔλαβεν ἐκ τῆς πωλήσεως τῆς οἰκίας, κατέθεσεν εἰς Τράπεζαν πρὸς 6%. Κατὰ πόσον ἠυξήθησαν αἱ πρόσοδοί του;

636 ) Ἐνας γεωργὸς ἐδανείσθη 65 000 δραχμὰς ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν πρὸς 9% ἐτησίως. Τὸ δάνειον ἔγινε τὴν 12ην Δεκεμβρίου 1948 καὶ ἐξωφλήθη τὴν 20ὴν Ἰανουαρίου 1949. Πόσα χρήματα ἐπλήρωσεν;

637 ) Τὸ ἥμισυ ἐνὸς κεφαλαίου 380 000 δρχ. κατετέθη πρὸς 4,5% καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 4,75%. Πόσον τόκον θὰ λάβῃ μετὰ 5 ἔτη;

## 2. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

§ 303. *Πρόβλημα.* Ἐνας γεωργὸς ἐδανείσθη ἓνα κεφάλαιον πρὸς 8%. Μετὰ 4 δὲ ἔτη ἐπλήρωσε τόκον 6 000 δραχμὰς. Πόσα χρήματα ἐδανείσθη;

*Κατάταξις :*

Αἱ 100 δρχ.	εἰς 1 ἔτος φέρουν τόκον	8 δρχ.	
» χ	» » 4 »	» »	6 000 »

K = ;  
 E = 8%  
 X = 4 ἔτη  
 T = 6 000 δρχ.

*Λύσις.* Εὐκόλως ἐννοοῦμεν ὅτι διπλάσιον, τριπλάσιον κ.τ.λ. κεφάλαιον φέρει τὸν αὐτὸν τόκον εἰς τὸ ἥμισυ, τρίτον κ.τ.λ. τοῦ χρόνου. Εἶναι δηλαδή τὸ κεφάλαιον καὶ ὁ χρόνος ποσὰ ἀντίστροφα.

Ἐπειδὴ τὸ κεφάλαιον εἶναι ἀνάλογον πρὸς τὸν τόκον καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογον πρὸς τὸν χρόνον, θὰ εἶναι :

$$χ = 100 \text{ δρχ.} \times \frac{1}{4} \times \frac{6000}{8} = \frac{6000 \times 100}{4 \times 8} = 18\,750 \text{ δραχμαί.}$$

Ὡστε ἐδανείσθη 18 750 δραχμὰς.

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ κεφάλαιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100, ἂν ὁ χρόνος ἐκφράζηται εἰς ἔτη, καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν τιμῶν τῶν δύο ἄλλων γνωσῶν ποσῶν.

§ 304. Τύπος τοῦ κεφαλαίου. Ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω κανόνα συνάγομεν ὅτι ὁ τύπος τοῦ κεφαλαίου εἶναι :

$$K = \frac{T \cdot 100}{E \cdot X}$$

Εἶναι προφανὲς ὅτι εἰς τὸν ἀνωτέρω τύπον πρέπει νὰ θέτωμεν ἀντὶ 100 τὸν 1 200, ὅταν ὁ χρόνος δίδεται εἰς μῆνας καὶ τὸν 36 000, ὅταν ὁ χρόνος δίδεται εἰς ἡμέρας.

*Ἐφαρμογή.* Πόσον κεφάλαιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν πρὸς 5 % διὰ νὰ λάβωμεν τόκον 50 000 δραχ. εἰς 4 ἔτη ;

Ἐὰν εἰς τὸν τύπον  $K = \frac{T \cdot 100}{E \cdot X}$  θέσωμεν  
 $T = 50\,000$ ,  $E = 5$ ,  $X = 4$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$K = \frac{50\,000 \times 100}{5 \times 4} = 250\,000 \text{ δραχμαί.}$$

Ὡστε πρέπει νὰ τοκίσωμεν 250 000 δραχμάς.

$$\begin{aligned} K &= ; \\ E &= 5\% \\ X &= 4 \text{ ἔτη} \\ T &= 50\,000 \text{ δρ.} \end{aligned}$$

#### Ἀσκήσεις

A' Ὁμάς. Προφορικῶς. 638 ) Ποῖον κεφάλαιον τοκίζόμενον :

1. Πρὸς 4% φέρει ἐτήσιον τόκον 1 200 δραχ. ;
2. » 5% » » » 6 000 δραχ. ;
3. » 3% » εἰς 4 μῆνας » 5 000 δραχ. ;

B' Ὁμάς. Γραπτῶς. 639 ) Ποῖον κεφάλαιον τοκίζόμενον πρὸς 8% φέρει εἰς 3 ἔτη 6 μῆν. τόκον 30 240 δραχμάς ;

640 ) Ποῖον κεφάλαιον τοκίζόμενον πρὸς 9% φέρει εἰς 4 ἔτη 9 μῆν. 10 ἡμ. τόκον 4 730 δραχμάς ;

641 ) Ἐνας γεωργὸς ἐδανείσθη διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἕνα ποσὸν χρημάτων πρὸς 12% ἐτησίως. Μετὰ 1 ἔτος καὶ 3 μῆνας ἐπλήρωσε 3 000 δρχ. διὰ τόκον. Πόσα χρήματα ἐδανείσθη ;

642 ) Ἐνας ὑπάλληλος ἔκαμε μίαν ἐνδυμασίαν μὲ πίστωσιν 8 μηνῶν καὶ μὲ τόκον πρὸς 5%. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ τιμὴ τῆς ἐνδυμασίας ηὔξηθη κατὰ 65 δραχμάς. Πόσον ἐκόστισεν αὐτὴ ἡ ἐνδυμασία ;

Γ'. Ὁμάς. 643 ) Ἐχει τις καταθέσει δύο κεφάλαια πρὸς 4%. Ἀπὸ τὸ πρῶτον λαμβάνει ἡμερησίως 9,5 δραχ. Ἀπὸ δὲ τὸ δεύτερον 990 δραχ. κατὰ τριμηνίαν. Ποῖα τὰ κατατεθέντα κεφάλαια ;

644) Ἐπώλησέ τις μίαν οἰκίαν καὶ κατέθεσε τὰ  $\frac{3}{4}$  τῶν χρημάτων, ποὺ ἔλαβεν, εἰς μίαν Τράπεζαν πρὸς 5%. Μετὰ 3 ἔτη ἔλαβε τόκον 40 500 δραχ. Πόσον ἐπώλησε τὴν οἰκίαν;

645) Ἐχασέ τις τὰ  $\frac{4}{5}$  τῶν χρημάτων του. Τὸ ὑπόλοιπον καταθέτει πρὸς 4,5% καὶ λαμβάνει ἐτήσιον τόκον 3 825 δραχ. Πόσα χρήματα εἶχεν;

646) Ἐχει τις καταθέσει εἰς μίαν Τράπεζαν δύο κεφάλαια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα λαμβάνει ἐτήσιον τόκον 26 650 δραχ. Τὸ α' κεφάλαιον εἶναι 250 000 δραχ. καὶ ἔχει κατατεθῆ πρὸς 4%, τὸ δὲ ἄλλο ἔχει κατατεθῆ πρὸς 4,5%. Πόσον ἦτο τὸ β' κεφάλαιον;

### 3. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

§ 305. *Πρόβλημα.* Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει νὰ τοκίσωμεν 150 000 δραχ. πρὸς 4% διὰ νὰ λάβωμεν τόκον 18 000 δραχ.;

*Κατάταξις :*

Αἱ 100 δραχ. εἰς 1 ἔτος φέρουν τόκον 4δραχ.  
 » 150 000 » » χ » » 18 000 »

*Λύσις.* Ἐπειδὴ ὁ χρόνος εἶναι ἀντίστροφος πρὸς τὸ κεφάλαιον καὶ ἀνάλογος πρὸς τὸν τόκον, θὰ εἶναι :

$$X = 1 \text{ ἔτ.} \times \frac{100}{150\,000} \times \frac{18\,000}{4} = \frac{100 \times 18\,000}{150\,000 \times 4} = 3 \text{ ἔτη.}$$

$K = 150\,000 \text{ δραχ.}$ $E = 4\%$ $X = ;$ $T = 18\,000 \text{ δραχ.}$
---

Ὡστε πρέπει νὰ τοκίσωμεν τὰς 150 000 δραχ. ἐπὶ 3 ἔτη.

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν χρόνον, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν τιμῶν τῶν δύο ἄλλων γνωστῶν ποσῶν. Τὸ ἐξαγόμενον ἐκφράζει τότε ἔτη.

§ 306. *Τύπος τοῦ χρόνου.* Ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω κανόνα συνάγομεν ὅτι ὁ τύπος τοῦ χρόνου εἶναι :

$$X = \frac{T \cdot 100}{K \cdot E} \text{ ἔτ.}$$

*Ἐφαρμογή.* Ἐπὶ πόσον χρόνον 240 000 δραχμαὶ τοκιζόμεναι πρὸς 6% φέρουν τόκον 21 600 δραχμάς;

Ἐάν εἰς τὸν τύπον  $X = \frac{T \cdot 100}{K \cdot E}$  θέσωμεν

$T = 21\ 600$ ,  $K = 240\ 000$ ,  $E = 6$ , εὐρίσκομεν :

$$X = \frac{21\ 600 \times 100}{240\ 000 \times 6} = \frac{3}{2} \text{ \%} = 1 \text{ \textepsilon} \text{τος } 6 \text{ \textmu}\eta\text{νες.}$$

Ἔστωτε αἱ 240 000 δραχ. πρέπει νὰ τοκισθοῦν ἐπὶ 1 ἔτος 6 μῆνας.

$K = 240\ 000$  δρ.

$E = 6\%$

$X = ;$

$T = 21\ 600$  δρ.

### Ἀσκήσεις

A' Ὁμάς. Προφορικῶς. 647) Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει νὰ τοκίσωμεν :

1. 40 000 δραχ. πρὸς 4%, διὰ νὰ λάβωμεν τόκον 3 200 δραχ. ;

2. 60 000 » » 5%, » » » » 6 000 δραχ. ;

B' Ὁμάς. Γραπτῶς. 648) Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει νὰ τοκίσωμεν :

1. 190 000 δραχ. πρὸς 5%, διὰ νὰ λάβωμεν τόκον 28 500 δρχ. ;

2. 250 400 » » 5%, » » » » 75 120 δρχ. ;

3. 900 000 » » 4,5% » » » » 128 250 δρχ. ;

649) Εἰς πόσον χρόνον 360 000 δραχ. τοκίζόμεναι πρὸς 4% γίνονται 400 000 δραχ. μὲ τοὺς τόκους των ;

650) Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει νὰ τοκίσωμεν ἓνα κεφάλαιον πρὸς 8 %, διὰ νὰ διπλασιασθῇ ;

651) Ἐπὶ πόσον χρόνον πρέπει νὰ τοκισθῇ ἓνα κεφάλαιον πρὸς 12 %, διὰ νὰ φέρῃ τόκον ἴσον μὲ τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ κεφαλαίου ;

652) Ἐνας γεωργὸς ἐδανείσθη ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν 85 000 δρχ., διὰ νὰ καλλιεργήσῃ τὰ κτήματά του. Τὸ δάνειον ἔγινε πρὸς 6 % καὶ ἐξωφλήθη μὲ 88 400 δραχ. Πόσον χρόνον διήρκεσε τὸ δάνειον τοῦτο ;

### 4. ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

§ 307. Πρόβλημα. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν 480 000 δραχ., διὰ νὰ λάβωμεν 96 000 δραχμᾶς τόκον εἰς 4 ἔτη ;

Κατάταξις :

Αἱ 480 000 δρχ. κεφ. εἰς 4 ἔτη φέρουν 96 000 δρχ. τόκον

» 100 » » » 1 » » Χ » »

*Λύσις.* Ἐπειδὴ ὁ τόκος εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὸ κεφάλαιον καὶ πρὸς τὸν χρόνον, ἔχομεν :

$$\chi = 96\,000 \text{ δραχ.} \times \frac{100}{480\,000} \times \frac{1}{4} = \frac{96\,000 \times 100}{480\,000 \times 4} = 5 \text{ δραχ.}$$

Ἔστωτε τὸ ἐπιτόκιον εἶναι 5%.

$$K = 480\,000 \text{ δρα.}$$

$$E = ;$$

$$X = 4 \text{ ἔτη}$$

$$T = 96\,000 \text{ δρα.}$$

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἐπιτόκιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100, ἂν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἔτη, καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν τιμῶν τῶν δύο ἄλλων γνωστῶν ποσῶν.

§ 308. Τύπος τοῦ ἐπιτοκίου. Ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω κανόνα

συνάγομεν ὅτι ὁ τύπος τοῦ ἐπιτοκίου εἶναι :

$$E = \frac{T \cdot 100}{K \cdot X}$$

Εἶναι προφανές ὅτι εἰς τὸν ἀνωτέρω τύπον πρέπει νὰ θέσωμεν ἀντὶ τοῦ 100 τὸν 1 200, ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς μῆνας καὶ τὸν 36 000, ὅταν ὁ χρόνος ἐκφράζεται εἰς ἡμέρας.

*Ἐφαρμογή.* Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν 360 000 δραχ., διὰ νὰ λάβωμεν τόκον 48 000 δραχ. εἰς 1 ἔτος 8 μῆνας ;

Ἐὰν εἰς τὸν τύπον  $E = \frac{T \cdot 1\,200}{K \cdot X}$  θέσωμεν

$$T = 48\,000, K = 360\,000, X = 1 \text{ ἔτ. } 8 \text{ μῆν.} = 20 \text{ μῆν.},$$

$$\text{εὐρίσκομεν } E = \frac{48\,000 \times 1\,200}{360\,000 \times 20} = 8.$$

Ἔστωτε τὸ ἐπιτόκιον εἶναι 8%.

$$K = 360\,000 \text{ δραχ.}$$

$$E = ;$$

$$X = 1 \text{ ἔτ. } 8 \text{ μ.} = 20 \text{ μ}$$

$$T = 48\,000 \text{ δραχ.}$$

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

A' Ὁ μ ἄ ς. 653 ) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν :

1. 396 000 δραχ., διὰ νὰ λάβωμεν εἰς 2 ἔτη 4 μ. 20 ἡμ. τόκ. 42 570 δρα. ;

2. 537 000 » » » » 2 » » 42 960 δρα. ;

654 ) Ἐνας ἐργάτης ἐδανείσθη 2 560 δραχ. διὰ τὰς ἀνάγκας του. Μετὰ 4 μῆνας ἐπέστρεψε τὰ χρήματα καὶ τὸν τόκον 76,80 δραχ. Πρὸς πόσον % ἔγινε τὸ δάνειον ;

B'. Ὁ μ ἄ ς. 655 ) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν

184 000 δραχ., διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 4 ἔτη καὶ 6 μῆνας 208 840 δραχ. τόκον καὶ κεφάλαιον ;

656 ) Ἐνα κεφάλαιον κατατεθειμένον εἰς τὸ Ταμιευτήριον ηὐξήθη μετὰ 15 μῆνας κατὰ τὸ  $\frac{1}{16}$  τῆς ἀξίας του. Μὲ ποῖον ἐπιτόκιον εἶχε κατατεθῆ ;

657 ) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκισθῆ ἓνα κεφάλαιον διὰ νὰ διπλασιασθῆ μετὰ 20 ἔτη ;

### Διάφορα προβλήματα τόκου.

658 ) Κτηματίας ἐπώλησε 3 500 χλγ. σίτου πρὸς 2,40 δραχ. τὸ χλγ. Τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα ἔλαβεν ἀπὸ τὴν πώλησιν, ἐδάνεισε πρὸς 8 %. Νὰ εὐρεθῆ πόσον τόκον θὰ λαμβάνη κάθε χρόνον ἀπὸ τὰ χρήματα αὐτά.

659 ) Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ καταθέσωμεν εἰς μίαν Τράπεζαν πρὸς 4%, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 3 ἔτη τόσον τόκον, ὅσον φέρουν 360 000 δραχ. εἰς 5 ἔτη καὶ 10 μῆνας πρὸς 3% ;

660 ) Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 750 000 δρχ. τοκίζόμενον πρὸς 4% φέρει τὸν αὐτὸν τόκον, πού φέρουν 250 000 δραχ. εἰς 1 ἔτος καὶ 8 μῆνας πρὸς 6% ;

661 ) Ἐτόκισέ τις 250 000 δραχ. πρὸς 5% καὶ 150 000 δραχ. πρὸς 4,5%. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἔπρεπε νὰ τοκίσῃ τὰς 400 000 δραχ., διὰ νὰ λάβῃ ἐτήσιον τόκον ἴσον μὲ τὰ  $\frac{4}{5}$  τοῦ τόκου, τὸν ὁποῖον θὰ λάβῃ κατὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν ;

662 ) Ἐμπορος λαμβάνει 1 512 δραχ. ἐτήσιον τόκον ἀπὸ ἓνα κεφάλαιον, τὸ ὁποῖον ἔχει δανείσει πρὸς 6%. Μὲ τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ ἀγοράζει 131,25 μέτρα ὑφάσματος. Νὰ εὐρεθῆ πόσον ἠγόρασε τὸ μέτρον τοῦ ὑφάσματος.

663 ) Κτηματίας ἀγοράζει ἓνα κῆπον 1,760 στρεμμάτων πρὸς 2 500 δραχμὰς τὸ στρέμμα. Πληρώνει τὸ ἥμισυ τῆς ἀξίας του τοῖς μετρητοῖς καὶ τὸ ὑπόλοιπον μετὰ 8 μῆνας μὲ τοὺς τόκους πρὸς 4,5%. Πόσον ἐπλήρωσεν ἐν ὄλῳ ;

664 ) Γεωργὸς ἐπώλησε 5 600 χλγ. σίτου πρὸς 2,30 δρχ., τὸ χλγ. Τὰ χρήματα, πού εἰσέπραξεν, ἐδάνεισε πρὸς 9% καὶ μετὰ ἓνα ὠρι-

σμένον χρόνον ἔλαβε τόκους καὶ κεφάλαιον 16 744 δραχ. Νὰ εὐρεθῇ πόσον χρόνον ἔμειναν δανεισμένα τὰ χρήματα.

665 ) Πόσα χιλγ. σίτου πρέπει νὰ πωλήσῃ γεωργός τις πρὸς 2,40 δραχ. τὸ χιλγ., διὰ νὰ λάβῃ ἕνα χρηματικὸν ποσόν, τὸ ὁποῖον κατατιθέμενον εἰς μίαν Τράπεζαν πρὸς 8% νὰ φέρῃ ἐτήσιον τόκον 528 δραχμᾶς ;

666 ) Ἔχει τις μίαν οἰκίαν ἀξίας 250 000 δραχ. Νὰ εὐρεθῇ τί εἶναι προτιμότερον νὰ κάμῃ ὁ ἰδιοκτήτης τῆς : Νὰ τὴν ἐνοικιάσῃ πρὸς 1 800 δραχμᾶς τὸν μῆνα ἢ νὰ τὴν πωλήσῃ καὶ νὰ καταθέσῃ τὰ χρήματα εἰς μίαν Τράπεζαν πρὸς 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub> ;

667 ) Ἦγόρασέ τις ἕνα οἰκόπεδον 360 τ.τ. πῆχ. πρὸς 175 δραχ. τὸν τ.τ. πῆχ. Ἐπὶ τοῦ οἰκοπέδου αὐτοῦ ἔκτισε μίαν οἰκίαν ἀξίας 325 000 δραχ. Πόσον πρέπει νὰ ἐνοικιάσῃ τὴν οἰκίαν μηνιαίως, διὰ νὰ εἰσπράττῃ 6% ἐπὶ τοῦ δαπανηθέντος ποσοῦ ;

#### 5. ΧΡΗΣΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

§ 309. *Πρόβλημα 1ον.* Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ καταθέσωμεν πρὸς 4,5%, διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 3 ἔτη καὶ 4 μῆνας τόκον καὶ κεφάλαιον 1 380 000 δραχ ;

*Λύσις.* Διὰ νὰ λύσωμεν τὰ προβλήματα τοῦ εἴδους αὐτοῦ, πρέπει : 1ον νὰ εὐρωμεν εἰς τί ποσόν θὰ ἀνέλθῃ κεφάλαιον 100 δραχ. τοκίζόμενον ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὄρους· καὶ 2ον τῇ βοηθείᾳ τοῦ ἐξαγομένου αὐτοῦ νὰ εὐρωμεν τὸ ζητούμενον ἀρχικὸν κεφάλαιον.

$K = ;$ $E = 4,5\%$ $X = 40 \text{ μῆν.}$ $T = ;$ $K + T = 1\,380\,000 \text{ δρ.}$
---

Αἰ 100 δραχ. τοκίζόμεναι πρὸς 4,5% φέρουν εἰς 3 ἔτη καὶ 4 μῆνας ἢ εἰς 40 μῆν. τόκον  $\frac{100 \times 4,5 \times 40}{1\,200} = 15$  δραχ. καὶ ἐπομένως γίνονται μετὰ τὸν τόκον τῶν  $100 + 15 = 115$  δραχ.

Ἐπειτα λύομεν τὸ κάτωθι πρόβλημα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν :

Αἰ	115 δραχ.	K + T	προέρχονται	ἀπὸ	100 δραχ.	K
»	1 380 000	»	»	»	»	»
					X	

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ Κεφάλαιον + Τόκος καὶ Κεφάλαιον εἶναι ἀνάλογα, ἔχομεν :

$$\chi = 100 \text{ δραχ.} \times \frac{1\,380\,000}{115} = 1\,200\,000 \text{ δραχ.}$$

\*Ωστε πρέπει να καταθέσωμεν 1 200 000 δραχμάς.

*Σημείωσις.* Τὰ κεφάλαια τὰ ἠνωμένα με τοὺς τόκους των δὲν εἶναι ἀνάλογα πρὸς τὰ ἀρχικὰ κεφάλαια, παρὰ μόνον, ὅταν οἱ προστιθέμενοι τόκοι ἔχουν ὑπολογισθῆ με τὸ αὐτὸ ἐπιτόκιον καὶ διὰ τὸν αὐτὸν χρόνον.

### Ἄσκησεις

668 ) Κατέθεσέ τις ἓνα κεφάλαιον εἰς μίαν Τράπεζαν πρὸς 4% καὶ μετὰ 8 ἔτη ἔλαβε τόκον καὶ κεφάλαιον 105 600 δραχ. Ποῖον κεφάλαιον κατέθεσε καὶ πόσον τόκον ἔλαβεν ;

669 ) Πατήρ ἀποκτήσας κόρην θέλει νὰ καταθέσῃ εἰς μίαν Τράπεζαν ἓνα ποσόν, τὸ ὁποῖον τοκιζόμενον πρὸς 4% νὰ ἀνέλθῃ μετὰ τῶν τόκων του εἰς 45 000 δραχμάς, ὅταν γίνῃ ἡ κόρη του 20 ἐτῶν. Πόσα πρέπει νὰ καταθέσῃ ;

670 ) Ἐπώλησέ τις ἓνα οἰκόπεδον 950 τ.μ. καὶ τὰ χρήματα, πού ἔλαβεν ἐκ τῆς πωλήσεως αὐτοῦ, ἐτόκισε πρὸς 6%. Μετὰ 2 ἔτη 6 μῆνας ἔλαβε τόκον καὶ κεφάλαιον 196 650 δραχ. Πόσον ἐπώλησε τὸ τετρ. μέτρον τοῦ οἰκοπέδου αὐτοῦ ;

§ 310. *Πρόβλημα 2ον.* Ἐτόκισέ τις τὰ  $\frac{3}{4}$  τοῦ κεφαλαίου του πρὸς 5% καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 4% καὶ ἔλαβεν ἐτήσιον τόκον 95 000 δραχμάς. Πόσον ἦτο τὸ κεφάλαιόν του ;

*Λύσις.* Ἐὰν ἐτόκιζε με τοὺς αὐτοὺς ὄρους 400 δραχμάς, τότε ἀπὸ μὲν τὰ  $\frac{3}{4}$  τῶν 400 δραχμῶν, δηλ. ἀπὸ τὰς 300 δραχμάς, θὰ ἐλάμβανε τόκον  $\frac{300 \times 5 \times 1}{100} = 15$  δραχμάς, ἀπὸ δὲ τὰς 100 δραχμάς τόκον 4 δραχμῶν ἤτοι θὰ ἐλάμβανεν τὸ ὅλον 15 δραχ. + 4 δραχ. = 19 δραχ. τόκον.

\*Ἐπειτα σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Διὰ νὰ λάβῃ τόκον 19 δραχ. πρέπει νὰ τοκίσῃ 400 δραχ.

» » » 95 000 » » » χ »

\*Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ τόκος καὶ κεφάλαιον εἶναι ἀνάλογα, ἔχομεν :

$$\chi = 400 \text{ δραχ.} \times \frac{95\,000}{19} = 2\,000\,000 \text{ δραχ.}$$

Πρὸς 5% ἐτόκισε 2 000 000  $\times \frac{3}{4} = 1\,500\,000$  δραχμᾶς καὶ πρὸς 4% ἐτόκισε 500 000 δραχ.

§ 311. *Πρόβλημα 3ον.* Ἐτόκισέ τις τὰ  $\frac{4}{9}$  τοῦ κεφαλαίου του πρὸς 5% καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 3%. Ἀπὸ τὸ α' κεφάλαιον ἔλαβε μετὰ ἓνα ἔτος 54 000 δραχμᾶς περισσότερον τόκον παρὰ ἀπὸ τὸ β' κεφάλαιον. Ποῖον ἦτο τὸ κεφάλαιον ;

*Λύσις.* Ἐὰν τὸ κεφάλαιον ἦτο 900 δραχμαί, τότε ἀπὸ μὲν τὰς 400 δραχμᾶς θὰ ἐλάμβανε τόκον  $\frac{400 \times 5}{100} = 20$  δραχμᾶς, ἀπὸ δὲ τὰς 500 δραχμᾶς θὰ ἐλάμβανε τόκον  $\frac{500 \times 3}{100} = 15$  δραχμᾶς.

Ἡ διαφορὰ τῶν τόκων τῶν δύο αὐτῶν κεφαλαίων εἶναι  
20 δραχ. — 15 δραχ. = 5 δραχ.

Ἐπειτα σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Ὅταν οἱ τόκοι διαφέρουν κατὰ 5 δρχ. τὸ κεφ. εἶναι 900 δραχ.  
» » » » » 54 000 » » » » χ »

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ διαφορὰ τόκων καὶ κεφάλαιον εἶναι ἀνάλογα, ἔχομεν :

$$\chi = 900 \text{ δραχ.} \times \frac{54\,000}{5} = 9\,720\,000 \text{ δραχ.}$$

Τὸ τοκισθὲν κεφάλαιον ἦτο 9 720 000 δραχμαί.

### Ἀσκήσεις

671 ) Ἐτόκισέ τις τὸ  $\frac{1}{3}$  τοῦ κεφαλαίου του πρὸς 5%, τὰ  $\frac{2}{5}$  αὐτοῦ πρὸς 4,5% καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 4%. Μετὰ 2 ἔτη ἔλαβε τόκους ἐκ τῶν τριῶν μερῶν 40 800 δραχ. Νὰ εὑρεθῇ πόσον ἦτο τὸ κεφάλαιον καὶ πόσον κατέθεσε πρὸς ἕκαστον ἐπιτόκιον.

672 ) Ἐτόκισέ τις τὰ  $\frac{3}{4}$  ἑνὸς κεφαλαίου πρὸς 5%, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πρὸς 4,5%. Ἐὰν ἐτόκιζεν ὅλον τὸ κεφάλαιον πρὸς 5%, θὰ ἐλάμβανεν ἐτήσιον τόκον 52 δραχμᾶς περισσότερον. Πόσον ἦτο τὸ τοκισθὲν κεφάλαιον ;

673 ) Τὰ  $\frac{5}{7}$  ἑνὸς κεφαλαίου τοκιζόμενα πρὸς 3% δίδουν ἐτήσιως 420 δραχμᾶς τόκον περισσότερον, ἀπὸ ὅσον δίδει τὸ ὑπόλοιπον τοκιζόμενον πρὸς 4%. Ποῖον ἦτο τὸ κεφάλαιον ;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

### ΥΦΑΙΡΕΣΙΣ

#### 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

§ 312. **Γραμμάτιον.** Εἰς τὸ ἐμπόριον χονδρικῆς πωλήσεως τὰ ἐμπορεύματα δὲν πληρώνονται συνήθως τοῖς μετρητοῖς. Ὁ πωλητὴς δίδει γενικῶς εἰς τὸν ἀγοραστὴν μίαν μικρὰν ἀναβολὴν ἀπὸ 1 μέχρις 6 μηνῶν περίπτου πρὸς ἐξόφλησιν τοῦ χρέους του. Τὸ ἀκόλουθον παράδειγμα θὰ μᾶς δεῖξη πῶς ἐνεργοῦνται συνήθως αἱ πράξεις αὐταί.

*Παράδειγμα.* Ὁ κ. Α. Δημητρίου ἔμπορος χονδρικῆς πωλήσεως πωλεῖ τὴν 15 Σεπτεμβρίου εἰς τὸν κ. Β. Γεωργίου ἔμπορον Τριπόλεως ἐμπορεύματα ἀξίας 3 500 δραχ., μὲ τὴν συμφωνίαν νὰ πληρώσῃ τὴν ἀξίαν των ( χωρὶς ἄλλην ἐπιβάρυνσιν ) μετὰ 3 μῆνας. Ὁ κ. Δημητρίου ζητεῖ καὶ λαμβάνει ἀπὸ τὸν κ. Γεωργίου μίαν **ἔγγραφον ὑπόσχεσιν** ὅτι ὑποχρεοῦται νὰ πληρώσῃ τὴν 15ην Δεκεμβρίου τὰς 3 500 δραχ. Ἡ ἔγγραφος αὐτὴ ὑπόσχεσις ὀνομάζεται **γραμμάτιον εἰς διαταγὴν ἢ ἀπλῶς γραμμάτιον.**

Ὁ συνήθης τύπος τοῦ γραμματίου εἶναι ὁ κάτωθι :

Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Σεπτεμβρίου 1956. Διὰ δραχμὰς 3 500.  
Τὴν 15ην Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. ὑπόσχομαι νὰ πληρώσω εἰς τὸν κ. Α. Δημητρίου ἢ εἰς διαταγὴν αὐτοῦ τὸ ἄνω ποσὸν τῶν τριῶν χιλιάδων πεντακοσίων δραχμῶν, ἀξίαν ληφθεῖσαν εἰς ἐμπορεύματα.

Χαρτόσημον

Β. Γεωργίου ὁδὸς.....

Ὁ κ. Α. Δημητρίου δύναται νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν ὀφειλέτην του κ. Β. Γεωργίου νὰ ὑπογράψῃ ἀντὶ γραμματίου μίαν **συναλλαγματικήν.**

Ἡ συναλλαγματική εἶναι ἓνα ἔγγραφο, διὰ τοῦ ὁποῖου ὁ δανειζὼν χρήματα ἢ δίδων ἐμπορεύματα ἐπὶ πιστώσει διατάσσει τὸν ὀφειλέτην τοῦ νὰ πληρώσῃ εἰς τρίτον πρόσωπον τὸ εἰς τὸ ἔγγραφο αὐτὸ ἀναφερόμενον χρηματικὸν ποσὸν καὶ εἰς ὠρισμένον χρόνον.

Ἡ συναλλαγματική συντάσσεται ὑπὸ τοῦ δανειστοῦ τῆ συγκυταθέσει τοῦ ὀφειλέτου καὶ ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ ὀφειλέτου.

Ὁ τύπος τῆς συναλλαγματικῆς εἶναι :

Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Σεπτεμβρίου 1956. Διὰ δρχ. 3 500  
 Τὴν 15ην Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. πληρώσατε διὰ τῆς παρουσίας συναλλαγματικῆς τῆς διαταγῆς ἐμοῦ τοῦ ἰδίου εἰς . . . . .  
 . . . . .  
 τὸ ποσὸν τῶν τριῶν χιλιάδων πεντακοσίων δραχμῶν, ἀξίαν ληφθεῖσαν εἰς ἐμπορεύματα.

A. Δημητρίου

Πρὸς τὸν κ. Β. Γεωργίου  
 ὁδὸς . . . . .  
 εἰς Τρίπολιν

Δεκτὴ  
 Β. Γεωργίου  
 ὁδὸς . . . . .

Ὁ κ. Δημητρίου δύναται τότε τὸ γραμμάτιον εἰς διαταγὴν ἢ τὴν συναλλαγματικὴν νὰ χρησιμοποιήσῃ ὡς χαρτονόμισμα, διὰ νὰ πληρώσῃ τὰς ἰδικὰς τοῦ ὑποχρεώσεις. Τὴν 15ην Δεκεμβρίου ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος κατέχει αὐτὸ τὸ ἔγγραφο, θὰ τὸ παρουσιάσῃ εἰς τὸν κ. Γεωργίου, ἀπὸ τὸν ὁποῖον θὰ λάβῃ τὰς 3 500 δραχμάς.

**Σημείωσις.** Κατὰ τὴν ὀριζομένην προθεσίαν ὁ ὀφειλέτης ὑποχρεοῦται ὄχι μόνον νὰ ἐπιστρέψῃ τὸ ληφθὲν ποσόν, ἀλλὰ καὶ νὰ πληρώσῃ καὶ τὸν τόκον τῶν χρημάτων, τὰ ὁποῖα ἔλαβεν ὡς δάνειον. Διὰ τοῦτο εἰς τὸ γραμμάτιον ἀναφέρεται ὄχι τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον ἔλαβεν ὡς δάνειον, ἀλλὰ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ πληρώσῃ (δηλ. δάνειον καὶ τόκον).

§ 313. **Ὑφαίρεσις.** Ὁ κ. Δημητρίου ἀντὶ νὰ παραχωρήσῃ τὸ γραμμάτιον ἢ τὴν συναλλαγματικὴν εἰς ἓνα τῶν δανειστῶν του, δύναται νὰ πωλήσῃ αὐτὸ εἰς μίαν Τράπεζαν πρὸ τῆς 15ης Δεκεμβρίου. Πρὸς τοῦτο ὑπογράφει ὀπισθεν τοῦ ἔγγραφου αὐτοῦ (**ὀπισθογρά-**

φησις) και οὕτω μεταβιβάζει τὰ δικαιώματά του εἰς τὴν Τράπεζαν. Ἡ πράξις αὕτη λέγεται **προεξόφλησις** τοῦ γραμματίου.

Ἡ Τράπεζα, ἡ ὁποία θὰ ἀναλάβῃ νὰ προεξοφλήσῃ τὸ γραμματίον, δὲν θὰ δώσῃ εἰς τὸν κ. Δημητρίου τὸ ποσὸν τῶν 3 500 δραχ., ποῦ ἀναγράφει τὸ γραμματίον, ἀλλὰ θὰ κρατήσῃ ἐξ αὐτοῦ ἓνα ποσὸν ἴσον πρὸς τὸν τόκον τῶν 3 500 δραχ. εἰς 3 μῆνας π.χ. ἂν ἡ προεξόφλησις γίνῃ 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου, πρὸς συμπεφωνημένον ἐπιτόκιον, ἔστω 12 %. Ὑπολογίζοντες τὸν τόκον τῶν 3 500 δραχ. εἰς 3 μῆνας πρὸς 12%, εὐρίσκομεν ὅτι ἡ Τράπεζα θὰ κρατήσῃ 105 δραχ. καὶ θὰ δώσῃ :

$$3\ 500 \text{ δραχ.} - 105 \text{ δραχ.} = 3\ 395 \text{ δραχ.}$$

Τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον ἀναγράφεται εἰς τὸ γραμματίον (3 500 δραχ.), εἶναι ἡ **ὀνομαστικὴ ἀξία (Ο.Α.)** τοῦ γραμματίου.

Τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον δίδει ἡ Τράπεζα (3 395 δραχ.), εἶναι ἡ **παροῦσα ἢ πραγματικὴ ἀξία (Π.Α.)** τοῦ γραμματίου, τὸ δὲ ποσόν, τὸ ὁποῖον κρατεῖ ἡ Τράπεζα (105 δραχ.), εἶναι ἡ **ὑφαίρεσις (Υ)**. Ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποῖαν εἶναι πληρωτέον τὸ γραμματίον, εἶναι ἡ **λήξις** τοῦ γραμματίου.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Ἐφαίρεσις εἶναι ἡ ἔκπτωσις, τὴν ὁποῖαν ὑφίσταται ἓνα χρέος, ὅταν τοῦτο πληρῶνῃται πρὸ τῆς λήξεώς του.

§ 314. Εἶδη ὑφαίρεσεων. Ἐπειδὴ δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν ὑφαίρεσιν ἑνὸς γραμματίου ἐπὶ τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας του ἢ ἐπὶ τῆς πραγματικῆς ἀξίας του, διὰ τοῦτο διακρίνομεν δύο εἶδη ὑφαίρεσεως : τὴν **ἐξωτερικὴν** καὶ τὴν **ἐσωτερικὴν**.

## 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΦΑΙΡΕΣΙΣ

§ 315. Ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις. Ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις ἢ ἐμπορικὴ ὑφαίρεσις εἶναι ὁ τόκος τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας ἑνὸς γραμματίου εἰς χρόνον λογιζόμενον ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς προεξοφλήσεως μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου.

Τὸ ἐπιτόκιον, βάσει τοῦ ὁποῖου γίνεται ἡ προεξόφλησις, ὀρίζεται δι' ἰδιαιτέρας συμφωνίας μεταξὺ τοῦ παραδίδοντος καὶ τοῦ προεξοφλοῦντος τὸ γραμματίον.

Αἱ μεγάλαι Τράπεζαι κάμνουν τὰς προεξοφλήσεις μὲ τὸ νόμιμον

προεξοφλητικὸν ἐπιτόκιον. Τοῦτο εἶναι 12% διὰ τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ διὰ τὰς ἄλλας Τραπεζάς.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι τὰ προβλήματα τῆς ἐξωτερικῆς ὑφαίρεσεως ἀνάγονται εἰς τὰ προβλήματα τοῦ τόκου.

**§ 316.** Εὐρέσεις ἐξωτερικῆς ὑφαίρεσεως. *Πρόβλημα.* Γραμματίον 3 600 δραχ. προεξοφλεῖται 5 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 9%. Πόση εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις καὶ πόση ἡ πραγματικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου ;

*Λύσις.* Ἡ ζητουμένη ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις εἶναι ὁ τόκος τῶν 3 600 δραχ. εἰς 5 μῆνας πρὸς 9% ἦτοι :

$$\text{Ἐξωτ. ὑφ.} = T = \frac{3\,600 \times 5 \times 9}{1\,200} = 135 \text{ δραχ.}$$

Ἡ πραγματικὴ ἀξία =  
ὄνομαστ. ἀξία—ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις =  
3 600 — 135 = 3 465 δραχμαί.

Ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις	
K = Ὀν.ἀξ. =	3 600 δρ.
E =	9%
X =	5 μῆν.
T = ἐξ.ὑφ. =	
K—T = Π.Α. =	

**§ 317.** Εὐρέσεις τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας. *Πρόβλημα 1ον.* Ποία ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου, τὸ ὁποῖον προεξοφληθὲν 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 6% εἶχεν ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν 36 δραχμάς ;

$$\text{Ἐπειδὴ Ὀν. ἀξ.} = K = \frac{T \cdot 1\,200}{E \cdot X}, \text{ ἔχομεν :}$$

$$\text{Ὀνομ. ἀξ.} = \frac{36 \times 1\,200}{6 \times 3} = 2\,400 \text{ δραχμαί.}$$

Ὡστε ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου εἶναι 2 400 δραχ.

*Πρόβλημα 2ον.* Ἐνα γραμματίον προεξοφλήθη 75 ἡμέρας πρὸ τῆς λήξεως πρὸς 12% ἀντὶ 1 755 δρχ. Ποία ἦτο ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου ;

*Λύσις.* Εὐρίσκομεν πρῶτον τὴν ἐξωτ. ὑφαίρεσιν γραμματίου ὀνομ. ἀξίας 100 δραχ. εἰς 75 ἡμ. πρὸς 12%.

$$\text{Ἐπειδὴ ἐξ. ὑφ.} = T = \frac{K \cdot E \cdot X}{36\,000}, \text{ ἔχομεν :}$$

$$\text{ἐξωτερ. ὑφαίρ.} = \frac{100 \times 12 \times 75}{36\,000} = 2,5 \text{ δραχ.}$$

Οὕτω γραμματίον 100 δραχ. ὀνομ. ἀξίας προεξοφλούμενον 75 ἡμέρας πρὸ τῆς λήξεώς του ἔχει ὑφαίρεσιν 2,5

Ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις	
K = Ὀν.ἀξ. =	
E =	12%
X =	75 ἡμ.
T = ἐξ.ὑφ. =	
K—T = Π.Α. =	1 755 δρ

δραχμῶν καὶ ἐπομένως πραγματικὴν ἀξίαν 100 δραχ. — 2,5 δραχ. = 97,5 δραχ. Ἐπειτα ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Αἰ 97,5 δρχ. πραγμ. ἀξ. προέρχ. ἀπὸ γραμμ. 100 δρχ. ὀν. ἀξ.  
 » 1755 » » » » » » Χ » » »

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, θὰ εἶναι :

$$Χ = 100 \text{ δραχ.} \times \frac{1755}{97,5} = 1800 \text{ δραχ.}$$

Ὡστε ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου ἦτο 1800 δραχ.

§ 318. Εὗρεσις τοῦ ἐπιτοκίου. *Πρόβλημα.* Ἐπὶ ἑνὸς γραμματίου 1200 δραχμῶν, πληρωτέου μετὰ 5 μῆνας, μία Τράπεζα ἐκράτησε 45 δραχμὰς ὡς ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν. Νὰ εὑρεθῇ πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἔγινεν ἡ προεξόφλησις.

*Λύσις.* Τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἀνάγεται εἰς τὴν περίπτωσιν ἐκείνην, κατὰ τὴν ὁποίαν ζητοῦμεν πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν 1200 δρχ. διὰ νὰ λάβωμεν μετὰ 5 μῆνας 45 δραχ. τόκον.

Ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις	
K = ὀν. ἀξ. = 1200 δρ.	
E =	=;
X =	= 5 μῆν.
T = ἐξ. ὑφ. = 45 δρ.	

Ἐπειδὴ  $E = \frac{T \cdot 1200}{K \cdot X}$ , ἔπεται ὅτι  $E = \frac{45 \times 1200}{1200 \times 5} = 9$ .

Ὡστε ἡ προεξόφλησις ἔγινε πρὸς 9 %.

§ 319. Εὗρεσις τοῦ χρόνου τῆς λήξεως. *Πρόβλημα.* Γραμμάτιον 16000 δραχ. προεξοφληθὲν πρὸς 9% εἶχεν ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν 480 δραχ. Πρὸ πόσου χρόνου ἔγινεν ἡ προεξόφλησις ;

*Λύσις.* Τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἀνάγεται εἰς τὴν περίπτωσιν ἐκείνην, κατὰ τὴν ὁποίαν ζητοῦμεν τὸν χρόνον, κατὰ τὸν ὁποῖον ἕνα κεφάλαιον 16000 δραχ. τοκίζομενον πρὸς 9% δίδει τόκον 480 δραχ.

Ἐπειδὴ  $X = \frac{T \cdot 100}{K \cdot E}$ , θὰ εἶναι  $X = \frac{480 \times 100}{16000 \times 9} = \frac{1}{3}$  ἔτ. = 4 μῆνας.

Ὡστε ἡ προεξόφλησις ἔγινε πρὸ 4 μηνῶν.

#### Ἀσκήσεις

674) Γραμμάτιον 2400 δραχμῶν προεξοφλεῖται 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεως του πρὸς 9%. Πόση εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις καὶ πόση ἡ παροῦσα ἀξία τοῦ γραμματίου ;

675 ) Ένα γραμμάτιον ἦτο πληρωτέον τὴν 10ην Αὐγούστου καὶ προεξωφλήθη τὴν 20ὴν Ἰουνίου πρὸς 6 %. Ποία ἦτο ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου, ἐὰν ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις ἦτο 150 δραχ. ;

676 ) Γραμμάτιον προεξωφλήθη 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του ἀντὶ 17 595 δραχ. πρὸς 9 %. Ποία ἦτο ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου ;

677 ) Γραμμάτιον 17 200 δραχ. προεξωφλήθη 36 ἡμέρας πρὸ τῆς λήξεώς του με ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν 137,60 δραχ. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἔγινεν ἡ προεξόφλησις ;

678 ) Γραμμάτιον 2 400 δραχ. προεξωφλήθη 5 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του ἀντὶ 2 300 δραχ. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἔγινεν ἡ προεξόφλησις ;

679 ) Γραμμάτιον 1 800 δραχ. προεξωφλήθη πρὸς 6% εἶχεν ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν 27 δραχ. Πρὸ πόσου χρόνου ἔγινεν ἡ προεξόφλησις ;

680 ) Γραμμάτιον 12 000 δραχ. προεξωφλήθη πρὸς 5 % ἀντὶ 11 865 δραχ. Ἐὰν ἡ προεξόφλησις ἔγινε τὴν 1ην Αὐγούστου, πότε ἔληγε τὸ γραμμάτιον ;

681 ) Ἐνας ἔμπορος εἶχεν εἰς διαταγὴν τοῦ ἑνα γραμμάτιον, τὸ ὁποῖον ἔληγε τὴν 20ὴν Μαρτίου 1949. Τὴν 20ὴν Ἰανουαρίου 1949 τὸ μετεβίβασεν εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ἀντὶ 7 350 δραχμῶν. Ὑπελογίσθη δὲ ἡ ὑφαίρεσις αὐτοῦ πρὸς 12 %. Νὰ εὑρεθῇ ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία αὐτοῦ τοῦ γραμματίου.

### 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΦΑΙΡΕΣΙΣ

§ 320. Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις. Οἱ προεξοφλοῦντες γραμμάτια με ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν ὑπολογίζουν τὴν ὑφαίρεσιν (τόκον), τὴν ὁποῖαν θὰ κρατήσουν, ἐπὶ τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τοῦ γραμματίου καὶ οὐχὶ ἐπὶ τοῦ ποσοῦ, τὸ ὁποῖον διαθέτουν πρὸς ἐξόφλησιν τοῦ γραμματίου, δηλ. ἐπὶ τῆς πραγματικῆς ἀξίας αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἄδικος.

Διὰ νὰ μὴ συμβαίνει αὐτὴ ἡ ἀδικία, πρέπει ἡ Τράπεζα νὰ κερδίζει τὸν τόκον μόνον τῶν χρημάτων, τὰ ὁποῖα δίδει, διὰ νὰ ἀγοράσῃ τὸ γραμμάτιον. Αὐτὸς ὁ τόκος λέγεται **ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις**. Ὡστε :

Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις εἶναι ὁ τόκος τῆς πραγματικῆς

ἀξίας τοῦ γραμματίου εἰς ὠρισμένον χρόνον, λογιζόμενον ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς προεξοφλήσεως μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου πρὸς ὠρισμένον ἐπιτόκιον.

Κατὰ ταῦτα ἡ πραγματικὴ ἀξία ἐνὸς γραμματίου προεξοφληθέντος μὲ ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν εἶναι ἀξία, ἡ ὁποία αὐξανομένη κατὰ τὸν τόκον, τὸν ὁποῖον αὐτὴ θὰ ἔδιδε μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου πρὸς ὠρισμένον ἐπιτόκιον, θὰ ἰσοῦτο μὲ τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν. \*Ἦτοι εἶναι :

$$\text{*Ὀνομαστικὴ ἀξία} = \text{πραγματικὴ ἀξία} + \text{ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις}$$

§ 321. Εὕρεσις τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαιρέσεως. *Πρόβλημα 1ον.* Γραμμάτιον προεξοφλεῖται 5 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 12 % ἀντὶ 1 700 δραχμῶν. Ποία εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις καὶ ποία ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία του ;

*Λύσις.* Ἡ ζητούμενη ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις εἶναι ὁ τόκος τῆς πραγματικῆς ἀξίας 1 700 δραχ. εἰς 5 μῆνας πρὸς 12 %.

$$\text{*Ἐπειδὴ ἔσ. ὑφ.} = T = \frac{K \cdot E \cdot X}{1200}, \text{ ἔχομεν :}$$

$$\text{ἔσωτ. ὑφ.} = \frac{1700 \times 12 \times 5}{1200} = 85 \text{ δραχ.}$$

Ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου εἶναι  $1700 + 85 = 1785$  δραχμαί.

*Πρόβλημα 2ον.* Γραμμάτιον 2 472 δραχμῶν προεξοφλεῖται 4 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 9%. Ποία εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις του καὶ ποία ἡ πραγματικὴ ἀξία του ;

*Λύσις.* Εὐρίσκομεν πρῶτον τὴν ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν γραμματίου πραγματικῆς ἀξίας 100 δραχμῶν πρὸς 9 % εἰς 4 μῆνας.

$$\text{*Ἐπειδὴ ἔσ. ὑφ.} = T = \frac{K \cdot E \cdot X}{1200}, \text{ θὰ εἶναι :}$$

$$\text{ἔσ. ὑφ.} = \frac{100 \times 9 \times 4}{1200} = 3 \text{ δραχ.}$$

Οὕτω γραμμάτιον πραγματικῆς ἀξίας 100 δραχ. ἔχει ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν 3 δραχ. καὶ ἐπομένως ὀνομαστικὴν ἀξίαν

$$100 \text{ δραχ.} + 3 \text{ δραχ.} = 103 \text{ δραχ.}$$

\*Ἐπειτα σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

\*Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις

$$K = \text{πρ. ἀξ.} = 1700 \text{ δρ.}$$

$$E = 12\%$$

$$X = 5 \text{ μῆν.}$$

$$T = \text{ἔσ. ὑφ.} = ;$$

$$K + T = \text{ὀν. ἀξ.} = ;$$

\*Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις

$$K = \text{πρ. ἀξ.} = ;$$

$$E = 9\%$$

$$X = 4 \text{ μῆν.}$$

$$T = \text{ἔσ. ὑφ.} = ;$$

$$K + T = \text{ὀν. ἀξ.} = 2472 \text{ δρ.}$$

Ἄν τὸ γρ. εἶχεν ὄν. ἀξ. 103 δραχ. θὰ εἶχεν ἐσωτερ. ὑφ. 3 δραχ.  
 » » » » » 2 472 » » » » » χ »

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, θὰ εἶναι :

$$\chi = 3 \text{ δραχ.} \times \frac{2472}{103} = 72 \text{ δραχμαί.}$$

Ὡστε ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις τοῦ γραμματίου εἶναι 72 δραχ.

Ἐπομένως ἡ πραγματικὴ ἀξία του θὰ εἶναι :

$$2\,472 \text{ δραχ.} - 72 \text{ δραχ.} = 2\,400 \text{ δραχ.}$$

*Συμπέρασμα.* Ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρόβλημα βλέπομεν ὅτι, διὰ νὰ εὐρῶμεν τὴν ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν, ἐργαζόμεθα ὡς ἑξῆς :

Εὐρίσκομεν πρῶτον τὸν τόκον τῶν 100 δραχ. ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς προεξοφλήσεως ἕως τὴν ἡμέραν τῆς λήξεως. Μετὸν τόκον τοῦτον πολλαπλασιάζομεν τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν, τὸ δὲ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀθροίσματος τοῦ 100 καὶ τοῦ τόκου τῶν 100 δραχμῶν, τὸν ὁποῖον εὐρομεν.

§ 322. Εὐρεσις τοῦ χρόνου τῆς λήξεως. *Πρόβλημα.* Γραμμάτιον 4 980 δραχ. προεξοφλεῖται μετὰ ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν πρὸς 9 % ἀντὶ 4 800 δραχ. Πόσον χρόνον πρὸ τῆς λήξεώς του ἔγινεν ἡ προεξόφλησις ;

*Λύσις.* Τὸ πρόβλημα ἀνάγεται εἰς τὴν περίπτωσιν ἐκείνην, κατὰ τὴν ὁποῖαν ζητοῦμεν εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 4 800 δραχ. (πραγματικὴ ἀξία) τοκίζομενον πρὸς 9 % φέρει τόκον 4 980 δραχ. — 4 800 δραχ. = 180 δραχ. (ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν).

Ἐπειδὴ  $X = \frac{T \cdot 100}{K \cdot E}$ , θὰ εἶναι :

$$X = \frac{180 \times 100}{4800 \times 9} = \frac{5}{12} \text{ ἔτους} = 5 \text{ μῆνες.}$$

Ὡστε ἡ προεξόφλησις ἔγινε πρὸς 5 μηνῶν.

Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις	
K = πρ. ἀξ. =	4 800 δραχ.
E =	9%
X =	=;
T =	=;
K + T = ὄν. ἀξ. =	4 980 δραχ.

§ 323. Εὐρεσις τοῦ ἐπιτοκίου. *Πρόβλημα.* Γραμμάτιον 3 640 δραχμῶν, τὸ ὁποῖον ἔληγε τὴν 15ην Μαΐου ἐ.ἔ., προεξοφλήθη μετὰ ἐσωτερικὴν ὑφαίρεσιν τὴν 15ην Ἰανουαρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἀντὶ 3 500 δραχμῶν. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἔγινεν ἡ προεξόφλησις ;

Λύσις. Τὸ πρόβλημα ἀνάγεται εἰς τὴν περίπτωσιν ἐκείνην, κατὰ τὴν ὁποίαν ζητεῖται, πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσωμεν 3 500 δραχ. (πραγματικὴ ἀξία), διὰ νὰ λάβωμεν τόκον (ἔσωτερικὴν ὑφαίρεσιν) 3 640 δραχ. — 3 500 δραχ. = 140 δραχ. εἰς 4 μῆν. (ἀπὸ 15 Ἰανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου).

Ἐπειδὴ  $E = \frac{T \cdot 1200}{K \cdot X}$ , θὰ εἶναι :

$$E = \frac{140 \times 1200}{3500 \times 4} = 12.$$

Ὡστε ἡ προεξόφλησις ἔγινε πρὸς 12%.

Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις	
K = πρ. ἀξ. =	3 500 δρ.
E	=;
X	= 4 μῆν.
T = ἔσ. ὑφ. =	
K + T = ὀν. ἀξ. =	3640 δρ.

### Ἀσκήσεις

682) Γραμμάτιον προεξοφλεῖται 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 9 % ἀντὶ 12 400 δραχμῶν. Πόση εἶναι ἡ ἔσωτερ. ὑφαίρεσις καὶ πόση ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία του ;

683) Γραμμάτιον πληρωτέον τὴν 15ην Ἰουλίου προεξωφλήθη τὴν 20ην Ἀπριλίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους πρὸς 12 % ἀντὶ 4 800 δραχμῶν. Πόση ἦτο ἡ ἔσωτερ. ὑφαίρεσις καὶ πόση ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία του ;

684) Γραμμάτιον 4 944 δραχμῶν προεξοφλεῖται ἔσωτερικῶς πρὸς 9 % ἀντὶ 4 800 δραχμῶν. Πόσον χρόνον πρὸ τῆς λήξεώς του ἔγινεν ἡ προεξόφλησις ;

685) Γραμμάτιον 1 218 δραχμῶν πληρωτέον τὴν 20ην Αὐγούστου προεξωφλήθη ἔσωτερικῶς ἀντὶ 1 200 δραχμῶν πρὸς 6 %. Πότε ἔγινεν ἡ προεξόφλησις ;

686) Γραμμάτιον 3 735 δραχμῶν προεξωφλήθη ἔσωτερικῶς 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του ἀντὶ 3 600 δραχμῶν. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἔγινεν ἡ προεξόφλησις ;

§ 324. Κοινὴ λήξις γραμματίων. Ἐνίοτε ὀφείλει τις εἰς τὸ αὐτὸ πρόσωπον δύο ἢ περισσότερα γραμμάτια, τὰ ὁποῖα λήγουν εἰς διαφόρους χρόνους καὶ θέλει πρὸς εὐκολίαν του νὰ ἀντικαταστήσῃ αὐτὰ μὲ ἓνα μόνον γραμμάτιον καὶ τοιοῦτον, ὥστε ἡ παροῦσα ἀξία τοῦ νέου γραμματίου νὰ εἶναι ἴση μὲ τὴν παροῦσαν ἀξίαν τῶν γραμματίων, πού θέλει νὰ ἀντικαταστήσῃ. Ἡ τοιαύτη ἀντικατάστασις λέγεται **κοινὴ λήξις** τῶν γραμματίων.

Εἰς τὴν κοινὴν λήξιν τῶν γραμματίων διακρίνομεν δύο εἶδη προβλημάτων :

1ον. Τὰ προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα δίδεται ὁ χρόνος τῆς λήξεως τοῦ νέου γραμματίου καὶ ζητεῖται ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία αὐτοῦ.

2ον. Τὰ προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα δίδεται ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ νέου γραμματίου καὶ ζητεῖται ὁ χρόνος τῆς λήξεως αὐτοῦ.

§ 325. *Πρόβλημα 1ον.* "Ένας ἔμπορος ὀφείλει εἰς τὸ αὐτὸ πρόσωπον δύο γραμμάτια, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἓνα ἐκ δραχμῶν 3 600 λήγει μετὰ 45 ἡμέρας, τὸ δὲ ἄλλο ἐκ δραχμῶν 4 750, λήγει μετὰ 4 μῆνας. Θέλει δὲ νὰ ἀντικαταστήσῃ αὐτὰ μὲ ἓνα μόνον νέον γραμμάτιον, τὸ ὁποῖον νὰ λήγῃ μετὰ 50 ἡμέρας. Πόση θὰ εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ νέου αὐτοῦ γραμματίου, ἐὰν τὸ ἐπιτόκιον εἶναι 6 % ;

*Λύσις.* Ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις τοῦ πρώτου γραμματίου εἶναι :

$$\frac{3\ 600 \times 45 \times 6}{36\ 000} = 27 \text{ δραχ.}$$

Ἄρα ἡ παροῦσα ἀξία του εἶναι  $3\ 600 - 27 = 3\ 573$  δραχ.

Ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις τοῦ δευτέρου γραμματίου εἶναι :

$$\frac{4\ 750 \times 4 \times 6}{1\ 200} = 95 \text{ δραχ.}$$

Ἄρα ἡ παροῦσα ἀξία του εἶναι  $4\ 750 - 95 = 4\ 655$  δραχ.

Ἡ παροῦσα ἀξία καὶ τῶν δύο μαζί γραμματίων εἶναι :

$$3\ 573 + 4\ 655 = 8\ 228 \text{ δραχ.}$$

Ἡ παροῦσα λοιπὸν ἀξία τοῦ νέου γραμματίου πρέπει νὰ εἶναι 8 228 δραχ. Τώρα ἔχομεν νὰ λύσωμεν τὸ κάτωθι πρόβλημα :

**Ποία εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία γραμματίου, τὸ ὁποῖον προεξοφλεῖται 50 ἡμέρας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 6 % ἀντὶ 8 228 δραχ. ;**

Λύοντες τὸ πρόβλημα αὐτό, ὅπως ἐλύσαμεν τὸ πρόβλημα 2ον τῆς § 317, εὐρίσκομεν ὅτι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ νέου γραμματίου εἶναι 8 297 δραχμαί.

*Πρόβλημα 2ον.* "Ένας ἔμπορος ὀφείλει εἰς τὸ αὐτὸ πρόσωπον δύο γραμμάτια, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἓνα ἐκ δραχμῶν 3 000 λήγει μετὰ 4 μῆνας, τὸ δὲ ἄλλο ἐκ δραχ. 5 000 λήγει μετὰ 6 μῆνας. Θέλει δὲ νὰ ἀντικαταστήσῃ αὐτὰ μὲ ἓνα μό-

νον νέον γραμμάτιον ὀνομαστικῆς ἀξίας 8 000 δραχ. πρὸς 6 % .  
 Μετὰ πόσον χρόνον θὰ λήγη τὸ νέον αὐτὸ γραμμάτιον ;

Λύσις. Κατὰ τὰ γνωστὰ εὐρίσκομεν ὅτι ἡ παροῦσα ἀξία τοῦ πρώτου γραμματίου εἶναι 2 940 δραχ., τοῦ δὲ δευτέρου εἶναι 4 850 δραχ. καὶ τῶν δύο μαζί εἶναι 7 790 δραχ.

Τώρα ἔχομεν νὰ λύσωμεν τὸ κάτωθι πρόβλημα :

Μετὰ πόσον χρόνον λήγει γραμμάτιον ὀνομαστικῆς ἀξίας 8 000 δραχμῶν, τὸ ὁποῖον προεξοφλεῖται σήμερον πρὸς 6 % ἀντὶ 7 790 δραχμῶν ;

Λύοντες τὸ πρόβλημα αὐτὸ κατὰ τὰ γνωστὰ εὐρίσκομεν ὅτι τὸ νέον γραμμάτιον θὰ λήγη μετὰ 5 μῆνας καὶ 7 ἡμέρας.

#### Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

687 ) Ὅφειλει τις τρία γραμμάτια : Τὸ πρῶτον ἐκ δραχ. 6 000 πληρωτέον μετὰ 30 ἡμέρας, τὸ δεύτερον ἐκ δραχμῶν 900 πληρωτέον μετὰ 60 ἡμέρ. καὶ τὸ τρίτον ἐκ δραχμῶν 1 000 πληρωτέον μετὰ 90 ἡμέρ. Ποία θὰ εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία ἑνὸς νέου γραμματίου, τὸ ὁποῖον θὰ ἀντικαταστήσῃ τὰ τρία ἀνωτέρω γραμμάτια, πληρωτέου μετὰ 60 ἡμέρας πρὸς 6 % ;

688 ) Ἐχομεν τέσσαρα γραμμάτια : Τὸ πρῶτον 2 000 δραχ. πληρωτέον μετὰ 10 ἡμ., τὸ δεύτερον 1 500 δραχ. πληρωτέον μετὰ 20 ἡμ. τὸ τρίτον 1 800 δραχ. πληρωτέον μετὰ 35 ἡμέρ. καὶ τὸ τέταρτον 2 400 δραχ. πληρωτέον μετὰ 60 ἡμέρ. Θέλομεν νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὰ τέσσαρα αὐτὰ γραμμάτια δι' ἑνὸς γραμματίου 7 700 δραχ. Νὰ προσδιορισθῇ ὁ χρόνος τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου αὐτοῦ, ἐὰν τὸ ἐπιτόκιον εἶναι 6 %.

#### Διάφορα προβλήματα ὑφαιρέσεως.

689 ) Ἐμπορος ἠγόρασε ζάχαριν ἀντὶ 8 600 δραχμῶν, τὰς ὁποίας ἔπρεπε νὰ πληρώσῃ μετὰ 1 ἔτος. Ἄν πληρώσῃ σήμερον, τοῦ γίνεται ἔκπτωσης 4 % . Ποία εἶναι ἡ ἔκπτωσης ( ἔξωτερικὴ ὑφαίρεσις ) καὶ πόσα θὰ πληρώσῃ ;

690 ) Ἐργοστασιάρχης ἀποστέλλει εἰς ἓνα ἔμπορον 165 μέτρα ὑφάσματος πρὸς 24,60 δραχ. τὸ μέτρον μὲ πίστωσιν 15 μηνῶν. Ὅ

ἔμπορος ὅμως πληρώνει ἀμέσως καὶ δι' αὐτὸ τοῦ γίνεται ἔκπτωσης ( ἔξωτερικὴ ὑφαίρεσις ) 5 %. Πόση εἶναι ἡ ἔκπτωσης καὶ πόσα θὰ πληρώση ;

691 ) Ἐνα γραμμάτιόν μας 16 000 δραχμῶν εἶναι πληρωτέον μετὰ 15 μῆνας. Ἄντ' αὐτοῦ λαμβάνομεν ἓνα ἄλλο γραμμάτιον 15 200 δραχμῶν, τὸ ὁποῖον εἶναι πληρωτέον μετὰ 6 μῆνας. Νὰ εὔρεθῇ ἂν ἐκερδίσαμεν ἢ ἐχάσαμεν ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴν αὐτὴν, ἂν ἡ ἔξωτερικὴ ὑφαίρεσις γίνεται πρὸς 6 %.

692 ) Ἐπλήρωσέ τις 5 700 δραχμὰς ἀντὶ ἐνὸς ποσοῦ, τὸ ὁποῖον ὤφειλε νὰ πληρώσῃ μετὰ 15 μῆνας. Νὰ εὔρεθῇ ποῖον χρηματικὸν ποσὸν ἐχρεώσται, ἂν γνωρίζωμεν ὅτι ἡ ἔκπτωσης ὑπελογίσθη πρὸς 4 %.

693 ) Γεωργὸς ἠγόρασεν ἀπὸ ἔμπορον ἐμπορεύματα ἀξίας 2 480 δραχμῶν, τὰ ὁποῖα ὀφείλει νὰ πληρώσῃ μετὰ 8 μῆνας. Ἄλλὰ 5 μῆνας μετὰ τὴν ἀγορὰν θέλει νὰ πληρώσῃ τὸ ὀφειλόμενον ποσὸν μὲ ἔκπτωσιν 6 %. Πόσα θὰ πληρώσῃ ;

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε'

ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΑ. ΑΝΑΜΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ

§ 326. Ἀριθμοὶ ἀνάλογοι ἄλλων. Ἐστῶσαν οἱ ἀριθμοὶ :

$$3, \quad 4, \quad 7$$

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν αὐτοὺς ἐπὶ τυχόντα ἀριθμὸν, π.χ. τὸν 5, προκύπτουν ἀντιστοίχως οἱ ἀριθμοὶ :

$$15, \quad 20, \quad 35.$$

Οἱ ἀριθμοὶ 15, 20, 35 λέγονται **ἀνάλογοι** πρὸς τοὺς 3, 4, 7.

*Ἀντιστρόφως* : Οἱ ἀριθμοὶ 3, 4, 7 λέγονται ἀνάλογοι πρὸς τοὺς 15, 20, 35, διότι γίνονται ἀπὸ αὐτοὺς διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ αὐτῶν ἐπὶ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν  $\frac{1}{5}$ . Πράγματι ἔχομεν :

$$15 \times \frac{1}{5} = 3, \quad 20 \times \frac{1}{5} = 4, \quad 35 \times \frac{1}{5} = 7.$$

Ἔστω :

Δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ λέγονται **ἀνάλογοι** πρὸς ἄλλους ἰσοπληθεῖς, ἐὰν γίνωνται ἀπὸ αὐτοὺς διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς :

Ὁ 15 γίνεται ἀπὸ τὸν 3 διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ 5· ἀλλὰ καὶ ὁ 3 γίνεται ἀπὸ τὸν 15 διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ  $\frac{1}{5}$ . Οἱ δύο οὗτοι ἀριθμοὶ λέγονται **ὁμόλογοι** ἀριθμοί. Ὀμοίως οἱ 4 καὶ 20 εἶναι ὁμόλογοι, ἐπίσης ὁ 7 καὶ 35.

Ἐπίσης παρατηροῦμεν ὅτι :  $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$ ,  $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ ,  $\frac{7}{35} = \frac{1}{5}$ .

Ἀπὸ αὐτὰς δὲ προκύπτουν αἱ ἰσότητες :

$$15 = 3 \times 5 \quad 20 = 4 \times 5 \quad 35 = 7 \times 5.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

α') Ἄν μερικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς ἄλλους, ὁ λόγος τῶν ὁμολόγων ἀριθμῶν εἶναι δι' ὅλους ὁ αὐτός.



Κατάταξις :	α ) 3
Μεριστέος 180 000	β ) 5
	γ ) 7
	ἄθροισμα $\overline{15}$

Κανών : Ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συνάγομεν τὸν κάτωθι κανόνα :

Διὰ νὰ μερίσωμεν ἀριθμὸν εἰς μέρη ἀνάλογα ἄλλων δοθέντων ἀριθμῶν, πολλαπλασιάζομεν τὸν μεριστέον ἀριθμὸν ἐπὶ ἕκαστον τῶν δοθέντων ἀριθμῶν καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἄθροισματος αὐτῶν.

§ 329. Παρατηρήσεις : Ἐάν θέλωμεν νὰ μερίσωμεν τὸν ἀριθμὸν 180 000 εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς  $3 \times 4$ ,  $5 \times 4$ ,  $7 \times 4$ , δηλ. πρὸς τοὺς 12, 20, 28 καὶ ἐφαρμόσωμεν τὸν προηγούμενον κανόνα, θὰ εὐρωμεν τὰ αὐτὰ ἐξαγόμενα. Πράγματι εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{τὸ α' μέρος εἶναι } \frac{180\,000 \times 12}{60} = \frac{180\,000 \times 3}{15} = 36\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\text{τὸ β' μέρος εἶναι } \frac{180\,000 \times 20}{60} = 60\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\text{καὶ τὸ γ' μέρος εἶναι } \frac{180\,000 \times 28}{60} = 84\,000 \text{ δραχ.}$$

Ὡστε, εἴτε μερίσωμεν τὸν ἀριθμὸν 180 000 εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς 3, 5, 7, εἴτε πρὸς τοὺς 12, 20, 28, εὐρίσκομεν τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι :

Τὰ μέρη τοῦ μεριστέου ἀριθμοῦ δὲν βλάπτονται, ἐάν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ πολλαπλασιασθοῦν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἢ διαιρεθοῦν διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

§ 330. Πρόβλημα 2ον. Νὰ μερισθοῦν 130 000 δραχμαὶ εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{7}{12}$ .

Λύσις. Τρέποντες τὰ κλάσματα  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{7}{12}$  εἰς ὁμώνυμα εὐρίσκομεν τὰ ἴσα κλάσματα  $\frac{9}{12}$ ,  $\frac{10}{12}$ ,  $\frac{7}{12}$ .

Ἐπειδὴ τὰ ζητούμενα μέρη πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογα πρὸς τὰ κλάσματα αὐτά, θὰ εἶναι ἀνάλογα καὶ πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 9, 10, 7, δηλ. πρὸς τοὺς ἀριθμητὰς τῶν κλασμάτων.

Πρέπει λοιπόν να μερίσωμεν τὸν ἀριθμὸν 130 000 εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 9, 10, 7. Ἐφαρμόζοντες τὸν ἀνωτέρω κανόνα (§ 328) εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{τὸ α' μέρος εἶναι } \frac{130\,000 \times 9}{26} = 45\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\text{τὸ β' μέρος εἶναι } \frac{130\,000 \times 10}{26} = 50\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\text{καὶ τὸ γ' μέρος εἶναι } \frac{130\,000 \times 7}{26} = 35\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\text{Κατάταξις : } 130\,000 \text{ δραχ.} \quad \left\{ \begin{array}{l} \alpha) \frac{3}{4} \text{ ἢ } \frac{3}{4} \times 12 = 9 \\ \beta) \frac{5}{6} \text{ ἢ } \frac{5}{6} \times 12 = 10 \\ \gamma) \frac{7}{12} \text{ ἢ } \frac{7}{12} \times 12 = 7 \end{array} \right.$$


---


$$\text{ἄθροισμα} = 26$$

§ 331. *Πρόβλημα 3ον.* Τρεῖς ἐργάται ἔλαβον 1 566 δραχ. διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐργασίας τινός. Ὁ α' εἰργάσθη ἐπὶ 5 ἡμέρας, ἀλλὰ ἐπὶ 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, ὁ β' ἐπὶ 9 ἡμέρας τῶν 6 ὥρῶν καὶ ὁ γ' ἐπὶ 10 ἡμέρας τῶν 8 ὥρῶν. Πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

*Λύσις.* Ὁ α' ἐργάτης εἰργάσθη ἐπὶ 8 ὥρ.  $\times$  5 = 40 ὥρας, ὁ β' ἐπὶ 6 ὥρ.  $\times$  9 = 54 ὥρας καὶ ὁ γ' ἐπὶ 8 ὥρ.  $\times$  10 = 80 ὥρας.

Πρέπει λοιπόν να μερίσωμεν τὰς 1 566 δραχ. εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 40, 54, 80.

Ἐφαρμόζοντες τὸν σχετικὸν κανόνα εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{ὁ α' ἐργάτης θὰ λάβῃ } \frac{1\,566 \times 40}{174} = 360 \text{ δραχ.}$$

$$\text{ὁ β' ἐργάτης θὰ λάβῃ } \frac{1\,566 \times 54}{174} = 486 \text{ δραχ.}$$

$$\text{καὶ ὁ γ' ἐργάτης θὰ λάβῃ } \frac{1\,566 \times 80}{174} = 720 \text{ δραχ.}$$

$$\text{Κατάταξις : } 1\,566 \text{ δραχ.} \quad \left\{ \begin{array}{l} \alpha) \quad 5 \text{ ἡμ. } 8 \text{ ὥρ. ἢ } 40 \text{ ὥρ.} \\ \beta) \quad 9 \text{ » } 6 \text{ » ἢ } 54 \text{ ὥρ.} \\ \gamma) \quad 10 \text{ » } 8 \text{ » ἢ } 80 \text{ ὥρ.} \end{array} \right.$$


---


$$\text{ἄθροισμα} = 174$$

§ 332. Ἀριθμοὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογοι ἄλλων. Δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογοι πρὸς ἄλλους ἰσοπληθεῖς, ὅταν εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀντιστρόφους αὐτῶν ἀριθμοῦς. Π.χ. ἔστωσαν οἱ ἀριθμοὶ 3, 4, 5.

Οἱ ἀριθμοὶ 6, 8, 10 εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς 3, 4, 5, ἀλλὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογοι πρὸς τοὺς  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ .

§ 333. Πρόβλημα 4ον. Νὰ μερισθοῦν 360 000 δραχμαὶ εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 12, 15, 20, (δηλ. νὰ μερισθοῦν αἱ 360 000 δραχ. εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀντιστρόφους τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν).

Λύσις. Οἱ ἀντίστροφοι τῶν ἀριθμῶν 12, 15, 20 εἶναι ἀντιστοιχῶς οἱ  $\frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{15}$ ,  $\frac{1}{20}$ . Τὸ πρόβλημα λοιπὸν ἀνάγεται εἰς τὴν περίπτωσηιν ἐκείνην, κατὰ τὴν ὁποίαν ζητεῖται νὰ μερισθοῦν αἱ 360 000 δραχ. εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰ κλάσματα  $\frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{15}$ ,  $\frac{1}{20}$  ἢ πρὸς τὰ ὁμώνυμά των  $\frac{5}{60}$ ,  $\frac{4}{60}$ ,  $\frac{3}{60}$  ἢ πρὸς τοὺς ἀριθμητάς των 5, 4, 3.

Ἐφαρμόζοντες τὸν σχετικὸν κανόνα εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{τὸ α' μέρος εἶναι } \frac{360\,000 \times 5}{12} = 150\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\text{τὸ β' μέρος εἶναι } \frac{360\,000 \times 4}{12} = 120\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\text{καὶ τὸ γ' μέρος εἶναι } \frac{360\,000 \times 3}{12} = 90\,000 \text{ δραχ.}$$

	ἀντιστρόφως ἀνάλογα	ἢ ἀναλόγως			
Κατάταξις : 360 000 δραχ.	α) 12	τοῦ $\frac{1}{12}$	ἢ $\frac{5}{60}$	ἢ 5	
	β) 15	τοῦ $\frac{1}{15}$	ἢ $\frac{4}{60}$	ἢ 4	
	γ) 20	τοῦ $\frac{1}{20}$	ἢ $\frac{3}{60}$	ἢ 3	
					ἄθροισμα = 12

### Ἀ σ κ ή σ ε ι ς

Α' Ὁμάς. 694) Τρεῖς ἐργάται ἔλαβον 2 800 δραχ. δι' ἐρ-

γασίαν των. 'Ο α' ειργάσθη ἐπὶ 8 ἡμέρας, ὁ β' ἐπὶ 12 ἡμέρας καὶ ὁ γ' ἐπὶ 15 ἡμέρας. Πόσας δραχμὰς ἔλαβεν ἕκαστος ;

695 ) Τρεῖς κτηνοτρόφοι ἐνοικίασαν ἀπὸ κοινοῦ ἓνα λιβάδιον ἀντὶ 13 500 δραχ. διὰ τὴν βοσκὴν τῶν προβάτων των. 'Ο α' ἔχει 120 πρόβατα, ὁ β' 110 καὶ ὁ γ' 220. Πόσον θὰ πληρώσῃ ἕκαστος ;

696 ) Τρία χωρία, ποὺ τὰ ἐχώριζεν ἓνας ποταμός, ἀπεφάσισαν νὰ κάμουν μίαν γέφυραν μὲ κοινὰ ἔξοδα, ἀλλὰ ἀναλόγως τῶν κατοίκων τοῦ ἔχει κάθε χωρίον. Ἐπλήρωσαν δὲ διὰ τὴν γέφυραν αὐτὴν 32 450 δραχ. Πόσα πρέπει νὰ πληρώσῃ κάθε χωρίον, ἂν τὸ πρῶτον εἶχε 565 κατοίκους, τὸ δεύτερον 735 καὶ τὸ τρίτον 1 650 ;

697 ) Ἐνας θεῖος ἀφήνει τὴν περιουσίαν του εἰς τοὺς τρεῖς ἀνεψιούς του. Εἰς τὸν πρῶτον δίδει 1 250 000 δραχμὰς, εἰς τὸν δεύτερον 1 850 000 δραχμὰς καὶ εἰς τὸν τρίτον 1 150 000 δραχ. Παραγγέλλει ὅμως νὰ δώσουν εἰς ἓνα παλαιὸν ὑπηρέτην του 255 000 δραχ. Νὰ εὐρεθῇ πόσα πρέπει νὰ δώσῃ κάθε ἀνεψιὸς εἰς τὸν ὑπηρέτην.

698 ) Τρεῖς ἀδελφοὶ ἠγόρασαν μαζί ἓνα ἀγρόν. 'Ο πρῶτος ἔδωσε διὰ τὴν ἀγορὰν 8 400 δραχμὰς, ὁ δεύτερος 9 600 δραχμὰς καὶ ὁ τρίτος 10 500 δραχμὰς. Ἀπὸ τὴν καλλιέργειαν τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ ἔλαβον 1 425 χλγ. σίτου. Πόσα χλγ. σίτου πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος ;

699 ) Τρεῖς γεωργοὶ ἠγόρασαν μίαν θεριστικὴν μηχανὴν ἀντὶ 75 000 δραχμῶν. 'Ο πρῶτος ἐπλήρωσε 31 000 δραχμὰς, ὁ δεύτερος 17 500 δραχμὰς καὶ ὁ τρίτος τὸ ὑπόλοιπον. Μὲ τὴν μηχανὴν αὐτὴν ἐθήρισαν τοὺς ἀγρούς τῶν συγχωριανῶν των καὶ εἰσέπραξαν ἀπὸ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν 22 500 δραχμὰς. Πόσα πρέπει νὰ λάβῃ κάθε γεωργὸς ἀπὸ τὰ εἰσπραχθέντα ;

700 ) Ἐργάτης ἐκτελεῖ ἓνα ἔργον εἰς 25 ἡμ. Ἄλλος ἐργάτης ἐκτελεῖ αὐτὸ εἰς 30 ἡμ. καὶ τρίτος εἰς 35 ἡμ. Εἰργάσθησαν καὶ οἱ τρεῖς μαζί καὶ ἔλαβον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἑνὸς ἔργου 13 125 δραχμὰς. Πόσον πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος ; ( Μερίσσατε τὰς 13 125 δρχ. εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 25, 30, 35 ).

Β' 'Ο μ ἄ ς. 701 ) Ἐνα κτῆμα 5 628 στρεμμάτων ἐμοιράσθη μεταξὺ τριῶν κληρονόμων ἀναλόγως πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ . Πόσον ἔλαβεν ἕκαστος ;

702 ) Φιλάνθρωπος μοιράζει 122 000 δραχ. εἰς τὰ δύο σχολεῖα ( Δημοτικὸν καὶ Γυμνάσιον ) καὶ εἰς τὸν φιλανθρωπικὸν σύλλογον

τῆς πατρίδος του ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν  $\frac{3}{4}$ , 2 καὶ  $2\frac{1}{3}$ . Πόσα θὰ λάβῃ κάθε σχολεῖον καὶ πόσα ὁ φιланθρωπικὸς σύλλογος ;

703 ) Θεῖος ἀφήνει εἰς τοὺς τρεῖς ἀνεπιούς του 540 000 δραχ. διὰ νὰ τὰς μοιραθοῦν εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα πρὸς τὰς ἡλικίας των. Ὁ α' ἦτο 18 ἐτῶν, ὁ β' 12 ἐτῶν καὶ ὁ γ' 9 ἐτῶν. Πόσας δραχμάς θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

704 ) Φιλάνθρωπος κατέθεσεν εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν 720 000 δραχμάς πρὸς 3,5% καὶ διέταξεν οἱ ἐτήσιοι τόκοι νὰ μοιράζωνται εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον καὶ εἰς τὸ Γυμνάσιον τῆς πατρίδος του ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 5. Πόσοι τόκοι ἀναλογοῦν εἰς κάθε σχολεῖον ;

705 ) Ποσὸν τι χρημάτων διενεμήθη μεταξύ τριῶν προσώπων ἀναλόγως πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς  $2\frac{1}{4}$ ,  $7\frac{2}{5}$  καὶ  $8\frac{1}{2}$ . Τὸ γ' πρόσωπον μὲ τὰ χρήματα, πού ἔλαβεν, ἐπλήρωσεν τὸ ἐτήσιον ἐνοίκιον τῆς οἰκίας του πρὸς 1 275 δραχ. τὸν μῆνα. Πόσον ἔλαβεν ἕκαστον πρόσωπον καὶ πόσον ἦτο τὸ διανεμηθὲν ποσόν ;

Γ' Ὁ μ' α'. 706 ) Δύο ποιμένες ἐνοικίασαν ἓνα λιβάδιον ἀντὶ 4 275 δραχ. Ὁ α' ἐβόσκησεν εἰς αὐτὸ 200 πρόβατα ἐπὶ 25 ἡμέρας, ὁ β' 150 πρόβατα ἐπὶ 1 μῆνα. Πόσον ἐνοίκιον πρέπει νὰ πληρώσῃ ἕκαστος ;

707 ) Δύο κτηνοτρόφοι ἐνοικίασαν ἀπὸ κοινοῦ ἓνα λιβάδιον ἀντὶ 9 750 δραχ. Ὁ α' ἐβόσκησε 5 ἀγελάδας καὶ ὁ β' 120 πρόβατα. Γνωρίζομεν ὅτι μία ἀγελάς τρώγει ὅσον 15 πρόβατα. Πόσον πρέπει νὰ πληρώσῃ κάθε κτηνοτρόφος ;

708 ) Δύο οἰκογένειαι ἐνοικίασαν ἐξοχικὴν παραθαλασσίαν οἰκίαν ἀντὶ 5 100 δραχ. Ἡ α' οἰκογένεια ἀπετελεῖτο ἀπὸ 3 ἄτομα καὶ παρέμεινεν εἰς τὴν ἐξοχὴν ἐπὶ 3 μῆνας, ἡ β' ἀπετελεῖτο ἀπὸ 4 ἄτομα καὶ παρέμεινεν ἐπὶ 2 μῆνας. Τὸ ἐνοίκιον θὰ πληρωθῇ ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων καὶ τῆς διάρκειας τῆς παραμονῆς. Πόσα πρέπει νὰ πληρώσῃ ἕκαστη οἰκογένεια ;

709 ) Τρεῖς ἐργάται ἀνέλαβον νὰ κάνουν συνεταιρικῶς μίαν ἐργασίαν, διὰ τὴν ὁποίαν ἐπληρώθησαν 2 460 δραχμάς. Ὁ πρῶτος ἐργάτης εἰργάσθη 5 ἡμέρας, ἀλλὰ ἀπὸ 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, ὁ δεύτερος 9 ἡμέρας, ἀλλὰ ἀπὸ 6 ὥρας τὴν ἡμέραν καὶ ὁ τρίτος 10 ἡμέρας ἀπὸ 7 ὥρας τὴν ἡμέραν. Πόσον ἔλαβεν ἕκαστος ;

710 ) Λογιστής λαμβάνει 52 700 δραχ. διὰ τὴν πληρώσῃ τοὺς ἐργάτας ἑνὸς ἐργοστασίου. Ἡ α' ὁμὰς ἐξ 25 ἐργατῶν εἰργάσθη ἐπὶ 10 ἡμέρας, ἡ δὲ β' ὁμὰς ἐκ 35 ἐργατῶν εἰργάσθη ἐπὶ 15 ἡμέρας. Πόσον πρέπει νὰ πληρώσῃ εἰς ἑκάστην ὁμάδα καὶ πόσον ἦτο τὸ ἡμερομίσθιον ;

711 ) Τρεῖς γεωργοὶ ἐνοικίασαν ἓνα αὐτοκίνητον ἄροτρον διὰ νὰ καλλιεργήσουν τὰ κτήματά των ἀντὶ 6 950 δραχ. Ὁ α' ἐχρησιμοποίησεν αὐτὸ ἐπὶ 6 ἡμ. καὶ ἐπὶ 10 ὥρ. τὴν ἡμέραν. Ὁ β' ἐπὶ 5 ἡμ. καὶ ἐπὶ 5 ὥρ. τὴν ἡμ. καὶ ὁ γ' ἐπὶ 6 ἡμ. καὶ ἐπὶ 9 ὥρ. τὴν ἡμέραν. Πόσα πρέπει νὰ πληρώσῃ ἕκαστος γεωργός ;

Δ' Ὁ μ α ς. 712 ) Νὰ μοιρασθῶσι 2 754 χλγ. σίτου εἰς 4 οἰκογενείας κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον : Ἡ δευτέρα οἰκογένεια νὰ λάβῃ τὰ  $\frac{2}{3}$  τοῦ μεριδίου τῆς πρώτης, ἡ τρίτη τὸ  $\frac{1}{4}$  τῶν ὄσων θὰ λάβουν αἱ δύο πρῶται μαζὶ καὶ ἡ τετάρτη τὰ  $\frac{2}{5}$  τοῦ μεριδίου τῆς τρίτης.

713 ) Ἐνας φιλόσοφος μοιράζει 3 500 000 δραχ. εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον, εἰς τὸ Νοσοκομεῖον καὶ εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖον τῆς πατρίδος του κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον : Τὸ Νοσοκομεῖον θὰ λάβῃ διπλάσια τοῦ Σχολείου, καὶ τὸ Ὀρφανοτροφεῖον τὰ  $\frac{4}{3}$  τῶν ὄσων θὰ λάβουν τὸ Νοσοκομεῖον καὶ τὸ Σχολεῖον μαζὶ. Νὰ εὐρεθῇ πόσα θὰ λάβῃ κάθε ἴδρυμα.

714 ) Νὰ μερισθοῦν 9 500 000 δραχ. μεταξὺ 3 προσώπων οὕτως, ὥστε τὰ μερίδια τοῦ β' καὶ τοῦ γ' νὰ εἶναι ἴσα, τοῦ δὲ α' νὰ εἶναι ἴσον μὲ τὰ  $\frac{5}{7}$  ἑκάστου τῶν ἄλλων.

715 ) Τρεῖς ἀδελφοὶ ἐμοιράσθησαν ἓνα ἀγρὸν 12 600 στρεμ. κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον : Ὁ α' ἔλαβεν ὅσον καὶ οἱ δύο ἄλλοι μαζὶ, τῶν ὀπίστων τὰ μερίδια ἦσαν ὡς οἱ ἀριθμοὶ 3 πρὸς 4. Πόσον ἔλαβεν ἕκαστος ;

716 ) Ἐνας θεῖος ἠθέλησε νὰ μοιράσῃ τὴν περιουσίαν του εἰς τοὺς τρεῖς ἀνεψιούς του ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 7, 6, 5. Μετέβαλεν ὁμῶς γνώμην καὶ ἐμοίρασεν ταύτην ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 6, 5, 4. Ποῖος ἐκ τῶν ἀνεψιῶν ὠφελήθη ἐκ τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς ; Ὁ ἓνας τῶν ἀνεψιῶν ἔλαβεν 12 000 δραχ. ἐπὶ πλέον ἢ πρότερον. Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ περιουσία τοῦ θείου καὶ τὸ μερίδιον ἑκάστου.

## 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

§ 334. Τα προβλήματα εταιρείας είναι προβλήματα μερισμού. Εις αυτά ζητείται να μερισθῆ τὸ κέρδος ἢ ἡ ζημία μιᾶς ἐπιχειρήσεως μεταξύ ἐκείνων, οἱ ὅποιοι ἀνέλαβον νὰ κάμουν τὴν ἐπιχείρησιν αὐτὴν.

§ 335. *Πρόβλημα 1ον.* Τρεῖς συνεταιῖροι κατέθεσαν εἰς μίαν ἐπιχείρησιν τὰ ἐξῆς ποσά: 'Ο α' 85 000 δραχμάς, ὁ β' 105 000 δραχμάς καὶ ὁ γ' 65 000 δραχμάς. Ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς ἐκέρδισαν 51 000 δραχμάς. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

*Λύσις.* Εἶναι φανερόν ὅτι τὸ κέρδος πρέπει νὰ μερισθῆ εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν καταθέσεων ἑκάστου. Μεριζοντες λοιπὸν τὸ κέρδος τῶν 51 000 δραχ. εἰς μέρη ἀνάλογα, πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 85 000, 105 000, 65 000 ἢ πρὸς τοὺς 85, 105, 65, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\text{ὁ α' θὰ λάβῃ } \frac{51\,000 \times 85}{255} = 17\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\text{ὁ β' θὰ λάβῃ } \frac{51\,000 \times 105}{255} = 21\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\text{καὶ ὁ γ' θὰ λάβῃ } \frac{51\,000 \times 65}{255} = 13\,000 \text{ δραχ.}$$

Κατάταξις : 51 000 δραχ.	{	α) 85 000	ἢ	85
		β) 105 000	ἢ	105
		γ) 65 000	ἢ	65
		ἄθροισμα = 255		

§ 336. *Πρόβλημα 2ον.* Ἐμπορὸς ἤρχισεν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν μὲ 75 000 δραχ. Μετὰ 6 μῆνας προσέλαβε καὶ συνεταιῖρον, ὁ ὁποῖος κατέθεσε τὸ αὐτὸ ποσόν. Μετὰ 4 μῆνας προσέλαβεν καὶ τρίτον συνεταιῖρον, ὁ ὁποῖος κατέθεσε τὸ αὐτὸ ποσόν. Ἐν ἔτος μετὰ τὴν πρόσληψιν τοῦ τρίτου εὔρον ὅτι ἐκέρδισαν 64 000 δραχ. Πόσον κέρδος πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος ;

*Λύσις.* Τὸ κεφάλαιον τοῦ τρίτου ἔμεινεν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἐπὶ 1 ἔτος ἢ ἐπὶ 12 μῆνας· τοῦ β' ἐπὶ 12 μῆν. + 4 μῆν. = 16 μῆν, καὶ τοῦ α' ἐπὶ 16 μῆν. + 6 μῆν. = 22 μῆνας.

Ἐπειδὴ καὶ οἱ τρεῖς συνεταιῖροι κατέθεσαν τὸ αὐτὸ ποσόν, εἶναι προφανές ὅτι τὸ κέρδος τῶν 64 000 δραχ. πρέπει νὰ μερισθῆ

εις μέρη ανάλογα πρὸς τοὺς χρόνους, κατὰ τοὺς ὁποίους ἔμειναν αἱ καταθέσεις εἰς τὴν ἐπιχείρησιν.

Μερίζοντες λοιπὸν τὸ κέρδος 64 000 δραχμῶν εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 22, 16, 12, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\delta \alpha' \text{ θὰ λάβῃ } \frac{64\,000 \times 22}{50} = 28\,160 \text{ δραχ.}$$

$$\delta \beta' \text{ θὰ λάβῃ } \frac{64\,000 \times 16}{50} = 20\,480 \text{ δραχ.}$$

$$\text{καὶ } \delta \gamma' \text{ θὰ λάβῃ } \frac{64\,000 \times 12}{50} = 15\,360 \text{ δραχ.}$$

*Κατάταξις :*

Μεριζτέον κέρδος 64 000 δραχ.

Μετὰ 6 μῆν.

» 4 »

1 ἔτ. μετὰ τὸν γ'

Κεφάλαια    Διάρκεια    καταθέσεων

{ α) 75 000    22 μῆν.

{ β) »    16 »

{ γ) »    12 »

ἄθροισμα = 50

§ 337. *Πρόβλημα 3ον.* Δύο ἔμποροι ἔκαμαν μίαν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν. Ὁ α' κατέθεσε 50 000 δραχμὰς καὶ ὁ β' 65 000 δραχμὰς. Ἀλλὰ τὰ χρήματα τοῦ α' ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἐπὶ 12 μῆνας, τοῦ δὲ β' ἐπὶ 8 μῆνας. Κατόπιν ἐλογαριάσθησαν καὶ εὔρον ὅτι ἐκέρδισαν 44 800 δραχμὰς. Πόσον κέρδος πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος ;

*Λύσις.* Εἰς τὸ πρόβλημα αὐτὸ εἶναι διάφοροι καὶ αἱ καταθέσεις τῶν ἐμπόρων καὶ οἱ χρόνοι. Διὰ νὰ λύσωμεν δὲ αὐτὸ, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς :

Ὁ α' ἔμπορος θὰ λάβῃ μέρος τοῦ κέρδους, διότι κατέθεσε 50 000 δραχμὰς ἐπὶ 12 μῆνας. Ἄν θέλῃ νὰ λάβῃ τὸ αὐτὸ κέρδος εἰς 1 μῆνα, πρέπει νὰ καταθέσῃ 12 φορές περισσότερον, ἦτοι :

$$50\,000 \times 12 = 600\,000 \text{ δραχ.}$$

Ὁ β' θὰ λάβῃ μέρος τοῦ κέρδους, διότι κατέθεσεν 65 000 δραχμὰς ἐπὶ 8 μῆνας. Ἄν θέλῃ νὰ λάβῃ τὸ αὐτὸ κέρδος εἰς 1 μῆνα, πρέπει νὰ καταθέσῃ 8 φορές περισσότερον, ἦτοι :

$$65\,000 \times 8 = 520\,000 \text{ δραχ.}$$

Πρέπει λοιπὸν νὰ μερίσωμεν τὸ κέρδος τῶν 44 800 δραχ. εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 600 000 καὶ 520 000, δηλ. εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰ γινόμενα τῶν καταθέσεων ἐπὶ τοὺς χρό-

νους ἢ εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 60 καὶ 52. Μεριζοντες τὸ κέρδος εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\delta \alpha' \text{ θὰ λάβῃ } \frac{44\,800 \times 60}{112} = 24\,000 \text{ δραχ.}$$

$$\delta \beta' \text{ θὰ λάβῃ } \frac{44\,800 \times 52}{112} = 20\,800 \text{ δραχ.}$$

Κατάταξις :

$$\text{Μεριστέον κέρδος } \left\{ \begin{array}{l} \alpha) 50\,000 \times 12 = 600\,000 \text{ ἢ } 60 \\ 44\,800 \text{ δραχμαὶ } \left\{ \begin{array}{l} \beta) 65\,000 \times 8 = 520\,000 \text{ ἢ } 52 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$\text{ἄθροισμα} = 112$$

*Συμπέρασμα.* Ἐκ τῆς λύσεως τῶν ἀνωτέρω τριῶν προβλημάτων συνάγομεν ὅτι τὸ κέρδος ἢ ἡ ζημία μιᾶς ἐπιχειρήσεως μερίζεται :

1ον. Εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν καταθέσεων, ἐὰν οἱ χρόνοι εἶναι ἴσοι.

2ον. Εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν χρόνων, ἐὰν αἱ καταθέσεις εἶναι αἱ αὐταί.

3ον. Εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰ γινόμενα τῶν καταθέσεων ἐπὶ τοὺς χρόνους, ἐὰν αἱ καταθέσεις καὶ οἱ χρόνοι εἶναι διάφοροι.

*Σημείωσις.* Οἱ χρόνοι πρέπει νὰ μετρῶνται μετὴν αὐτὴν μονάδα.

### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

Α'. Ὁμάς. 717) Δύο συνεταῖροι κατέβαλον δι' ἐπιχείρησιν 123 000 δραχ. Ὁ α' κατέθεσεν 12 000 δραχ. περισσότερον τοῦ β'. Ἐκ δὲ τῆς ἐπιχειρήσεως ἐκέρδισαν 43 050 δραχ. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

718) Δύο συνεταῖροι κατέβαλον δι' ἐπιχείρησιν ἓνα ποσὸν καὶ ἐκέρδισαν 73 400 δραχμάς. Πόσον κέρδος πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος, ἐὰν ἡ κατάθεσις τοῦ α' εἶναι ἴση μετὰ τὰ  $\frac{2}{3}$  τῆς καταθέσεως τοῦ β ;

719) Δύο συνεταῖροι ἐκέρδισαν ἐκ μιᾶς ἐπιχειρήσεως ὁ μὲν α' 5 200 δραχ., ὁ δὲ β' 6 400 δραχ. Ἐὰν ὁ α' κατέθεσεν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν 41 600 δραχ., πόσας κατέθεσεν ὁ β ;

720) Δύο συνεταῖροι κατέθεσαν εἰς μίαν ἐπιχείρησιν 105 000 δραχ. Ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς ἐκέρδισεν ὁ α' 11 250 δραχμάς, ὁ δὲ β' 18 750 δραχ. Πόσον κατέθεσεν ἕκαστος ;

721) Τρεῖς κτηματῖαι, τῶν ὁποίων τὰ κτήματα ἐγειτόνουν,

ήνοιξαν συνεταιρικῶς ἓνα φρέαρ, διὰ νὰ ποτιζῶσι τὰ κτήματά των. Τὸ φρέαρ ἐκόστισε 2 400 δραχ. Πόσον πρέπει νὰ πληρώσῃ ἕκαστος, ἂν τὰ κτήματα τοῦ α' ἦσαν 5,6 στρέμ., τοῦ β' 7,4 στρέμ. καὶ τοῦ γ' 7 στρέμματα ;

722 ) Τρεῖς γεωργοὶ συνεταιρισθέντες ἠγόρασαν ἓνα κτῆμα ἀντὶ 45 000 δραχμῶν. Ὁ α' διέθεσεν 8 500 δραχμᾶς· ὁ β' 12 500 δραχμᾶς καὶ ὁ γ' τὸ ὑπόλοιπον. Τὸ κτῆμα τοῦτο κατὰ τὸ α' ἔτος τῆς καλλιεργείας του ἀπέφερε 8 600 χλγ. γεωμῆλων, τὰ ὁποῖα ἐπώλησαν πρὸς 1,80 δραχ. τὸ χλγ. Πόσον πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος ἐκ τοῦ εἰσπραχθέντος ποσοῦ ;

Β'. Ὁ μ ἄ ς. 723 ) Τρεῖς συνεταιῖροι ἐκέρδισαν ἐκ μιᾶς ἐπιχειρήσεως 72 000 δραχ. Καὶ οἱ τρεῖς κατέθεσαν τὸ αὐτὸ ποσόν, ἀλλὰ τὰ χρήματα τοῦ α' ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν 11 μῆνας, τοῦ β' 9 μῆνας καὶ τοῦ τρίτου 5 μῆνας. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

724 ) \*Ἐμπορος ἤρχισεν ἐπιχείρησιν. Μετὰ 8 μῆνας προσέλαβε καὶ συνεταιῖρον, ὁ ὁποῖος κατέθεσε τὸ αὐτὸ ποσόν· 5 μῆνας βραδύτερον προσέλαβον καὶ γ', ὁ ὁποῖος κατέθεσε τὸ αὐτὸ ποσόν. Δύο ἔτη ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιχειρήσεως εὔρον ὅτι ἐζημιώθησαν 2 550 δραχ. Πόση ζημία ἀναλογεῖ εἰς ἕκαστον ;

725 ) \*Ἐμπορος ἤρχισεν ἐπιχείρησιν. Μετὰ 6 μῆνας προσέλαβε καὶ συνεταιῖρον, ὁ ὁποῖος κατέθεσε τὸ αὐτὸ ποσόν. Ἐν ἔτος μετὰ τὴν πρόσληψιν τοῦ συνεταιῖρου εὔρον ὅτι ἐκέρδισαν 54 000 δραχμᾶς. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

726 ) \*Ἐμπορος ἤρχισεν ἐπιχείρησιν μὲ 65 000 δραχ. Μετὰ 4 μῆνας προσέλαβε καὶ συνεταιῖρον, ὁ ὁποῖος κατέθεσεν 75 000 δραχ. 5 μῆνας βραδύτερον προσέλαβον καὶ γ' συνεταιῖρον, ὁ ὁποῖος κατέθεσε 100 000 δραχ. Μετὰ 10 μῆνας ἀπὸ τῆς προσλήψεως τοῦ γ' εὔρον ὅτι ἐκέρδισαν 134 400 δραχ. Πόσον κέρδος θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

Γ'. Ὁ μ ἄ ς. 727 ) Δύο ἐπιχειρηματῆαι συνεταιρισθέντες ἐκέρδισαν ἐκ μιᾶς ἐπιχειρήσεως ἓνα ποσόν ἴσον πρὸς τὰ 40 % τῶν συνολικῶν καταθέσεών των. Ὁ α' ἔλαβεν ἐκ τοῦ κέρδους 30 000 δραχ., ὁ δὲ δεῦτερος 92 000 δραχ. Πόσον κατέθεσεν ἕκαστος ;

728 ) \*Ἐμπορος ὀφείλει εἰς τρεῖς πιστωτάς του τὰ ἑξῆς ποσά : Εἰς τὸν α' 12 000 δραχ., εἰς τὸν β' 13 000 δραχ. καὶ εἰς τὸν γ' 15 000 δραχ. Πτωχεύσας ὁμως διαθέτει δι' αὐτοὺς μόνον 24 000 δραχ. Πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστος πιστωτῆς καὶ πόσον % ζημιουταὶ ἕκαστος ;

729 ) Δύο βιομήχανοι ἔκαμαν μίαν ἐπιχείρησιν. Ὁ α' κατέθεσε 40 000 δραχ. δι' 6 μῆνας εἰς τὴν ἐπιχείρησιν καὶ ἐκέρδισεν ἐξ αὐτῆς 6 000 δραχ. Ὁ β' ἐκέρδισεν ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως 16 875 δραχ. Πόσον κατέθεσεν ὁ β', ἐὰν τὰ χρήματά του ἔμειναν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἐπὶ 9 μῆνας ;

730 ) Ἡ ἑκαθάρσις ἐνὸς πτωχεύσαντος ἐμπόρου εὔρεν ὅτι οὗτος δύναται νὰ διαθέσῃ 40% εἰς τοὺς τρεῖς δανειστάς του. Ὁ α' εἶχε δανείσει εἰς αὐτὸν 7 500 δραχ., ὁ β' 5 000 δραχ. καὶ ὁ γ' 12 500 δραχ. Πόσα θὰ λάβῃ ἕκαστος, ἐὰν ἀφαιρεθοῦν προηγουμένως τὰ ἔξοδα τῆς ἑκαθαρίσεως, τὰ ὁποῖα ἀνέρχονται εἰς 5% ;

### 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

§ 338. *Πρόβλημα.* Ἐνας ἡμερομίσθιος ἐργάτης ἔλαβε μίαν ἡμέραν 84 δραχμάς, τὴν ἄλλην 87 δραχ. καὶ τὴν τρίτην 93 δραχ. Μὲ πόσον σταθερὸν ἡμερομίσθιον θὰ ἐλάμβανε τὸ αὐτὸ ποσὸν κατὰ τὰς τρεῖς αὐτὰς ἡμέρας ;

*Λύσις.* Τὰς τρεῖς ἡμέρας ἔλαβε τὸ ὅλον :

$$84 + 87 + 93 = 264 \text{ δραχ.}$$

Ἐπρεπε λοιπὸν νὰ λαμβάνῃ τὴν ἡμέραν :

$$264 \text{ δραχ.} : 3 = 88 \text{ δραχ.}$$

Αὐτὸ τὸ ἡμερομίσθιον λέγεται ἀριθμητικὸν μέσον ἢ μέσος ὄρος τῶν 84, 87 καὶ 93 δραχ. Δηλαδή :

Μέσος ὄρος δύο ἢ περισσοτέρων ἀφηρημένων ἀριθμῶν ἢ συγκεκριμένων ἀλλὰ ὁμοειδῶν ἀριθμῶν λέγεται τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει τὸ πλῆθος αὐτῶν.

Ἡ χρῆσις τοῦ μέσου ὄρου εἶναι συνηθεστάτη εἰς τὴν Στατιστικὴν καὶ εἰς τὰς Φυσικὰς Ἐπιστήμας.

### Ἄ σ κ ἡ σ ε ι ς

731 ) Ποδηλάτης διήνυσεν τὴν α' ἡμέραν 85,400 χλμ., τὴν β' 96,500 χλμ., τὴν γ' 84,700 χλμ. καὶ τὴν δ' 88 χλμ. Πόσον διήνυσεν τὴν ἡμέραν κατὰ μέσον ὄρον ;

732 ) Ἡ κατωτέρα θερμοκρασία μιᾶς ἡμέρας ἦτο 6°,4 καὶ ἡ ἀνωτέρα 12°,8. Πόση ἦτο ἡ μέση θερμοκρασία τῆς ἡμέρας ;

733 ) Μαθητής τις έλαβε εις τὰ διάφορα μαθήματά του τούς έξής βαθμούς 15, 18, 17, 19, 15. Ποίος είναι ό μέσος γενικός βαθμός του ;

734 ) 'Η μεγαλύτερα απόσταση του 'Ηλίου από τής Γης είναι 152 000 000 χλμ., ή δέ μικρότερα 147 000 000 χλμ. Πόση είναι ή μέση απόσταση αυτού ;

735 ) Είς μίαν πόλιν κατά τὸ α' έξάμηνον ένὸς έτους απέθανον κατά τὸν μήνα 'Ιανουάριον 75 άτομα, κατά τὸν Φεβρουάριον 63, κατά τὸν Μάρτιον 105, κατά τὸν 'Απρίλιον 84, κατά τὸν Μάϊον 60 καί κατά τὸν 'Ιούνιον 45. Πόσος είναι ό μέσος όρος τῶν θανάτων κατά μήνα εις τήν πόλιν αὐτήν ;

736 ) "Ενας γεωργός έσπειρε τὸ παρελθὸν έτος δύο άγρους. 'Ο α' ήτο 12 στρεμμάτων καί παρήγαγε 2 300 χλγ. σίτου. 'Ο β' ήτο 8 στρεμμάτων καί παρήγαγε 1 500 χλγ. Πόση ήτο κατά μέσον όρον ή παραγωγή ένὸς στρέμματος από τούς άγρους αὐτούς ;

737 ) Διά νά εύρη ένας Φυσικός τήν ταχύτητα τοῦ ήχου εις τὸν άέρα έκαμε 4 πειράματα. Κατά τὸ α' πείραμα εύρε ταχύτητα 344 μέτρα κατά δευτερόλεπτον, κατά τὸ β' 338,5 μ. κατά τὸ γ' 342,10 μ. καί κατά τὸ δ' 338,4 μ. Πόση ήτο κατά μέσον όρον ή ταχύτης τοῦ ήχου εις τὸν άέρα ;

#### 4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ

§ 339. Οί έμποροι ειδῶν διατροφής, όταν έχουν διαφόρους ποιότητας ένὸς καί τοῦ αὐτοῦ είδους, π.χ. ελαίου, βουτύρου, λίπους, καφέ κ.λ.π. καί δέν δύνανται νά πωλήσουν χωριστὰ τὰ είδη αὐτά, είτε λόγω τής υπερβολικῆς τιμῆς των είτε λόγω τής κατωτέρας ποιότητός των, αναγκάζονται συνήθως νά αναμειγνύουν τὰς ποιότητας έκάστου είδους. Σχηματίζουν οὔτως ένα μείγμα μετρίας ποιότητος καί μετρίας άξίας, τὸ όποϊον δύνανται νά πωλήσουν εύκολότερον.

§ 340. Πρώτον είδος. *Πρόβλημα.* "Ενας λαδέμπορος άνέμειξε 50 χλγ. ελαίου τῶν 22 δραχ. κατά χλγ. με 80 χλγ. τῶν 24 δραχ. κατά χλγ. καί με 70 χλγ. τῶν 26 δραχμῶν κατά χλγ. Πόσον τιμᾶται τὸ χλγ. τοῦ μείγματος ;

*Λύσις.*

Τὰ 50 χλγ. πρὸς 22 δρχ. τὸ χλγ. τιμῶνται	$22 \times 50 = 1\ 100$	δρχ.
» 80 » » 24 » » » »	$24 \times 80 = 1\ 920$	»
» 70 » » 26 » » » »	$26 \times 70 = 1\ 820$	»

» 200 χλγ. τοῦ μείγματος τιμῶνται 4 840 δρχ.  
 \* Ἄρα 1 χλγ. τοῦ μείγματος τιμᾶται  $4\ 840 : 200 = 24,20$  δρχ.

*Παρατήρησις.* Εἰς τὰ προβλήματα αὐτοῦ τοῦ εἶδους δίδονται :  
**1ον.** Τὸ πλήθος τῶν ὁμοειδῶν μονάδων, αἱ ὁποῖαι ἀναμειγνύονται ἀπὸ κάθε εἶδος.

**2ον.** Ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος ἀπὸ κάθε εἶδος.

Ζητεῖται δὲ ἡ τιμὴ μιᾶς ὁμοειδοῦς μονάδος τοῦ μείγματος.

Διὰ νὰ εὐρωμεν δὲ αὐτὴν τὴν τιμὴν, διαιροῦμεν τὴν τιμὴν τοῦ μείγματος διὰ τοῦ πλήθους τῶν μονάδων αὐτοῦ.

#### Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

738 ) Ἀλευροπώλης ἀνέμειξεν 150 χλγ. ἀλεύρου τῶν 4,6 δρχ. κατὰ χλγ. μὲ 180 χλγ. ἄλλου τῶν 3,5 δρχ. κατὰ χλγ. Πόσον πρέπει νὰ πωλῆ τὸ χλγ. τοῦ μείγματος ;

739 ) Ἐνα βαρέλιον εἶναι πλήρες οἴνου τῶν 4,80 δρχ. κατὰ χλγ. Ἐξάγομεν τὸ  $\frac{1}{4}$  τοῦ περιεχομένου καὶ τὸ ἀντικαθιστῶμεν μὲ οἶνον τῶν 5,60 δρχ. κατὰ χλγ. Πόσον ἀξίζει τὸ χλγ. τοῦ μείγματος ;

740 ) Παντοπώλης ἀνέμειξεν 80 χλγ. λίπους τῶν 26 δραχμῶν τὸ χλγ. μὲ 20 χλγ. βουτύρου τῶν 50 δρχ. τὸ χλγ. Πόσον πρέπει νὰ πωλῆ τὸ χλγ. τοῦ μείγματος, διὰ νὰ κερδίζη 25% ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ μείγματος ;

741 ) Ἀνέμειξέ τις 50 χλγ. ἐλαίου τῶν 21 δρχ. κατὰ χλγ. μὲ 25 χλγ. τῶν 18 δρχ. κατὰ χλγ. Ἐὰν πωλῆ 24 δρχ. τὸ χλγ. πόσον τοῖς ἑκατὸν κερδίζει ;

742 ) Ἀνέμειξέ τις 5 χλγ. καφέ τῶν 48 δρχ. τὸ χλγ. μὲ 3 χλγ. καφέ τῶν 46 δραχμῶν τὸ χλγ. καὶ 2 χλγ. καφέ τῶν 45 δραχμῶν κατὰ χλγ. Τὸ μείγμα αὐτὸ καβουρδισθὲν ἔχασε τὸ  $\frac{1}{10}$  τοῦ βάρους του. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸ χλγ. τοῦ καβουρδισμένου καφέ :  
**1ον** χωρὶς κέρδος καὶ **2ον** μὲ κέρδος 20% ;

§ 341. Δεύτερον είδος. *Πρόβλημα.* "Έμπορος έχει βούτυρον τών 40 δραχμών τὸ χλγ. καὶ λίπος τών 16 δραχμών τὸ χλγ. Πόσα χλγ. πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ κάθε είδος, διὰ νὰ σχηματίσῃ μείγμα 120 χλγ., τὸ ὁποῖον νὰ πωλῆ πρὸς 25 δραχμὰς τὸ χλγ. ;

*Λύσις.* Ἡ ἀνάμειξις πρέπει νὰ γίνῃ κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε τὸ κέρδος, τὸ ὁποῖον θὰ προκύψῃ ἐκ τῆς κατωτέρας ποιότητος (λίπος) νὰ εἶναι ἴσον μὲ τὴν ζημίαν, ἢ ὁποῖα θὰ προκύψῃ ἐκ τῆς καλύτερας ποιότητος (βούτυρον).

Τὸ 1 χλγ. βουτύρου πωλεῖται χωριστὰ 40 δραχμὰς· ὅταν τεθῆ εἰς τὸ μείγμα, θὰ πωληθῆται 25 δραχμὰς. Ἄρα θὰ χάνῃ 15 δραχμὰς ἀπὸ κάθε χλγ. βουτύρου.

Τὸ 1 χλγ. λίπους πωλεῖται χωριστὰ 16 δραχμὰς· ὅταν ὁμως τεθῆ εἰς τὸ μείγμα, θὰ πωληθῆται 25 δρχ. Ἄρα θὰ κερδίζῃ 9 δραχμὰς ἀπὸ κάθε χλγ. λίπους.


Ἐὰν λοιπὸν λάβῃ ἀπὸ τὸ βούτυρον 9 χλγ. (δηλ. ὅσας δραχμὰς κερδίζει ἀπὸ τὸ 1 χλγ. τοῦ λίπους), θὰ χάσῃ εἰς τὸ μείγμα  $15 \times 9$  δραχμὰς, δηλαδὴ 135 δραχμὰς. Ἐὰν λάβῃ ἀπὸ τὸ λίπος 15 χλγ. (δηλ. ὅσας δραχμὰς χάνει ἀπὸ τὸ ἓνα χλγ. τοῦ βουτύρου), θὰ κερδίσῃ  $9 \times 15$  δρχ., δηλ. 135 δραχμὰς.

Παρατηροῦμεν ὅτι οὔτε θὰ χάνῃ οὔτε θὰ κερδίζῃ ὁ ἔμπορος, ἐὰν λαμβάνῃ ἀπὸ τὸ βούτυρον 9 χλγ. καὶ ἀπὸ τὸ λίπος 15 χλγ. Ὡστε κατ' αὐτὴν τὴν ἀναλογίαν πρέπει νὰ γίνῃ ἡ ἀνάμειξις : δηλ. ὅσας φορὰς θὰ λαμβάνῃ 9 χλγ. ἀπὸ τὸ βούτυρον, τόσας φορὰς πρέπει νὰ λαμβάνῃ ἀπὸ τὸ λίπος 15 χλγ.

Διὰ νὰ εὐρωμεν τώρα πόσα χλγ. πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸ βούτυρον καὶ πόσα ἀπὸ τὸ λίπος, διὰ νὰ σχηματίσῃ μείγμα 120 χλγ. πρέπει νὰ μερίσωμεν τὰ 120 χλγ. εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 9 καὶ 15. Ἐκτελοῦντες τὸν μερισμὸν εὐρίσκομεν ὅτι πρέπει νὰ λάβῃ :

$$\text{ἀπὸ τὸ βούτυρον } \frac{120 \times 9}{24} = 45 \text{ χλγ.}$$

$$\text{καὶ ἀπὸ τὸ λίπος } \frac{120 \times 15}{24} = 75 \text{ χλγ.}$$



**Σημειώσεις.** Εἰς τὴν πρᾶξιν σχηματίζομεν τὸν ἀνωτέρω πίνακα, εἰς τὸν ὁποῖον γράφομεν τὴν μίαν κάτωθι τῆς ἄλλης τὰς τιμὰς τῶν μονάδων τῶν δύο ἀναμειγνυομένων εἰδῶν καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὀλίγον δεξιὰ τὴν τιμὴν τῆς μονάδος τοῦ μείγματος. Ἐπειτα εὐρίσκομεν τὰς διαφορὰς  $40 - 25 = 15$  καὶ  $25 - 16 = 9$  δηλ. τὰς διαφορὰς ἀπὸ τὴν τιμὴν τῆς μονάδος τοῦ μείγματος, τὰς ὁποίας γράφομεν ἐπὶ τῆς διαγωνίου τῶν ἀφαιρουμένων τιμῶν καὶ εἰς τὸ ὕψος τῆς ἄλλης τιμῆς, καὶ μερίζομεν τὸν ἀριθμὸν 120 εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τὰς διαφορὰς αὐτάς. Τὸ μερίδιον, τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν α' διαφοράν, δηλοῖ χλγ. λίπους, τὸ δὲ ἄλλο μερίδιον διηλοῖ χλγ. βουτύρου.

**Παρατήρησις.** Εἰς τὰ προβλήματα τοῦ εἶδους αὐτοῦ δίδεται :

**1ον.** Ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος ἀπὸ ἑνα εἶδος καὶ ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος ἀπὸ ἑνα ἄλλο εἶδος.

**2ον.** Ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος τοῦ μείγματος.

Ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν εὐρίσκεται ἡ ἀναλογία τῆς ἀναμείξεως τῶν δύο εἰδῶν καὶ ἔπειτα αἱ ποσότητες ἀπὸ κάθε εἶδος, ἂν χρειασθῇ ὠρισμένη ποσότης μείγματος.

Εἶναι φανερόν ὅτι ὅλαι αἱ μονάδες αὐταὶ πρέπει νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς καὶ ὅτι ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μείγματος πρέπει νὰ εἶναι μεταξὺ τῶν τιμῶν τῶν μονάδων τῶν εἰδῶν, ποὺ ἀναμειγνύονται.

#### 'Α σ κ ή σ ε ι ς

Α'. (Ὁμάς, 743) Ἐχει τις οἶνον τῶν 6 δραχ. τὸ χλγ. καὶ τῶν 4 δραχ. τὸ χλγ. καὶ θέλει νὰ σχηματίσῃ μείγμα 400 χλγ., τοῦ ὁποῖου τὸ χλγ. νὰ τιμᾶται 5,50 δραχ. Πόσα χλγ. πρέπει νὰ λάβῃ ἐξ ἑκάστου εἶδους ;

744) Γεωργὸς ἔχει σῖτον τῶν 2,50 δρχ. κατὰ χλγ. καὶ κριθὴν τῆς 1,80 δρχ. κατὰ χλγ. καὶ θέλει νὰ σχηματίσῃ μείγμα 210 χλγ. καὶ συνο-

λικής αξίας 420 δραχ. Πόσα χλγ. πρέπει να λάβη ἕξ ἐκάστου εἶδους ;

745 ) Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν πρέπει νὰ ἀναμειξωμεν λίπος τῶν 20 δραχ. τὸ χλγ. καὶ βούτυρον τῶν 36 δραχ. τὸ χλγ., διὰ νὰ σχηματίσωμεν μείγμα τῶν 24 δραχ. τὸ χλγ. ;

Β'. Ὁ μ ἄ ς. 746 ) Ἀνέμειξέ τις 25 χλγ. ἐλαίου τῶν 23 δραχ. τὸ χλγ. μὲ 35 χλγ. ἄλλου καὶ ἐσχημάτισε μείγμα, τοῦ ὁποῖου τὸ χλγ. κοστίζει 22,30 δραχ. Πόσον κοστίζει τὸ χλγ. τοῦ δευτέρου εἶδους ;

747 ) Ἀνέμειξέ τις 130 χλγ. οἴνου τῶν 5,40 δραχ. κατὰ χλγ. μὲ 120 χλγ. ἄλλου οἴνου καὶ μὲ 50 χλγ. ὕδατος καὶ ἐσχημάτισε μείγμα, τὸ ὁποῖον ἐπώλει πρὸς 4,10 δραχ. τὸ χλγ. Πόσον ἐκόστισε τὸ χλγ. τοῦ οἴνου τοῦ δευτέρου εἶδους ;

748 ) Ἐνας παντοπώλης ἀνέμειξε 100 χλγ. βουτύρου ἀξίας 56 δραχ. τὸ χλγ. μὲ λίπος 24 δραχ. τὸ χλγ. Ἐπώλησε δὲ τὸ μείγμα πρὸς 42 δραχ. τὸ χλγ. καὶ ἐκέρδισε 310 δραχ. Πόσα χλγ. λίπους εἶχεν ἀναμείξει ;

749 ) Πῶς πρέπει νὰ ἀναμειξωμεν λίπος τῶν 20 δραχ. τὸ χλγ. μὲ βούτυρον τῶν 50 δραχ. τὸ χλγ., διὰ νὰ σχηματίσωμεν μείγμα, τὸ ὁποῖον νὰ πωλῶμεν πρὸς 51 δραχ. τὸ χλγ., διὰ νὰ κερδίζωμεν 20% ἐπὶ τῆς ἀξίας του ;

Λύσις. Εὐρίσκομεν πόσον κοστίζει τὸ χλγ. τοῦ μείγματος σκεπτόμενοι ὡς ἑξῆς :

Ὅταν πωλῆ τὸ χλγ. 120 δραχ. τοῦ κοστίζει 100 δραχ.

» » » » 51 » » » χ »

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα, θὰ εἶναι :

$$\chi = 100 \text{ δραχ.} \times \frac{51}{120} = 42,50 \text{ δραχ.}$$

Ἐπειτα λύομεν τὸ πρόβλημα κατὰ τὰ γνωστά.

750 ) Ἐχει τις δύο εἶδη ἀλεύρου τοῦ α' εἶδους τὸ χλγ. τιμᾶται 4,80 δραχ., τοῦ δὲ β' 3,60 δραχ. Πόσα χλγ. πρέπει νὰ λάβη ἕξ ἐκάστου εἶδους, διὰ νὰ σχηματίσῃ μείγμα 1 200 χλγ., τὸ ὁποῖον νὰ πωλῆ πρὸς 5 δραχ. τὸ χλγ., διὰ νὰ κερδίῃ οὕτως 25% ;

## 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ

§ 342. Ἐὰν συγχωνεύσωμεν διὰ τήξεως δύο ἢ περισσότερα μέταλλα, λαμβάνομεν ἓνα σῶμα, τὸ ὁποῖον λέγεται **κρᾶμα**. Ὁ λόγος τοῦ βάρους τοῦ πολυτίμου μετάλλου, τὸ ὁποῖον περιέχεται εἰς τὸ

κράμα, πρὸς τὸ βάρος τοῦ κράματος λέγεται **τίτλος ἢ βαθμὸς καθαρότητος** τοῦ κράματος.

Εὐκόλως φαίνεται, ὅτι ὁ τίτλος τοῦ κράματος συμπίπτει ἀριθμητικῶς μὲ τὸ βάρος τοῦ πολυτίμου μετάλλου, τὸ ὁποῖον περιέχεται εἰς μίαν μονάδα τοῦ κράματος.

Ὁ τίτλος ἐκφράζεται συνήθως εἰς **χιλιοστά**. Π.χ. ὅταν λέγωμεν ὅτι ἓνα χρυσοῦν κόσμημα ἢ ἓνα νόμισμα ἔχει τίτλον 0,900, σημαίνει ὅτι  $\frac{900}{1000}$  τοῦ βάρους τοῦ νομίσματος εἶναι καθαρὸς χρυσὸς καὶ ἐπομένως ἐπὶ τῶν 1 000 γραμμαρ. τοῦ νομίσματος μόνον τὰ 900 γραμμάρια εἶναι καθαρὸς χρυσὸς καὶ τὰ ἄλλα 100 γραμμάρια εἶναι ἄλλο μέταλλον μὴ πολύτιμον π.χ., χαλκός.

Ὁ τίτλος τῶν χρυσῶν κοσμημάτων ἐκφράζεται καὶ εἰς **καράτια**. Αὐτὰ δηλώνουν πόσα **εἰκοστὰ τέταρτα** τοῦ βάρους τοῦ κράματος εἶναι καθαρὸς χρυσός. Ὅταν λοιπὸν ἓνα κόσμημα εἶναι ἐκ καθαροῦ χρυσοῦ, λέγομεν ὅτι εἶναι 24 καρατίων. Ἄν δὲ ἓνα χρυσοῦν κόσμημα εἶναι 14 καρατίων, ἐννοοῦμεν ὅτι τὰ  $\frac{14}{24}$  τοῦ βάρους του εἶναι καθαρὸς χρυσὸς καὶ τὰ ὑπόλοιπα  $\frac{10}{24}$  του ἄλλα μέταλλα.

Τὰ προβλήματα τῶν κραμάτων λύονται ὅπως καὶ τὰ προβλήματα τῆς μείξεως.

§ 343. *Πρόβλημα 1ον.* Συγχωνεύομεν 25 γραμ. χρυσοῦ βαθμοῦ καθαρότητος 0,900 μὲ 35 γραμ. ἄλλου χρυσοῦ βαθμοῦ καθαρότητος 0,600. **Νὰ εὐρεθῇ ὁ τίτλος (βαθμὸς καθαρότητος) τοῦ κράματος.**

*Λύσις.* Τὰ 25 γρ. τοῦ α' εἶδ. περιέχ.  $0,900 \times 25 = 22,5$  γρ. καθ. χρ.

» 35 » » β' » »  $0,600 \times 35 = 21$  » » »

» 60 » » κράμ. περιέχ.  $43,5$  γρ. καθ. χρ.

» 1 » » »  $43,5 : 60 = 0,725$  » » »

Ὡστε ὁ τίτλος τοῦ κράματος εἶναι 0,725.

§ 344. *Πρόβλημα 2ον.* Χρυσοχόος ἔχει δύο εἶδη χρυσοῦ κράματος. Τοῦ α' εἶδους ὁ τίτλος εἶναι 0,900, τοῦ δὲ β' 0,750. Θέλει δὲ νὰ σχηματίσῃ κράμα 45 γραμμαρίων καὶ τίτλου 0,800. **Πόσον πρέπει νὰ λάβῃ ἐξ ἐκάστου εἶδους ;**

*Λύσις.* Τὸ 1 γραμμάριον τοῦ πρώτου εἶδους ἔχει 0,900 γραμ.

καθαροῦ χρυσοῦ. Ἐπειδὴ δὲ τὸ κράμα, θὰ ἔχη τίτλον 0,800, ἀπὸ 1 γραμ. τοῦ πρώτου εἴδους θὰ περισσεύσῃ εἰς τὸ κράμα  $0,900 - 0,800 = 0,100$  τοῦ γραμ. καθαροῦ χρυσοῦ.

Τὸ 1 γραμμάριον δευτέρου εἴδους ἔχει 0,750 γραμ. καθαροῦ χρυσοῦ. Ἐπειδὴ τὸ κράμα θὰ ἔχη τίτλον 0,800, ἀπὸ 1 γραμ. τοῦ δευτέρου εἴδους θὰ λείπη εἰς τὸ κράμα  $0,800 - 0,750 = 0,050$  τοῦ γραμ. καθαροῦ χρυσοῦ.


Ἐὰν λοιπὸν ἀπὸ τὸ πρῶτον εἶδος λάβῃ 0,050 τοῦ γραμ. θὰ ἔχη εἰς τὸ κράμα περίσσευμα  $0,100 \times 0,050$  τοῦ γραμ. καθαροῦ χρυσοῦ. Ἐὰν λάβῃ ἀπὸ τὸ δεύτερον εἶδος 0,100 τοῦ γραμ. θὰ ἔχη εἰς τὸ κράμα ἕνα ἔλλειμμα  $0,050 \times 0,100$  τοῦ γραμ. καθαροῦ χρυσοῦ.

Παρατηροῦμεν ὅτι οὔτε περίσσευμα οὔτε ἔλλειμμα καθαροῦ χρυσοῦ θὰ ὑπάρχῃ εἰς τὸ κράμα, ὅταν λαμβάνωμεν 0,050 γραμ. ἀπὸ τὸ α' εἶδος καὶ 0,100 γραμ. ἀπὸ τὸ β' εἶδος· ὥστε κατ' αὐτὴν τὴν ἀναλογίαν πρέπει νὰ γίνῃ ἡ συγχώνευσίς των.

Ἐπειδὴ θέλομεν νὰ σχηματίσωμεν κράμα 45 γραμ. πρέπει νὰ μερίσωμεν τὸν ἀριθμὸν 45 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 0,050 καὶ 0,100 ἢ τῶν ἀριθμῶν 5 καὶ 10. Ἐκτελοῦντες τὸν μερισμὸν, εὐρίσκομεν ὅτι πρέπει νὰ λάβωμεν :

ἀπὸ τὸ α' εἶδος  $\frac{45 \times 5}{15} = 15$  γραμ. καὶ ἀπὸ τὸ β' εἶδος  $\frac{45 \times 10}{15} = 30$  γραμ.

Κατάταξις :



Ἐναλογία  
συντήξεως

#### Ἄσκησεις

751) Ἐνας χρυσοχόος ἔτηξε μαζί 30 γραμμάρια ἀργυροῦ κράματος τίτλου 0,850 μὲ 12 γραμμάρια ἄλλου ἀργυροῦ κράματος τίτλου 0,880. Πόσος εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κράματος, τὸ ὁποῖον ἐσχηματίσθη ἀπὸ αὐτά ;

752) Ἐνας χρυσοχόος ἔτηξε μίαν χρυσὴν λίραν Ἀγγλίας μαζί μὲ μίαν ἀργυρᾶν δραχμὴν τῆς Λ.Ν.Ε. Μὲ τὸ κράμα δὲ αὐτῶν ἔκαμεν ἕνα χρυσοῦν κόσμημα. Πόσος εἶναι ὁ τίτλος αὐτοῦ ;

753 ) Ένας χρυσοχόος έχει δύο κράματα αργύρου. Το α' έχει τίτλον 0,900 και το β' 0,870. Θέλει δε να κάμη νέον κράμα βάρους 50 γραμμαρίων με τίτλον 0,890. Πόσον πρέπει να λάβη από κάθε είδος ;

754 ) Ένας χρυσοχόος έτηξε 50 γραμμάρια χρυσοῦ κράματος τίτλου 0,920 με άλλο κράμα τίτλου 0,900. Το κράμα τούτων έχει τίτλον 0,9125. Πόσα γραμμάρια έθεσεν από το β' κράμα ;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗ»  
ΜΕΣΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΣΕΚΤΟΡΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

§ 345. Εἰς τὸ Α΄ βιβλίον ἐμάθομεν ὅτι ἡ ἐκτέλεσις τῶν 4 πράξεων στηρίζεται ἐπὶ διαφόρων ἰδιοτήτων, τὰς ὁποίας συνηγάγομεν ἐκ τῆς διπλῆς λύσεως προβλημάτων τινῶν μὲ συγκεκριμένους ἀριθμούς. Ἐνταῦθα θὰ δικαιολογήσωμεν τὰς ἰδιότητας ἐκείνας, καθὼς καὶ ἄλλας, μὲ γενικωτέραν μέθοδον.

#### 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 346. Ἰδιότης I. Ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι  $\alpha = 5$  καὶ  $\beta = 5$ . Καθὲν ἄλλοι πλὴν ἀπὸ τοὺς ἀριθμούς  $\alpha$  καὶ  $\beta$  ἔχει 5 μονάδας, δηλ. τὸ αὐτὸ πλῆθος μονάδων. Εἶναι λοιπὸν  $\alpha = \beta$ . Ὅμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ἐὰν  $\alpha = \beta$  καὶ  $\beta = \gamma$ , θὰ εἶναι καὶ  $\alpha = \gamma$ . Ὡστε :

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ εἶναι ἴσοι πρὸς τρίτον, θὰ εἶναι καὶ μετὰξὺ τῶν ἴσοι.

Ἡ ἰδιότης αὕτη ἐκφράζεται καὶ ὡς ἑξῆς :

Ἐὰν δύο ἰσότητες ἔχουν τὰ δευτέρα μέλη τῶν ἴσα, θὰ ἔχουν ἴσα καὶ τὰ πρῶτα μέλη τῶν.

§ 347. Ἰδιότης II. Ἐστω ὅτι  $\alpha = 5$ . Ἐὰν προσθέσωμεν ἀπὸ μίαν μονάδα εἰς τὸν  $\alpha$  καὶ εἰς τὸν 5, τὰ δύο ἀθροίσματα θὰ ἔχουν ἴσον πλῆθος μονάδων. Θὰ εἶναι λοιπὸν  $\alpha + 1 = 5 + 1$ .

Ἐὰν δὲ εἰς αὐτοὺς τοὺς ἴσους ἀριθμούς  $\alpha + 1$  καὶ  $5 + 1$  προσθέσωμεν ἀπὸ μίαν μονάδα, εὐρίσκομεν  $\alpha + 2 = 5 + 2$ . ὁμοίως ἔπειτα  $\alpha + 3 = 5 + 3$ ,  $\alpha + 4 = 5 + 4$  κ.τ.λ. Καὶ γενικῶς  $\alpha + \mu = 5 + \mu$ , ὅσαοσδήποτε μονάδας καὶ ἂν ἔχη ὁ ἀριθμὸς  $\mu$ . Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Ἐὰν εἰς ἴσους ἀριθμούς προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, εὐρίσκομεν ἴσα ἀθροίσματα.

Ἡ ἰδιότης αὕτη ἐκφράζεται καὶ ὡς ἐξῆς :

Ἐὰν προσθέσωμεν καὶ εἰς τὰ δύο μέλη μιᾶς ἰσότητος τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, προκύπτει πάλιν ἰσότης.

§ 348. Ἰδιότης III. Ἐστωσαν δύο ἴσοι ἀριθμοὶ  $\alpha$  καὶ  $\beta$ . Εἶναι φανερὸν ὅτι ὅσας μονάδας ἔχει ὁ  $\alpha$ , ἄλλας τόσας μονάδας ἔχει καὶ ὁ  $\beta$ . Ἐὰν προσθέσωμεν εἰς αὐτοὺς ἀντιστοίχως δύο ἴσους ἀριθμοὺς  $\alpha'$  καὶ  $\beta'$ , θὰ εὕρωμεν προφανῶς δύο νέους ἴσους ἀριθμοὺς. Εἰς τοὺς νέους αὐτοὺς ἀριθμοὺς δυνάμεθα ἐπίσης νὰ προσθέσωμεν ἀντιστοίχως δύο ἴσους ἀριθμοὺς  $\alpha''$  καὶ  $\beta''$  καὶ οὕτω καθεξῆς.

Οὕτως, ἐὰν εἶναι  $\alpha = \beta$ ,  $\alpha' = \beta'$ ,  $\alpha'' = \beta''$ , ...  
θὰ εἶναι καὶ  $\alpha + \alpha' + \alpha'' + \dots = \beta + \beta' + \beta'' + \dots$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συναγομέν ὅτι :

Ἐὰν προσθέσωμεν δύο ἢ περισσοτέρας ἰσότητας κατὰ μέλη, προκύπτει πάλιν ἰσότης.

§ 349. Ἰδιότης IV. Ἐστω ὅτι  $\alpha = 5$ . Ἄν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ μίαν μονάδα καὶ ἀπὸ τοὺς δύο ἴσους ἀριθμοὺς  $\alpha$  καὶ 5, τὰ ὑπόλοιπα θὰ ἔχουν ἴσον πλῆθος μονάδων. Θὰ εἶναι δηλ.  $\alpha - 1 = 5 - 1$ .

Ἄν δὲ πάλιν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ μίαν μονάδα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἴσα ὑπόλοιπα, τὰ νέα ὑπόλοιπα θὰ ἔχουν ἴσον πλῆθος μονάδων. Θὰ εἶναι δηλ.  $\alpha - 2 = 5 - 2$ .

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ἄν  $\alpha = \beta$ , θὰ εἶναι καὶ  $\alpha - \mu = \beta - \mu$ , ἂν  $\alpha > \mu$ . Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

Ἄν ἀπὸ ἴσους ἀριθμοὺς ἀφαιρέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, εὕρισκομεν ἴσα ὑπόλοιπα.

Ἡ ἰδιότης αὕτη ἐκφράζεται καὶ ὡς ἐξῆς :

Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέλη μιᾶς ἰσότητος τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, προκύπτει πάλιν ἰσότης.

§ 350. Ἰδιότης V. Μὲ ἀναλόγους συλλογισμοὺς πρὸς ἐκείνους, ποὺ ἐκάμαμεν εἰς τὴν § 348 εὕρισκομεν ὅτι, ἐὰν εἶναι  $\alpha = \beta$  καὶ  $\alpha' = \beta'$ , θὰ εἶναι  $\alpha - \alpha' = \beta - \beta'$ , ἄρκει νὰ εἶναι  $\alpha > \alpha'$ . Δηλαδή :

Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν δύο ἰσότητας κατὰ μέλη, προκύπτει πάλιν ἰσότης.

§ 351. **Ίδιότης VI.** "Αν  $\alpha = \beta$ , κατά την ιδιότητα II (§ 347),  
 θά είναι και  $\alpha + \alpha = \beta + \beta$  ή  $\alpha \cdot 2 = \beta \cdot 2$ .

Ή από αυτήν δε εύρισκομεν ὅτι :

$$\alpha + \alpha + \alpha = \beta + \beta + \beta \text{ κ.τ.λ. ή } \alpha \cdot 3 = \beta \cdot 3.$$

$$\text{Γενικῶς } \alpha \cdot \mu = \beta \cdot \mu.$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι :

"Αν πολλαπλασιάσωμεν δύο ἴσους ἀριθμούς ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον, εύρισκομεν ἴσα γινόμενα.

Ἡ ιδιότης αὐτὴ ἐκφράζεται καὶ ὡς ἐξῆς :

α') Τὰ ἰσοπολλαπλάσια ἴσων ἀριθμῶν εἶναι ἴσοι ἀριθμοί.

β') Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν καὶ τὰ δύο μέλη μιᾶς ἰσότητος ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον, προκύπτει πάλιν ἰσότης.

§ 352. **Ίδιότης VII.** Ἐστω  $\alpha = \beta$ . "Αν διαιρέσωμεν τὸν  $\alpha$  διὰ 3, εύρισκομεν ἓνα πηλίκον, ἔστω Π. Ἐπίσης, ἂν διαιρέσωμεν τὸν  $\beta$  διὰ 3, εύρισκομεν ἓνα πηλίκον Π'. Δηλαδή εἶναι :

$$\alpha : 3 = \Pi \text{ καὶ } \beta : 3 = \Pi' \text{ ( } \Pi \text{ καὶ } \Pi' \text{ ὑποτίθενται ἀκέραιοι ).}$$

Ή από αὐτὰς εύρισκομεν :  $\alpha = 3 \Pi$  καὶ  $\beta = 3 \cdot \Pi'$ .

Ή από τὰς τελευταίας ἰσότητας βλέπομεν ὅτι, ἂν ὁ 3 ἐπαναληφθῆ Π φορές, γίνεται  $\alpha$ . "Αν δὲ ὁ 3 ἐπαναληφθῆ Π' φορές, γίνεται  $\beta$ , ἥτοι πάλιν  $\alpha$ . Ἐπομένως θά εἶναι  $\Pi = \Pi'$ . Ἦτοι  $\alpha : 3 = \beta : 3$ .

Ὁμοίως ἀποδεικνύομεν ὅτι  $\alpha : \mu = \beta : \mu$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Ἐὰν διαιρέσωμεν δύο ἴσους ἀκεραίους διὰ τινος διαιρέτου των, εύρισκομεν ἴσα πηλικά.

Ἡ ιδιότης αὐτὴ ἐκφράζεται καὶ ὡς ἐξῆς :

Ἐὰν διαιρέσωμεν καὶ τὰ δύο μέλη μιᾶς ἰσότητος διὰ τοῦ αὐτοῦ διαιρέτου των, προκύπτει πάλιν ἰσότης.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

1) "Αν  $\chi = \psi$  καὶ  $\alpha \neq 0$ , συγκρίνατε τοὺς ἀριθμούς  $\alpha\chi + \beta$  καὶ  $\alpha\psi + \beta$ .

2) "Αν  $\chi - 3 = 7$ , νὰ εύρεθῆ ὁ  $\chi$ .

3) "Αν  $\chi + 2 = 8$ , νὰ εύρεθῆ ὁ  $\chi$ .

4) "Αν  $\chi = \psi$ ,  $\mu \neq 0$  καὶ  $\alpha = \beta$ , συγκρίνατε τοὺς ἀριθμούς  $\mu\chi - \alpha$  καὶ  $\mu\psi - \beta$ .

## 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 353. **Ίδιότης I.** Ἐστω ὅτι  $\alpha > 6$ . Τοῦτο σημαίνει ὅτι μερικαὶ μονάδες τοῦ  $\alpha$  δὲν ἔχουν ἀντιστοίχους μονάδας εἰς τὸν 6.

Ἄν εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀριθμοὺς  $\alpha$  καὶ 6 προσθέσωμεν ἀπὸ μίαν μονάδα, εὐρίσκομεν τοὺς ἀριθμοὺς  $\alpha + 1$  καὶ  $6 + 1 = 7$ .

Ἐπειδὴ δὲ αὐταὶ αἱ προσθεθεῖσαι μονάδες ἀντιστοιχοῦν πρὸς ἀλλήλας, ὅσαι μονάδες τοῦ  $\alpha$  δὲν εἶχον ἀντιστοίχους εἰς τὸν 6, αὐταὶ αἱ μονάδες τοῦ  $\alpha + 1$  δὲν θὰ ἔχουν ἀντιστοίχους εἰς τὸν  $6 + 1$ .

Θὰ εἶναι λοιπὸν  $\alpha + 1 > 6 + 1$ .

Διὰ τὸν ἴδιον λόγον ἀπὸ τὴν ἀνισότητα  $\alpha + 1 > 6 + 1$  προκύπτει ἡ ἀνισότης  $\alpha + 2 > 6 + 2$

ἀπὸ αὐτὴν ἡ  $\alpha + 3 > 6 + 3$  καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς,  $\alpha + \mu > 6 + \mu$ , ὅσασδήποτε μονάδας καὶ ἂν ἔχη ὁ  $\mu$ .

Γενικῶς λοιπὸν : Ἄν  $\alpha > \beta$ , θὰ εἶναι καὶ  $\alpha + \mu > \beta + \mu$ . Ὡστε :

**Ἄν εἰς ἀνίσους ἀριθμοὺς προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, εὐρίσκομεν ὁμοίως ἄνισα ἄθροισματα.**

Δηλαδή εὐρίσκομεν μεγαλύτερον ἄθροισμα ἀπὸ τὸν μεγαλύτερον ἀριθμὸν καὶ μικρότερον ἄθροισμα ἀπὸ τὸν μικρότερον ἀριθμὸν.

§ 354. **Ίδιότης II.** Ἐστω ὅτι  $\alpha > 8$  καὶ  $\beta > 10$ . Κατὰ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα θὰ εἶναι :

$$\alpha + \beta > 8 + \beta \quad \text{καὶ} \quad 8 + \beta > 8 + 10.$$

Ἀπὸ αὐτὰς λοιπὸν τὰς ἀνισότητας βλέπομεν ὅτι ὁ  $\alpha + \beta$  εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν μεγαλύτερον τῶν δύο ἄλλων ἀριθμῶν  $8 + \beta$  καὶ  $8 + 10$ . Κατὰ μείζονα λοιπὸν λόγον θὰ εἶναι  $\alpha + \beta > 8 + 10$ .

Ὅμοίως ἐννοοῦμεν ὅτι :

Ἄν  $\alpha > \beta$  καὶ  $\gamma > \delta$ , θὰ εἶναι καὶ  $\alpha + \gamma > \beta + \delta$ . Ὡστε :

**Ἄν εἰς ἀνίσους ἀριθμοὺς προσθέσωμεν ἀνίσους, ἀλλὰ τὸν μεγαλύτερον εἰς τὸν μεγαλύτερον καὶ τὸν μικρότερον εἰς τὸν μικρότερον, προκύπτουν ἀριθμοὶ ὁμοίως ἄνισοι.**

§ 355. **Ίδιότης III.** Ἀπὸ τὰς ἀνισότητος  $\alpha > \beta$  καὶ  $\alpha > \beta$  κατὰ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\alpha + \alpha > \beta + \beta \quad \text{ἢ} \quad \alpha \cdot 2 > \beta \cdot 2.$$

Ἀπὸ δὲ τὰς ἀνισότητος  $\alpha + \alpha > \beta + \beta$  καὶ  $\alpha > \beta$  προκύπτει ἡ ἀνισότης  $\alpha + \alpha + \alpha > \beta + \beta + \beta$  ἢ  $\alpha \cdot 3 > \beta \cdot 3$ .

Ἄν δὲ ἐξακολουθήσωμεν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, ἐννοοῦμεν ὅτι καὶ  $\alpha \cdot \mu > \beta \cdot \mu$ , οἷοσδήποτε  $\neq 0$  καὶ ἂν εἶναι ὁ  $\mu$ . Ὡστε :

Ἄν πολλαπλασιάσωμεν δύο ἀνίσους ἀριθμοὺς ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀκέραιον  $\neq 0$ , εὐρίσκομεν ὁμοίως ἄνισα γινόμενα.

Ἡ ιδιότης αὕτῃ ἐκφράζεται καὶ ὡς ἑξῆς :

Τὰ ἰσοπολλαπλάσια ἀνίσων ἀριθμῶν εἶναι ὁμοίως ἄνισοι ἀριθμοί.

§ 356. Ἰδιότης IV. Ἐστω ὅτι  $\alpha > \beta$  καὶ  $\alpha:3 = \pi$ ,  $\beta:3 = \pi'$ .

Ἀπὸ τὰς ἰσότητος αὐτὰς εὐρίσκομεν ὅτι :

$\alpha = 3 \cdot \pi$  καὶ  $\beta = 3 \cdot \pi'$  ( $\pi$  καὶ  $\pi'$  ὑποτίθενται ἀκέραιοι).

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι, ἂν ὁ 3 ἐπαναληφθῇ  $\pi'$  φορές, γίνεται  $\beta$ .

Ἐπειδὴ δὲ ἐξ ὑποθέσεως εἶναι  $\alpha > \beta$ , πρέπει ὁ 3 νὰ ἐπαναληφθῇ περισσοτέρας ἀπὸ  $\pi'$  φορές, διὰ νὰ δώσῃ τὸν  $\alpha$ . Ἄρα πρέπει νὰ εἶναι :

$$\pi > \pi' \quad \text{ἢ} \quad \alpha : 3 > \beta : 3.$$

Ὡστε :

Ἄν διαιρέσωμεν δύο ἀνίσους ἀριθμοὺς διὰ τινος διαιρέτου των, εὐρίσκομεν ὁμοίως ἄνισα πηλικά.

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

5) Ἄν εἶναι  $\chi > \psi$  καὶ  $\alpha \neq 0$ , συγκρίνατε τοὺς ἀριθμοὺς  $\alpha\chi + \beta$  καὶ  $\alpha\psi + \beta$ .

6) Ἄν εἶναι  $\chi > \psi$ ,  $\alpha \neq 0$  καὶ  $\gamma = \delta$ , συγκρίνατε τοὺς ἀριθμοὺς  $\alpha\chi + \gamma$  καὶ  $\alpha\psi + \delta$ .

7) Ἄν εἶναι  $\chi > \psi$ ,  $\alpha > \beta$  καὶ  $\gamma > \delta$ , συγκρίνατε τοὺς ἀριθμοὺς  $\alpha\chi$  καὶ  $\beta\psi$ . Ἐπειτα δὲ τοὺς ἀριθμοὺς  $\alpha\chi + \gamma$  καὶ  $\beta\psi + \delta$ .

### 3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΩΣ

§ 357. Θεώρημα I. Τὸ ἄθροισμα πολλῶν ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, καθ' οἷανδήποτε τάξιν καὶ ἂν προστεθοῦν αὐτοί.

Ἐστω τὸ ἄθροισμα  $3 + 5 + 7 + 4$  λέγω (= θὰ ἀποδείξω) ὅτι τοῦτο εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἄθροισμα  $4 + 5 + 7 + 3$ , (τὸ β' ἄθροισμα προέκυψεν ἐκ τοῦ α' δι' ἀλλαγῆς τῆς τάξεως τῶν προσθετέων). Δηλαδή λέγω ὅτι :  $3 + 5 + 7 + 4 = 4 + 5 + 7 + 3$ .

**Ἀπόδειξις.** Ἐκαστον ἐκ τῶν ἄθροισμάτων τούτων ἀποτελεῖται ἐκ τῶν μονάδων τῶν προσθετέων 3, 5, 7, 4, καὶ μόνον ἐξ αὐτῶν. Συνεπῶς εἰς ἐκάστην μονάδα τοῦ α' ἄθροίσματος ἀντιστοιχεῖ μία μονὰς τοῦ β' καὶ ἀντιστρόφως· εἰς ἐκάστην μονάδα τοῦ β' ἄθροίσματος ἀντιστοιχεῖ μία τοῦ α'. Θὰ εἶναι λοιπὸν

$$3 + 5 + 7 + 4 = 4 + 5 + 7 + 3.$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = \beta + \gamma + \delta + \alpha$$

**Σημείωσις.** Ἡ ιδιότης αὕτη εἶναι **θεμελιώδης**, διότι ἐπ' αὐτῆς στηρίζεται ἡ ἀπόδειξις τῶν ἄλλων ιδιοτήτων τῆς προσθέσεως.

Λέγεται δὲ καὶ **ιδιότης τῆς ἀντιμεταθέσεως**, ὡς καὶ ἄλλοτε εἴπομεν (§ 30).

§ 358. **Ὅρισμοί.** Διὰ σειρᾶς συλλογισμῶν ἐπέισθημεν ὅτι ἡ πρότασις τῆς § 357 εἶναι ἀληθής.

Σειρὰ συλλογισμῶν ἢ καὶ ἓνας συλλογισμὸς, διὰ τῶν ὁποίων πειθόμεθα ὅτι μία πρότασις εἶναι ἀληθής, λέγεται **ἀπόδειξις**.

Κάθε δὲ πρότασις, τῆς ὁποίας ἡ ἀλήθεια γίνεται φανερά διὰ τῆς ἀποδείξεως, λέγεται **θεώρημα**.

Ἵστε ἡ πρότασις τῆς § 357 εἶναι ἓνα θεώρημα.

§ 359. **Θεώρημα II.** Τὸ ἄθροισμα δοθέντων ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἂν μερικοὶ προσθετέοι ἀντικατασταθοῦν μὲ τὸ ἄθροισμά των.

Ἐστω τὸ ἄθροισμα  $5 + 8 + 7 + 4$ . Λέγω ὅτι τοῦτο εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἄθροισμα  $5 + 12 + 7$ , τὸ ὁποῖον προέκυψεν ἐκ τοῦ δοθέντος ἄθροίσματος, ἀφοῦ ἀντικατεστήσαμεν τοὺς προσθετέους 8 καὶ 4 διὰ τοῦ ἄθροίσματός των 12.

Δηλαδή λέγω ὅτι:  $5 + 8 + 7 + 4 = 5 + 12 + 7$ .

**Ἀπόδειξις.** Κατὰ τὴν θεμελιώδη ιδιότητα τῆς προσθέσεως, τὸ ἄθροισμα  $5 + 8 + 7 + 4$  εἶναι ἴσον

μὲ τὸ  $8 + 4 + 5 + 7$ . Ἴνα εὕρωμεν

ὁμῶς τὸ ἄθροισμα  $8 + 4 + 5 + 7$ , πρέ-

πει εἰς τὸν 8 νὰ προσθέσωμεν τὸν 4, εἰς

τὸ ἄθροισμα 12 νὰ προσθέσωμεν τὸν 5

Περίληψις ἀποδείξεως

$$5 + 8 + 7 + 4 = 8 + 4 + 5 + 7$$

$$= 12 + 5 + 7$$

$$= 5 + 12 + 7$$

κ.ο.κ. Ἐὰν ὁμως σταματήσωμεν τὴν πρόσθεσιν μέχρι τοῦ 5, δὲν βλάπτει τὸ ἐξαγόμενον. Θὰ εἶναι λοιπόν :

$$8 + 4 + 5 + 7 = 12 + 5 + 7 \quad (1)$$

$$\text{Ἄλλὰ καὶ} \quad 12 + 5 + 7 = 5 + 12 + 7 \quad (2)$$

Ἀπὸ τὰς ἰσότητας (1) καὶ (2) βλέπομεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ  $8+4+5+7$  καὶ  $5+12+7$  εἶναι ἴσοι πρὸς τὸν ἀριθμὸν  $12+5+7$ . Ἄρα, κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς § 346, θὰ εἶναι :

$$8 + 4 + 5 + 7 = 5 + 12 + 7 \quad \text{καὶ ἐπειδὴ εἶναι } 5 + 8 + 7 + 4 = 8 + 4 + 5 + 7, \text{ ἔπεται ὅτι: } 5 + 8 + 7 + 4 = 5 + 12 + 7.$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\boxed{\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = \alpha + (\beta + \delta) + \gamma + \epsilon = \alpha + (\beta + \delta + \epsilon) + \gamma}$$

Ἡ ιδιότης αὕτη λέγεται *συνθετική*.

§ 360. *Θεώρημα III.* Ἐὰν εἰς ἄθροισμα ἀντικαταστήσωμεν προσθετέον τινὰ μὲ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν αὐτὸν ὡς ἄθροισμα, τὸ ἀρχικὸν ἄθροισμα δὲν μεταβάλλεται.

Ἡ ἀπόδειξις τοῦ θεωρήματος εἶναι ἄμεσος συνέπεια τῆς προηγουμένης ιδιότητος.

Πράγματι, ἐὰν ἐναλλάξωμεν τὰ μέλη τῆς εὐρεθείσης ἰσότητος  $5+8+7+4=5+12+7$ , θὰ εἶναι  $5+12+7=5+8+7+4$ .

$$\text{Γενικῶς θὰ εἶναι: } \boxed{\alpha + (\beta + \gamma) + \delta = \alpha + \beta + \gamma + \delta}$$

Ἡ ιδιότης αὕτη λέγεται *ἀναλυτική*.

§ 361. *Θεώρημα IV.* Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἀριθμὸν εἰς ἄθροισμα, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν αὐτὸν εἰς ἓνα ἀπὸ τοὺς προσθετέους τοῦ ἄθροίσματος, τοὺς δὲ ἄλλους νὰ ἀφήσωμεν, ὅπως ἔχουσιν.

\*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ προσθέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 8 εἰς τὸ ἄθροισμα  $7+5+6$ , ἥτοι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα  $(7+5+6)+8$ . Λέγω ὅτι εἶναι  $(7+5+6)+8=7+13+6$ , (ὁ 13 προέκυψε ἐκ τῆς προσθέσεως τοῦ 8 καὶ τοῦ 5).

Ἄπόδειξις. Ἐὰν εἰς τὸ ἄθροισμα  $(7+5+6)+8$  ἀντικαταστήσωμεν τὸν προσθετέον  $(7+5+6)$  διὰ τῶν προσθετέων 7, 5, 6.

αυτοῦ, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$(7+5+6)+8=7+5+6+8, \quad \left| \begin{array}{l} \text{Περίληψις ἀποδείξεως} \\ (7+5+6)+8=7+5+6+8, \\ \text{ἀλλὰ } 7+5+6+8=7+13+6(\text{διατί;}) \quad =7+13+6. \end{array} \right.$$

\*Ἄρα θὰ εἶναι καὶ  $(7+5+6)+8=7+13+6$ .

Γενικῶς εἶναι :

$$\boxed{(\alpha+\beta+\gamma)+\delta=\alpha+(\beta+\delta)+\gamma}$$

§ 362. *Θεώρημα V. Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἀθροίσματα, σχηματίζομεν ἓν ἄθροισμα, τὸ ὁποῖον νὰ περιέχη ὅλους τοὺς προσθετέους τῶν δοθέντων ἀθροισμάτων καὶ μόνον αὐτοῦς.*

\*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ προσθέσωμεν τὰ ἀθροίσματα :

$$\alpha + \beta + \gamma \quad \text{καὶ} \quad \delta + \epsilon + \zeta$$

ἦτοι θέλομεν νὰ εὐρώμεν τὸ ἄθροισμα :  $(\alpha+\beta+\gamma) + (\delta+\epsilon+\zeta)$ .

Λέγω ὅτι :

$$(\alpha+\beta+\gamma) + (\delta+\epsilon+\zeta) = \alpha+\beta+\gamma+\delta+\epsilon+\zeta.$$

\**Ἀπόδειξις.* \*Ἄν εἰς τὸ ἄθροισμα  $(\alpha+\beta+\gamma) + (\delta+\epsilon+\zeta)$  ἀντικαταστήσωμεν τὸν προσθετέον  $(\alpha+\beta+\gamma)$  διὰ τῶν προσθετέων  $\alpha, \beta, \gamma$  αὐτοῦ, καὶ τὸν προσθετέον  $(\delta+\epsilon+\zeta)$  διὰ τῶν προσθετέων  $\delta, \epsilon, \zeta$  αὐτοῦ, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$\boxed{(\alpha+\beta+\gamma)+(\delta+\epsilon+\zeta)=\alpha+\beta+\gamma+\delta+\epsilon+\zeta}$$

#### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

8) Διατί ἀρχίζομεν τὴν πρόσθεσιν ἐκ δεξιῶν ; εἰς ποίαν περίπτωσιν δυνάμεθα νὰ τὴν ἀρχίσωμεν ἐξ οἰασδήποτε στήλης ;

9) Ποίαν μεταβολὴν ὑφίσταται τὸ ἄθροισμα  $18 + 27 + 32$ , ἂν αὐξήσωμεν τὸν 18 κατὰ 12 καὶ τὸν 32 κατὰ 8 ;

10) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι  $(14 + 19 + 32) + 7 = 70 + 2$ .

11) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι  $45 + 12 + 21 + 19 + 23 = 40 + 80$ .

12) Νὰ μετασχηματισθῇ τὸ ἄθροισμα  $32 + 14 + 3 + 11$  εἰς ἄθροισμα ἰσοδύναμον μὲ δύο προσθετέους, οἱ ὅποιοι λήγουν εἰς 5.

13) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι  $(13+28) + (35+22+9) + (7+3) = 55+62$

14) Τί γίνεται τὸ ἄθροισμα πέντε ἀριθμῶν, ὅταν τοὺς αὐξήσωμεν ἀντιστοίχως κατὰ 11, 12, 25, 47, 65 ;

## Περίληψις τῶν ιδιοτήτων τῆς προσθέσεως

1.	$\alpha + \beta + \gamma + \delta$	$= \beta + \delta + \gamma + \alpha$
2.	$\alpha + \beta + \gamma + \delta$	$= \alpha + (\beta + \gamma) + \delta$
3.	$\alpha + (\beta + \gamma) + \delta$	$= \alpha + \beta + \gamma + \delta$
4.	$(\alpha + \beta + \gamma) + \delta$	$= \alpha + (\beta + \delta) + \gamma$
5.	$(\alpha + \beta + \gamma) + (\delta + \epsilon)$	$= \alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon$

## 4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 363. *Θεώρημα I.* Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀριθμὸν ἀπὸ ἄθροισμα, δυνάμεθα νὰ ἀφαιρέσωμεν αὐτὸν ἀπὸ ἓνα μόνον προσθετὸν τοῦ ἀθροίσματος, τοὺς δὲ ἄλλους νὰ ἀφήσωμεν, ὅπως ἔχουν.

\*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 6 ἀπὸ τὸ ἄθροισμα  $(8 + 4 + 9)$ , ἥτοι νὰ εὕρωμεν τὴν διαφορὰν  $(8 + 4 + 9) - 6$ .

Λέγω ὅτι  $(8 + 4 + 9) - 6 = 8 + 4 + 3$  (ἀφήρεσα τὸν 6 ἀπὸ τὸν 9).

\**Ἀπόδειξις.* Ἐὰν προσθέσωμεν εἰς τὴν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον εὐρεθεῖσαν διαφορὰν  $8 + 4 + 3$  τὸν ἀφαιρετέον 6, θὰ εὕρωμεν τὸν μειωτέον. Πράγματι εἶναι  $(8 + 4 + 3) + 6 = 8 + 4 + 9$  (διατί ;)

Γενικῶς θὰ εἶναι :  $(\alpha + \beta + \gamma) - \delta = \alpha + (\beta - \delta) + \gamma$  ἔὰν  $\beta > \delta$

§ 364. *Πόρισμα.* Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ ἓνα ἄθροισμα ἓνα ἐκ τῶν προσθετέων του, ἀρκεῖ νὰ ἐξαλείψωμεν τὸν προσθετὸν αὐτὸν ἅπαξ.

\*Ἐστω ὅτι ἔχομεν νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ ἄθροισμα  $(10 + 8 + 7)$  ἓνα ἐκ τῶν προσθετέων του, π.χ., τὸν 7, ἥτοι νὰ εὕρωμεν τὴν διαφορὰν  $(10 + 8 + 7) - 7$ .

Λέγω ὅτι  $(10 + 8 + 7) - 7 = 10 + 8$  (ἐξήλειψα τὸν 7).

\**Ἀπόδειξις.* Κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα θὰ εἶναι :  
 $(10 + 8 + 7) - 7 = 10 + 8 + (7 - 7)$ . Ἀλλὰ  $7 - 7 = 0$ . Ὅθεν  
 $(10 + 8 + 7) - 7 = 10 + 8$ .

Γενικῶς θὰ εἶναι :  $(\alpha + \beta + \gamma) - \beta = \alpha + \gamma$  καὶ  
 $(\alpha + \beta + \gamma + \beta) - \beta = \alpha + \beta + \gamma$

**Πόρισμα** καλεῖται κάθε πρότασις, τῆς ὁποίας ἡ ἀλήθεια συνάγεται ἀμέσως ἐκ μιᾶς ἢ περισσοτέρων ἀληθῶν προτάσεων.

§ 365. *Θεώρημα II.* Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἄθροισμα ἀπὸ ἀριθμὸν, δυνάμεθα νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τὸν πρῶτον προσθετόν τοῦ ἄθροισματος, ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον τὸν δεύτερον, ἀπὸ τὸ νέον ὑπόλοιπον τὸν τρίτον κ.ο.κ., μέχρις ὅτου ἀφαιρεθοῦν ὅλοι οἱ προσθετοί.

\*Ἐστω ὅτι θέλομεν ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 100 νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ ἄθροισμα  $8 + 12$ , ἥτοι νὰ εὗρωμεν τὴν διαφοράν  $100 - (8 + 12)$ . Λέγω ὅτι ἀρκεῖ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν 100 τὸν 8, καὶ ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον  $(100 - 8)$  νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν 12, ἥτοι λέγω ὅτι :

$$100 - (8 + 12) = (100 - 8) - 12.$$

\**Ἀπόδειξις.* Ἐὰν ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 100 ἀφαιρέσωμεν τὸ ἄθροισμα  $8 + 12$  ἢ τὸ ἴσον του 20, εὕρισκομεν ὑπόλοιπον 80.

$$\text{Θὰ εἶναι λοιπὸν } 100 - (8 + 12) = 80 \quad (1)$$

ἢ, κατὰ τὸν γενικὸν ὀρισμὸν τῆς ἀφαιρέσεως (§ 43)

$$100 = (8 + 12) + 80 \quad \text{ἢ} \quad 100 = 8 + 12 + 80, \quad (2)$$

ἐπειδὴ  $(8 + 12) + 80 = 8 + 12 + 80$ .

\*Ἄν ἀφαιρέσωμεν καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέλη τῆς ἰσότητος (2) τὸν 8, θὰ εἶναι :

$$100 - 8 = (8 + 12 + 80) - 8 \quad \text{ἢ} \quad 100 - 8 = 12 + 80 \quad (\text{διατί ;})$$

\*Ἄν ἀφαιρέσωμεν πάλιν καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέλη τῆς τελευταίας ἰσότητος τὸν 12, θὰ εἶναι :

$$(100 - 8) - 12 = (12 + 80) - 12 \quad \text{ἢ} \quad (100 - 8) - 12 = 80 \quad (3)$$

Συγκρίνοντες τὰς ἰσότητας (1) καὶ (3) παρατηροῦμεν ὅτι τὰ δεύτερα μέλη των εἶναι ἴσα, ἄρα εἶναι ἴσα καὶ τὰ πρῶτα μέλη, ἥτοι :

$$100 - (8 + 12) = (100 - 8) - 12.$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\boxed{A - (\alpha + \beta + \gamma) = [(A - \alpha) - \beta] - \gamma}$$

§ 366. *Θεώρημα III.* Διὰ νὰ προσθέσωμεν διαφοράς, δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν χωριστὰ τοὺς μειωτέους καὶ χωριστὰ τοὺς ἀφαιρετέους, καὶ ἀπὸ τὸ πρῶτον ἄθροισμα νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ δεύτερον.

\*Εστω ὅτι θέλομεν νὰ προσθέσωμεν τὰς διαφορὰς  $38 - 17$  καὶ  $29 - 14$ , ἤτοι νὰ εὐρώμεν τὸ ἄθροισμα  $(38 - 17) + (29 - 14)$ , χωρὶς ἔννοεῖται νὰ ἐκτελέσωμεν τὰς ἀφαιρέσεις. Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ εὐρώμεν τὸ ἄθροισμα τοῦτο, ἂν ἀπὸ τοῦ ἄθροίσματος τῶν μειωτέων ἀφαιρέσωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν ἀφαιρετέων. \*Ἦτοι λέγω ὅτι :

$$(38 - 17) + (29 - 14) = (38 + 29) - (17 + 14).$$

\**Ἀπόδειξις.* Γνωρίζομεν ὅτι :

$$38 - 17 = 21 \quad (1), \quad \text{ἄρα } 38 = 17 + 21 \quad (1')$$

$$29 - 14 = 15 \quad (2), \quad \text{ἄρα } 29 = 14 + 15 \quad (2')$$

Προσθέτοντες τὰς (1) καὶ (2) κατὰ μέλη εὐρίσκομεν ὅτι :

$$(38 - 17) + (29 - 14) = 21 + 15. \quad (3)$$

Προσθέτοντες καὶ τὰς ἰσότητας (1') καὶ (2') κατὰ μέλη ἔχομεν :

$$38 + 29 = (17 + 14) + (21 + 15).$$

\*Ἀφαιροῦντες καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέλη αὐτῆς τὸ  $(17 + 14)$  εὐρίσκομεν ὅτι :  $(38 + 29) - (17 + 14) = 21 + 15.$  (4)

Συγκρίνοντας τὰς ἰσότητας (3) καὶ (4) παρατηροῦμεν ὅτι τὰ δεύτερα μέλη εἶναι ἴσα, ἄρα θὰ εἶναι καὶ τὰ πρῶτα· ἤτοι θὰ εἶναι  $(38 - 17) + (29 - 14) = (38 + 29) - (17 + 14).$

*Σημείωσις.* Διὰ νὰ εὐρώμεν τὸ ἄθροισμα  $(12-7) + (18-2) + (10-6)$ , εὐρίσκομεν πρῶτον ὅτι  $(12-7) + (18-2) = (12+18) - (7+2)$  καὶ ἔπειτα  $[(12+18)-(7+2)] + (10-6) = (12+18+10) - (7+2+6)$ .  
\*Ὡστε :  $(12-7) + (18-2) + (10-6) = (12+18+10) - (7+2+6).$

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\boxed{(\alpha - \beta) + (\gamma - \delta) + (\epsilon - \zeta) = (\alpha + \gamma + \epsilon) - (\beta + \delta + \zeta)}$$

§ 367. *Θεώρημα IV.* \*Ἡ διαφορὰ δύο ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν καὶ εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς.

\*Εστω ἡ διαφορὰ  $25 - 12$ . λέγω ὅτι, ἂν προσθέσωμεν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, π.χ. τὸν 8, καὶ εἰς τὸν μειωτέον 25 καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον 12, ἡ διαφορὰ  $25 - 12$  δὲν μεταβάλλεται. \*Ἦτοι λέγω ὅτι :

$$25 - 12 = (25 + 8) - (12 + 8).$$

\**Ἀπόδειξις.* Εἶναι προφανές ὅτι, ἂν εἰς τὴν διαφορὰν  $25 - 12$  προσθέσωμεν τὴν διαφορὰν  $8 - 8$ , ἡ ὁποία εἶναι μηδέν, ἡ διαφορὰ  $25 - 12$  δὲν μεταβάλλεται· ἤτοι εἶναι :

$$25 - 12 = (25 - 12) + (8 - 8). \quad (1)$$

Εἰς τὸ β' μέλος ὁμως τῆς ἰσότητος (1) ἔχομεν νὰ προσθέσωμεν διαφορὰς καὶ κατὰ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα θὰ εἶναι :

$$(25 - 12) + (8 - 8) = (25 + 8) - (12 + 8).$$

Ἀπὸ τὴν ἰσότητα αὐτὴν καὶ τὴν (1) συνάγομεν ὅτι :

$$25 - 12 = (25 + 8) - (12 + 8).$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\boxed{\alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma)}$$

§ 368. *Θεώρημα V.* Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ ἀριθμὸν τὴν διαφορὰν δύο ἄλλων, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν ἀριθμὸν τοῦτον τὸν ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς καὶ ἀπὸ τὸ ἄθροισμα νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν μειωτέον αὐτῆς.

\*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 50 τὴν διαφορὰν  $25 - 12$ , ἤτοι νὰ εὐρωμεν τὸ ἐξαγόμενον  $50 - (25 - 12)$  χωρὶς νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν  $25 - 12$ . Λέγω ὅτι ἀρκεῖ εἰς τὸν 50 νὰ προσθέσωμεν τὸν 12, καὶ ἀπὸ τὸ ἄθροισμα  $50 + 12$  νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν 25. \*Ἦτοι λέγω ὅτι :  $50 - (25 - 12) = (50 + 12) - 25$ .

\**Ἀπόδειξις.* Κατὰ τὴν προηγουμένην ἰδιότητα, ἐὰν προσθέσωμεν καὶ εἰς τὸν μειωτέον 50 καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον  $25 - 12$  τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν 12, ἡ διαφορὰ δὲν μεταβάλλεται. Θὰ εἶναι λοιπὸν

$$50 - (25 - 12) = (50 + 12) - [(25 - 12) + 12]. \quad (1)$$

\*Ἀλλὰ κατὰ τὸν ὀρισμὸν τῆς ἀφαιρέσεως εἶναι  $(25 - 12) + 12 = 25$

\*Ὡστε ἡ ἰσότης (1) γίνεταί :

$$50 - (25 - 12) = (50 + 12) - 25.$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\boxed{\alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - \beta}$$

Περίληψις τῶν ἰδιοτήτων τῆς ἀφαιρέσεως

$$\begin{array}{l} 1. \quad \alpha - (\beta + \gamma) = (\alpha - \beta) - \gamma \\ 2. \quad (\alpha + \beta) - \gamma = \alpha + (\beta - \gamma) \\ 3. \quad (\alpha - \beta) + (\gamma - \delta) = (\alpha + \gamma) - (\beta + \delta) \\ 4. \quad \alpha - \beta = (\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) \\ 5. \quad \alpha - (\beta - \gamma) = (\alpha + \gamma) - \beta \end{array}$$

### Ἄσκησεις

A'. Ὁμάς. 15) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $(\alpha - \beta) - \gamma = \alpha - (\beta + \gamma)$  καὶ νὰ διατυπωθῆ ἡ σχετικὴ ιδιότης τῆς ἀφαιρέσεως.

16) Νὰ εὑρεθῆ τὸ ἐξαγόμενον τῶν κάτωθι πράξεων κατὰ δύο τρόπους :

1.  $75 - (40 + 20)$   $80 - (35 + 15)$
2.  $100 - (40 - 25)$   $74 - (35 - 29)$
3.  $(12 + 45) - (10 + 18)$   $(378 + 243) - (137 + 65)$
4.  $(58 - 35) + (75 - 64)$   $(127 - 83) + (184 - 76)$
5.  $(7 - 66) - (35 - 18)$   $(379 - 294) - (325 - 318)$ .

17) Νὰ εὑρεθῆ τὸ ἐξαγόμενον τῶν κάτωθι πράξεων :

1.  $(12 + 18) - 9$   $(25 + 40) - 18$   $(65 + 48) - 37$
2.  $(37 + 23) - 25$   $(74 + 35 + 63) - 57$   $(148 + 356) - 245$ .

18) Διὰ νὰ εὑρωμεν ἀπὸ μνήμης τὴν διαφορὰν  $478 - 345$ , λέγομεν  $478, 178, 138, 133$ . Ποῦ στηριζόμεθα ;

19) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

1.  $789 - 43 = 800 - 54$
2.  $2886 - 997 = 2889 - 1000$
3.  $3765 - 1001 = 3764 - 1000$ .

B'. Ὁμάς. 20) Τί γίνεται τὸ ὑπόλοιπον μιᾶς ἀφαιρέσεως :

1. Ὄταν αὐξήσωμεν τὸν μειωτέον κατὰ  $\mu$  μονάδας ;
2. Ὄταν αὐξήσωμεν τὸν ἀφαιρετέον κατὰ  $\mu$  μονάδας ;
3. Ὄταν ἐλαττώσωμεν τὸν μειωτέον κατὰ  $\mu$  μονάδας ;
4. Ὄταν ἐλαττώσωμεν τὸν ἀφαιρετέον κατὰ  $\mu$  μονάδας ;
5. Ὄταν ἐλαττώσωμεν καὶ τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον κατὰ  $\mu$  μονάδας ;

21) Ποῖον ἀριθμὸν θὰ εὑρωμεν, ὅταν εἰς τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν προσθέσωμεν τὴν διαφορὰν των ;

22) Ποῖον ἀριθμὸν θὰ εὑρωμεν, ὅταν ἀπὸ τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν ἀφαιρέσωμεν τὴν διαφορὰν των ;

### 5. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

§ 369. *Θεώρημα I.* Τὸ γινόμενον δύο παραγόντων δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν ἐναλλάξωμεν τὴν θέσιν των.

\*Εστω τὸ γινόμενον  $3 \times 4$ . Θὰ δείξωμεν ὅτι  $3 \times 4 = 4 \times 3$ . Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι :

$$3 \times 4 = 3 + 3 + 3 + 3.$$

\*Ἐπειδὴ δὲ  $3 = 1 + 1 + 1$ , ἂν ἐφαρμόσωμεν τὴν ἀναλυτικὴν ιδιότητα τῆς προσθέσεως, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$3 \times 4 = \begin{cases} 1 + 1 + 1 \\ + 1 + 1 + 1 \\ + 1 + 1 + 1 \\ + 1 + 1 + 1 \end{cases} \\ = 4 + 4 + 4 \quad \eta \quad 4 \times 3.$$

\*Ὡστε ἀπεδείχθη ὅτι  $3 \times 4 = 4 \times 3$ .

\*Ὁμοίως ἀποδεικνύομεν ὅτι :

$$\boxed{\alpha \times \beta = \beta \times \alpha}$$

\*Ἡ ιδιότης αὐτὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι **θεμελιώδης**, διότι ἐπ' αὐτῆς στηρίζονται αἱ ἄλλαι ιδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Λέγεται δὲ καὶ **ιδιότης τῆς ἀντιμεταθέσεως**.

§ 370. *Θεώρημα II.* Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἄθροισμα ἐπὶ ἀριθμὸν, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον προσθετέον τοῦ ἄθροίσματος ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ προκύπτοντα γινόμενα.

\*Εστω ὅτι θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἄθροισμα  $\alpha + \beta + \gamma$  ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν 3, ἥτοι νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον  $(\alpha + \beta + \gamma) \times 3$ .

Λέγω ὅτι  $(\alpha + \beta + \gamma) \times 3 = (\alpha \times 3) + (\beta \times 3) + (\gamma \times 3)$ .

\**Ἀπόδειξις.* Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι :

$$(\alpha + \beta + \gamma) \times 3 = (\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha + \beta + \gamma).$$

\*Ἀλλὰ εἰς τὸ β' μέλος τῆς ἰσότητος αὐτῆς ἔχομεν νὰ προσθέσωμεν ἄθροισματα, καὶ κατὰ τὴν γνωστὴν ιδιότητα (§ 362) τοῦτο θὰ ἰσοῦται μὲ  $\alpha + \beta + \gamma + \alpha + \beta + \gamma + \alpha + \beta + \gamma$ .

\*Ἀλλὰ καὶ τοῦτο κατὰ τὴν γνωστὴν ιδιότητα τῆς προσθέσεως ἰσοῦται μὲ  $(\alpha + \alpha + \alpha) + (\beta + \beta + \beta) + (\gamma + \gamma + \gamma)$ .

ἢ μὲ  $(\alpha \times 3) + (\beta \times 3) + (\gamma \times 3)$ .

\*Ὅθεν συνάγομεν ὅτι :

$$(\alpha + \beta + \gamma) \times 3 = (\alpha \times 3) + (\beta \times 3) + (\gamma \times 3).$$

## Περίληψις ἀποδείξεως

$$\begin{aligned}
 (\alpha + \beta + \gamma) \times 3 &= (\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha + \beta + \gamma) \\
 &= \alpha + \beta + \gamma + \alpha + \beta + \gamma + \alpha + \beta + \gamma \\
 &= (\alpha + \alpha + \alpha) + (\beta + \beta + \beta) + (\gamma + \gamma + \gamma) \\
 &= (\alpha \times 3) + (\beta \times 3) + (\gamma \times 3)
 \end{aligned}$$

---


$$(\alpha + \beta + \gamma) \times 3 = (\alpha \times 3) + (\beta \times 3) + (\gamma \times 3).$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :  $(\alpha + \beta + \gamma) \cdot \delta = (\alpha \cdot \delta) + (\beta \cdot \delta) + (\gamma \cdot \delta)$

Ἡ ιδιότης αὐτὴ λέγεται **ἐπιμεριστικὴ ιδιότης**.

§ 371. Ἐξαγωγή κοινοῦ παράγοντος. Ἐὰν ἐναλλάξωμεν τὰ μέλη τῆς εὐρεθείσης ἰσότητος  $(\alpha + \beta + \gamma) \times 3 = (\alpha \times 3) + (\beta \times 3) + (\gamma \times 3)$ , θὰ ἔχωμεν  $(\alpha \times 3) + (\beta \times 3) + (\gamma \times 3) = (\alpha + \beta + \gamma) \times 3$ .

Ἐκ τῆς ἰσότητος ταύτης συνάγομεν ὅτι :

Ἐὰν ἔχωμεν ἄθροισμα γινομένων, τὰ ὁποῖα ἔχουν κοινὸν παράγοντα, δυνάμεθα νὰ θέτωμεν τὸν κοινὸν παράγοντα ἐκτὸς παρενθέσεως, ἐντὸς δὲ ταύτης νὰ θέτωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν μὴ κοινῶν παραγόντων.

Κατὰ ταῦτα τὸ

$$(\alpha \cdot \rho) + (\beta \cdot \rho) + (\gamma \cdot \rho) + (\delta \cdot \rho) = (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \cdot \rho.$$

Τὴν ἐργασίαν αὐτὴν καλοῦμεν **ἐξαγωγήν τοῦ κοινοῦ παράγοντος ἐκτὸς παρενθέσεως**.

§ 372. *Θεώρημα III.* Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄθροισμα, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ ἕκαστον τῶν προσθετέων τοῦ ἄθροίσματος καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ προκύπτοντα γινόμενα.

\*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν 5 ἐπὶ τὸ ἄθροισμα  $\alpha + \beta + \gamma$ , ἤτοι νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον  $5 \times (\alpha + \beta + \gamma)$ . Λέγω ὅτι  $5 \times (\alpha + \beta + \gamma) = (5 \times \alpha) + (5 \times \beta) + (5 \times \gamma)$ .

\**Ἀπόδειξις.* Κατὰ τὴν θεμελιώδη ιδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι :  $5 \times (\alpha + \beta + \gamma) = (\alpha + \beta + \gamma) \times 5$ .

\*Ἀλλὰ εἰς τὸ β' μέλος τῆς ἰσότητος ταύτης ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἄθροισμα ἐπὶ ἀριθμὸν καὶ κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα τοῦτο θὰ εἶναι ἴσον μὲ  $(\alpha \times 5) + (\beta \times 5) + (\gamma \times 5)$  ἢ μὲ τὸ  $(5 \times \alpha) + (5 \times \beta) + (5 \times \gamma)$  (διατί ;).

Ὅθεν συνάγομεν ὅτι:  $5 \times (\alpha + \beta + \gamma) = (5 \times \alpha) + (5 \times \beta) + (5 \times \gamma)$ .

$$\text{Γενικῶς θὰ εἶναι: } \boxed{\alpha \cdot (\beta + \gamma + \delta) = (\alpha \cdot \beta) + (\alpha \cdot \gamma) + (\alpha \cdot \delta)}$$

§ 373. *Θεώρημα IV.* Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἄθροισμα ἐπὶ ἄθροισμα, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον προσθετέον τοῦ πρώτου ἄθροίσματος ἐφ' ἕκαστον προσθετέον τοῦ δευτέρου ἄθροίσματος καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ προκύπτοντα γινόμενα.

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἄθροισμα  $(\alpha + \beta)$  ἐπὶ τὸ  $(\gamma + \delta)$ , ἤτοι νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον  $(\alpha + \beta) \times (\gamma + \delta)$ .

Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν  $\alpha$  ἐπὶ τὸν  $\gamma$  καὶ ἐπὶ τὸν  $\delta$ , κατόπιν τὸν  $\beta$  ἐπὶ τὸν  $\gamma$  καὶ  $\delta$ , καὶ τέλος νὰ προσθέσωμεν τὰ μερικὰ γινόμενα. Δηλαδή λέγω ὅτι:

$$(\alpha + \beta) \times (\gamma + \delta) = (\alpha \cdot \gamma) + (\beta \cdot \gamma) + (\alpha \cdot \delta) + (\beta \cdot \delta).$$

*Ἀπόδειξις.* Ἄν θεωρήσωμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα  $\alpha + \beta$  εὐρέθη καὶ παριστᾷ ἓνα μόνον ἀριθμὸν, θὰ ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄθροισμα, καὶ ἐπομένως κατὰ τὴν γνωστὴν ιδιότητα (§ 372) θὰ εἶναι:

$$(\alpha + \beta) \times (\gamma + \delta) = (\alpha + \beta) \times \gamma + (\alpha + \beta) \times \delta \quad (1)$$

Ἄλλὰ ἐπειδὴ  $(\alpha + \beta) \times \gamma = (\alpha \cdot \gamma) + (\beta \cdot \gamma)$ , καὶ  $(\alpha + \beta) \times \delta = (\alpha \cdot \delta) + (\beta \cdot \delta)$  (διατί; ) ἢ προηγουμένη ἰσότης γίνεται:

$$\boxed{(\alpha + \beta) \times (\gamma + \delta) = (\alpha \cdot \gamma) + (\beta \cdot \gamma) + (\alpha \cdot \delta) + (\beta \cdot \delta)}$$

Περίληψις ἀποδείξεως

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \times (\gamma + \delta) &= (\alpha + \beta) \times \gamma + (\alpha + \beta) \times \delta \\ &= (\alpha \cdot \gamma) + (\beta \cdot \gamma) + (\alpha \cdot \delta) + (\beta \cdot \delta). \end{aligned}$$

§ 374. *Θεώρημα V.* Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν διαφορὰν ἐπὶ ἀριθμὸν, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν καὶ τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν καὶ ἀπὸ τὸ πρῶτον γινόμενον νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ δεύτερον.

Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὴν διαφορὰν  $35 - 20$  ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν 3. Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν

μειωτέον 35 ἐπὶ 3 καὶ τὸν ἀφαιρετέον 20 ἐπὶ 3, καὶ ἀπὸ τὸ γινόμενον  $35 \times 3$  νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ γινόμενον  $20 \times 3$ . Δηλαδή λέγω ὅτι :

$$(35 - 20) \times 3 = (35 \times 3) - (20 \times 3).$$

Ἀποδείξεις. Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἔχομεν :

$$(35 - 20) \times 3 = (35 - 20) + (35 - 20) + (35 - 20).$$

Ἄλλ' εἰς τὸ β' μέλος τῆς ἰσότητος αὐτῆς ἔχομεν νὰ προσθέσωμεν διαφορὰς καὶ κατὰ γνωστὴν ἰδιότητα τῆς ἀφαιρέσεως (§ 366) τοῦτο θὰ εἶναι ἴσον μὲ

$$(35 + 35 + 35) - (20 + 20 + 20)$$

ἢ  $(35 \times 3) - (20 \times 3)$ . Ἄρα

$$(35 - 20) \times 3 = (35 \times 3) - (20 \times 3)$$

Περίληψις ἀποδείξεως

$$\begin{aligned} &(35 - 20) \cdot 3 = \\ &(35 - 20) + (35 - 20) + (35 - 20) \\ &= (35 + 35 + 35) - (20 + 20 + 20) \\ &= (35 \times 3) - (20 \times 3). \end{aligned}$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :  $(\alpha - \beta) \cdot \gamma = (\alpha \cdot \gamma) - (\beta \cdot \gamma)$

§ 375. Ἐξαγωγή κοινοῦ παράγοντος. Ἐὰν ἐναλλάξωμεν τὰ μέλη τῆς εὐρεθείσης ἰσότητος  $(35 - 20) \times 3 = (35 \times 3) - (20 \times 3)$ , εὐρίσκομεν ὅτι :

$$(35 \times 3) - (20 \times 3) = (35 - 20) \times 3.$$

Παρατηροῦμεν ὅτι, ἐὰν ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος τῆς διαφορᾶς δύο γινομένων ἔχουν κοινὸν παράγοντα, δυνάμεθα νὰ θέσωμεν τοῦτον ἐκτὸς παρενθέσεως.

Γενικῶς θὰ εἶναι :  $(\alpha \cdot \gamma) - (\beta \cdot \gamma) = (\alpha - \beta) \cdot \gamma.$

#### Ἀσκήσεις

Α'. Ὁ μ ἄ ς. 23) Ἐξηγήσατε διατί :  $8 \times 1 = 8.$

24) Χωρὶς νὰ ἐκτελεσθῇ ὁ πολλαπλασιασμός, εὑρετε :

1ον. Κατὰ πόσον τὸ γινόμενον  $25 \times 9$  ὑπερβαίνει τὸ  $25 \times 8.$

2ον. Κατὰ πόσον τὸ  $50 \times 15$  ὑπερβαίνει τὸ  $50 \times 13.$

25) Νὰ μετατραποῦν τὰ κάτωθι ἀθροίσματα εἰς γινόμενα ἀθροίσματος ἐπὶ ἀριθμὸν :

$$1. \quad 21 + 15 + 39, \quad 14 + 35 + 42, \quad 9 + 18 + 45$$

$$2. \quad \alpha \cdot \lambda + \beta \cdot \lambda + \gamma \cdot \lambda, \quad \kappa \cdot \mu + \beta \cdot \mu + \rho \cdot \mu, \quad 3 \cdot \alpha + 4 \cdot \alpha + \beta \cdot \alpha.$$

26) Νὰ μετατραποῦν αἱ κάτωθι διαφοραὶ εἰς γινόμενα διαφορᾶς ἐπὶ ἀριθμὸν :

$$1. \quad 17 \cdot 3 - 9 \cdot 3, \quad 45 \cdot 2 - 27 \cdot 2, \quad 125 \cdot 8 - 67 \cdot 8$$

$$2. \quad \alpha \cdot \mu - \beta \cdot \mu, \quad \pi \cdot \lambda - \beta \cdot \lambda, \quad \alpha \cdot \beta - \gamma \cdot \beta.$$

27) Νὰ ἐκτελεσθοῦν αἱ κάτωθι πράξεις :

- |  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| 1. $(\alpha + \beta) \cdot \mu,$             | $(\chi + \psi + \omega) \cdot \alpha,$ | $(\alpha + \delta + \beta) \cdot 3$ |
| 2. $(\alpha - \beta) \cdot \nu,$             | $(\mu - \nu) \cdot \chi,$              | $(8 - \alpha) \cdot 3$              |
| 3. $\chi \cdot (\alpha + \beta + \gamma),$   | $5 \cdot (\chi + \psi + \omega),$      | $\alpha \cdot (3 + \beta + \delta)$ |
| 4. $(\chi + \psi) \cdot (\varphi + \omega),$ | $(\delta + \alpha) \cdot (\beta + 2),$ | $(\alpha + \beta) \cdot (3 + 5)$    |

28) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

- $345 \times 699 = 34\,500 \times 7 - 345.$
- $6\,039 - 639 = 9 \times 600.$
- $15 \times (27 + 35 + 36) = 1\,500 - 30.$

29) Νὰ ἐξαχθῆ ἐκτὸς παρενθέσεως ὁ κοινὸς παράγων ἀπὸ τὰ κάτωθι ἀθροίσματα :

- $3 \cdot \chi + 3 \cdot \psi + 3 \cdot \omega,$      $\alpha \cdot \chi - \beta \cdot \chi,$      $2 \cdot \alpha \cdot \chi + 3 \cdot \beta \cdot \chi$
- $5 \cdot \chi + 6 \cdot \chi + 7 \cdot \chi,$      $15 \cdot \alpha - 12 \cdot \alpha,$      $5 \cdot \chi \cdot \psi - 5 \cdot \chi \cdot \omega$

B'. 'Ομάς. 30) "Ένας μαθητὴς θέλων νὰ εὔρη τὸ γινόμενον ἐνὸς ἀριθμοῦ ἐπὶ 80, πολλαπλασιάζει τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 8, ἀλλὰ λησμονεῖ νὰ γράψῃ ἕνα μηδὲν δεξιὰ τοῦ εὑρεθέντος γινομένου. Εὐρίσκει οὕτως ἕνα γινόμενον μικρότερον κατὰ 7 992 τοῦ πραγματικοῦ γινομένου. Ποῖος εἶναι ὁ πολλαπλασιαστής ;

31) Τὸ ἀθροισμα  $4\,700 + 470 + 47$  εἶναι τὸ γινόμενον τοῦ 47 ἐπὶ ἕνα ἀκέραιον ἀριθμὸν. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς αὐτός ;

32) Ποῖαν μεταβολὴν ὑφίσταται τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot \beta$ , ἐὰν ὁ παράγων  $\alpha$  αὐξηθῆ κατὰ μονάδα ἢ ἂν ὁ παράγων  $\beta$  αὐξηθῆ κατὰ μονάδα ;

33) Ποῖαν μεταβολὴν ὑφίσταται τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν, ἐὰν ὁ ἕνας ἐκ τῶν παραγόντων του ἐλαττωθῆ κατὰ μονάδα ;

## 6. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

"Ἴνα ἴδωμεν, ἂν ὁ νόμος τῆς ἀντιμεταθέσεως διὰ δύο παραγόντων ἰσχύη καὶ ὅταν οἱ παράγοντες εἶναι ὅσοιδήποτε, πρέπει νὰ ἀποδείξωμεν προηγουμένως τὴν ἀλήθειαν τῶν κάτωθι θεωρημάτων :

§ 376. *Θεώρημα I.* Γινόμενον τριῶν παραγόντων δὲν βλάπτεται, ἂν οἱ δύο τελευταῖοι παράγοντες ἀντικατασταθῶσι διὰ τοῦ γινομένου αὐτῶν.

Ἐστω τὸ γινόμενον  $7 \times 4 \times 3$ . Λέγω ὅτι τὸ γινόμενον αὐτὸ δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀντικαταστήσωμεν τοὺς παράγοντας 4 καὶ 3 διὰ τοῦ γινομένου των. Δηλ. θὰ δείξωμεν ὅτι  $7 \times 4 \times 3 = 7 \times 12$ .

Κατὰ τὸν ὄρισμὸν τοῦ γινομένου πολλῶν παραγόντων πρέπει νὰ εὗρωμεν τὸ γινόμενον  $7 \times 4$  καὶ νὰ ἐπαναλάβωμεν αὐτὸ 3 φορές. Ἐπειδὴ δὲ  $7 \times 4 = 7 + 7 + 7 + 7$ , ἔπεται ὅτι :

$$7 \times 4 \times 3 = \begin{cases} 7 + 7 + 7 + 7 \\ + 7 + 7 + 7 + 7 \\ + 7 + 7 + 7 + 7 \end{cases} \quad (1)$$

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ β' μέλος τῆς ἰσότητος ταύτης ἔχει τρεῖς σειρὰς καὶ κάθε σειρὰ ἔχει 4 προσθετέους.

Ἐχει λοιπὸν τὸ ἄθροισμα τοῦτο  $4 \times 3 = 12$  προσθετέους.

Καὶ ἐπειδὴ κάθε προσθετέος εἶναι 7, οὗτος ἐπαναλαμβάνεται 12 φορές. Τὸ ἄθροισμα λοιπὸν τοῦτο εἶναι  $7 \times 12$ , ἢ δὲ ἰσότης (1) γίνεται

$$7 \times 4 \times 3 = 7 \times 12.$$

Ὅμοιως ἀποδεικνύομεν ὅτι :  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$ .

**§ 377. Θεώρημα II.** Γινόμενον τριῶν παραγόντων δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀντιμετατεθῶσιν οἱ δύο τελευταῖοι παράγοντες αὐτοῦ.

Ἐστω τὸ γινόμενον  $3 \times 6 \times 4$ . Ἄν ἀντιμεταθέσωμεν τοὺς παράγοντας 6 καὶ 4, προκύπτει τὸ γινόμενον  $3 \times 4 \times 6$ .

Θὰ δείξωμεν ὅτι  $3 \times 6 \times 4 = 3 \times 4 \times 6$ .

Πράγματι, ἐὰν ἐφαρμόσωμεν τὴν προηγουμένην ιδιότητα καὶ εἰς τὰ δύο ταῦτα γινόμενα, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$3 \times 6 \times 4 = 3 \times 24 \quad \text{καὶ} \quad 3 \times 4 \times 6 = 3 \times 24.$$

Ἐπειδὴ δὲ τὰ δεύτερα μέλη τῶν ἰσοτήτων τούτων εἶναι ἴσα, θὰ εἶναι ἴσα καὶ τὰ πρῶτα μέλη των, δηλαδή θὰ εἶναι :

$$3 \times 6 \times 4 = 3 \times 4 \times 6.$$

Ὅμοιως ἀποδεικνύομεν ὅτι :  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma \cdot \beta$ .

**§ 378. Θεώρημα III.** Γινόμενον πολλῶν παραγόντων δὲν μεταβάλλεται, ἂν δύο ἐφεξῆς παράγοντες αὐτοῦ ἀντιμετατεθῶσιν.

Ἐστω τὸ γινόμενον  $3 \times 5 \times 2 \times 7 \times 6$ . Λέγω ὅτι τὸ γινόμενον αὐτὸ δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀντιμεταθέσωμεν δύο ἐφεξῆς παράγοντας, π.χ. τοὺς 2 καὶ 7. Θὰ δείξωμεν δηλαδή ὅτι :

$$3 \times 5 \times 2 \times 7 \times 6 = 3 \times 5 \times 7 \times 2 \times 6.$$

Ἐκτελοῦμεν καὶ εἰς τὰ δύο γινόμενα ἓνα μέρος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, σταματῶμεν δὲ τὴν πρᾶξιν εἰς τοὺς ἀντιμετατιθεμένους παράγοντας.

Εὐρίσκομεν λοιπὸν ὅτι :

$$\begin{array}{l} 3 \times 5 \times 2 \times 7 \times 6 = 15 \times 2 \times 7 \times 6 \\ \text{καὶ} \quad 3 \times 5 \times 7 \times 2 \times 6 = 15 \times 7 \times 2 \times 6 \end{array} \quad (1)$$

Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα εἶναι :

$$\begin{array}{l} 15 \times 2 \times 7 = 15 \times 7 \times 2 \quad \text{ἔπεται ὅτι καὶ} \\ 15 \times 2 \times 7 \times 6 = 15 \times 7 \times 2 \times 6. \end{array}$$

Τὰ δευτέρα λοιπὸν μέλη τῶν ἰσοτήτων (1) εἶναι ἴσα. Ἐπομένως καὶ τὰ πρῶτα μέλη αὐτῶν θὰ εἶναι ἴσα, ἦτοι :

$$3 \times 5 \times 2 \times 7 \times 6 = 3 \times 5 \times 7 \times 2 \times 6.$$

Ὅμοίως ἀποδεικνύομεν ὅτι καὶ

$$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon \cdot \zeta = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \epsilon \cdot \delta \cdot \zeta$$

§ 379. *Θεώρημα IV.* Γινόμενον πολλῶν παραγόντων δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀλλάξη ὅπωςδήποτε ἡ τάξις αὐτῶν.

Ἐστω τὸ γινόμενον  $6 \times 4 \times 8 \times 9 \times 12$ . Ἄν ἐφαρμόσωμεν εἰς αὐτὸ τὴν προηγουμένην ιδιότητα διὰ δύο ἐφεξῆς παράγοντας, π.χ. τοὺς 8 καὶ 9, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$6 \times 4 \times 8 \times 9 \times 12 = 6 \times 4 \times 9 \times 8 \times 12.$$

Ἄν δὲ εἰς τὸ δεύτερον γινόμενον κάμωμεν τὸ ἴδιον διὰ τοὺς παράγοντας 9 καὶ 4, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$6 \times 4 \times 9 \times 8 \times 12 = 6 \times 9 \times 4 \times 8 \times 12.$$

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον εἶναι :

$$6 \times 9 \times 4 \times 8 \times 12 = 9 \times 6 \times 4 \times 8 \times 12,$$

$$9 \times 6 \times 4 \times 8 \times 12 = 9 \times 4 \times 6 \times 8 \times 12,$$

$$9 \times 4 \times 6 \times 8 \times 12 = 9 \times 4 \times 6 \times 12 \times 8.$$

Εἶναι λοιπὸν :

$$\begin{aligned} 6 \times 4 \times 8 \times 9 \times 12 &= 6 \times 4 \times 9 \times 8 \times 12 = 6 \times 9 \times 4 \times 8 \times 12 \\ &= 9 \times 6 \times 4 \times 8 \times 12 = 9 \times 4 \times 6 \times 8 \times 12 \\ &= 9 \times 4 \times 6 \times 12 \times 8 \text{ κ.τ.λ.} \end{aligned}$$

Βλέπομεν δηλ. ὅτι, ἂν κάθε φορὰν ἀντιμεταθέσωμεν δύο ἐφεξῆς παράγοντας, δυνάμεθα νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς παράγοντας τοῦ γινομένου οἰανδήποτε τάξιν θέλομεν, χωρὶς νὰ βλάψωμεν τὸ γινόμενον.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἀποδεικνύομεν ὅτι :

$$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon = \alpha \gamma \cdot \beta \cdot \delta \cdot \epsilon = \alpha \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \beta \cdot \epsilon = \gamma \cdot \alpha \cdot \delta \cdot \beta \cdot \epsilon \quad \kappa.τ.λ.$$

Ἡ ιδιότης αὕτη λέγεται **ιδιότης τῆς ἀντιμεταθέσεως**.

§ 380. *Θεώρημα V.* Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀντικαταστήσωμεν παράγοντάς τινας αὐτοῦ μὲ τὸ γινόμενόν των.

\*Ἐστω τὸ γινόμενον  $7 \times 6 \times 9 \times 4$ . Λέγω ὅτι τοῦτο εἶναι ἴσον μὲ τὸ  $7 \times 24 \times 9$ , εἰς τὸ ὁποῖον ὁ παράγων 24 προέκυψεν ἐκ τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν παραγόντων 6 καὶ 4 διὰ τοῦ γινομένου των.

Δηλαδή λέγω ὅτι  $7 \times 6 \times 9 \times 4 = 7 \times 24 \times 9$ .

\**Ἀπόδειξις.* Κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ἀντιμεταθέσεως θὰ εἶναι :

$$7 \times 6 \times 9 \times 4 = 6 \times 4 \times 7 \times 9. \quad (1)$$

Διὰ νὰ εὕρωμεν δὲ τὸ γινόμενον  $6 \times 4 \times 7 \times 9$ , πρέπει νὰ εὕρωμεν πρῶτον ὅτι  $6 \times 4 = 24$ . \*Ἐπειτα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ γινόμενον 24 ἐπὶ 7, καὶ τὸ νέον γινόμενον ἐπὶ 9. Αὐτὰς ὁμως τὰς πράξεις κάμνομεν καὶ διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον  $24 \times 7 \times 9$  καὶ ἐπομένως εἶναι :

$$6 \times 4 \times 7 \times 9 = 24 \times 7 \times 9.$$

Περίληψις ἀποδείξεως

\*Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἰσότητα καὶ ἀπὸ τὴν

$$7 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 4 = 6 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 9$$

(1) ἐννοοῦμεν ὅτι :

$$= 24 \cdot 7 \cdot 9$$

$$7 \times 6 \times 9 \times 4 = 24 \times 7 \times 9 = 7 \times 24 \times 9$$

$$= 7 \cdot 24 \cdot 9$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon = \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma \cdot \epsilon \\ = \alpha \cdot (\beta \cdot \delta \cdot \epsilon) \cdot \gamma$$

Αὕτη ἡ ιδιότης λέγεται **συνθετικὴ ιδιότης**.

§ 381. *Θεώρημα VI.* Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν παράγοντά τινα δι' ἄλλων, οἱ ὁποῖοι ἔχουσιν αὐτὸν ὡς γινόμενον.

Πράγματι, ἐὰν ἐναλλάξωμεν τὰ δύο μέλη τῆς εὐρεθείσης ἰσότητος

$$7 \times 6 \times 9 \times 4 = 7 \times 24 \times 9,$$

βλέπομεν ὅτι :

$$7 \times 24 \times 9 = 7 \times 6 \times 9 \times 4.$$

$$\text{Καί γενικῶς : } \boxed{\alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta}$$

Αὐτὴ ἡ ιδιότης λέγεται ἀναλυτικὴ ιδιότης.

§ 382. *Θεώρημα VII.* Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν γινόμενον πολλῶν παραγόντων ἐπὶ ἀριθμὸν, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἓνα μόνον παράγοντα τοῦ γινομένου ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν, τοὺς δὲ ἄλλους νὰ ἀφήσωμεν, ὅπως ἔχουσιν.

Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$  ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν  $\delta$ , ἤτοι νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot \delta$ . Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἓνα μόνον παράγοντα τοῦ γινομένου, π.χ. τὸν παράγοντα  $\beta$  ἐπὶ τὸν  $\delta$ . Δηλαδή λέγω ὅτι :

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot \delta = \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma.$$

Ἀπόδειξις. Κατὰ τὴν ἀναλυτικὴν ιδιότητα θὰ εἶναι :

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot \delta = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \quad (1)$$

Ἀλλὰ κατὰ τὴν συνθετικὴν ιδιότητα θὰ εἶναι :

$$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta = \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma \quad (2)$$

Ἀπὸ τὰς ἰσότητας (1) καὶ (2) συμπεραίνομεν ὅτι :

$$\boxed{(\alpha \beta \gamma) \delta = \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma}$$

§ 383. *Θεώρημα VIII.* Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν γινόμενα, σχηματίζομεν ἓνα γινόμενον, τὸ ὁποῖον νὰ περιέχῃ ὅλους τοὺς παράγοντας τῶν δοθέντων γινομένων καὶ μόνον αὐτούς.

Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰ γινόμενα  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$  καὶ  $\delta \cdot \epsilon \cdot \zeta$ , δηλ. νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \times (\delta \cdot \epsilon \cdot \zeta)$ . Λέγω ὅτι :

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \times (\delta \cdot \epsilon \cdot \zeta) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon \cdot \zeta.$$

Ἀπόδειξις. Ἐὰν εἰς τὸ γινόμενον  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \times (\delta \cdot \epsilon \cdot \zeta)$  ἀντικαταστήσωμεν τὸν παράγοντα  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)$  διὰ τῶν παραγόντων  $\alpha, \beta, \gamma$  αὐτοῦ, καὶ τὸν παράγοντα  $(\delta \cdot \epsilon \cdot \zeta)$  διὰ τῶν  $\delta, \epsilon, \zeta$ , τὸ γινόμενον δὲν μεταβάλλεται (§ 381).

$$\text{Θὰ εἶναι λοιπόν : } \boxed{(\alpha \beta \gamma) \times (\delta \cdot \epsilon \cdot \zeta) = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon \cdot \zeta}$$

## Περίληψις ιδιοτήτων

## α' Γινόμενου δύο παραγόντων

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | $\alpha \cdot \beta$                       | $= \beta \cdot \alpha$  |
| 2. | $(\alpha + \beta) \cdot \rho$              | $= (\alpha \cdot \rho) + (\beta \cdot \rho)$  |
| 3. | $\nu \cdot (\alpha + \beta)$               | $= (\nu \cdot \alpha) + (\nu \cdot \beta)$  |
| 4. | $(\alpha + \beta) \cdot (\gamma + \delta)$ | $= (\alpha \cdot \gamma) + (\beta \cdot \gamma) + (\alpha \cdot \delta) + (\beta \cdot \delta)$ |
| 5. | $(\alpha - \beta) \cdot \mu$               | $= (\alpha \cdot \mu) - (\beta \cdot \mu)$  |

## β' Γινόμενου πολλῶν παραγόντων

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$                    | $= \delta \cdot \alpha \cdot \gamma \cdot \beta$                |
| 2. | $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$                    | $= \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \cdot \delta$              |
| 3. | $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \cdot \delta$                  | $= \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$                |
| 4. | $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot \delta$                  | $= \alpha \cdot (\beta \cdot \delta) \cdot \gamma$              |
| 5. | $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\delta \cdot \epsilon)$ | $= \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \epsilon$ |

## Άσκησεις

34) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $8 \times 9 \times 2 = 160 - 16$ .

35) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $7 \times 2 \times 99 = 1400 - 14$ .

36) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $9 \times 3 \times 8 \times 111 = 24\,000 - 24$ .

37) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $2 \times 9 \times 5 \times 111 = 10\,000 - 10$ .

38) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι  $3 \times 5 \times 11 = (50 \times 3) + (5 \times 3)$ .

39) Ἐξετάσατε ποίαν μεταβολὴν πάσχει τὸ γινόμενον  $3 \times 5 \times 8$ , ἂν εἰς ἓνα παράγοντα αὐτοῦ προστεθῆ μία μονάς. Γενικεύσατε τὸ ζήτημα τοῦτο διὰ τὸ γινόμενον  $\alpha \times \beta \times \gamma$ .

40) Ἐξετάσατε ποίαν μεταβολὴν πάσχει τὸ γινόμενον  $7 \times 5 \times 6$ , ἂν ἀπὸ ἓνα παράγοντα αὐτοῦ ἀφαιρεθῆ ἡ μονάς. Γενικεύσατε τὸ ζήτημα τοῦτο διὰ τὸ γινόμενον  $\alpha \times \beta \times \gamma$ .

41) Σχηματίσατε ἓνα γινόμενον μὲ 4 παράγοντας καὶ ἴσον πρὸς τὸ γινόμενον  $(3 \times \alpha) \times (2 \times \beta) \times (4 \times \gamma)$ .

42) Σχηματίσατε ἓνα γινόμενον μὲ 5 παράγοντας, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἓνας νὰ λήγῃ εἰς 0 καὶ ἴσον πρὸς τὸ γινόμενον :

$$(2 \times \alpha) \times (7 \times \beta) \times (5 \times \gamma).$$

## 7. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 384. *Θεώρημα I.* Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἄθροισμα δι' ἀριθμοῦ, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν ἕκαστον προσθετόν τοῦ ἄθροισματος διὰ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ προκύπτοντα πηλίκα. (Ὑποτίθεται ὅτι ὅλοι οἱ προσθετοὶ διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ τοῦ ἀριθμοῦ).

\*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸ ἄθροισμα  $12 + 20 + 8$  διὰ τοῦ 4. Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τὸν 12 διὰ 4, τὸν 20 διὰ 4, καὶ τὸν 8 διὰ 4, τὰ δὲ προκύπτοντα πηλίκα 3, 5, 2 νὰ τὰ προσθέσωμεν. \*Ἦτοι λέγω ὅτι :

$$(12 + 20 + 8) : 4 = 3 + 5 + 2.$$

\**Ἀπόδειξις.* Ἐὰν τὸ  $3 + 5 + 2$  εἶναι πράγματι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $(12 + 20 + 8) : 4$ , πρέπει πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην νὰ μᾶς δίδῃ τὸν διαιρετόν.

\*Ἐπειδὴ δὲ  $(3 + 5 + 2) \times 4 = 12 + 20 + 8$  (διατί ;), ἦτοι ὁ διαιρετός, συμπεραίνομεν ὅτι τὸ πηλίκον εἶναι ὄντως  $3 + 5 + 2$ .

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$(α + β + γ) : δ = (α : δ) + (β : δ) + (γ : δ)$$

§ 385. *Θεώρημα II.* Διὰ νὰ διαιρέσωμεν διαφορὰν δι' ἀριθμοῦ, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ ἀπὸ τὸ πρῶτον πηλίκον νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ δεύτερον. (Ὑποτίθεται ὅτι ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος τῆς διαφορᾶς διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ τοῦ ἀριθμοῦ).

\*Ἐστω ἡ διαφορὰ  $45 - 30$ , τὴν ὁποῖαν θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ 5. Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τὸν μειωτέον 45 διὰ 5 καὶ τὸν ἀφαιρετέον 30 διὰ 5, καὶ ἀπὸ τὸ πρῶτον πηλίκον 9 νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ δεύτερον 6.

\*Ἦτοι λέγω ὅτι εἶναι  $(45 - 30) : 5 = 9 - 6$ .

\**Ἀπόδειξις.* Διότι, ἂν πράγματι ἡ διαφορὰ  $9 - 6$  εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $(45 - 30) : 5$ , πρέπει πολλαπλασιαζομένη ἐπὶ τὸν διαιρέτην 5 νὰ δίδῃ τὸν διαιρετόν  $45 - 30$ .

\*Ἐπειδὴ δὲ (§ 374) εἶναι  $(9 - 6) \times 5 = 45 - 30$ , συμπεραίνομεν ὅτι τὸ πηλίκον εἶναι ὄντως  $9 - 6$ .

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$(α - β) : γ = (α : γ) - (β : γ)$$

§ 386. *Θεώρημα III.* Διὰ νὰ διαιρέσωμεν γινόμενον δι' ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν ἓνα μόνον ἐκ τῶν παραγόντων τοῦ γινομένου διὰ τοῦ ἀριθμοῦ ( ὑποτίθεται ὅτι διαιρεῖται ἀκριβῶς ), τοὺς δὲ ἄλλους παράγοντας νὰ ἀφήσωμεν, ὅπως ἔχουσιν.

Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸ γινόμενον  $5 \times 12 \times 8$  διὰ τοῦ 4, ἤτοι νὰ εὕρωμεν τὸ πηλίκον  $(5 \times 12 \times 8) : 4$ . Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν ἓνα μόνον τῶν παραγόντων τοῦ γινομένου τούτου, ἔστω τὸν 12, διὰ τοῦ 4, τοὺς δὲ ἄλλους ἀφήσωμεν, ὅπως ἔχουσιν. Λέγω δηλαδὴ ὅτι  $(5 \times 12 \times 8) : 4 = 5 \times 3 \times 8$ .

*Ἀπόδειξις.* Διότι, ἂν  $5 \times 3 \times 8$  εἶναι πράγματι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως  $(5 \times 12 \times 8) : 4$ , πρέπει πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην 4 νὰ μᾶς δίδῃ τὸν διαιρετέον  $5 \times 12 \times 8$ .

Ἐπειδὴ δὲ (§ 382) εἶναι  $(5 \cdot 3 \cdot 8) \cdot 4 = 5 \cdot 12 \cdot 8$ , συμπεραίνομεν ὅτι τὸ πηλίκον εἶναι ὄντως  $5 \times 3 \times 8$ .

Γενικῶς θὰ εἶναι :  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) : \delta = (\alpha : \delta) \cdot \beta \cdot \gamma$

ὅπου ἡ διαίρεσις  $\alpha : \delta$  ὑποτίθεται τελεία.

§ 387. *Πόρισμα.* Διὰ νὰ διαιρέσωμεν γινόμενον διὰ τινος τῶν παραγόντων του, ἀρκεῖ νὰ ἐξαλείψωμεν αὐτόν.

Ἦτοι :  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) : \beta = \alpha \cdot \gamma$ .

*Σημείωσις.* Ἄν περισσότεροι παράγοντες τοῦ γινομένου εἶναι ἴσοι μὲ τὸν διαιρέτην, ἐξαλείφομεν τὸν ἓνα μόνον ἀπ' αὐτούς.

§ 388. *Θεώρημα IV.* Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν διὰ γινομένου πολλῶν παραγόντων, δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν διὰ τοῦ πρώτου παράγοντος, τὸ εὐρεθὲν πηλίκον διὰ τοῦ δευτέρου παράγοντος καὶ οὕτω καθεξῆς, μέχρις ὅτου λάβωμεν ὅλους τοὺς παράγοντας τοῦ γινομένου.

Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 120 διὰ τοῦ γινομένου  $3 \cdot 5 \cdot 4$ , ἤτοι νὰ εὕρωμεν τὸ πηλίκον  $120 : (3 \cdot 5 \cdot 4)$ . Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 120 διὰ 3, καὶ τὸ εὐρεθὲν πηλίκον  $(120 : 3)$  διὰ τοῦ 5, τὸ νέον πηλίκον  $(120 : 3) : 5$  διὰ τοῦ 4. Δηλαδὴ λέγω ὅτι  $120 : (3 \cdot 5 \cdot 4) = [(120 : 3) : 5] : 4$ .

*Ἀπόδειξις.* Διότι, ἂν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν τοῦ 120 διὰ τοῦ γινομένου  $3 \cdot 5 \cdot 4$  ἢ τοῦ 60, εὐρίσκομεν πηλίκον 2, ἤτοι εἶναι :

$$120 : (3 \cdot 5 \cdot 4) = 2. \quad (1)$$

Ἐπειδὴ εἰς κάθε τελείαν διαίρεσιν ὁ διαιρετέος ἰσοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον, εἶναι :

$$120 = (3 \cdot 5 \cdot 4) \cdot 2 \text{ ἢ } 120 = 3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 \text{ (διατί ; )} \quad (2)$$

Διαιροῦντες καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἰσότητος (2) διὰ τοῦ 3 εὐρίσκομεν

$$120 : 3 = (3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2) : 3 \text{ ἢ } 120 : 3 = 5 \cdot 4 \cdot 2 \text{ (διατί ; )} \quad (3)$$

Διαιροῦντες πάλιν καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἰσότητος (3) διὰ τοῦ 5 εὐρίσκομεν :

$$(120 : 3) : 5 = (5 \cdot 4 \cdot 2) : 5 \text{ ἢ } (120 : 3) : 5 = 4 \cdot 2 \quad (4)$$

Διαιροῦντες διὰ 4 καὶ τὰ δύο μέλη τῆς (4) εὐρίσκομεν :

$$[(120 : 3) : 5] : 4 = (4 \cdot 2) : 4 \text{ ἢ } [(120 : 3) : 5] : 4 = 2 \quad (5)$$

Συγκρίνοντας τὰς ἰσότητας (1) καὶ (5) συνάγομεν ὅτι :

$$120 : (3 \cdot 5 \cdot 4) = [(120 : 3) : 5] : 4$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :  $A : (\beta \cdot \gamma \cdot \delta) = [(A : \beta) : \gamma] : \delta$

389. *Θεώρημα V.* Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἀτελοῦς διαιρέσεως ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Ἐστω  $\Delta$  ὁ διαιρετέος,  $\delta$  ὁ διαιρέτης,  $\pi$  τὸ πηλίκον καὶ  $\upsilon$  τὸ ὑπόλοιπον μιᾶς ἀτελοῦς διαιρέσεως. Λέγω ὅτι, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν διαιρετέον  $\Delta$  ἐπὶ ἓνα ἀριθμὸν π.χ. τὸν 5 (ἦτοι, ἂν γίνῃ  $\Delta \times 5$ ) καὶ τὸν διαιρέτην ἐπὶ 5 (δηλ. ἂν γίνῃ  $\delta \times 5$ ), τὸ πηλίκον  $\pi$  θὰ μείνῃ τὸ αὐτό, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπον  $\upsilon$  θὰ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ 5, ἦτοι θὰ γίνῃ  $\upsilon \times 5$ .

*Ἀπόδειξις.* Ἐπειδὴ εἰς κάθε διαίρεσιν ὁ διαιρετέος  $\Delta$  ἰσοῦται μὲ τὸν διαιρέτην  $\delta$  ἐπὶ τὸ πηλίκον  $\pi$  σὺν τῷ ὑπολοίπῳ  $\upsilon$ , θὰ εἶναι :

$$\Delta = (\delta \times \pi) + \upsilon. \quad (1)$$

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἰσότητος (1) ἐπὶ 5, θὰ ἔχωμεν :

$$\Delta \times 5 = [(\delta \times \pi) + \upsilon] \times 5 \text{ ἢ } \Delta \times 5 = (\delta \times \pi) \times 5 + (\upsilon \times 5),$$

$$\text{ἢ } \Delta \times 5 = (\delta \times 5) \times \pi + (\upsilon \times 5) \text{ (διατί ; )} \quad (2)$$

Ἐπειδὴ δὲ ἐξ ὑποθέσεως εἶναι  $\upsilon < \delta$ , θὰ εἶναι καὶ  $\upsilon \times 5 < \delta \times 5$  (3)

Ἐκ τῆς ἰσότητος (2) ἐν συνδυασμῶι πρὸς τὴν

ἀνισότητα (3) συνάγομεν ὅτι τὸ  $\pi$  εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ  $\Delta \times 5$  διὰ τοῦ  $\delta \times 5$  καὶ

τὸ  $\upsilon \times 5$  τὸ ὑπόλοιπον αὐτῆς.

$$\Delta \times 5 \left| \begin{array}{l} \delta \times 5 \\ \pi \end{array} \right.$$

## Περίληψις τῶν ιδιοτήτων τῆς διαιρέσεως

- |  |
|--|
| 1. $(\alpha + \beta + \gamma) : \delta = (\alpha : \delta) + (\beta : \delta) + (\gamma : \delta)$   |
| 2. $(\alpha - \beta) : \gamma = (\alpha : \gamma) - (\beta : \gamma)$  |
| 3. $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) : \delta = \alpha \cdot (\beta : \delta) \cdot \gamma$   |
| 4. $A : (\beta \cdot \gamma \cdot \delta) = [(A : \beta) : \gamma] : \delta$   |
| 5. Ἐάν εἶναι $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ , θὰ εἶναι<br>$\Delta \cdot \lambda = (\delta \cdot \lambda) \cdot \pi + \upsilon \cdot \lambda$ |

## Ἄσκησεις

43) Παρατηροῦντες ὅτι  $18 : 6 = 3$ , εὑρετε ἀμέσως τὸ πηλίκον  $(18 + 6) : 6$ . Ἐπειτα δὲ ἐξετάσατε γενικῶς τί γίνεται τὸ πηλίκον τελείας διαιρέσεως, ἂν ὁ διαιρετέος ἀυξηθῇ κατὰ τὸν διαιρέτην.

44) Παρατηροῦντες ὅτι  $28 : 4 = 7$ , εὑρετε ἀμέσως τὸ πηλίκον  $(28 - 4) : 4$ . Ἐπειτα δὲ ἐξετάσατε γενικῶς τί γίνεται τὸ πηλίκον τελείας διαιρέσεως, ἂν ὁ διαιρετέος αὐτῆς ἐλαττωθῇ κατὰ τὸν διαιρέτην.

45) Ἀπὸ τὴν ἰσότητα  $48 = (5 \times 9) + 3$  εὑρετε ἀμέσως τὸ πηλίκον  $(48 - 3) : 5$  καὶ τὸ πηλίκον  $(48 - 3) : 9$ .

46) Ἐξετάσατε τί γίνεται τὸ πηλίκον μιᾶς ἀτελοῦς διαιρέσεως, ἂν ἀπὸ τὸν διαιρετέον ἀφαιρεθῇ τὸ ὑπόλοιπον αὐτῆς. Ἐπίσης ἐξετάσατε, ἂν ἡ διαίρεσις θὰ μείνῃ πάλιν ἀτελής ἢ ὄχι.

47) Ὁ διαιρέτης μιᾶς ἀτελοῦς διαιρέσεως εἶναι 8, τὸ πηλίκον 6 καὶ τὸ ὑπόλοιπον μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ πηλίκον. Εὑρετε τὸν διαιρέτην.

48) Βασιζόμενοι εἰς τὴν ἰσότητα  $15 : 3 = 5$ , εὑρετε ἀμέσως τὸ πηλίκον  $(15 \times 6) : 3$ . Ἐπειτα δὲ ἐξετάσατε τί γίνεται τὸ πηλίκον μιᾶς τελείας διαιρέσεως, ἂν μόνον ὁ διαιρετέος πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ ἓνα ἀριθμόν.

49) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι  $(13 \times 9 \times 7) : 7 = 130 - 13$ .

50) Νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι  $(5 \times 9 \times 8 \times 11 \times 4) : (4 \times 10) = 400 - 4$ .

51) Ἐάν  $5 \times \psi = 20 \times 3$ , εὑρετε τὸν  $\psi$ .

52) Ἐάν  $6 \times \alpha = 5 \times 6 \times 3$ , εὑρετε τὸν  $\alpha$ .

53) Ἐάν  $3 \times \beta \times 4 = 6 \times 8 \times 2$ , εὑρετε τὸν  $\beta$ .

## 8. ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 390. Ἐμάθομεν (§ 113) ὅτι **δύναμις** ἀριθμοῦ τινος  $\alpha$  καλεῖται τὸ γινόμενον δύο ἢ πολλῶν παραγόντων ἴσων μὲ τὸν  $\alpha$ . Ἀκόμη ὅτι, ἂν οἱ ἴσοι παράγοντες εἶναι δύο, δηλαδὴ  $\alpha \cdot \alpha$ , ἡ δύναμις αὐτὴ καλεῖται **δευτέρα** δύναμις τοῦ  $\alpha$ . Γράφεται δὲ συντόμως  $\alpha^2$  καὶ ἀπαγγέλλεται: ἄλφα εἰς τὴν δευτέραν ἢ ἄλφα εἰς τὸ τετράγωνον. Ἐάν οἱ ἴσοι παράγοντες εἶναι τρεῖς π.χ.  $\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$ , ἡ δύναμις αὐτὴ καλεῖται **τρίτη** δύναμις ἢ **κύβος** τοῦ  $\alpha$ . Αὕτη γράφεται συντόμως  $\alpha^3$  καὶ ἀπαγγέλλεται: ἄλφα εἰς τὴν τρίτην ἢ εἰς τὸν κύβον.

Γενικῶς: Τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \alpha$  μ παραγόντων λέγεται **μυοστή** δύναμις τοῦ  $\alpha$ . Αὕτη συντόμως γράφεται  $\alpha^μ$ . Ὁ  $\alpha$  εἶναι **βάσις** καὶ ὁ  $μ$  **ἐκθέτης** τῆς δυνάμεως ταύτης.

## 9. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

§ 391. *Θεώρημα I.* Τὸ γινόμενον δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ἐκθέτην τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκθετῶν αὐτῶν.

\*Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον  $\alpha^3 \cdot \alpha^4 \cdot \alpha^2$ . Λέγω ὅτι τὸ γινόμενον αὐτὸ εἶναι δύναμις πάλιν τοῦ  $\alpha$  μ ἐκθέτην τὸ ἄθροισμα  $3 + 4 + 2$  τῶν ἐκθετῶν. Ἦτοι:  $\alpha^3 \cdot \alpha^4 \cdot \alpha^2 = \alpha^9$ .

\**Ἀπόδειξις.* Κατὰ τὸν ὅρισμόν τῶν δυνάμεων θὰ εἶναι:

$$\alpha^2 = \alpha \cdot \alpha, \quad \alpha^3 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha, \quad \alpha^4 = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha.$$

Πολλαπλασιάζοντες τὰς ἰσότητας αὐτὰς κατὰ μέλη εὐρίσκομεν ὅτι:

$$\begin{aligned} \alpha^3 \cdot \alpha^4 \cdot \alpha^2 &= (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha) \cdot (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha) \cdot (\alpha \cdot \alpha) \\ &= \alpha \cdot \alpha \quad (\text{διατί ;}) \\ &= \alpha^9 \end{aligned}$$

Γενικῶς θὰ εἶναι:

$$\alpha^μ \cdot \alpha^ν \cdot \alpha^ρ = \alpha^{μ+ν+ρ}$$

§ 392. *Θεώρημα II.* Δύναμις ἀριθμοῦ ὑψοῦται εἰς ἄλλην δύναμιν, ἂν θέσωμεν βάσιν μὲν αὐτὸν τὸν ἀριθμόν, ἐκθέτην δὲ τὸ γινόμενον τῶν ἐκθετῶν τῶν δυνάμεων τούτων.

\*Ἐστω ὅτι ἔχομεν τὴν δύναμιν  $\alpha^3$  καὶ θέλομεν νὰ τὴν ὑψώσω-

μεν εἰς τὴν τετάρτην δύναμιν, ἤτοι νὰ εὕρωμεν μὲ τί ἰσοῦται ἡ  $(\alpha^3)^4$ .  
 Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ θέσωμεν ὡς βάσιν μὲν τὸν  $\alpha$ , ὡς ἐκθέτην δὲ  
 τὸ γινόμενον τῶν ἐκθετῶν 3 καὶ 4 τῶν δυνάμεων τούτων.

Ἦτοι λέγω ὅτι  $(\alpha^3)^4 = \alpha^{12}$ .

Ἀπόδειξις. Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τῶν δυνάμεων θὰ εἶναι :

$$(\alpha^3)^4 = \alpha^3 \cdot \alpha^3 \cdot \alpha^3 \cdot \alpha^3 = \alpha^{3+3+3+3} = \alpha^{12} \quad (\text{διατί ;})$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\boxed{(\alpha^u)^v = \alpha^{u \cdot v}}$$

§ 393. *Θεώρημα III.* Γινόμενον ὑψοῦται εἰς δύναμιν, ἂν  
 πάντες οἱ παράγοντες αὐτοῦ ὑψωθῶσιν εἰς τὴν δύναμιν αὐτήν.

Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ ὑψώσωμεν τὸ γινόμενον  $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$  εἰς τὴν  
 τρίτην δύναμιν, ἤτοι νὰ εὕρωμεν μὲ τί ἰσοῦται ἡ δύναμις  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^3$ .  
 Λέγω ὅτι δυνάμεθα νὰ ὑψώσωμεν ὅλους τοὺς παράγοντας  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$   
 εἰς τὴν τρίτην δύναμιν. Ἦτοι λέγω ὅτι  $(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^3 = \alpha^3 \cdot \beta^3 \cdot \gamma^3$ .

Ἀπόδειξις. Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τῶν δυνάμεων θὰ εἶναι :

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^3 &= (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \cdot (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) \\ &= \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \gamma && (\text{διατί ;}) \\ &= (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha) \cdot (\beta \cdot \beta \cdot \beta) \cdot (\gamma \cdot \gamma \cdot \gamma) && (\text{διατί ;}) \\ &= \alpha^3 \cdot \beta^3 \cdot \gamma^3 && (\text{διατί ;}) \end{aligned}$$

Γενικῶς θὰ εἶναι :

$$\boxed{(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^v = \alpha^v \cdot \beta^v \cdot \gamma^v}$$

§ 394. *Θεώρημα IV.* Τὸ πηλίκον δύο δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ  
 ἀριθμοῦ εἶναι δύναμις αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἐκ-  
 θέτην τὴν διαφορὰν τοῦ ἐκθέτου τοῦ διαιρέτου ἀπὸ τοῦ ἐκθέτου  
 τοῦ διαιρετέου.

Ἔστω ὅτι θέλομεν νὰ διαιρέσωμεν τὴν δύναμιν  $\alpha^5$  διὰ τῆς  $\alpha^3$   
 (ὑποτίθεται  $\alpha \neq 0$ , διότι ἡ διὰ τοῦ 0 διαίρεσις εἶναι ἀδύνατος),  
 ἤτοι νὰ εὕρωμεν τὸ πηλίκον  $\alpha^5 : \alpha^3$ . Λέγω ὅτι τοῦτο εἶναι δύναμις  
 τοῦ  $\alpha$  μὲ ἐκθέτην τὴν διαφορὰν τῶν ἐκθετῶν  $5 - 3 = 2$ . Ἦτοι λέ-  
 γω ὅτι  $\alpha^5 : \alpha^3 = \alpha^2$ .

Ἀπόδειξις. Διότι, ἐὰν ἡ δύναμις  $\alpha^2$  εἶναι τὸ πηλίκον  $\alpha^5 : \alpha^3$ ,  
 πρέπει πολλαπλασιαζομένη ἐπὶ τὸν διαιρέτην  $\alpha^3$  νὰ δίδῃ τὸν διαι-  
 ρετέον  $\alpha^5$ . Πράγματι εἶναι  $\alpha^2 \cdot \alpha^3 = \alpha^5$ .

Γενικῶς θὰ εἶναι :  $\alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu-\nu}$  , ἂν  $\mu > \nu$ .

§ 395. Ἐκθέτης μηδέν. Ἐν παραδεχθῶμεν ὅτι ἡ προηγουμένη ιδιότης ὑφίσταται καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν οἱ ἐκθέται τοῦ διαιρετέου καὶ διαιρέτου εἶναι ἴσοι, εὐρίσκομεν ὅτι :

$$5^3 : 5^3 = 5^{3-3} = 5^0.$$

Δηλαδή προκύπτει τὸ σύμβολον  $5^0$ , τὸ ὁποῖον αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ δὲν ἔχει καμμίαν ἔννοιαν ὡς δύναμις· ( $5^0$  δὲν δύναται νὰ παριστάνῃ δύναμιν τοῦ 5, διότι διὰ νὰ εἶναι δύναμις ἀριθμοῦ πρέπει οἱ ἴσοι παράγοντες νὰ εἶναι τουλάχιστον δύο). Ἐπειδὴ ὁμως εἶναι καὶ  $5^3 : 5^3 = 1$  (διατί ; ) ὁδηγοῦμεθα εἰς τὸ νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι  $5^0$  παριστάνει τὴν 1. Ὁμοίως εὐρίσκομεν ὅτι  $7^0 = 1$  καὶ γενικῶς :

$$\alpha^0 = 1, \text{ ἂν } \alpha \neq 0$$

Ἔστω :

Ἡ μηδενικὴ δύναμις ἀριθμοῦ ( διαφόρου τοῦ μηδενός ) παριστάνει τὴν μονάδα.

Περὶληψις τῶν ιδιοτήτων τῶν δυνάμεων

$$\begin{array}{l} 1. \alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} \cdot \alpha^{\rho} = \alpha^{\mu+\nu+\rho} \\ 2. (\alpha^{\mu})^{\nu} = \alpha^{\mu \cdot \nu} \\ 3. (\alpha \cdot \beta \cdot \gamma)^{\mu} = \alpha^{\mu} \cdot \beta^{\mu} \cdot \gamma^{\mu} \\ 4. \alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu-\nu} \end{array}$$

#### Ἀσκήσεις

Α'. Ὁμάς. 54) Νὰ γραφοῦν ὑπὸ μορφήν μιᾶς δυνάμεως τὰ κάτωθι γινόμενα :

$$1. 2^3 \times 2^5 \times 2^4, \quad 12 \times 12^4 \times 12^2, \quad 7 \times 7^3 \times 7^5$$

$$2. 3^1 \times 3 \times 3^5, \quad 5^3 \times 5^6 \times 5^2, \quad 4^3 \times 4 \times 4^6$$

55) Νὰ ὑψωθοῦν εἰς τὸ τετράγωνον τὰ γινόμενα :

$$1. 3 \times 5, \quad 7 \times 8 \times 6$$

$$2. 8 \times 7 \times 3, \quad 5 \times 2 \times 4 \times 5 \times 8.$$

56) Νὰ ὑψωθοῦν εἰς τὸν κύβον τὰ κάτωθι γινόμενα :

$$1. 5 \times 6 \times 4, \quad 2 \times 3 \times 4 \times 5, \quad \chi \cdot \psi \cdot \omega$$

$$2. 2 \times 3 \times 1, \quad 10 \times 5 \times 2, \quad 3 \cdot \alpha \cdot \gamma$$

57) Τὰ κάτωθι γινόμενα νὰ τραποῦν εἰς δύναμιν ἑνὸς ἀριθμοῦ :

$$1. \quad 4 \cdot 8 \cdot 64, \quad 25 \cdot 125 \cdot 5^2$$

$$2. \quad 3 \cdot 27 \cdot 81, \quad 16 \cdot 2^3 \cdot 4^2$$

58) Τὰ κάτωθι γινόμενα νὰ τραποῦν εἰς γινόμενον δυνάμεων δύο ἀριθμῶν :

$$1. \quad 18 \cdot 27 \cdot 32 \cdot 81, \quad 27 \cdot 64 \cdot 81 \cdot 2$$

$$2. \quad 25 \cdot 8 \cdot 125 \cdot 32, \quad 9 \cdot 25 \cdot 27 \cdot 625$$

59) Τὰ κάτωθι γινόμενα νὰ τραποῦν εἰς δύναμιν ἑνὸς ἀριθμοῦ :

$$1. \quad 2 \cdot 27 \cdot 16 \cdot 9, \quad 81 \cdot 16 \cdot 625$$

$$2. \quad 8 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 125, \quad 27 \cdot 8 \cdot 32 \cdot 243$$

Β'. Ὁ μ ἄ ς. 60) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ τετράγωνον ἑνὸς ἀριθμοῦ, ὃ ὁποῖος λήγει εἰς 0, λήγει τουλάχιστον εἰς δύο μηδενικά.

61) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ τετράγωνον ἑνὸς ἀκεραίου ἀριθμοῦ δὲν δύναται ποτὲ νὰ λήγῃ εἰς 2, 3, 7 ἢ 8.

62) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ τετραπλάσιον ἑνὸς τετραγώνου εἶναι τετράγωνον. Καὶ ὅτι τὸ ὀκταπλάσιον ἑνὸς κύβου εἶναι κύβος.

63) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :  $2^n + 2 = 4 \cdot 2^n$  καὶ ὅτι  $3^n + 3 = 27 \cdot 3^n$

64) Νὰ ἀποδειχθῆ ὅτι :

$$5^n - 2 = 5^n : 25, \quad 2^{3^n} = 8^n \quad \text{καὶ} \quad (5^3)^n = (5^n)^3$$

65) Εὔρετε τὰ γινόμενα :

$$(2\alpha^2) \cdot (3\alpha^3) \cdot (4\alpha), \quad (5\chi^2) \cdot (2\chi^3) \cdot (3\chi^4)$$

66) Εὔρετε τὰ πηλίκα :

$$8\alpha^2 : 4, \quad 9\alpha\beta^2 : (3\alpha), \quad 12\alpha^2\beta^2 : (4\alpha\beta)$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ

§ 396. Ὅρισμοί. Λόγος δύο ἀριθμῶν (ἀφηρημένων ἢ συγκεκριμένων, ἀλλὰ ὁμοειδῶν) καλεῖται τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ πρώτου διὰ τοῦ δευτέρου. Οὕτω λόγος τοῦ 12 πρὸς τὸν 4 εἶναι ὁ  $\frac{12}{4}$  ἢ 3. Ὁ λόγος τοῦ 3 πρὸς 15 εἶναι  $\frac{3}{15}$  ἢ  $\frac{1}{5}$ .

Γενικῶς :

Λόγος τοῦ α πρὸς τὸν β εἶναι τὸ πηλίκον  $\frac{\alpha}{\beta}$  ἢ  $\alpha : \beta$ .

Οἱ ἀριθμοὶ ἑνὸς λόγου λέγονται ὅροι αὐτοῦ. Ἐπίσης εἶδομεν ὅτι ἡ ἰσότης δύο λόγων καλεῖται ἀναλογία. Π.χ. ἡ ἰσότης  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  εἶναι ἀναλογία.

Μία ἀναλογία λέγεται **συνεχῆς**, ἂν οἱ μέσοι ὅροι τῆς εἶναι ἴσοι. Ὁ μέσος ὅρος συνεχοῦς ἀναλογίας λέγεται **μέσος ἀνάλογος** τῶν δύο ἄκρων.

Οὕτως ἡ ἀναλογία  $4 : 8 = 8 : 16$  εἶναι συνεχῆς, ὁ δὲ 8 λέγεται μέσος ἀνάλογος τῶν 4 καὶ 16.

Ὁμοίως ἡ ἀναλογία  $\alpha : \beta = \beta : \gamma$  εἶναι συνεχῆς καὶ ὁ β εἶναι μέσος ἀνάλογος τῶν α καὶ γ.

Ὁ τέταρτος ὅρος μιᾶς συνεχοῦς ἀναλογίας λέγεται **τρίτος ἀνάλογος** τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου, ἐπειδὴ ὁ τρίτος συμπίπτει μὲ τὸν δεύτερον. Οὕτως εἰς τὴν ἀναλογίαν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta}{\gamma}$  ὁ γ εἶναι τρίτος ἀνάλογος τῶν α καὶ β.

§ 397. Λόγοι δύο ὁμοειδῶν ποσῶν. Λόγος ἑνὸς εὐθυγράμμου τμήματος ΑΒ πρὸς ἕνα ἄλλο εὐθύγραμμον τμήμα ΓΔ λέγεται ὁ ἀριθμὸς, ὁ ὁποῖος μετρεῖ τὸ ΑΒ, ὅταν τὸ ΓΔ ληφθῇ ὡς μονάς.

$$\frac{A}{B} \quad \frac{\Gamma}{\Delta}$$

Ὁ λόγος τοῦ ΑΒ πρὸς τὸ ΓΔ παρίσταται οὕτως :  $\frac{AB}{\Gamma\Delta}$  ἢ  $AB:\Gamma\Delta$ .

Γενικῶς :

Λόγος ἑνὸς ποσοῦ Α πρὸς ἕνα ἄλλο ὁμοειδὲς ποσὸν Β εἶναι

ὁ ἀριθμὸς  $\frac{A}{B}$ , ὁ ὁποῖος μετρεῖ τὸ μέγεθος  $A$ , ὅταν τὸ  $B$  ληφθῆ ὡς μονάδα.

Ἐστω ὅτι ἐμετρήσαμεν τὰς διαστάσεις μιᾶς θύρας μὲ μονάδα μήκους τὸ 1 μέτρον καὶ εὐρήκαμεν ὅτι τὸ ὕψος τῆς  $u$  εἶναι 3 μέτρα καὶ ἡ βᾶσις τῆς  $\beta$  εἶναι 1,20 μέτρα. Ὁ λόγος τῶν διαστάσεων αὐτῶν εἶναι:  $\frac{u}{\beta} = \frac{3}{1,20} = 2,5$ .

Ἄν τώρα μετρηθοῦν αἱ διαστάσεις τῆς θύρας μὲ μονάδα μήκους τὸ δεκατόμετρον, θὰ εὐρωμεν  $u = 30$  δεκατόμετρα καὶ  $\beta = 12$  δεκατόμετρα καὶ ὁ λόγος  $\frac{u}{\beta}$  θὰ εἶναι  $\frac{30}{12} = 2,5$ .

Ἄν τώρα μετρηθοῦν αἱ διαστάσεις τῆς θύρας μὲ μονάδα μήκους τὸ ἑκατοστόμετρον, θὰ εὐρωμεν πάλιν ὅτι  $\frac{u}{\beta} = \frac{300}{120} = 2,5$ .

Ὡστε, οἰανδήποτε μονάδα μήκους καὶ ἂν χρησιμοποιήσωμεν διὰ τὴν μέτρησιν τῶν διαστάσεων τῆς θύρας, ὁ λόγος τῶν διαστάσεων αὐτῶν θὰ εἶναι σταθερὸς καὶ ἴσος μὲ 2,5.

Ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα καὶ ἀπὸ ἄλλα ὅμοια πρὸς αὐτὸ συνάγομεν ὅτι:

Ὁ λόγος  $\frac{A}{B}$  ἐνὸς ποσοῦ  $A$  πρὸς ἓνα ἄλλο ὁμοειδὲς ποσὸν  $B$  εἶναι σταθερὸς καὶ ἴσος μὲ τὸν λόγον τῶν ἀριθμῶν, οἱ ὁποῖοι μετροῦν τὰ ποσὰ αὐτά, ὅταν μετρηθοῦν μὲ τὴν αὐτὴν μονάδα.

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ

Εἰς τὴν § 277 ἐμάθομεν πρακτικῶς τὴν κατωτέρω ιδιότητα καὶ δύο ἐφαρμογὰς τῆς. Ἐδῶ θὰ ἐξετάσωμεν θεωρητικῶς τὴν ιδιότητα ἐκείνην καὶ ἄλλας ἀκόμη.

§ 398. *Θεώρημα I.* Εἰς κάθε ἀναλογίαν τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων ὄρων τῆς ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν μέσων ὄρων.

Ἐστω ἡ ἀναλογία  $\alpha : \beta = \gamma : \delta$  ἢ  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$

Λέγω ὅτι εἶναι  $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma$ .

Ἀπόδειξις. Ἄν πολλαπλασιάσωμεν καὶ τοὺς δύο ἴσους ἀριθμοὺς  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν  $\beta \cdot \delta$  (δηλ. ἐπὶ τὸ γινόμε-

μενον τῶν παρονομαστῶν τῶν λόγων ), θὰ προκύψουν ἑξαγόμενα ἴσα, ἤτοι θὰ εἶναι :

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta \cdot \delta = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \beta \cdot \delta \text{ ἢ μετὰ τὴν ἀπλοποίησησιν } \alpha \cdot \delta = \gamma \cdot \beta.$$

§ 399. Ἐφαρμογαί. Στηριζόμενοι εἰς τὴν ιδιότητα αὐτὴν δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν ἓνα ὄρον μιᾶς ἀναλογίας, ὅταν μᾶς δοθοῦν οἱ ἄλλοι τρεῖς ὄροι.

*Πρόβλημα 1ον.* Νὰ εὑρεθῇ ὁ ἄγνωστος ὄρος  $\chi$  τῆς ἀναλογίας  $6 : 5 = 12 : \chi$ .

Κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα θὰ εἶναι :  $6 \cdot \chi = 5 \cdot 12$ .

Ἄν διαιρέσωμεν καὶ τὰ δύο μέλη τῆς ἰσότητος αὐτῆς διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ 6, ἡ ἰσότης δὲν μεταβάλλεται (§ 352).

$$\text{Θὰ εἶναι λοιπόν : } \frac{6 \cdot \chi}{6} = \frac{5 \cdot 12}{6} \text{ ἢ } \chi = \frac{5 \cdot 12}{6}.$$

Ἐκ τῆς τελευταίας ἰσότητος συνάγομεν ὅτι :

Διὰ νὰ εὑρωμεν τὴν τιμὴν ἑνὸς ἄκρου ὄρου μιᾶς ἀναλογίας, πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο μέσους ὄρους τῆς καὶ τὸ προκύπτον γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γνωστοῦ ἄκρου ὄρου τῆς.

*Πρόβλημα 2ον.* Νὰ ὑπολογισθῇ ὁ ἄγνωστος ὄρος  $\chi$  τῆς ἀναλογίας  $4 : 7 = \chi : 56$ .

Ἐργαζόμενοι, ὅπως εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα, εὐρίσκομεν κατὰ σειράν :

$$7 \cdot \chi = 4 \cdot 56 \text{ (διατί ; ) ἢ } \chi = \frac{4 \cdot 56}{7} = 32 \text{ (διατί ; )}$$

Διατυπώσατε τὸν κανόνα, κατὰ τὸν ὁποῖον εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν ἑνὸς ἀγνώστου μέσου ὄρου μιᾶς ἀναλογίας.

*Πρόβλημα 3ον.* Νὰ ὑπολογισθῇ ὁ μέσος ὄρος τῆς ἀναλογίας  $6 : \chi = \chi : 24$ .

Κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα ἔχομεν :

$$\chi^2 = 6 \cdot 24 \text{ ἢ } \chi^2 = 144.$$

Ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς  $\chi$  εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 144.

Ἐπειδὴ δὲ  $\sqrt{144} = 12$ , ἔπεται ὅτι  $\chi = 12$ .

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν ὅτι :

Ὁ μέσος ἀνάλογος δύο ἀριθμῶν εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ γινομένου αὐτῶν.

§ 400. *Θεώρημα II.* Ἐάν τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενον δύο ἄλλων ἀριθμῶν, οἱ τέσσαρες αὐτοὶ ἀριθμοὶ δύνανται νὰ σχηματίζουσι ἀναλογίαν, ἀρκεῖ νὰ θέσωμεν τοὺς παράγοντας τοῦ ἑνὸς γινομένου ὡς ἄκρους ὄρους καὶ τοὺς παράγοντας τοῦ ἄλλου γινομένου ὡς μέσους ὄρους.

Ἐστω ὅτι  $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma$ . Λέγω ὅτι οἱ ἀριθμοὶ  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  σχηματίζουσι ἀναλογίαν.

*Ἀπόδειξις.* Διότι διαιροῦντες τὰ δύο ἴσα γινόμενα  $\alpha \cdot \delta$  καὶ  $\beta \cdot \gamma$  διὰ τοῦ γινομένου  $\beta \cdot \delta$  (τὸ ὁποῖον εὐρίσκομεν, ἂν λάβωμεν ἓνα παράγοντα ἐκ τοῦ πρώτου γινομένου καὶ τὸν ἄλλον ἐκ τοῦ δευτέρου γινομένου) θὰ προκύψωσι ἐξαγόμενα ἴσα ἤτοι θὰ εἶναι :

$$\frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \delta} = \frac{\beta \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta} \quad \eta \quad (\text{μετὰ τὴν ἀπλοποίησησιν}) \quad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}.$$

*Παρατήρησις.* Ἄν διαιρέσωμεν τὰ δοθέντα ἴσα γινόμενα  $\alpha \cdot \delta$  καὶ  $\beta \cdot \gamma$  διὰ  $\beta \cdot \delta$  ἢ διὰ  $\gamma \cdot \delta$  ἢ διὰ  $\alpha \cdot \gamma$  ἢ διὰ  $\alpha \cdot \beta$ , προκύπτουσιν ἀντιστοίχως αἱ ἀναλογίαι :

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \quad (1), \quad \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta} \quad (2), \quad \frac{\delta}{\gamma} = \frac{\beta}{\alpha} \quad (3), \quad \frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{\alpha} \quad (4).$$

§ 401. *Πόρισμα I.* Ἀπὸ τὰς ἰσότητας (1) καὶ (2) καθὼς καὶ τὰς (1) καὶ (4) τῆς προηγουμένης παραγράφου συνάγομεν ὅτι :

Ἄν εἰς ἀναλογίαν ἀνταλλάξωμεν τοὺς μέσους ὄρους, προκύπτει νέα ἀναλογία, ὁμοίως καὶ ἂν ἀνταλλάξωμεν τοὺς ἄκρους ὄρους ἀναλογίας.

*Πόρισμα II.* Παρατηροῦντες τὰς (1) καὶ (3) συνάγομεν ὅτι :

Ἐάν δύο λόγοι εἶναι ἴσοι, θὰ εἶναι καὶ οἱ ἀντίστροφοι αὐτῶν ἴσοι.

§ 402. *Θεώρημα III.* Ἐάν εἰς μίαν ἀναλογίαν ἀντικαταστήσωμεν τὸν πρῶτον ὄρον τῆς διὰ τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο πρώτων ὄρων καὶ τὸν τρίτον ὄρον τῆς διὰ τοῦ ἀθροίσματος τῶν δύο τελευταίων ὄρων τῆς, σχηματίζομεν μίαν νέαν ἀναλογίαν.

Ἐστω ἡ ἀναλογία  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ . Λέγω ὅτι, ἐὰν ἀντικαταστήσωμεν τὸν πρῶτον ὄρον  $\alpha$  διὰ τοῦ ἀθροίσματος  $\alpha + \beta$  καὶ τὸν τρίτον ὄρον  $\gamma$  διὰ τοῦ ἀθροίσματος  $\gamma + \delta$ , θὰ προκύψῃ νέα ἀναλογία. Δηλαδή λέγω ὅτι εἶναι :

$$\frac{\alpha + \beta}{\beta} = \frac{\gamma + \delta}{\delta}.$$

Ἀπόδειξις. Διότι, ἐὰν προσθέσωμεν καὶ εἰς τοὺς δύο ἴσους ἀριθμούς  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν 1, θὰ προκύψουν ἐξαγόμενα ἴσα.

\*Ἦτοι θὰ εἶναι :

$$\frac{\alpha}{\beta} + 1 = \frac{\gamma}{\delta} + 1 \quad \eta \quad \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} + \frac{\delta}{\delta} \quad \eta \quad \frac{\alpha+\beta}{\beta} = \frac{\gamma+\delta}{\delta}.$$

§ 403. *Θεώρημα IV.* Ἐὰν εἰς μίαν ἀναλογίαν ἀντικαταστήσωμεν τὸν πρῶτον ὄρον τῆς διὰ τῆς διαφορᾶς τῶν δύο πρώτων καὶ τὸν τρίτον ὄρον τῆς διὰ τῆς διαφορᾶς τῶν δύο τελευταίων, σχηματίζομεν μίαν νέαν ἀναλογίαν.

\*Ἐστω ἡ ἀναλογία  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ . Λέγω ὅτι θὰ εἶναι καὶ  $\frac{\alpha-\beta}{\beta} = \frac{\gamma-\delta}{\delta}$ .

Ἀπόδειξις. Διότι, ἐὰν ἀφαιρέσωμεν καὶ ἀπὸ τοὺς δύο ἴσους ἀριθμούς  $\frac{\alpha}{\beta}$  καὶ  $\frac{\gamma}{\delta}$  τὸν ἀριθμὸν 1 ( ὑποτίθεται ὅτι ἡ ἀφαίρεσις εἶναι δυνατή ), θὰ προκύψουν ἐξαγόμενα ἴσα, ἥτοι θὰ εἶναι :

$$\frac{\alpha}{\beta} - 1 = \frac{\gamma}{\delta} - 1 \quad \eta \quad \frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} - \frac{\delta}{\delta} \quad \eta \quad \frac{\alpha-\beta}{\beta} = \frac{\gamma-\delta}{\delta}.$$

§ 404. *Θεώρημα V.* Ἐὰν εἶναι  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ , θὰ εἶναι ἐπίσης καὶ  $\frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta} = \frac{\gamma+\delta}{\gamma-\delta}$ .

Ἀπόδειξις. Ἐκ τῆς ἀναλογίας  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  εἶναι, κατὰ γνωστὴν ιδιότητα (§ 402), καὶ  $\frac{\alpha+\beta}{\beta} = \frac{\gamma+\delta}{\delta}$  ἢ, ἂν ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν μέσων ὄρων αὐτῆς,  $\frac{\alpha+\beta}{\gamma+\delta} = \frac{\beta}{\delta}$ . (1)

Ὁμοίως ἐκ τῆς ἀναλογίας  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$  προκύπτει, κατὰ γνωστὴν ιδιότητα τῶν ἀναλογιῶν (§ 403), ὅτι

$$\frac{\alpha-\beta}{\beta} = \frac{\gamma-\delta}{\delta} \quad \eta \quad \frac{\alpha-\beta}{\gamma-\delta} = \frac{\beta}{\delta} \quad (\text{διατί ;}) \quad (2)$$

Ἐπειδὴ τὰ δευτέρα μέλη τῶν ἰσοτήτων (1) καὶ (2) εἶναι ἴσα, θὰ εἶναι καὶ τὰ πρῶτα, ἥτοι θὰ εἶναι  $\frac{\alpha+\beta}{\gamma+\delta} = \frac{\alpha-\beta}{\gamma-\delta}$ .

\*Ἄν ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν τῶν μέσων ὄρων αὐτῆς εὐρίσκομεν

$$\frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta} = \frac{\gamma+\delta}{\gamma-\delta}$$

§ 405. *Θεώρημα VI.* Ἐὰν πολλοὶ λόγοι εἶναι ἴσοι, τὸ ἄθροισμα τῶν προηγουμένων ὄρων διαιρούμενον διὰ τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἐπομένων ὄρων δίδει ἓνα νέον λόγον ἴσον πρὸς αὐτούς.

Ἐστω ὅτι οἱ λόγοι  $\frac{\alpha}{\beta}$ ,  $\frac{\gamma}{\delta}$ ,  $\frac{\epsilon}{\zeta}$  εἶναι ἴσοι, ἤτοι ἔστω ὅτι  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\epsilon}{\zeta}$ .

$$\text{Θὰ δεῖξω ὅτι } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha + \gamma + \epsilon}{\beta + \delta + \zeta}.$$

Ἀπόδειξις Ἄν παραστήσωμεν τοὺς ἴσους λόγους μὲ λ, θὰ εἶναι :

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\epsilon}{\zeta} = \lambda \quad (1)$$

Ἀπὸ τῆν σχέσιν αὐτὴν λαμβάνομεν :

$$\frac{\alpha}{\beta} = \lambda, \quad \text{ἄρα } \alpha = \beta \cdot \lambda \quad (\text{διατί ;}) \quad (2)$$

$$\frac{\gamma}{\delta} = \lambda, \quad \text{ἄρα } \gamma = \delta \cdot \lambda \quad (\text{διατί ;}) \quad (3)$$

$$\frac{\epsilon}{\zeta} = \lambda, \quad \text{ἄρα } \epsilon = \zeta \cdot \lambda \quad (\text{διατί ;}) \quad (4)$$

Προσθέτοντες τὰς ἰσότητες (2), (3), (4) κατὰ μέλη εὐρίσκομεν ὅτι :  
 $\alpha + \gamma + \epsilon = \beta \cdot \lambda + \delta \cdot \lambda + \zeta \cdot \lambda$  ἢ  $\alpha + \gamma + \epsilon = (\beta + \delta + \zeta) \cdot \lambda$  (§ 371).

Διαιροῦντες καὶ τὰ δύο μέλη τῆς τελευταίας ἰσότητος διὰ  $(\beta + \delta + \zeta)$  εὐρίσκομεν :  $\frac{\alpha + \gamma + \epsilon}{\beta + \delta + \zeta} = \lambda$ . (5)

Παραβάλλοντες τὰς ἰσότητες (1) καὶ (5) συνάγομεν ὅτι :

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\epsilon}{\zeta} = \frac{\alpha + \gamma + \epsilon}{\beta + \delta + \zeta} \quad \text{ὁ.ξ.δ.}$$

Σημείωσις. Ἡ ἀνωτέρω ιδιότης λέγεται καὶ **ιδιότης τῶν ἴσων κλασμάτων**.

### Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

Α'. Ὁ μ ἄ ς. 67) Νὰ γραφῆ ὑπὸ μορφήν ἀναλογίας καθ' ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους ἢ ἰσότης  $3 \times 12 = 4 \times 9$ .

68) Οἱ τρεῖς ὄροι μιᾶς ἀναλογίας εἶναι 2, 5, 8. Ποῖος εἶναι ὁ τέταρτος ;

69) Νὰ γραφῆ ὑπὸ μορφήν ἀναλογίας ἢ ἰσότης  $\gamma^2 = \alpha \cdot \beta$ .

70) Νὰ ὑπολογισθῆ ὁ ἄγνωστος ὄρος εἰς τὰς ἀναλογίας :

$$\begin{array}{l} 1. \quad \frac{x}{8} = \frac{9}{36}, \quad \frac{3}{x} = \frac{6}{4}, \quad \frac{5,4}{8} = \frac{x}{3} \\ 2. \quad \frac{5}{x} = \frac{x}{125}, \quad \frac{2,5}{4} = \frac{6,3}{x}, \quad \frac{45}{x} = \frac{x}{125} \end{array}$$

71) Νά εύρεθῆ ὁ τρίτος ἀνάλογος τῶν κάτωθι ἀριθμῶν :

24 καὶ 12, 27 καὶ 3, 36 καὶ 12

B'. 'Ο μ α ς. 72) 'Ο λόγος τῶν ἐμβαδῶν δύο οἰκοπέδων εἶναι  $\frac{5}{8}$ . Τὸ πρῶτον οἰκοπέδον εἶναι 240 τ.μ. καὶ 56 τ. παλ. Πόσον εἶναι τὸ ὄλικόν ἐμβαδὸν τῶν δύο οἰκοπέδων ;

73) Δύο τόξα τῆς αὐτῆς περιφερείας εἶναι  $17^\circ 21' 45''$  τὸ ἓνα καὶ  $11^\circ 27' 3''$  τὸ ἄλλο. Νά εύρεθῆ ὁ λόγος τοῦ πρῶτου πρὸς τὸ δεύτερον.

74) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι, ἐὰν ἔχωμεν τὴν ἀναλογίαν  $\alpha : \beta = \gamma : \delta$ , θὰ ἔχωμεν καί :

1.  $\alpha : \delta = \beta\gamma : \delta^2$

3.  $\mu\alpha : \nu\beta = \mu\gamma : \nu\delta$

2.  $1 : \beta = \gamma : \alpha\delta$

4.  $(\alpha-1) : \beta = (\beta\gamma-\delta) : \beta\delta$ .

75) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι, ἐὰν ἔχωμεν τὴν ἀναλογίαν  $\alpha : \beta = \beta : \gamma$ , θὰ ἔχωμεν καί :

1.  $\gamma : \beta = \beta : \alpha$ , 2.  $\alpha : \gamma = \beta^2 : \gamma^2$ ,

3.  $(\alpha\gamma-1) : (\beta-1) = (\beta+1) : 1$ .

76) Νά ἀποδειχθῆ ὅτι, ἐὰν ἔχωμεν τὴν ἀναλογίαν  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ , θὰ ἔχωμεν καί :

1.  $\frac{\alpha+\beta}{\gamma+\delta} = \frac{\beta}{\delta}$ .

3.  $\frac{\alpha+\gamma}{\alpha-\gamma} = \frac{\beta+\delta}{\beta-\delta}$ , ἂν  $\alpha > \gamma$ .

2.  $\frac{\alpha-\beta}{\gamma-\delta} = \frac{\beta}{\delta}$ , ἂν  $\alpha > \beta$ .

4.  $\frac{3\alpha+4\gamma}{3\alpha-4\gamma} = \frac{3\beta+4\delta}{3\beta-4\delta}$ , ἂν  $3\alpha > 4\gamma$ .

# ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

### ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Σελίς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ἀριθμησις. Προεισαγωγικαὶ γνώσεις. Προφορικὴ ἀρίθμησις. Γραπτὴ ἀρίθμησις. Μέτρησις ποσῶν.	5 - 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Πρόσθεσις τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Ἔννοια τῆς προσθέσεως. Ἰδιότητες τῆς προσθέσεως. Ἐκτέλεσις τῆς προσθέσεως. Συντομίαι τῆς προσθέσεως καὶ εὗρεσις ἀθροίσματος ἀριθμῶν ἀπὸ μνήμης. Προβλήματα προσθέσεως.	21 - 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Ἀφαιρέσις τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Ἔννοια τῆς ἀφαιρέσεως. Ἰδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως. Ἐκτέλεσις τῆς ἀφαιρέσεως. Συντομίαι ἀφαιρέσεως καὶ εὗρεσις τῆς διαφορᾶς δύο ἀριθμῶν ἀπὸ μνήμης. Προβλήματα ἀφαιρέσεως.	34 - 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Πολλαπλασιασμός τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Ἔννοια τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Ἰδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Ἐκτέλεσις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Συντομίαι τοῦ πολλαπλασιασμοῦ καὶ εὗρεσις τοῦ γινομένου δύο ἀριθμῶν. Χρησις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ πρὸς λύσιν προβλημάτων. Προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ. Γινόμενον πολλῶν παραγόντων.	46 - 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. Διαίρεσις τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Ἔννοια τῆς διαιρέσεως. Ἰδιότητες τῆς διαιρέσεως. Ἐκτέλεσις τῆς διαιρέσεως δύο ἀριθμῶν. Συντομίαι διαιρέσεως καὶ εὗρεσις τοῦ πηλίκου δύο ἀριθμῶν ἀπὸ μνήμης. Συντομίαι πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως. Χρησις τῆς διαιρέσεως πρὸς λύσιν προβλημάτων. Προβλήματα διαιρέσεως. Προβλήματα ἐπὶ τῶν 4 πράξεων τῶν ἀκεραίων.	68 - 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. Δυνάμεις τῶν ἀριθμῶν. Ὁρισμοί. Ἰδιότητες τῶν δυνάμεων.	90 - 94
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. Διαιρετότης. Ὁρισμοί καὶ ἰδιότητες. Χαρακτῆρες διαιρετότητος. Κοινὸς διαιρέται. Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης. Ἰδιότητες τῶν κοινῶν διαιρετῶν. Εὗρεσις τοῦ μ.κ.δ. δοθέντων ἀριθμῶν. Ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον ἀριθμῶν. Πρῶτοι καὶ σύνθετοι ἀριθμοί. Ἀνάλυσις ἀριθμῶν εἰς γινόμενα πρῶτων παραγόντων καὶ ἐφαρμογαὶ αὐτῆς.	95 - 119

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

### ΟΙ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ἐννοια τῶν κλασματικῶν ἀριθμῶν. Ὅρισμοί. Ἐφαρμογαί. Σελίς  
120 - 134
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Πράξεις ἐπὶ τῶν κλασμάτων. Πρόσθεσις κλασμάτων. Ἀφαίρεσις κλασμάτων. 135 - 144
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων. Πολλαπλασιασμός ἀριθμοῦ ἐπὶ ἀκεραίου ἀριθμόν. Πολλαπλασιασμός ἀριθμοῦ ἐπὶ κλάσμα. Πολλαπλασιασμός ἀριθμοῦ ἐπὶ μεικτόν. Γινόμενον πολλῶν παραγόντων. 145 - 167
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Διαίρεισις κλασμάτων. Διαίρεισις ἀριθμοῦ δι' ἀκεραίου. Διαίρεισις ἀριθμοῦ διὰ κλάσματος. Διαίρεισις ἀριθμοῦ διὰ μεικτοῦ. Σύνθετα κλάσματα. Προβλήματα, τὰ ὅποια λύονται διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα. Δυνάμεις τῶν κλασμάτων. Διάφορα προβλήματα πρὸς ἐπανάληψιν τῶν πράξεων τῶν κλασμάτων. 168 - 187

### ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

#### ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΑΡΙΘΜΟΥ. ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ.

- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Δεκαδικοὶ ἀριθμοί. Ὅρισμοί. Ἰδιότητες τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν. Πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν. Πολλαπλασιασμός τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν. Διαίρεισις τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν. Συντομία πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως. Προβλήματα ἐπὶ τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν. 188 - 211
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ. Τετράγωνον ἀριθμοῦ. Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ. Ἐξαγωγή τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ἀριθμοῦ. Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,1 0,01 κ.τ.λ. Ἐξαγωγή τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ἑνὸς κλάσματος. 212 - 217
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Μετρικὸν σύστημα. Μέτρον ποσοῦ. Μονάδες μήκους. Μονάδες ἐπιφανειῶν. Μονάδες ὄγκου καὶ χωρητικότητος. Μονάδες βάρους. Μονάδες χρόνου. Μονάδες τόξων. Μονάδες νομισμάτων. 218 - 229
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Συμμιγεῖς ἀριθμοί. Ὅρισμοί. Τροπὴ συμμιγοῦς ἀριθμοῦ εἰς ἀπλοῦν καὶ τανάπαυιν. Πρόσθεσις συμμιγῶν ἀριθμῶν. Ἀφαίρεσις συμμιγῶν ἀριθμῶν. Πολλαπλασιασμός καὶ διαίρεισις συμμιγῶν ἀριθμῶν. Διάφορα προβλήματα ἐπὶ ἀπλῶν καὶ συμμιγῶν ἀριθμῶν. 230 - 253

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

### ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Σελίς

- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Λόγοι, ἀναλογίαι καὶ μεταβλητὰ ποσά. Λόγοι καὶ ἀναλογίαι. Ποσὰ ἀνάλογα καὶ ποσὰ ἀντίστροφα. Μεταβλητὰ ποσά. Γραφικὴ παράστασις τῆς μεταβολῆς αὐτῶν. 254 - 269
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Ἀπλῆ καὶ σύνθετος μέθοδος τῶν τριῶν. Ἀπλῆ μέθοδος τῶν τριῶν. Προβλήματα ποσοστῶν. Σύνθετος μέθοδος τῶν τριῶν. Συνεξευγμένη μέθοδος. 270 - 286
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Προβλήματα τόκου. Ὅρισμοί. Εὐρεσις τοῦ τόκου. Εὐρεσις τοῦ κεφαλαίου. Εὐρεσις τοῦ χρόνου. Εὐρεσις τοῦ ἐπιτοκίου. Διάφορα προβλήματα τόκου. Χρήσις βοηθητικοῦ ποσοῦ. 287 - 299
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Ὑφαίρεσις. Ὅρισμοί. Ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις. Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις. Κοινὴ λῆξις γραμματίων. Διάφορα προβλήματα ὑφαίρεσεως. 300 - 311
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. Μερισμὸς εἰς μέρη ἀνάλογα. Ἀναμείξεις. Προβλήματα μερισμοῦ. Προβλήματα ἐταιρείας. Προβλήματα μέσου ὄρου. Προβλήματα ἀναμείξεως. Προβλήματα κραμάτων. 312 - 332

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ἰδιότητες τῶν πράξεων. Ἰδιότητες τῆς ἰσότητος τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Ἰδιότητες τῶν ἀνίσων ἀριθμῶν. Ἰδιότητες τῆς προσθέσεως. Ἰδιότητες τῆς ἀφαιρέσεως. Ἰδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Ἰδιότητες τοῦ γινομένου πολλῶν παραγόντων. Ἰδιότητες τῆς διαιρέσεως. Περὶ δυνάμεων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Ἰδιότητες τῶν δυνάμεων τῶν ἀριθμῶν. 333 - 365
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Λόγοι καὶ ἀναλογίαι. Ὅρισμοί. Ἰδιότητες τῶν ἀναλογιῶν. 366 - 372

Τὰ αντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιοσημον, εἰς ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

Ἄντίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψίτυπον. Ὁ διαθέτων, πωλῶν, ἢ χρησιμοποιοῦν αὐτὸ διώκεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ νόμου 1129 τῆς 15/21 Μαρτίου 1946 (Ἐφ. Κυβ. 1946 Α' 108).



ΕΚΔΟΣΙΣ Θ', 1963 (VIII)—ΑΝΤΙΤΥΠΑ 40.000—ΣΥΜΒΑΣΙΣ 1170/20-5-63

Ἐκτύπωσις-Βιβλιοδεσία : ΙΩ. ΚΑΜΠΑΝΑ Ο.Ε. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4 ΑΘΗΝΑΙ



$$\frac{18}{10} = \frac{\quad}{100}$$

3,24

$$\begin{array}{r} 144 \\ 18 \\ \hline 324 \end{array}$$

530  

---

16<sup>05</sup>

~~3400~~  
3400

€10

1040