

5348



Κ. Ξ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ

τοῦ τῶν Μαθηματικῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις Λυκείου τῶν θηλέων (Ἀρσακείου)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ

ΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τιμᾶται μετὰ βιβλιοθήμου καὶ Φόρου . . Δρ. 35.70

Βιβλιόσημον Δραχ. 12,75. Ἀναγκ. Δαν. . . 3.85

Ἀριθμὸς πράξεως 179—27]8]927.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Δ. ΤΖΑΚΑ, ΣΤΕΦ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ

81^Α — ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ — 81^Α

ΑΘΗΝΑΙ

1927

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κ. Ξ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγητοῦ τῶν Μαθηματικῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις Διδασκαλείου τῶν θηλέων (Ἰατρικεῖου)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝΕΚΔΟΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ


ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Δ. ΤΖΑΚΑ, ΣΤΕΦ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Σ^Α81^Α — ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ — 81^Α

ΑΘΗΝΑΙ

1927

Πάν γνήσιον αντίτυπον φέρει τὴν ἰδιόχειρον ὑπογραφήν
τοῦ συγγραφέως καὶ τὴν σφραγίδα τῶν ἐκδοτῶν.



N. Tzaka & S. Delagrammatika

ΤΥΠΟΙΣ "ΑΥΓΗΣ" ΑΘ. Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ



ΚΑΦΑΛΑΙΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Μονάς καὶ ἀριθμός.

1. Ὄταν παρατηρῶμεν πράγματα ὅμοια, παραδείγματος χάριν, μαθητὰς, πρόβατα, δένδρα, κτλ., (χωρὶς νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὰ ἰδιαιτέρα χαρακτηριστικὰ αὐτῶν), ἕκαστον ἐξ αὐτῶν λαμβάνεται ὡς **μονάς** ὥστε ὁ μαθητὴς, τὸ πρόβατον, τὸ δένδρον, κτλ. εἶναι μονάς. Δυνάμεθα ὅμως μὲ πολλοὺς μαθητὰς νὰ σχηματίσωμεν τάξεις, ἢ μὲ πολλὰ πρόβατα νὰ σχηματίσωμεν ποίμνια, τότε μονάς εἶναι ἡ τάξις, τὸ ποίμνιον. Ὡστε

Μονάς λέγεται ἕκαστον ἐκ τῶν πολλῶν ὁμοίων πραγμάτων (ἢ καὶ πολλὰ ὁμοῦ ὅμοια πράγματα, τὰ ὁποῖα θεωροῦμεν ὡς ἓν ὅλον).

Ἀριθμός λέγεται πλῆθός τις μονάδων (ἢ καὶ μία μόνη μονάς).

Ἀρίθμησις.

2. Ἡ εὕρεσις τοῦ ἀριθμοῦ, ὅστις ὀρίζει πλῆθός τι, λέγεται **ἀρίθμησις** τοῦ πλήθους τούτου. Ἀρίθμησις λέγεται προσέτι καὶ ἡ ἐξήγησις τοῦ τρόπου, διὰ τοῦ ὁποίου σχηματίζομεν, ὀνομάζομεν, γράφομεν καὶ ἀπαγγέλλομεν τοὺς ἀριθμούς.

Τὴν ἀρίθμησιν καὶ τὰ περὶ ἀριθμῶν ἐν γένει διδάσκει ἡ **Ἀριθμητικὴ**.

Σχηματισμὸς καὶ ὀνομασία τῶν ἀριθμῶν.

3. Ἡ μονάς ὡς ἀριθμὸς θεωρουμένη λέγεται **ἓν**. Ἐὰν μὲ τὴν μονάδα ἐνώσωμεν καὶ ἄλλην μίαν μονάδα (παραδ. χάριν, ἂν ἔχωμεν ἐν μῆλον καὶ λάβωμεν ἐν μῆλον ἀκόμη), σχηματίζομεν νέον ἀριθμόν, τὸν ὁποῖον ὀνομάζομεν **δύο**. Ἐὰν μὲ τὸν δύο ἐνώσωμεν καὶ ἄλλην μίαν μονάδα, σχηματίζομεν νέον ἀριθμόν, τὸν ὁποῖον ὀνομάζομεν **τρία**. Οὕτω δὲ ἐξακολουθοῦντες, σχηματίζομεν διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς μονάδος τοὺς ἐξῆς κατὰ σειρὰν ἀριθμούς: **τέσσαρα, πέντε, ἕξ, ἐπτά, ὀκτώ, ἐννέα**.

Οἱ ἀνωτέρω ἀριθμοὶ οἱ σχηματιζόμενοι διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς μονάδος παριστῶσι **μονάδας ἀπλᾶς**· διότι, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, ὑπάρχουσι καὶ μονάδες σύνθετοι ἐξ ἄλλων μονάδων.

4. Ἐὰν πάλιν μὲ τὸν ἀριθμὸν ἐννέα ἐνώσωμεν μίαν μονάδα ἢ ἐν ἀκόμῃ, σχηματίζομεν νέον ἀριθμὸν, τὸν ὁποῖον ὀνομάζομεν **δέκα**. Ἐξακολουθοῦντες τὸν αὐτὸν τρόπον, δυνάμεθα νὰ σχηματίζομεν ὅσουσδήποτε ἀριθμοὺς θέλομεν, χωρὶς ποτε νὰ τελειώσωμεν. Ἄλλ' ἐπειδὴ εἴμεθα ἠναγκασμένοι εἰς ἕκαστον σχηματιζόμενον ἀριθμὸν νὰ δίδωμεν καὶ νέον ὄνομα, ἵνα διακρίνωμεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων, ὅτε θὰ ἦτο ἀδύνατον νὰ ἐνθυμώμεθα ὅλα τὰ ὀνόματα αὐτῶν, διὰ τοῦτο πρὸς σχηματισμὸν τῶν ἀριθμῶν μεταχειρίζομεθα ἄλλον τρόπον, διὰ τοῦ ὁποῖου δι' ὀλίγων λέξεων δυνάμεθα νὰ ὀνομάσωμεν μέγα πλῆθος ἀριθμῶν. Ὁ τρόπος οὗτος στηρίζεται ἐπὶ τῆς ἐξῆς συνθήκης :

Ἀριθμοὶ τινες δύνανται νὰ θεωρῶνται ὡς νέαι μονάδες καὶ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως αὐτῶν νὰ σχηματίζονται ἄλλοι ἀριθμοί.

5. Ὁ ἀριθμὸς λοιπὸν δέκα, ἂν καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα μονάδας, θεωρεῖται ὅμως ὡς νέα μονὰς καὶ λέγεται **δεκάς**. Ὅπως διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς μονάδος ἐσχηματίσθησαν οἱ ἀνωτέρω ἀριθμοί, οὕτω καὶ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς δεκάδος σχηματίζονται οἱ ἐξῆς ἀριθμοί :

Μία δεκάς ἢ ἀπλούστερον **δέκα**, δύο δεκάδες ἢ **εἴκοσι**, τρεῖς δεκάδες ἢ **τριάκοντα**, τέσσαρες δεκάδες ἢ **τεσσαράκοντα**, πέντε δεκάδες ἢ **πεντήκοντα**, ἕξ δεκάδες ἢ **ἑξήκοντα**, ἑπτὰ δεκάδες ἢ **ἑβδομήκοντα**, ὀκτὼ δεκάδες ἢ **ὀγδοήκοντα**, ἐννέα δεκάδες ἢ **ἐνενήκοντα**.

Οἱ ἀνωτέρω ἀριθμοὶ οἱ σχηματιζόμενοι διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς δεκάδος παριστῶσι **δεκάδας**.

6. Οἱ μεταξὺ δύο διαδοχικῶν δεκάδων ἀριθμοὶ λαμβάνουσι τὰ ὀνόματα τῶν δεκάδων, ἦτοι **δέκα, εἴκοσι, τριάκοντα, . . . ἐνενήκοντα** καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἀπλῶν μονάδων **ἐν, δύο, τρία, . . . ἐννέα**, προτάσσονται ὅμως τὰ ὀνόματα τῶν δεκάδων καὶ βαίνουσι κατὰ τὴν ἐξῆς σειράν :

Δέκα, ἐνδεκα (ἕξαιρετικῶς ἀντὶ δέκα ἐν), **δώδεκα** (ἀντὶ δέκα δύο), **δέκα τρία, δέκα τέσσαρα, δέκα πέντε, δέκα ἕξ, δέκα ἑπτὰ, δέκα ὀκτὼ, δέκα ἐννέα**.

Εἴκοσι, εἴκοσι ἐν, εἴκοσι δύο, . . . εἴκοσι ἐννέα.

Τριάκοντα, τριάκοντα ἕν, . . . τριάκοντα ἐννέα.

Ἐνενήκοντα, ἐνενήκοντα ἐν, . . . ἐνενήκοντα ἐννέα.

7. Ἐὰν μὲ τὸν ἀριθμὸν ἐνενήκοντα ἐνώσωμεν μίαν δεκάδα ἀκόμῃ ἢ μὲ τὸν ἀριθμὸν ἐνενήκοντα ἐννέα ἐνώσωμεν μίαν μονάδα ἢ ἐν ἀκόμῃ, σχηματίζομεν νέον ἀριθμὸν, τὸν ὁποῖον ὀνομάζομεν **ἐκατόν**. Ὁ ἀριθμὸς οὗτος, ἂν καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα δεκάδας (ἢ ἐκατόν μονάδας),

θεωρεῖται ὅμως ὡς νέα μονὰς καὶ λέγεται *ἐκατοντάς*. Διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς ἐκατοντάδος σχηματίζονται οἱ ἑξῆς ἀριθμοί :

Μία ἐκατοντάς ἢ *ἐκατόν*, δύο ἐκατοντάδες ἢ *διακόσια*, τρεῖς ἐκατοντάδες ἢ *τριακόσια*, τέσσαρες ἐκατοντάδες ἢ *τετρακόσια*, πέντε ἐκατοντάδες ἢ *πεντακόσια*, ἕξ ἐκατοντάδες ἢ *ἑξακόσια*, ἑπτὰ ἐκατοντάδες ἢ *ἑπτακόσια*, ὀκτὼ ἐκατοντάδες ἢ *ὀκτακόσια*, ἑννέα ἐκατοντάδες ἢ *ἐννεακόσια*.

Οἱ μεταξὺ δύο διαδοχικῶν ἐκατοντάδων ἀριθμοὶ λαμβάνουσι τὰ ὀνόματα τῶν ἐκατοντάδων, ἤτοι *ἐκατόν*, *διακόσια*, *τριακόσια*, . . . *ἐννεακόσια* καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς μέχρι τοῦ *ἐνενήκοντα ἑννέα*, προτάσσονται ὅμως τὰ ὀνόματα τῶν ἐκατοντάδων καὶ βαίνουνσι κατὰ τὴν ἑξῆς σειρᾶν :

Ἐκατόν, ἐκατόν ἔν, ἐκατόν δύο, ἐκατόν τρία . . . *ἐκατόν ἐνενήκοντα ἑννέα*.

Διακόσια, διακόσια ἔν, . . . διακόσια ἐνενήκοντα ἑννέα.

Ἐννεακόσια, ἐννεακόσια ἔν, . . . ἐννεακόσια ἐνενήκοντα ἑννέα.

8. Ἐὰν μὲ τὸν ἀριθμὸν ἐννεακόσια ἐνώσωμεν μίαν ἐκατοντάδα ἢ μὲ τὸν ἀριθμὸν ἐννεακόσια ἐνενήκοντα ἑννέα ἐνώσωμεν μίαν μονάδα ἢ ἔν, σχηματίζομεν νέον ἀριθμὸν, τὸν ὁποῖον ὀνομάζομεν *χίλια*. Ὁ ἀριθμὸς χίλια, ἂν καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα ἐκατοντάδας (ἢ ἐκατόν δεκάδας ἢ χιλιάς μονάδας), θεωρεῖται ὅμως ὡς νέα μονὰς καὶ λέγεται *χιλιάς*. Διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τώρα τῆς χιλιάδος σχηματίζονται ἀριθμοὶ χιλιάδων, οἵτινες λαμβάνουσι τὰ ὀνόματα τῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς μέχρι τοῦ ἐννεακόσια ἐνενήκοντα ἑννέα, εἰς τὰ ὁποῖα προσαρτᾶται ἡ λέξις *χιλιάδες*, ἤτοι λέγομεν *τρεῖς χιλιάδες*, *ἑξήκοντα πέντε χιλιάδες*, κτλ. Δυνατὸν ὅμως ἀριθμὸς τις τῶν χιλιάδων νὰ περιέχη καὶ ἀριθμὸν μικρότερον τοῦ χίλια, ἤτοι ἀριθμὸν περιλαμβανόμενον μεταξὺ τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ἐννεακόσια ἐνενήκοντα ἑννέα.

9. Ὁ ἀριθμὸς δέκα χιλιάδες (τὸν ὁποῖον οἱ ἀρχαῖοι Ἑλληνες ὀνόμαζον *μύρια*) θεωρεῖται ὡς νέα μονὰς καὶ λέγεται *δεκάς τῶν χιλιάδων*. Ὁ ἀριθμὸς δέκα δεκάδες χιλιάδων ἢ ἐκατόν χιλιάδες θεωρεῖται ὡς νέα μονὰς καὶ λέγεται *ἐκατοντὰ τῶν χιλιάδων*. Ὁ ἀριθμὸς δέκα ἐκατοντάδες χιλιάδων ἢ χίλια χιλιάδες θεωρεῖται ὡς νέα μονὰς καὶ λέγεται *ἐκατομμύριον* (διότι εἶναι ἐκατόν μύρια).

10. Ὅπως διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς χιλιάδος ἐσχηματίσθησαν ἀριθμοὶ χιλιάδων, οὕτω καὶ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ ἐκατομμυρίου σχηματίζονται ἀριθμοὶ ἐκατομμυρίων. Καὶ ὁ μὲν ἀριθμὸς δέκα ἐκα-

τομμύρια θεωρεῖται ὡς νέα μονὰς καὶ λέγεται **δεκάς ἑκατομμυρίου**, ὅ δὲ ἀριθμὸς δέκα δεκάδες ἑκατομμυρίων ἢ ἑκατὸν ἑκατομμύρια θεωρεῖται ὡς νέα μονὰς καὶ λέγεται **ἑκατοντὰς ἑκατομμυρίου**, ὁ δὲ ἀριθμὸς δέκα ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων ἢ χίλια ἑκατομμύρια θεωρεῖται ὡς νέα μονὰς καὶ λέγεται **δισεκατομμύριον**.

11. Διὰ τῆς ἐπαναλήψεως πάλιν τοῦ δισεκατομμυρίου σχηματίζονται ἀριθμοὶ δισεκατομμυρίων, ἐπομένως ἔχουσι καὶ οὗτοι μονάδας, δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας δισεκατομμυρίων. Χίλια δισεκατομμύρια σχηματίζουν τὸν ἀριθμὸν **τρισεκατομμύριον** καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω βλέπομεν, ὅτι μὲ ὀλίγας λέξεις δυνάμεθα νὰ ὀνομάσωμεν μέγα πλῆθος ἀριθμῶν.

12. Ἡ μονὰς (ἀπλή) λέγεται καὶ μονὰς **πρώτης τάξεως**, ἢ δεκάς **δευτέρας τάξεως**, ἢ ἑκατοντὰς **τρίτης τάξεως** καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς. Ἡτοι αἱ μονάδες τῶν διαφόρων τάξεων, ἃς ἐσχηματίσαμεν ἀνωτέρω, εἶναι κατὰ σειρὰν αἱ ἑξῆς :

Μονὰς (ἀπλή)	ἢ μονὰς πρώτης τάξεως
Δεκάς	» δευτέρας »
Ἐκατοντὰς	» τρίτης »
Μονὰς τῶν χιλιάδων ἢ χιλιάς	» τετάρτης »
Δεκάς χιλιάδων	» πέμπτης »
Ἐκατοντὰς »	» ἕκτης »
Μονὰς ἑκατομ. ἢ ἑκατομμύριον	» ἑβδόμης »
Δεκάς »	» ὀγδόης »
Ἐκατοντὰς »	» ἐνάτης »
Μονὰς δισεκατομμυρίου	» δεκάτης »
Δεκάς »	» ἑνδεκάτης »
Ἐκατοντὰς »	» δωδεκάτης »

κ.τ.λ.

13. Ἐκ τῶν ἀνωτέρων μονάδων αἱ ἑξῆς: **μονάς, χιλιάς, ἑκατομμύριον, δισεκατομμύριον, τρισεκατομμύριον**, κτλ. ὧν ἑκάστη ἀποτελεῖται ἀπὸ χιλιάς μονάδας τῆς ἀμέσως προηγούμενης, λέγονται **ἀρχικαὶ μονάδες** καὶ ἑκάστη τούτων ἀποτελεῖ ἴδιον τμήμα περιλαμβάνον τρεῖς τάξεις, μονάδας, δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας. Ἡτοι ἔχομεν τὸν ἑξῆς πίνακα τῶν διαφόρων τμημάτων μετὰ τῶν ἐν αὐτοῖς τάξεων.

Τμήμα ἑκατομμυρίων ἢ ἑκατομμύρια			Τμήμα χιλιάδων ἢ χιλιάδες			Τμήμα μονάδων ἢ μονάδες		
Ἐκατοντάδες	Δεκάδες	Μονάδες	Ἐκατοντάδες	Δεκάδες	Μονάδες	Ἐκατοντάδες	Δεκάδες	Μονάδες
τῶν Ἐκατομμυρίων			τῶν Χιλιάδων			τῶν Μονάδων		

Εἰς τὸν ἀνωτέρω πίνακα αἱ μονάδες τῶν διαφορῶν τάξεων εἶναι γεγραμμένοι οὕτως, ὥστε ἐκάστη ἐξ αὐτῶν εὐρισκομένη πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἄλλης παριστᾶ μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως.

Διὰ τοῦ σχηματισμοῦ τῶν μονάδων τῶν διαφορῶν τάξεων δύναται πᾶς ἀριθμὸς νὰ θεωρηθῆ ὡς ἀποτελούμενος ἐκ μονάδων διαφορῶν τάξεων, καὶ ἐξ ἐκάστης τούτων νὰ μὴ περιέχη περισσοτέρας τῶν ἑννέα, διότι ἂν περιέχη δέκα, τότε δέκα μονάδες τάξεώς τινος ἀποτελοῦσι μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως. Ὅστε γνωρίζοντες τὰς μονάδας ἐκάστης τάξεως, ἅς περιέχει ἀριθμὸς τις, ὀρίζομεν ἔντελῶς τὸν ἀριθμὸν τοῦτον. Παραδείγματος χάριν, ὁ ἀριθμὸς ὅστις περιέχει τρεῖς χιλιάδας, πέντε ἑκατοντάδας, δύο δεκάδας καὶ ἕξ μονάδας εἶναι ἔντελῶς ὠρισμένος.

Γραφή καὶ ἀπαγγελία τῶν ἀριθμῶν.

14. Τὰ σημεῖα ἢ χαρακτῆρες, δι' ὧν παριστῶμεν τοὺς ἑννέα πρώτους ἀριθμοὺς

ἕν, δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε, ἕξ, ἑπτὰ, ὀκτώ, ἑννέα, εἶναι τὰ ἑξῆς: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Τὰ σημεῖα ταῦτα μετὰ τοῦ σημείου 0, δι' ὧν γράφονται ὅλοι οἱ ἀριθμοί, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, λέγονται **ψηφία ἢ Ἀραβικοὶ χαρακτῆρες**· διότι ἢ γνῶσις αὐτῶν μετεδόθη εἰς ἡμᾶς ἐκ τῶν Ἀράβων. Τὸ ψηφίον 0 λέγεται **μηδὲν ἢ μηδενικὸν** καὶ οὐδένα ἀριθμὸν παριστᾶ, ἀλλὰ χρησιμεύει, ὡς θὰ ἴδωμεν, εἰς τὸ νὰ κατέχη κατὰ τὴν γραφὴν τῶν ἀριθμῶν τὰς θέσεις ἑλλειπόντων ψηφίων, τὰ δὲ ἄλλα ψηφία λέγονται πρὸς διάκρισιν **σημαντικά**.

Διὰ τῆς παραδοχῆς τῶν ἀνωτέρω ψηφίων δυνάμεθα τώρα νὰ συντομεύσωμεν τὴν γραφὴν τῶν ἀριθμῶν, ἀρκεῖ νὰ γράφωμεν ἀντὶ τῶν λέξεων, δι' ὧν ἐκφράζονται οἱ ἀριθμοὶ τῶν μονάδων ἐκάστης τάξεως, τὰ ἀντίστοιχα ψηφία αὐτῶν. Παραδ. χάριν, ὁ ἀριθμὸς ὅστις ἔχει δύο δεκάδας καὶ ἑπτὰ μονάδας, ἦτοι ὁ εἴκοσι ἑπτὰ, γράφεται 2 δεκάδες καὶ 7 μονάδες. Δυνάμεθα ἀκόμη νὰ συντομεύσωμεν τὴν γραφὴν τῶν ἀριθμῶν, ἂν παραλείψωμεν καὶ τὰς λέξεις, δι' ὧν ἐκφράζεται τὸ εἶδος τῶν μονάδων ἐκάστου ψηφίου, ἀρκεῖ πρὸς τοῦτο νὰ γράφωμεν τὰ ψηφία τῶν διαφορῶν μονάδων μὲ τὴν αὐτὴν τάξιν ὡς εἶναι γεγραμμένοι αἱ μονάδες τῶν διαφορῶν τάξεων ἐν τῷ προηγουμένῳ πίνακι, ἦτοι εἰς τὴν πρώτην θέσιν (πρὸς τὰ δεξιὰ) νὰ γράφωμεν τὸ ψηφίον τῶν ἀπλῶν μονάδων, εἰς τὴν δευτέραν τὸ τῶν δεκάδων, εἰς τὴν τρίτην τὸ τῶν ἑκατοντάδων καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς· ἕκαστον τότε ψηφίον, ὡς ἐκ τῆς θέσεως τὴν ὁποίαν ἔχει ἐν τῷ ἀριθμῷ, ὀρίζει καὶ τὸ εἶδος τῶν μονάδων, ἅς πα-

ριστᾶ. Διὰ τοῦτο λοιπὸν ἐτέθη ἡ ἐξῆς συνθήκη πρὸς σύντομον γραφὴν τῶν ἀριθμῶν.

15. *Πᾶν ψηφίον, τὸ ὁποῖον γράφεται πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἄλλου, παριστᾶ μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως. Καὶ τὰνάπαλιν.*

Κατὰ τὴν συνθήκην λοιπὸν ταύτην, ὁ ἀνωτέρω ἀριθμὸς 2 δεκάδες καὶ 7 μονάδες γράφεται συντόμως ὡς ἐξῆς: 27, (διότι ὁ 2 ὡς κατέχων τὴν δευτέραν θέσιν παριστᾶ δεκάδας). Ἐὰν δὲ μονάδες κατωτέρας τινὸς τάξεως δὲν ὑπάρχωσι, γράφομεν εἰς τὴν θέσιν αὐτῶν 0, ἵνα τηρηθῇ τὸ εἶδος τῶν μονάδων ἐκάστου ψηφίου. Παρ. χάριν, ὁ ἀριθμὸς ὅστις ἔχει 2 ἑκατοντάδας καὶ 5 μονάδας, ἦτοι ὁ διακόσια πέντε, δὲν δύναται νὰ γραφῇ οὕτω: 25, διότι τότε κατὰ τὴν ἀνωτέρω συνθήκην ὁ 2, ὡς εὐρισκόμενος πρὸς τὰ ἀριστερὰ τῶν μονάδων, παριστᾶ δεκάδας καὶ οὐχὶ ἑκατοντάδας· ἵνα λοιπὸν τηρηθῇ τὸ εἶδος τῶν μονάδων τοῦ 2, ἦτοι νὰ παριστᾶ ἑκατοντάδας, πρέπει νὰ γράψωμεν 0 εἰς τὴν θέσιν τῶν ἑλλειπουσῶν δεκάδων, ἦτοι 205. Ὡστε ἦτο ἀνάγκη νὰ ἔχωμεν καὶ ἓν ἰδιαιτέρον ψηφίον, τὸ ὁποῖον νὰ ἀναπληροῖ τὴν θέσιν τῶν ἑλλειπουσῶν μονάδων τάξεώς τινος.

Κατὰ ταῦτα οἱ ἀριθμοὶ δέκα (1 δεκάς), εἴκοσι (2 δεκάδες), τριάκοντα . . . ἑνεήκοντα, γράφονται κατὰ σειρὰν ὡς ἐξῆς: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ὡσαύτως οἱ ἀριθμοὶ ἑκατὸν (1 ἑκατοντάς), διακόσια (2 ἑκατοντάδες), τριακόσια . . . ἑννεακόσια γράφονται κατὰ σειρὰν ὡς ἐξῆς: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900· ἐγράψαμεν δύο μηδενικὰ πρὸς τὰ δεξιὰ τῶν ἑκατοντάδων, διότι δὲν ἐδόθησαν δεκάδες καὶ μονάδες.

Σημ. Οἱ ἀριθμοὶ οἱ ἔχοντες ἓν ψηφίον λέγονται *μονοψήφιοι*, οἱ ἔχοντες δύο λέγονται *διψήφιοι*, οἱ ἔχοντες τρία *τριψήφιοι* καὶ γενικῶς οἱ ἔχοντες πολλὰ λέγονται *πολυψήφιοι*.

16. Ὄταν συνηθίσωμεν νὰ γράφωμεν καὶ ἀπαγγέλλωμεν εὐκόλως τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τοῦ [ένος μέχρι τοῦ χίλια, δυνάμεθα νὰ γράφωμεν καὶ νὰ ἀπαγγέλλωμεν καὶ οἰονδήποτε ἄλλον ἀριθμὸν μεγαλύτερον τοῦ χίλια, ἀρκεῖζμόνον νὰ γνωρίζωμεν ἀπὸ μνήμης τὴν φυσικὴν σειρὰν τῶν τμημάτων τοῦ προηγουμένου πίνακος ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ τὰνάπαλιν, ἐξ ἀριστερῶν ἀπὸ οἰουδήποτε τμήματος πρὸς τὰ δεξιὰ. Προσέτι νὰ ἐνθυμώμεθα, ὅτι ἕκαστον τμήμα περιέχει τρεῖς τάξεις, ἦτοι μονάδας, δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας. Ἐχοντες λοιπὸν ταῦτα ὑπ' ὄψει, δυνάμεθα νὰ γράφωμεν εὐκόλως πάντα ἀριθμὸν, ἀκολουθοῦντες τὸν ἐξῆς κανόνα:

Διὰ νὰ γράψωμεν ἀριθμὸν ἀπαγγελλόμενον, γράψωμεν πρῶτον

τὸν ἀριθμὸν τοῦ τμήματος τῆς ἀνωτέρας δοθείσης ἀρχικῆς μονάδος· ἔπειτα πρὸς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ γράφομεν κατὰ σειρὰν τὸν ἀριθμὸν τοῦ τμήματος ἐκάστης κατωτέρας ἀρχικῆς μονάδος· προσέχοντες ὅμως, ἂν ὁ ἀριθμὸς τοῦ τμήματος κατωτέρας τινὸς ἀρχικῆς μονάδος δὲν δοθῇ, νὰ γράφωμεν εἰς τὴν θέσιν αὐτοῦ τρία μηδενικά πρὸς ἀναπλήρωσιν τῶν ἑλλειπουσῶν θέσεων μονάδων, δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων τοῦ τμήματος τούτου· ἂν ὅμως δοθῇ τοιοῦτος καὶ εἶναι διψήφιος, νὰ γράφωμεν πρὸς τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ ἓν μηδενικὸν πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς ἑλλειπούσης θέσεως τῶν ἑκατοντάδων· ἂν δὲ εἶναι μονοψήφιος, νὰ γράφωμεν δύο μηδενικά πρὸς ἀναπλήρωσιν τῶν ἑλλειπουσῶν θέσεων τῶν δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων.

Παρ. χάριν, ὁ ἀριθμὸς δέκα πέντε δισεκατομμύρια τριάκοντα ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ἕξ μονάδες γράφεται ὡς ἑξῆς : 15 000 038 006 (ἦτοι ἐγράψαμεν πρῶτον τὸν ἀριθμὸν 15 τοῦ τμήματος τῶν δισεκατομμυρίων· ἔπειτα τρία μηδενικά πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ τμήματος τῶν ἑκατομμυρίων· ἔπειτα τὸν ἀριθμὸν 38 τοῦ τμήματος τῶν χιλιάδων, ἀλλὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ ἐγράψαμεν καὶ ἓν μηδενικόν, διότι ὁ ἀριθμὸς τοῦ τμήματος τούτου εἶναι διψήφιος· καὶ τέλος τὸν ἀριθμὸν 6 τοῦ τμήματος τῶν μονάδων, ἀλλὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ ἐγράψαμεν καὶ δύο μηδενικά, διότι ὁ ἀριθμὸς τοῦ τμήματος τούτου εἶναι μονοψήφιος).

Ὡσαύτως οἱ ἀριθμοὶ μία χιλιάς ἢ χίλια, ἓν ἑκατομμύριον, ἓν δισεκατομμύριον, ἓν τρισεκατομμύριον γράφονται κατὰ σειρὰν ὡς ἑξῆς :

1 000, 1 000 000, 1 000 000 000, 1 000 000 000 000.

17. Διὰ νὰ ἀπαγγείλωμεν τώρα ἀριθμὸν γεγραμμένον διὰ ψηφίων καὶ ἔχοντα περισσότερα τῶν τριῶν ψηφίων, πρᾶττομεν ὡς ἑξῆς· χωρίζομεν αὐτὸν εἰς τριψήφια τμήματα δι' ὑποδιαστολῶν, ἀρχόμενοι ἔκ δεξιῶν (τὸ τελευταῖον τμήμα πρὸς τὰ ἀριστερὰ δυνατόν νὰ εἶναι διψήφιον ἢ μονοψήφιον), ἔπειτα ἀρχόμενοι ἕξ ἀριστερῶν, ἀπαγγέλλομεν ἕκαστον τμήμα μετὰ τοῦ ὀνόματός του.

Παραδ. χάριν, διὰ νὰ ἀπαγγείλωμεν τὸν ἀριθμὸν 23567309, χωρίζομεν αὐτὸν εἰς τριψήφια τμήματα, ἦτοι 23,567,309 καὶ ἀπαγγέλλομεν αὐτὸν ὡς ἑξῆς· εἴκοσι τρία ἑκατομμύρια, πεντακόσια ἑξήκοντα ἑπτὰ χιλιάδες καὶ τριακόσiai ἑννέα μονάδες.

18. Ἐπειδὴ, ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω, δέκα μονάδες τάξεώς τινος χρειάζονται ὅπως ἀποτελεσθῇ μία μονὰς τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, πρὸς δὲ δέκα ψηφία μεταχειρίζομεθα πρὸς γραφὴν ὅλων τῶν ἀριθμῶν, διὰ

τοῦτο ὁ ἀνωτέρω τρόπος τῆς ἀριθμήσεως λέγεται **δεκαδικὸν σύστημα**, ὁ δὲ ἀριθμὸς 10 λέγεται **βάσις** τοῦ συστήματος.

Συγκεκριμένοι καὶ ἀφηρημένοι ἀριθμοί.

Ὁμοειδεῖς καὶ ἑτεροειδεῖς ἀριθμοί.

19. **Συγκεκριμένοι** ἀριθμοὶ λέγονται ἐκεῖνοι, οἵτινες ὀρίζουσι τὸ πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον παριστῶσι· παραδ. χάριν, 5 βιβλία, 8 μαθηταί, 3 μῆλα. **Ἀφηρημένοι** δὲ ὅσοι δὲν ὀρίζουσι τὸ πρᾶγμα· π. χ. 2, 9, 18.

Οἱ συγκεκριμένοι ἀριθμοὶ διακρίνονται εἰς **ὁμοειδεῖς** καὶ **ἑτεροειδεῖς**.

Ὁμοειδεῖς ἀριθμοὶ λέγονται ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων αἱ μονάδες παριστῶσι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα· παραδ. χάριν, 5 μῆλα καὶ 7 μῆλα.

Ἑτεροειδεῖς δὲ ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων αἱ μονάδες παριστῶσι διάφορα πρᾶγματα· π. χ. 8 πρόβατα καὶ 20 δραχμαί.

Ἴσοι ἀριθμοί.

20. Δύο ἀριθμοὶ λέγονται ἴσοι, ὅταν αἱ μονάδες τοῦ ἑνὸς εἶναι, τόσαι, ὅσαι εἶναι αἱ μονάδες καὶ τοῦ ἄλλου. Ἐὰν π. χ. δώσωμεν εἰς ἓν παιδίον 3 μῆλα καὶ εἰς ἄλλο παιδίον ἄλλα 3 μῆλα, οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι εἶναι ἴσοι. Ὅταν δὲ θέλωμεν νὰ δεῖξωμεν, ὅτι δύο ἀριθμοὶ εἶναι ἴσοι, γράφομεν μεταξὺ αὐτῶν τὸ σημεῖον τῆς ἰσότητος, τὸ ὁποῖον εἶναι = καὶ ἀπαγγέλλεται **ἴσον**. Παραδ. χάριν, γράφομεν $3=3$ καὶ ἀπαγγέλλομεν **τρία ἴσον τρία**.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ γραφῆ διὰ ψηφίων ὁ ἀριθμὸς δέκα χιλιάδες καὶ ἐξήκοντα μονάδες. Ὡσαύτως ὁ ἀριθμὸς πέντε δισεκατομμύρια καὶ πέντε χιλιάδες.

2) Νὰ ἀπαγγεληθῶσιν οἱ ἀριθμοὶ 2037089, 203407814, 3000082656.

3) Μὲ πόσα μηδενικὰ γράφεται μία χιλιάς, ἓν ἑκατομμύριον, ἓν δισεκατομμύριον ;

4) Πόσας ἓν ὄλω μονάδας (ἀπλᾶς), δεκάδας, ἑκατοντάδας κλπ. ἔχει ὁ ἀριθμὸς 356708 ;

Διὰ νὰ μάθωμεν πόσας μονάδας, δεκάδας, ἑκατοντάδας κτλ. ἔχει ἓν ὄλω ἀριθμὸς τις, ἀπαγγέλλομεν αὐτὸν μέχρι τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων, δεκάδων, ἑκατοντάδων, κτλ. Ὁ ἀνωτέρω λοιπὸν ἀριθμὸς ἔχει 356708 μονάδας, 35670 δεκάδας, 3567 ἑκατοντάδας κτλ.

5) Πόσας ἑκατοντάδας ἔχουν 25 χιλιάδες ;

6) Πόσα ἑκατομμύρια ἔχουν τὰ πέντε δισεκατομμύρια ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

21. Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἔδωκέ τις εἰς τινα 5 μῆλα καὶ εἰς ἄλλον 3 μῆλα καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσα μῆλα ἔδωκε καὶ εἰς τοὺς δύο. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ ἐνώσωμεν μὲ τὰ μῆλα τοῦ ἐνὸς ἐξ αὐτῶν ὅλα τὰ μῆλα τοῦ ἄλλου ἀνὰ ἓν καὶ ἔστω μὲ τὰ 5 μῆλα τοῦ πρώτου νὰ ἐνώσωμεν τὰ 3 μῆλα τοῦ δευτέρου· ὅθεν λέγομεν 5 καὶ 1 κάμνουν 6, 6 καὶ 1 κάμνουν 7, 7 καὶ 1 κάμνουν 8. Ὡστε ἔδωκε καὶ εἰς τοὺς δύο 8 μῆλα. Ἡ πράξις αὕτη, διὰ τῆς ὁποίας σχηματίσαμεν ἓνα μόνον ἀριθμὸν τὸν 8, ὁ ὁποῖος ἔχει τόσας μονάδας, ὅσας ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ 5 καὶ 3, λέγεται **πρόσθεσις**.

Ὑποθέσωμεν ἐπίσης, ὅτι ἔδωκέ τις εἰς τινα πτωχὸν 2 δραχμὰς, εἰς ἄλλον 4 καὶ εἰς ἄλλον 6 καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσας δραχμὰς ἔδωκεν ἐν ὅλῳ. Ἀρκεῖ πάλιν νὰ σχηματίσωμεν ἓνα μόνον ἀριθμὸν, ὅστις νὰ ἔχη τόσας μονάδας, ὅσας ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ 2, 4, 6. Ὡστε ὀρίζομεν τὴν πρόσθεσιν ὡς ἐξῆς :

Πρόσθεσις λέγεται ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας σχηματίζομεν ἓνα ἀριθμὸν ἐξ ὄλων τῶν μονάδων, τὰς ὁποίας ἔχουσι δύο ἢ περισσότεροι θεθέντες ἀριθμοὶ.

Οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ, οἵτινες πρέπει νὰ προστεθῶσι, λέγονται **προσθετέοι**· ὁ δὲ διὰ τῆς προσθέσεως αὐτῶν σχηματιζόμενος ἀριθμὸς λέγεται **ἄθροισμα**.

Διὰ νὰ δεῖξωμεν, ὅτι δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ πρόκειται νὰ προστεθῶσι, γράφομεν μεταξὺ αὐτῶν τὸ σημεῖον + τὸ ὁποῖον ἀπαγγέλλεται **σύν**· ἦτοι 5+3 καὶ ἀπαγγέλλομεν πέντε σύν τρία (συνήθως ὅμως λέγομεν πέντε καὶ τρία).

Οἱ προσθετέοι ἀριθμοὶ δύνανται νὰ εἶναι συγκεκριμένοι ἢ ἀφηρημένοι· ἐὰν ὅμως εἶναι συγκεκριμένοι, πρέπει νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς· διότι ἕτεροειδεῖς ἀριθμοὺς δὲν δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν. Παραδ. χάριν, 6 μῆλα καὶ 3 πρόβατα δὲν προστίθενται (διότι οὔτε 9 μῆλα κάμνουν, οὔτε 9 πρόβατα). Ἐπειδὴ λοιπὸν οἱ προσθετέοι θὰ εἶναι ὁμοειδεῖς, διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν θὰ εἶναι ὁμοειδὲς μὲ τοὺς προσθετέους.

Ὁ ἀνωτέρω τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου προσθέτομεν εἰς ἀριθμὸν τινα τὰς μονάδας ἄλλου ἀνὰ μίαν, ἀπαιτεῖ καὶ κόπον καὶ χρόνον, διὰ τοῦτο

εἶναι ἀνάγκη νὰ συνηθίσωμεν διὰ μικρᾶς ἀσκήσεως νὰ εὐρίσκωμεν εὐκόλως ἀπὸ μνήμης τὸ ἄθροισμα δύο οἰωνδήποτε μονοψηφίων ἀριθμῶν, καθὼς καὶ τὸ ἄθροισμα διψηφίου ἢ πολυψηφίου καὶ μονοψηφίου. Τοῦτέστι πρέπει νὰ γνωρίζωμεν, ὅτι 5 καὶ 3 κάμνουν 8, 7 καὶ 9 κάμνουν 16, 83 καὶ 8 κάμνουν 91 κτλ.

Εἰς τὴν πρόσθεσιν οἱ ἀριθμοὶ δύνανται νὰ εἶναι ἢ μονοψήφιοι ἢ οἰοιδήποτε.

Πρόσθεσις μονοψηφίων ἀριθμῶν.

22. Διὰ νὰ προσθέσωμεν πολλοὺς μονοψηφίους ἀριθμοὺς πράττομεν ὡς ἑξῆς : Προσθέτομεν πρῶτον τοὺς δύο πρώτους, εἰς τὸ ἄθροισμα αὐτῶν προσθέτομεν τὸν τρίτον, εἰς τὸ νέον ἄθροισμα προσθέτομεν τὸν τέταρτον καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς, μέχρις ὅτου λάβωμεν ὅλους τοὺς προσθετέους.

Παραδ. χάριν, διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα $8+5+6+9$, λέγομεν 8 καὶ 5, 13· καὶ 6, 19· καὶ 9, 28. Τὸ αὐτὸ ἄθροισμα θὰ εὐρωμεν, ἂν προσθέσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς καθ' οἰανδήποτε ἄλλην τάξιν· διότι αἱ μονάδες τῶν δοθέντων ἀριθμῶν εἶναι ὀρισμέναι καὶ ἐπομένως εἶναι ἀδιάφορον κατὰ ποῖον τρόπον θὰ προστεθῶσι. Παραδ. χάριν, λέγομεν 8 καὶ 6, 14· καὶ 5, 19· καὶ 9, 28. ἢ 9 καὶ 6, 15· καὶ 8, 23· καὶ 5, 28. ἢ Ὡστε εἶναι $8+5+6+9=8+6+5+9=9+6+8+5=28$.

23. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὴν ἑξῆς ιδιότητα τῆς προσθέσεως.

Τὸ ἄθροισμα δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται καθ' οἰανδήποτε τάξιν καὶ ἂν προσθέσωμεν αὐτούς.

Σημ. Τὸ ψηφίον 0, ἐπειδὴ οὐδένα ἀριθμὸν παριστᾷ, διὰ τοῦτο προστιθέμενον εἰς ἀριθμὸν οὐδὲ ὅπως μεταβάλλει αὐτόν. ἢ $2+0=2$, $0+5=5$.

Πρόσθεσις οἰωνδήποτε ἀριθμῶν.

Ἔστω, ὡς παράδειγμα, νὰ προστεθῶσιν οἱ ἀριθμοὶ 7936, 4503, 54. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν χωριστὰ τὰς μονάδας αὐτῶν, χωριστὰ τὰς δεκάδας, χωριστὰ τὰς ἑκατοντάδας κτλ. καὶ ἔπειτα νὰ ἐνώσωμεν τὰ μερικὰ ταῦτα ἄθροίσματα. Ὡστε ἡ πρόσθεσις τῶν πολυψηφίων ἀνάγεται εἰς τὴν πρόσθεσιν τῶν μονοψηφίων. Ἄλλ' ἵνα μὴ συμβῇ λάθος ἐν τῇ πράξει καὶ προσθέσωμεν ψηφία διαφόρων τάξεων (ἴτοι μονάδας μὲ δεκάδας, ἢ δεκάδας μὲ ἑκατοντάδας κτλ.), δὲν γράφομεν τοὺς προσθετέους ἀριθμοὺς ὡς ἑξῆς : $7936+4503+54$, ἀλλὰ τὸν ἕνα ὑποκάτω τοῦ ἄλλου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην. Ἐπειτα σύρομεν ὑπο-

κάτω αὐτῶν ὀριζοντίαν γραμμὴν (διὰ τὸ νὰ χωρίζονται οἱ προσθετοὶ ἀπὸ τὸ ἄθροισμα) καὶ ὑποκάτω αὐτῆς γράφομεν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν, ὡς δεικνύει ἡ κατωτέρω διάταξις.

7936

4503

54

12493

Εὐρίσκομεν κατὰ πρῶτον τὸ ἄθροισμα τῶν μονάδων, ἧτοι λέγομεν 4 καὶ 3, 7 καὶ 6, 13. Ἄλλ' ἐπειδὴ 13 μονάδες ἀποτελοῦσι 1 δεκάδα καὶ 3 μονάδας, διὰ τοῦτο γράφομεν 3 ὑποκάτω τῆς γραμμῆς καὶ εἰς τὴν αὐτὴν στήλην τῶν μονάδων καὶ κρατοῦμεν τὴν 1 δεκάδα διὰ τὸ τὴν προσθέσωμεν εἰς τὰς δεκάδας.

Μεταβαίνομεν ἔπειτα εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων καὶ προσθέτομεν αὐτάς, λέγοντες 1 (τὸ κρατούμενον) καὶ 5, 6 καὶ 3, 9· γράφομεν λοιπὸν 9 εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων.

Μεταβαίνομεν ἔπειτα εἰς τὴν στήλην τῶν ἑκατοντάδων, λέγοντες 5 καὶ 9, 14. Ἄλλ' ἐπειδὴ 14 ἑκατοντάδες ἀποτελοῦσι 1 χιλιάδα καὶ 4 ἑκατοντάδας, διὰ τοῦτο γράφομεν 4 εἰς τὴν στήλην τῶν ἑκατοντάδων καὶ κρατοῦμεν τὴν 1 χιλιάδα διὰ τὸ τὴν προσθέσωμεν εἰς τὰς χιλιάδας.

Μεταβαίνομεν τέλος εἰς τὴν στήλην τῶν χιλιάδων, λέγοντες 1 (τὸ κρατούμενον) καὶ 4, 5 καὶ 7, 12 χιλιάδες. Ἄλλ' ἐπειδὴ 12 χιλιάδες ἀποτελοῦσι 1 δεκάδα χιλιάδων καὶ 2 χιλιάδας, διὰ τοῦτο γράφομεν 2 εἰς τὴν στήλην τῶν χιλιάδων καὶ πρὸς τὰ ἀριστερὰ αὐτῶν (ἧτοι εἰς τὴν θέσιν τῶν δεκάδων χιλιάδων) γράφομεν 1.

Τὸ ἄθροισμα λοιπὸν τῶν δοθέντων ἀριθμῶν εἶναι 12493.

24. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα τῆς προσθέσεως.

Διὰ τὸ νὰ προσθέσωμεν δύο ἢ περισσοτέρους ἀριθμούς, γράφομεν αὐτοὺς τὸν ἓνα ὑποκάτω τοῦ ἄλλου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην· ἔπειτα σύρομεν ὑποκάτω αὐτῶν ὀριζοντίαν γραμμὴν καὶ ἀρχόμεθα νὰ προσθέτωμεν ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερὰ χωριστὰ τὰ ψηφία ἐκάστης τάξεως. Καὶ ἂν μὲν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων τάξεώς τινος δὲν ὑπερβαίῃ τὸν 9, γράφομεν αὐτὸ ὑποκάτω τῆς γραμμῆς καὶ εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, ἐκ τῆς ὁποίας προέκυψεν ἂν δὲ ὑπερβαίῃ τὸν 9, γράφομεν μόνον τὰς ἀπλᾶς μοιάδας τοῦ ἄθροισματος, τὰς δὲ δεκάδας τοῦ προσθέτομεν εἰς τὴν πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἐπομένην τάξιν.

Παρατήρησις. Δυνάμεθα νὰ προσθέτωμεν τοὺς ἀριθμοὺς καὶ ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ· ἀλλ' εἴμεθα τότε ἠναγκασμένοι νὰ ἐξαλείψωμεν τὸ εὐρεθὲν ψηφίον ἐκ τῆς προσθέσεως τῶν ψηφίων μιᾶς στήλης διὰ νὰ προσθέσωμεν τὰ εὐρεθέντα κρατούμενα ἐκ τῆς ἀμέσως ἐπομένης στήλης. Διὰ νὰ ἀποφύγωμεν λοιπὸν τὸ τοιοῦτον, ἀρχόμεθα τὴν πρόσθεσιν ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερά. Ὅταν ὅμως δὲν ἔχωμεν κρατούμενα, τὸ ὁποῖον σπανίως συμβαίνει, τότε εἶναι ἀδιάφορον πόθεν θὰ ἀρχίσωμεν.

Δοκιμὴ τῆς προσθέσεως.

25. **Δοκιμὴ** μιᾶς ἀριθμητικῆς πράξεως λέγεται ἄλλη τις πράξις, τὴν ὁποίαν κάνομεν, διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν ἂν ἡ πρώτη ἔγινε χωρὶς λάθος.

Ἡ δοκιμὴ τῆς προσθέσεως ἐκτελεῖται ὡς ἐξῆς: Ἐὰν ἐπροσθέσαμεν τοὺς προσθετέους ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω, προσθέτομεν αὐτοὺς ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω, ἢ καὶ τὰνάπαλιν, καὶ ἂν εὗρωμεν τὸ ἴδιον ἄθροισμα, τότε εἶναι πιθανὸν ὅτι ἡ πράξις ἔγινε χωρὶς λάθος (ἐδάφ. 23). Δυνατὸν ὅμως καὶ κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς δοκιμῆς νὰ ὑποπέσωμεν πάλιν εἰς λάθος, διὰ τοῦτο καλυτέρα δοκιμὴ μιᾶς πράξεως εἶναι ἢ μετὰ προσοχῆς ἐκτέλεσις αὐτῆς.

Πρόσθεσις ἀπὸ μνήμης.

1) Νὰ προστεθῇ ὁ ἀριθμὸς 7 εἰς τὸν 47, εἰς τὸ εὐρεθὲν ἄθροισμα νὰ προστεθῇ πάλιν ὁ 7 καὶ οὕτω καθ'εξῆς μέχρις ὅτου εὐρεθῇ ὁ ἀριθμὸς 110.

2) Νὰ προστεθῇ ὁ ἀριθμὸς 9 εἰς τὸν 9, εἰς τὸ εὐρεθὲν ἄθροισμα νὰ προστεθῇ πάλιν ὁ 9 καὶ οὕτω καθ'εξῆς μέχρις ὅτου εὐρεθῇ ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ 100.

Σημ. Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἀπὸ μνήμης δύο διψηφίους ἀριθμοὺς λήγοντας εἰς μηδενικά, προσθέτομεν τὰ ψηφία τῶν δεκάδων των, καὶ εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν θέτομεν ἓν μηδενικόν. Παρ. χάριν, διὰ νὰ προσθέσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς 50 καὶ 70, λέγομεν 5 καὶ 7, 12· ἔπειτα θέτομεν 0 εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ 12 καὶ εὐρίσκομεν 120.

Ἐὰν οἱ διψηφιοὶ ἀριθμοὶ ἔχουν καὶ μονάδας, ἀναλύομεν τὸν ἓνα ἐξ αὐτῶν εἰς τὰ μέρη του καὶ προσθέτομεν ἕκαστον μέρος αὐτοῦ χωριστὰ εἰς τὸν ἄλλον, ἀρχόμενοι ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς ἀνωτέρας τάξεως. Παρ. χάριν, διὰ νὰ προσθέσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς 47 καὶ 35 λέγομεν 47 καὶ 30, 77 καὶ 5, 82.

Ἄσαύτως διὰ νὰ προσθέσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς 180 καὶ 64, λέγομεν 180 καὶ 60, 240 καὶ 4, 244.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

- 1) Ἦγόρασέ τις μίαν ἄμπελον ἀντὶ 3270 δραχμῶν· πόσον πρόκειναι νὰ τὴν πωλήσῃ, διὰ νὰ κερδίσῃ 295 δραχμάς; (3565).
- 2) Ἦγόρασέ τις μίαν οἰκίαν ἀντὶ 18500 δραχμῶν καὶ ἐξώδευσε διὰ νὰ τὴν ἐπισκευάσῃ 2574 δραχμάς· κατόπιν ἐπώλησεν αὐτὴν καὶ ἐκέρδισε 1105 δραχ. Πόσον τὴν ἐπώλησεν; (22180).
- 3) Ἐγεννήθη τις τὸ ἔτος 1874 (μετὰ Χριστὸν) καὶ ἔζησε 42 ἔτη. Ποῖον ἔτος ἀπέθανεν; (1916).
- 4) Οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες ἤρχισαν κατὰ πρῶτον τὸ ἔτος 777 πρὸ Χριστοῦ. Πόσα ἔτη παρήλθον μέχρι σήμερον; (1877).
- 5) Ἐπώλησέ τις ἐν χωράφιον ἀντὶ 4650 δραχμῶν καὶ ἐζημιώθη 230 δραχμάς· πόσον ἔπρεπε νὰ τὸ πωλήσῃ, διὰ νὰ κερδίσῃ 300 δραχμάς; (5180).
- 6) Παις ἐρωτηθεὶς περὶ τῆς ἡλικίας τῶν γονέων του, ἀπεκρίθη· ὅτε ἐγεννήθην, μοὶ λέγουν οἱ γονεῖς μου, ὅτι ἡ μὲν μήτηρ μου ἦτο 28 ἐτῶν, ὁ δὲ πατήρ μου ἦτο 9 ἔτη μεγαλύτερος τῆς μητρός μου, τώρα δὲ εἶμαι 14 ἐτῶν. Ποία εἶναι ἡ ἡλικία τῶν γονέων του; (42, 51)
- 7) Χωρικός τις ἐπώλησεν εἰς τινὰ 275 ὀκάδας σίτου καὶ εἰς ἄλλον 187 ὀκ. περισσότερον τοῦ πρώτου· ἔπειτα παρετήρησεν ὅτι τοῦ ἔμειναν τόσαι ὀκάδες, ὅσας ἐπώλησε καὶ εἰς τοὺς δύο καὶ 186 ὀκ. ἀκόμη. Ζητεῖται πόσας ὀκάδας εἶχεν ἀπ' ἀρχῆς. (1660).

Α Φ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ

26. Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἔχομεν 9 μῆλα καὶ ἐξ αὐτῶν πρόκειται νὰ δώσωμεν εἰς ἓν παιδίον 3 μῆλα· θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσα μῆλα θὰ μᾶς μείνουν. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ δίδωμεν ἀπὸ ἓνα ἓνα μῆλον· καὶ πρῶτον ἐκ τῶν 9 μῆλων δίδομεν 1 μῆλον, ὅτε μᾶς μένουν 8 μῆλα· ἔπειτα ἐκ τῶν 8 μῆλων δίδομεν ἄλλο 1 μῆλον, ὅτε μένουν 7 μῆλα· ἔπειτα ἐκ τῶν 7 μῆλων δίδομεν ἄλλο 1 μῆλον, ὅτε μένουν 6. Ὡστε μᾶς ἔμειναν 6 μῆλα καὶ ἐδώκαμεν τόσας φορὰς τὸ ἓν μῆλον, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ 3, τουτέστιν ἠλαττώσαμεν τὸν 9 κατὰ 3 μονάδας. Ἡ προᾶξις λοιπὸν αὕτη λέγεται **ἀφαίρεσις**. Ὡστε ὀρίζομεν τὴν ἀφαίρεσιν ὡς ἑξῆς:

Ἀφαίρεσις λέγεται ἡ προᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας ἐλαττώνομεν ἓνα ἀριθμὸν κατὰ τόσας μονάδας, ὅσας ἔχει ἄλλος δοθεὶς ἀριθμὸς.

Ὁ ἀριθμὸς, ὅστις θὰ ἐλαττωθῇ, λέγεται **μειωτέος**, ὁ δὲ ἄλλος, ὅστις δεικνύει κατὰ πόσας μονάδας θὰ ἐλαττωθῇ ὁ μειωτέος, λέγεται **ἀφαιρετέος**· ὁ δὲ διὰ τῆς ἀφαιρέσεως προκύπτων ἀριθμὸς λέγεται

διαφορὰ ἢ ὑπόλοιπον. Ὡστε εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα μειωτέος εἶναι ὁ 9, ἀφαιρετέος ὁ 3 καὶ διαφορὰ ὁ 6.

Διὰ τὸ νὰ δείξωμεν, ὅτι ἀριθμὸς τις πρόκειται νὰ ἀφαιρεθῆ ἀπὸ ἄλλον γράφομεν μεταξὺ αὐτῶν τὸ σημεῖον —, τὸ ὁποῖον ἀπαγγέλλεται **πλὴν ἢ μείζον**· καὶ πρῶτον μὲν ἀριθμὸν γράφομεν τὸν μειωτέον, δευτέρου δὲ τὸν ἀφαιρετέον, ἦτοι 9—3, καὶ ἀπαγγέλλομεν ἑννέα πλὴν τρία ἢ ἑννέα μείον τρία.

27. Ἐὰν εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα λάβωμεν τὰ 3 μῆλα, τὰ ὁποῖα ἐδώκαμεν, καὶ τὰ ἐνώσωμεν μὲ τὰ 6 μῆλα, ὅπου μᾶς ἔμειναν, θὰ ἔχωμεν πάλιν τὰ 9 μῆλα. Ἐκ τούτου συμπεραίνομεν, ὅτι **ὁ μειωτέος εἶναι ἄθροισμα τοῦ ἀφαιρετέου καὶ τῆς διαφορᾶς**, ἐπομένως ὁρίζομεν τὴν ἀφαίρεσιν καὶ ὡς ἐξῆς :

Ἀφαίρεσις λέγεται ἢ πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας, ὅταν μᾶς δοθῇ τὸ ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν καὶ εἷς τῶν προσθετέων, εὐρίσκομεν τὸν ἄλλον.

Καὶ εἰς τὴν ἀφαίρεσιν πρέπει οἱ δοθέντες ἀριθμοί, ἂν εἶναι συγκριτέοι, νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς· διότι ἄλλως δὲν δύναται νὰ γίνῃ ἡ ἀφαίρεσις, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ διαφορὰ θὰ εἶναι ὁμοειδῆς μὲ τοὺς δεδομένους.

Τὸ ψηφίον 0 ἀφαιρούμενον ἀπ' ἀριθμὸν οὐδόλως μεταβάλλει αὐτόν· ἦτοι εἶναι $4-0=4$. Ἐὰν ὁ ἀφαιρετέος εἶναι ἴσος μὲ τὸν μειωτέον οὐδεμία μονὰς τοῦ μειωτέου μένει μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν, λέγομεν δὲ τότε ὅτι ἡ διαφορὰ εἶναι μηδέν, π. χ. εἶναι $7-7=0$.

Ἡ ἀφαίρεσις εἶναι ἀδύνατος, ὅταν ὁ μειωτέος εἶναι μικρότερος τοῦ ἀφαιρετέου.

Εἶδομεν ἀνωτέρω, ὅτι διὰ τὸ νὰ ἀφαιρέσωμεν μονοψήφιον ἀριθμὸν ἀπὸ ἄλλον, ἀρκεῖ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν μειωτέον ὅλας τὰς μονάδας τοῦ ἀφαιρετέου μίαν πρὸς μίαν, ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἐπίπονον, μάλιστα δὲ ὅταν οἱ ἀριθμοί εἶναι μεγάλοι. Διὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ συνηθίσωμεν διὰ μικρᾶς ἀσκήσεως νὰ ἀφαιρῶμεν εὐκόλως ἀπὸ μνήμης μονοψήφιον ἀριθμὸν ἀπὸ μονοψήφιον ἢ διψήφιον, διότι εἰς τὴν ἀφαίρεσιν ταύτην ἀνάγεται καὶ ἡ ἀφαίρεσις τῶν πολυψηφίων, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω.

Ἰδιότης τῆς ἀφαιρέσεως.

28. **Ἐὰν εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον προσθέσωμεν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἡ διαφορὰ δὲν μεταβάλλεται.**

Ὑποθέσωμεν, παραδ. χάριν, ὅτι ἐκ δύο ἀδελφῶν ὁ μὲν εἷς εἶναι 9 ἐτῶν, ὁ δὲ ἄλλος 7 ἐτῶν· ἡ διαφορὰ τῶν ἡλικιῶν αὐτῶν εἶναι $9-7=2$ ἔτη. Ἄλλ' εἶναι φανερόν, ὅτι καὶ μετὰ 1 ἔτος καὶ μετὰ 2 ἔτη καὶ

μετὰ 3 ἔτη κτλ. ἢ διαφορὰ τῶν ἡλικιῶν των θὰ εἶναι πάλιν 2 ἔτη. Ὡστε βλέπομεν ὅτι, ἂν αὐξηθῇ ὁ μειωτέος 9 καὶ ὁ ἀφαιρετέος 7 κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἢ διαφορὰ αὐτῶν δὲν ἀλλάσσει.

Ἀφαιρέσεις πολυψηφίου ἰπὸ πολυψηφίου.

29. Ἐστω πρῶτον νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 347 ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 879. Πρὸς τοῦτο γράφομεν τὸν ἀφαιρετέον ὑποκάτω τοῦ μειωτέου, ὅπως καὶ εἰς τὴν πρόσθεσιν· ἔπειτα ἀφαιροῦμεν χωριστὰ τὰς μονάδας ἐκάστης τάξεως τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὰς ἀντιστοίχους μονάδας τοῦ μειωτέου, ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν.

Ἡ πράξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς :

879

347

532

Ἀφαιροῦμεν κατὰ πρῶτον τὰς μονάδας τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὰς μονάδας τοῦ μειωτέου λέγοντες 7 ἀπὸ 9 μένουν 2, γράφομεν λοιπὸν 2 εἰς τὴν στήλην τῶν μονάδων· ἔπειτα ἀφαιροῦμεν τὰς δεκάδας τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὰς δεκάδας τοῦ μειωτέου λέγοντες 4 ἀπὸ 7 μένουν 3, γράφομεν λοιπὸν 3 εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων· ἔπειτα ἀφαιροῦμεν τὰς ἑκατοντάδας λέγοντες 3 ἀπὸ 8 μένουν 5, γράφομεν λοιπὸν 5 εἰς τὴν στήλην τῶν ἑκατοντάδων. Ὡστε ἡ διαφορὰ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν εἶναι 532.

Σημ. Εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα ἠδυνάμεθα νὰ ἀφαιρέσωμεν καὶ ἔξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ· διότι ἕκαστον ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου εἶναι μικρότερον τοῦ ἀντιστοίχου ψηφίου τοῦ μειωτέου.

Ἐστω δεύτερον νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 6473 ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 92865. Ἡ πράξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς :

92865

6473

86392

Ἀφαιροῦμεν κατὰ πρῶτον τὰς μονάδας τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὰς μονάδας τοῦ μειωτέου λέγοντες 3 ἀπὸ 5 μένουν 2, γράφομεν λοιπὸν 2 εἰς τὴν στήλην τῶν μονάδων. Ἐπειτα ἀφαιροῦμεν τὰς δεκάδας, ἀλλ' ἔπειδὴ ὁ 7 δὲν ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὸν 6, προσθέτομεν νοερῶς εἰς τὸ ψηφίον τοῦτο τοῦ μειωτέου 10 δεκάδας καὶ γίνονται 16 δεκάδες· τώρα λέγομεν 7 ἀπὸ 16 μένουν 9 (δεκάδες), γράφομεν λοιπὸν 9 εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων. Ἐπειτα ἀφαιροῦμεν τὰς ἑκατοντάδας, ἀλλὰ διὰ νὰ

Κ. Ε. Παπανικητοπούλου, Πρακτικ. Ἀριθμητικῆ ἔκδ. δ', 9/6/927 2

μη μεταβληθῆ ἢ διαφορὰ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν, πρέπει νὰ προσθέσωμεν καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον 10 δεκάδας (ἑδάφ. 28), ὅσας δηλ. ἐπροσθέσαμεν καὶ εἰς τὸν μειωτέον, ἀλλὰ τὸ ἴδιον εἶναι ἂν προσθέσωμεν 1 ἑκατοντάδα εἰς τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοντάδων τοῦ ἀφαιρετέου λέγοντες 1 καὶ 4, 5 ἀπὸ 8 μένουν 3 (ἑκατοντάδες), γράφομεν λοιπὸν 3 εἰς τὴν στήλην τῶν ἑκατοντάδων. Ἐπειτα ἀφαιροῦμεν τὰς χιλιάδας, ἀλλ' ἐπειδὴ πάλιν δὲν ἀφαιρεῖται ὁ 6 ἀπὸ τὸν 2, προσθέτομεν εἰς αὐτὸν 10 χιλιάδας καὶ γίνονται 12 χιλιάδες· τώρα λέγομεν 6 ἀπὸ 12 μένουν 6 (χιλιάδες), γράφομεν λοιπὸν 6 εἰς τὴν στήλην τῶν χιλιάδων. Ἀλλὰ διὰ νὰ μη μεταβληθῆ ἢ διαφορὰ, πρέπει νὰ προσθέσωμεν καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον 10 χιλιάδας ἢ 1 δεκάδα τῶν χιλιάδων, καὶ ἐπειδὴ τοιαύτας δὲν ἔχει ὁ ἀφαιρετέος, ἀφαιροῦμεν αὐτὴν ἀπὸ τὰς δεκάδας τῶν χιλιάδων τοῦ μειωτέου, ἥτοι λέγομεν 1 ἀπὸ 9 μένουν 8 (δεκάδες τῶν χιλιάδων), γράφομεν λοιπὸν 8 εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων τῶν χιλιάδων. Ὡστε ἡ διαφορὰ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν εἶναι 86392.

Παραδείγματα.

5667	85204	670000
879	27685	38480
4788	57519	639520

30. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα τῆς ἀφαιρέσεως
Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀριθμὸν ἀπὸ ἄλλον, γράφομεν τὸν ἀφαιρετέον ὑποκάτω τοῦ μειωτέου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην. Ἐπειτα σύρομεν ὀριζοντίαν γραμμὴν καὶ ἀφαιροῦμεν ἕκαστον ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχον ψηφίον τοῦ μειωτέου (ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν). Ἐὰν δὲ συμβῆ ψηφίον τι τοῦ ἀφαιρετέου νὰ μὴ ἀφαιρῆται ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχον ψηφίον τοῦ μειωτέου, προσθέτομεν εἰς τὸ ψηφίον τοῦτο τοῦ μειωτέου 10 καὶ ἔπειτα ἀφαιροῦμεν, προσέχοντες νὰ προσθέσωμεν ἔπειτα καὶ εἰς τὸ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἐπόμενον ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου 1, διὰ νὰ μὴ μεταβληθῆ ἢ διαφορὰ.

31. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν πολλοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ ἓνα ἄλλον, ἢ εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν καὶ τὸ ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸν μειωτέον ἢ ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὸν μειωτέον τὸν πρῶτον, ἀπὸ τὴν εὐρεθεῖσαν διαφορὰν τὸν δεύτερον καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς, μέχρις ὅτου ἀφαιρέσωμε ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς. Ὁ πρῶτος ὁμως τρόπος εἶναι συντομώτερος τοῦ δευτέρου.

Δοκιμή τῆς ἀφαιρέσεως.

32. Ἐπειδὴ ὁ μειωτέος εἶναι ἄθροισμα τοῦ ἀφαιρετέου καὶ τῆς διαφορᾶς (ἔδαφ. 27), διὰ τοῦτο κάμνομεν τὴν δοκιμὴν τῆς ἀφαιρέσεως ὡς ἑξῆς. Προσθέτομεν τὸν ἀφαιρετέον καὶ τὴν διαφορὰν, καὶ ἐὰν εὐρωμεν τὸν μειωτέον, συμπεραίνομεν ὅτι ἡ πρᾶξις ἔγινε χωρὶς λάθους.

Ἡ καὶ ὡς ἑξῆς. Ἐπειδὴ ἡ διαφορὰ δεικνύει πόσας μονάδας ἔχει ὁ μειωτέος περισσοτέρας τοῦ ἀφαιρετέου, διὰ τοῦτο ἀφαιροῦμεν τὴν διαφορὰν ἀπὸ τὸν μειωτέον, καὶ ἂν εὐρωμεν τὸν ἀφαιρετέον, συμπεραίνομεν ὅτι ἡ πρᾶξις ἔγινε χωρὶς λάθους.

Ἀφαίσεις ἀπὸ μνήμης.

1) Ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 74 νὰ ἀφαιρεθῇ ὁ 8, ἀπὸ τὴν εὐρεθεῖσαν διαφορὰν νὰ ἀφαιρεθῇ πάλιν 8 καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς, μέχρις ὅτου εὐρεθῇ ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ 30.

2) Πόσαι ὥραι εἶναι ἀπὸ τῆς 7ης πρὸ μεσημβρίας μέχρι τῆς 9ης μετὰ μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας;

Σημ. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν νοερῶς 9 ἀπὸ ἄλλον, ἀφαιροῦμεν 10 καὶ ἔπειτα προσθέτομεν εἰς τὴν διαφορὰν 1. Παραδ. χάριν, διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν 9 ἀπὸ τὸν 83, λέγομεν 10 ἀπὸ 83, 73 καὶ 1, 74. Ὅταν πάλιν ἔχωμεν νὰ προσθέσωμεν 9 εἰς ἀριθμὸν, προσθέτομεν 10 καὶ ἔπειτα ἀφαιροῦμεν 1.

Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν νοερῶς διψήφιον ἀπὸ ἄλλον, ἀφαιροῦμεν τὰ μέρη του χωριστὰ ἀρχόμενοι ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς ἀνωτέρας τάξεως. Παραδ. χάριν, διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν 35 ἀπὸ τὸν 272, λέγομεν 30 ἀπὸ 272 μένουν 242· ἔπειτα 5 ἀπὸ 242 μένουν 237.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἠγόρασέ τις ἐν χωράφιον ἀντὶ 3560 δραχμῶν, ἀλλ' ἔδωκε μόνον 2785 δραχμάς. Πόσας χρεωστεῖ ἀκόμη; (775).

2) Ἡ ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων ἔγινε τὸ ἔτος 1453. Πόσα ἔτη παρῆλθον μέχρι σήμερον;

3) Ἀποθανὼν τις διέταξεν ἐν τῇ διαθήκῃ του, ὅπως ἡ περιουσία του, ἀποτελουμένη ἐκ 30000 δραχμῶν, διανεμηθῇ ὡς ἑξῆς· ἡ σύζυγός του νὰ λάβῃ 10000 δραχμ. καὶ ἡ θυγάτηρ του 18600, τὸ δὲ ὑπόλοιπον νὰ δοθῇ εἰς φιλανθρωπικόν τι κατάστημα. Πόσαι δραχμαὶ θὰ δοθῶσι; (1400).

4) Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐγεννήθη τὸ ἔτος 356 πρὸ Χριστοῦ καὶ

ἀπέθανεν εἰς ἡλικίαν 33 ἐτῶν. Πότε ἀπέθανε; Καὶ πόσα ἔτη παρήλθον ἀπὸ τοῦ θανάτου του μέχρι σήμερον;

(Ἀπέθανε τὸ ἔτος 323 πρὸ Χριστοῦ).

5) Μήτηρ της εἶναι 37 ἐτῶν καὶ ἔχει κόρην 9 ἐτῶν· πόσων ἐτῶν θὰ εἶναι ἡ μήτηρ, ὅταν ἡ κόρη γίνῃ 23 ἐτῶν; (51).

6) Χωρική τις εἶχεν εἰς δύο καλάθια αὐγά· κατόπιν ἔλαβεν ἓκ τοῦ ἑνὸς καλάθιου 38 αὐγά καὶ τὰ ἔθεσεν εἰς τὸ ἄλλο, παρετήρησε δὲ τότε, ὅτι τὸ καθὲν καλάθιον εἶχε 275 αὐγά. Πόσα εἶχε τὸ καθὲν ἀπ' ἀρχῆς; (237 καὶ 313).

7) Ἄνθρωπός τις ἀπέθανε τὸ ἔτος 1920 εἰς ἡλικίαν 84 ἐτῶν. Πόσων ἐτῶν ἦτο τὸ ἔτος 1870; (34).

8) Ἡγόρασέ τις μίαν ἄμπελον καὶ ἐξώδευσε διὰ νὰ τὴν καλλιεργήσῃ 370 δραχμὰς· κατόπιν τὴν ἐπώλησεν ἀντὶ 3240 δραχμῶν καὶ ἐκέρδισεν 485 δρ. Πόσον εἶχεν ἀγοράσει τὴν ἄμπελον; (2385).

9) Εἶχέ τις 284 δραχμὰς καὶ ἐξ αὐτῶν ἔδωκε μέρος διὰ νὰ ἀγοράσῃ μίαν ἐνδυμασίαν του καὶ 28 δρ. διὰ ὑποδήματά του· ἔπειτα παρετήρησεν ὅτι τοῦ ἔμειναν 129 δραχμαί. Πόσον ἔδωκε διὰ τὴν ἐνδυμασίαν; (127).

10) Ἐρωτηθεὶς τις εἰς ποίαν ἡλικίαν ἀπέθανεν ὁ πατήρ του, ἀπεκρίθη· ἐνθυμοῦμαι, ὅτι ἡ μήτηρ μου ἀπέθανε μετὰ 5 ἔτη ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ πατρός μου εἰς ἡλικίαν 68 ἐτῶν, καὶ ἦτο μικροτέρα τοῦ πατρός μου κατὰ 10 ἔτη. Εἰς ποίαν ἡλικίαν ἀπέθανεν ὁ πατήρ; (73 ἐτῶν).

11) Θέλει τις νὰ ἀγοράσῃ μίαν οἰκίαν ἀξίας 14750 δραχμῶν, ἀλλὰ τὰ χρήματά του δὲν φθάνουν· ἐὰν ὅμως εἶχεν ἀκόμη 3500 δραχμὰς θὰ ἠγόραζεν αὐτὴν καὶ θὰ ἐπερίσσειον 10 δρ. Πόσας δραχμὰς εἶχε;

Δύσεις. Ἐχρειάζετο ἀκόμη 3500—10 ἢ 3490 δρ. διὰ νὰ ἀγοράσῃ τὴν οἰκίαν, ἐπομένως εἶχε 14750—3490 ἢ 11260 δραχμὰς.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

33. Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἡ ὀκτὼ ἐνὸς πράγματος τιμᾶται 5 δραχμὰς καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν, πόσας δραχμὰς θὰ δώσωμεν διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 3 ὀκάδας.

Πρὸς τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 1 ὀκᾶν, θὰ δώσωμεν 5 δραχμὰς· διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 2 ὀκάδας, θὰ δώσωμεν δύο φορὰς τὰς 5 δραχμὰς, ἤτοι 5+5· καὶ διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 3 ὀκάδας, θὰ δώσωμεν τρεῖς φορὰς τὰς 5 δραχμὰς, ἤτοι 5+5+5 ἢ 15 δραχμὰς. Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι ἐπαναλαμβάνονται αἱ 5 δραχμαὶ τόσας φο

φοράς, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ 3· ἢ πρᾶξις λοιπὸν αὕτη λέγεται **πολλαπλασιασμός**. Ὡστε οὐρίζομεν τὸν πολλαπλασιασμὸν ὡς ἑξῆς :

Πολλαπλασιασμός λέγεται ἡ πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας ἐπαναλαμβάνομεν ἓνα ἀριθμὸν τόσας φορές, ὅσας μονάδας ἔχει ἄλλος δοθεὶς ἀριθμός.

Ὁ ἀριθμός, ὅστις θὰ ἐπαναληφθῆ, λέγεται **πολλαπλασιαστέος**, ὁ δεικνύων ποσάκις θὰ ἐπαναληφθῆ οὗτος λέγεται **πολλαπλασιαστής**, ὁ δὲ ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ σχηματιζόμενος ἀριθμὸς λέγεται **γινόμενον**. Εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα πολλαπλασιαστέος εἶναι ὁ 5, πολλαπλασιαστής ὁ 3 καὶ γινόμενον ὁ 15.

Ὁ πολλαπλασιαστέος καὶ ὁ πολλαπλασιαστής λέγονται μὲ ἓν ὄνομα **παράγοντες** τοῦ γινομένου. Ὅταν οἱ παράγοντες εἶναι ἀφηρημένοι καὶ τὸ γινόμενον εἶναι ἀφηρημένον, ὅταν ὅμως οἱ παράγοντες εἶναι συγκεκριμένοι, καθὼς οἱ ἀνωτέρω, τὸ γινόμενον εἶναι πάντοτε ὁμοειδὲς μὲ τὸν πολλαπλασιαστέον, ἦτοι παριστᾷ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα, διότι γίνεται ἕξ αὐτοῦ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως· ὁ δὲ πολλαπλασιαστής θεωρεῖται ἓν τε τῇ πράξει καὶ τῇ σκέψει ὡς ἀφηρημένος ἀριθμὸς καὶ δεικνύει ἀπλῶς ποσάκις θὰ ἐπαναληφθῆ ὁ πολλαπλασιαστέος.

Διὰ νὰ δεῖξωμεν, ὅτι δύο ἀριθμοὶ πρόκειται νὰ πολλαπλασιασθῶσι, καθὼς οἱ ἀνωτέρω 5 καὶ 3, γράφομεν μεταξὺ αὐτῶν τὸ σημεῖον X, τὸ ὁποῖον ἀπαγγέλλεται **ἐπί**, ἀλλὰ πρῶτον γράφομεν τὸν πολλαπλασιαστέον, ἦτοι 5×3 , καὶ ἀπαγγέλλομεν πέντε ἐπὶ τρία. Ὡστε 7×5 , παραδ. χάριν, σημαίνει νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸν 7 πέντε φορές, ἦτοι νὰ σχηματίσωμεν ἄθροισμα ἐκ πέντε προσθετέων ἴσων μὲ τὸν 7, ἦτοι εἶναι $7 \times 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7$ ἢ 35.

Ὁ τρόπος οὗτος τῆς ἐπαναλήψεως ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ πολλάκις εἶναι ἐπίπονος, μάλιστα δὲ ὅταν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι μεγάλοι. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ πολλαπλασιασμός δύο οἰωνδήποτε ἀκεραίων ἀριθμῶν ἀνάγεται, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν, διὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζωμεν ἀπὸ μνήμης τὰ γινόμενα ὅλων τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν.

Τὰ γινόμενα ταῦτα περιέχονται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα, ὅστις λέγεται **Πυθαγόρειος πένταξ**· διότι ὁ φιλόσοφος Πυθαγόρας (ἀκμάσας περὶ τὸ 570 πρὸ Χρ.) λέγεται ὅτι ἐπενόησεν αὐτόν.

Πίναξ Πυθαγόρειος.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81


Ἡ πρώτη ὀριζοντία σειρά τοῦ ἀνωτέρω πίνακος καὶ ἡ πρώτη κατακόρυφος σειρά περιέχουσι τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ 1 μέχρις 9, ἡ δευτέρα σειρά τούτων περιέχει τὰ γινόμενα αὐτῶν ἐπὶ 2, ἡ τρίτη σειρά τὰ γινόμενα αὐτῶν ἐπὶ 3 καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς μέχρι τοῦ πολλαπλασιαστοῦ 9.

Διὰ νὰ εὑρωμεν τώρα εἰς τὸν πίνακα τοῦτον τὸ γινόμενον δύο οἰωνδήποτε μονοψηφίων ἀριθμῶν, καὶ ἔστω τὸ γινόμενον τοῦ 6 ἐπὶ 8, ζητοῦμεν τὸν μὲν ἓνα ἀριθμὸν εἰς τὴν πρώτην ὀριζοντίαν σειράν (ἢ εἰς τὴν πρώτην κατακόρυφον σειράν), τὸν δὲ ἄλλον εἰς τὴν πρώτην κατακόρυφον σειράν (ἢ εἰς τὴν πρώτην ὀριζοντίαν σειράν). Ἐκεῖ δέ, ὅπου διασταυροῦνται αἱ ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς 6 καὶ 8 ἀρχόμεναι δύο σειραί, εὑρίσκειται ὁ ἀριθμὸς τοῦ γινομένου αὐτῶν· εἰς τὸ παράδειγμά μας διασταυροῦνται εἰς τὸν ἀριθμὸν 48, οὗτος λοιπὸν εἶναι τὸ γινόμενον τοῦ 6 ἐπὶ 8.

Ἰδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

34. Ὑποθέσωμεν, ὅτι εἰς ἕνα κήπον ὑπάρχουν δένδρα εἰς τρεῖς ὀριζοντίας σειράς, ἐκάστη τῶν ὁποίων περιέχει 4 δένδρα, καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσα δένδρα ὑπάρχουν τὸ ὅλον.

Ἄντι νὰ μετρήσωμεν αὐτὰ ἕνα πρὸς ἕνα, πράττομεν ὡς ἑξῆς.



Ἐπειδὴ εἰς ἐκάστην ὀριζοντίαν σειρὰν ὑπάρχουν 4 δένδρα καὶ ἔπειδὴ τοιαῦται σειραὶ εἶναι 3, ἔπεται ὅτι τὸ πλῆθος τῶν δένδρων εἶναι $4 + 4 + 4 = 4 \times 3$, ἥτοι 12.

Ἡ καὶ ὡς ἑξῆς. Ἐπειδὴ εἰς ἐκάστην κατακόρυφον σειρὰν ὑπάρχουν 3 δένδρα καὶ ἔπειδὴ τοιαῦται [σειραὶ εἶναι 4, ἔπεται ὅτι τὸ πλῆθος τῶν δένδρων εἶναι $3 + 3 + 3 + 3 = 3 \times 4$, ἥτοι 12. Οἶονδήποτε ὅμως τρόπον καὶ ἂν μεταχειρισθῶμεν, ὁ ἀριθμὸς τῶν δένδρων εὐρίσκεται ὁ αὐτός, διὰ τοῦτο πρέπει νὰ εἶναι $4 \times 3 = 3 \times 4$.

Ἐκ τῆς ἰσότητος ταύτης συνάγομεν τὴν ἑξῆς ἰδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

25. *Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν (θεωρουμένων ἀφηρημένων) δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀλλάξωμεν τὴν τάξιν αὐτῶν, ἥτοι ὁ πολλαπλασιαστέος νὰ γίνῃ πολλαπλασιαστής καὶ ὁ πολλαπλασιαστής πολλαπλασιαστέος.*

Σημ. Τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ τινος ἐπὶ τὴν μονάδα 1 εἶναι ὁ ἴδιος ἀριθμὸς· διότι εἶναι π. χ. $4 \times 1 = 1 \times 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$. Ὡσαύτως εἶναι $1 \times 1 = 1$.

Τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ τινος ἐπὶ 0 εἶναι 0· διότι εἶναι $3 \times 0 = 0 \times 3 = 0 + 0 + 0 = 0$.

Πολλαπλασιασμὸς πολυψηφίου ἐπὶ μονοψηφίου.

36. Ὑποθέσωμεν, ὅτι πατήρ τις ἀποθανὼν ἀφησεν εἰς τοὺς τέσσαρας υἱοὺς του ἀνὰ 4635 δραχ. εἰς ἕκαστον καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσας δραμαὺς ἀφησεν ἐν ὅλῳ.

Πρὸς τοῦτο θὰ ἐπαναλάβωμεν τὰς 4635 δραχ. τέσσαρας φορές, ἥτοι $4635 \times 4 = 4635 + 4635 + 4635 + 4635$ ἢ κάλλιον

$$\begin{array}{r}
 4635 \\
 4635 \\
 4635 \\
 4635 \\
 \hline
 18540
 \end{array}$$

Ὡστε ἄφησεν ἐν ὄλῳ 18540 δραχ.

Ἐνιαῦθα παρατηροῦμεν ὅτι ἕκαστον ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ 4635 ἐπαναλαμβάνεται 4 φορές, ἥτοι πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 4· ὅθεν συντομεύομεν τὴν προᾶξιν ὡς ἐξῆς.

Γράφομεν ὑποκάτω τοῦ πολλαπλασιαστέου 4635 τὸν πολλαπλασιαστὴν 4 καὶ ὑποκάτω αὐτοῦ σύρομεν ὀριζοντίαν γραμμὴν· ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν ἕκαστον ψηφίον τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ 4 καὶ τὸ γινόμενον γράφομεν ὑποκάτω τῆς γραμμῆς. Ἡ προᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

πολλαπλασιαστέος	4635
πολλαπλασιαστής	4
	4
γινόμενον	18540

Πολλαπλασιάζομεν πρῶτον τὰς 5 μονάδας λέγοντες 5 ἐπὶ 4 (ἢ 4 ἐπὶ 5) κάμνουν 20 μονάδας, ἥτοι 2 δεκάδας καὶ 0 μονάδας, γράφομεν λοιπὸν 0 ὑποκάτω τῆς γραμμῆς καὶ κρατοῦμεν τὰς 2 δεκάδας διὰ νὰ τὰς προσθέσωμεν εἰς τὸ γινόμενον τῶν δεκάδων τοῦ πολλαπλασιαστέου.

Ἐπειτα πολλαπλασιάζομεν τὰς 3 δεκάδας λέγοντες 3 ἐπὶ 4 κάμνουν 12 δεκάδας καὶ 2 τὰ κρατούμενα 14 δεκάδας, ἥτοι 1 ἑκατοντάδα καὶ 4 δεκάδας, γράφομεν λοιπὸν 4 εἰς τὴν θέσιν τῶν δεκάδων τοῦ γινομένου καὶ κρατοῦμεν τὴν 1 ἑκατοντάδα διὰ νὰ τὴν προσθέσωμεν εἰς τὸ γινόμενον τῶν ἑκατοντάδων.

Ἐπειτα πολλαπλασιάζομεν τὰς 6 ἑκατοντάδας λέγοντες 6 ἐπὶ 4 κάμνουν 24 ἑκατοντάδας καὶ 1 τὸ κρατούμενον 25 (ἑκατοντάδας), ἥτοι 2 χιλιάδας καὶ 5 ἑκατοντάδας, γράφομεν λοιπὸν 5 εἰς τὴν θέσιν τῶν ἑκατοντάδων τοῦ γινομένου καὶ κρατοῦμεν τὰς 2 χιλιάδας διὰ νὰ τὰς προσθέσωμεν εἰς τὸ γινόμενον τῶν χιλιάδων.

Τέλος πολλαπλασιάζομεν καὶ τὰς 4 χιλιάδας λέγοντες 4 ἐπὶ 4 κάμνουν 16 χιλιάδας καὶ 2 τὰ κρατούμενα 18 (χιλιάδας), γράφομεν λοιπὸν 18 πρὸς τὰ ἀριστερὰ τῶν ἄλλων ψηφίων τοῦ γινομένου. Τὸ γινόμενον λοιπὸν τοῦ ἀριθμοῦ 4635 ἐπὶ 4 εἶναι 18540 ἢ $4635 \times 4 = 18540$. Ὡστε

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν πολυψηφίον ἀριθμὸν ἐπὶ μονοψηφίον, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον ψηφίον αὐτοῦ χωριστὰ (ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν δι' ὃν λόγον εἶπομεν καὶ εἰς τὴν πρόσθεσιν)· καὶ ἂν μὲν τὸ γινόμενον ψηφίου τινὸς τοῦ πολλαπλασιαστέου εἶνε διψηφίον, γράφομεν μόνον τὰς μονάδας του, τὰς δὲ δεκάδας κρατοῦμεν καὶ προσθέτομεν εἰς τὸ γινόμενον τοῦ ἐπομένου ψηφίου.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω βλέπομεν, ὅτι ὁ πολλαπλασιασμός εἶναι σύντομος πρόσθεσις ἴσων ἀριθμῶν.

<i>Παραδείγματα.</i>	27456	79068	67009
	8	9	7
	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
	219648	711612	469063

Πολλαπλασιασμός ἀριθμῶν, ὧν ὁ εἷς ἔχει τὸ πρῶτον ψηφίον σημαντικόν, τὰ δὲ λοιπὰ μηδενικά.

37. Ἐστω νὰ εὐρεθῇ τὸ γινόμενον τῶν ἀριθμῶν 245 καὶ 3000. Ἐὰν λάβωμεν ὡς πολλαπλασιαστέον τὸν 3000 (τοῦτο δὲν βλέπει τὸ γινόμενον· ἐδάφ. 35), θὰ ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰς 3 χιλιάδας ἐπὶ 245, ἀλλὰ διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον τοῦτο, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 245 ἐπὶ 3, ὅτε εὐρίσκομεν 735, καὶ ἐπειδὴ τὸ γινόμενον τοῦτο πρέπει νὰ παριστᾷ χιλιάδας (ὡς ὁμοειδὲς μὲ τὸν πολλαπλασιαστέον), διὰ τοῦτο γράφομεν εἰς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ τρία μηδενικά (ἴσα δηλ. ἔχει ὁ 3000), ἦτοι 735000. Ὡστε

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο ἀριθμοὺς τῶν ὁποίων ὁ εἷς ἔχει τὸ πρῶτον ψηφίον σημαντικόν, τὰ δὲ λοιπὰ μηδενικά, παραλείπομεν τὰ μηδενικά αὐτοῦ καὶ πολλαπλασιάζομεν· ἔπειτα δὲ γράφομεν εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου τὰ παραλειφθέντα μηδενικά.

Τὸ γινόμενον ἐπίσης τοῦ 348 ἐπὶ 10 εὐρίσκεται, ἂν πολλαπλασιάσωμεν αὐτὸν ἐπὶ 1, ὅτε εὐρίσκομεν γινόμενον τὸν ἴδιον ἀριθμὸν 348, καὶ εἰς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ γράψωμεν ἓν μηδενικόν, ἦτοι εἶναι $348 \times 10 = 3480$. Ἐπίσης εἶναι $5763 \times 100 = 576300$. Ὡστε

38. *Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν συντόμως ἀριθμὸν τινα ἐπὶ 10, ἐπὶ 100, ἐπὶ 1000 καὶ γενικῶς ἐπὶ τὴν μονάδα ἀκολουθομένην ὑπὸ μηδενικῶν, γράφομεν εἰς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ ἓν, δύο, τρία κτλ. μηδενικά (δηλ. τόσα, ὅσα ἀκολουθοῦσι τὴν μονάδα).*

<i>Παραδείγματα.</i>	255	$356 \times 100 = 35600$
	3000	$17 \times 1000 = 17000$
	<hr style="width: 100%;"/>	
	735000	

Πολλαπλασιασμός ἀριθμοῦ ἐπὶ ἄθροισμα καὶ τὴνίπαλιν.

39. Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἐργάτης τις εἰργάσθη εἰς ἓν ἐργοστάσιον τὴν πρώτην φορὰν 4 ἡμέρας, τὴν δευτέραν φορὰν 3 ἡμέρας καὶ τὴν τρίτην φορὰν 2 ἡμέρας καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσας δραχμὰς ἔλαβε τὸ ὅλον, ἐὰν τὴν ἡμέραν ἐλάμβανε 5 δραχμὰς.

Διὰ τὰ μάθωμεν τοῦτο, εὐρίσκομεν πρῶτον πόσας ἡμέρας εἰργάσθη τὸ ὄλον, ἥτοι $4+3+2$ ἢ 9 ἡμ. Ὡστε ἔλαβε τὰς 5 δραχμὰς 9 φορὰς, ἥτοι 5×9 ἢ 45 δραχμὰς.

Ἀλλὰ τὸ γινόμενον τοῦτο 5×9 γράφομεν καὶ ὡς ἐξῆς· $5 \times (4+3+2)$, ἥτοι θέτομεν τὸ ἄθροισμα ἐντὸς παρενθέσεως, ἵνα δεῖξωμεν ὅτι πρέπει νὰ εὐρωμεν πρῶτον τὸ ἄθροισμα $4+3+2$ ἢ 9 καὶ ἔπειτα νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 5 ἐπὶ 9.

Δυνάμεθα νὰ λύσωμεν τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα καὶ ὡς ἐξῆς. Εὐρίσκομεν πόσας δραχμὰς ἔλαβε χωριστὰ ἐκάστην φορὰν, ἥτοι τὴν πρώτην φορὰν ἔλαβε 5×4 ἢ 20 δραχμὰς, τὴν δευτέραν φορὰν ἔλαβε 5×3 ἢ 15 δρ. καὶ τὴν τρίτην φορὰν ἔλαβε 5×2 ἢ 10 δρ. Ὡστε ἔλαβεν ἐν ὅλῳ $5 \times 4 + 5 \times 3 + 5 \times 2$ ἢ $20 + 15 + 10$ ἢ 45 δρ. Ἄλλ' εἴτε τὸν πρῶτον τρόπον μεταχειρισθῶμεν εἴτε τὸν δεύτερον, τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον θὰ εὐρωμεν. Ὡστε πρέπει νὰ εἶναι

$$5 \times 9 \text{ ἢ } 5 \times (4+3+2) = 5 \times 4 + 5 \times 3 + 5 \times 2 = \\ 20 + 15 + 10 = 45.$$

Ἐκ τῶν δύο τρόπων τῆς λύσεως τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συναγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

40. *Διὰ τὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄθροισμα, ἢ εὐρίσκομεν πρῶτον τὸ ἄθροισμα καὶ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ τὸ εὐρεθὲν ἄθροισμα ἢ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ ἕκαστον τῶν προσθετέων χωριστὰ καὶ ἔπειτα προσθέτομεν τὰ μερικὰ γινόμενα.*

Καὶ ἄθροισμα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἀριθμὸν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. Διότι δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὸν ἀριθμὸν ὡς πολλαπλασιαστέον καὶ τὸ ἄθροισμα ὡς πολλαπλασιαστὴν (ἔδ. 35) καὶ ἐπομένως θὰ ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄθροισμα.

Πολλαπλασιασμὸς πολυψήφιου ἐπὶ πολυψήφιον.

41. Ἐστω, ὡς παράδειγμα, νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν 5273 ἐπὶ 462, ἥτοι νὰ ἐπαναλάβωμεν αὐτὸν 462 φορὰς. Ἐπειδὴ εἶναι $462 = 400 + 60 + 2$, δυνάμεθα (κατὰ τὸ ἐδάφ. 40) νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν 5273 χωριστὰ ἐπὶ ἕκαστον τῶν μερῶν τοῦ 462, ἥτοι ἐπὶ 2, ἐπὶ 60 καὶ ἐπὶ 400 καὶ ἔπειτα νὰ προσθέσωμεν τὰ μερικὰ γινόμενα (ἔχοντες ὑπ' ὄψει καὶ τὸ ἐδάφιον 37), ἥτοι

5273 <u>2</u>	5273 <u>60</u>	5273 <u>400</u>
10546	316380	2109200

10546	Ἐπειδὴ τὰ πρὸς τὰ δεξιὰ μηδενικά τοῦ
316380	δευτέρου καὶ τρίτου μερικοῦ γινομένου
2109200	οὐδὲν προσθέτουσιν εἰς τὸ ἄθροισμα,

ἄθροισμα 2436126 διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ παραλείψωμεν

αὐτά, ἦτοι

10546
31638
21092
<u>2436126</u>

Ἡ ἀνωτέρω πρᾶξις διατάσσεται συντόμως ὡς ἐξῆς :

5272	πολλαπλασιαστέος
462	πολλαπλασιαστής

10546	μερικὸν γινόμενον ἐπὶ 2 (μονάδας)
31638	» » » 6 (δεκάδας)
21092	» » » 4 (ἑκατοντ.)

2436126 ὄλικὸν γινόμενον.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς γενικὸν κανόνα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν τινὰ ἐπὶ ἄλλον, γράφομεν ὑποκάτω τοῦ πολλαπλασιαστέου τὸν πολλαπλασιαστήν οὕτως, ὥστε οἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην καὶ ὑποκάτω αὐτῶν σύρομεν ὀριζοντίαν γραμμὴν. Ἐπειτα, ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν, πολλαπλασιάζομεν τὸν πολλαπλασιαστέον ἐπὶ ἕκαστον ψηφίον τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, τὰ δὲ μερικὰ γινόμενα γράφομεν τὸ ἐν ὑποκάτω τοῦ ἄλλου οὕτως, ὥστε τὸ πρῶτον πρὸς τὰ δεξιὰ ψηφίον ἑκάστου μερικοῦ γινομένου νὰ εὐρίσκηται ὑποκάτω ἐκείνου τοῦ ψηφίου τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, μὲ τὸ ὅποῖον πολλαπλασιάζομεν. Τέλος σύρομεν ὀριζοντίαν γραμμὴν καὶ ὑποκάτω αὐτῆς γράφομεν τὸ ἄθροισμα τῶν μερικῶν γινομένων.

Παρατήρησις. Ὅταν μετὰ τῶν σημαντικῶν ψηφίων τοῦ πολλαπλασιαστοῦ ὑπάρχωσι μηδενικά, πολλαπλασιάζομεν τὸν πολλαπλασιαστέον μόνον μὲ τὰ σημαντικὰ ψηφία τοῦ πολλαπλασιαστοῦ (διότι

τὸ γινόμενον τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ 0 εἶναι 0), προσέχοντες ὅμως νὰ γράφωμεν τὰ μερικὰ γινόμενα συμφώνως μὲ τὸν ἀνωτέρω κανόνα τοῦ πολλαπλασιαμοῦ.

Παραδείγματα.

679	7896	6089
86	703	1008
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>
4074	23688	48712
5432	55272	6089
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>
58394	5550888	6137712

Συντομίαι τοῦ πολλαπλασιαμοῦ.

1ον) Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο ἀριθμούς, τῶν ὁποίων ὁ εἷς ἢ καὶ οἱ δύο λήγουσιν εἰς μηδενικά, παραλείπομεν τὰ εἰς τὸ τέλος μηδενικά καὶ πολλαπλασιάζομεν αὐτούς· ἔπειτα γράφομεν εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου τὰ παραλειφθέντα μηδενικά.

Παραδ. χάριν, διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀριθμούς 24 καὶ 32000, παραλείπομεν τὰ μηδενικά τοῦ 32000 καὶ πολλαπλασιάζομεν τοὺς ἀριθμούς 24 καὶ 32, εἰς δὲ τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου αὐτῶν 768 γράφομεν τὰ παραλειφθέντα τρία μηδενικά, ἥτοι 768000 (ὁ λόγος εἶναι ὁ τοῦ ἔδαφίου 37).

Ἐσαύτως διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀριθμούς 43000 καὶ 120, παραλείπομεν τὰ μηδενικά αὐτῶν καὶ πολλαπλασιάζομεν τοὺς ἀριθμούς 43 καὶ 12, ἔπειτα γράφομεν εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου αὐτῶν 516 τὰ τέσσαρα παραλειφθέντα μηδενικά, ἥτοι 5160000.

Διότι, διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 43000 ἐπὶ 120, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 43000 ἐπὶ 12 καὶ εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου νὰ γράφωμεν ἓν μηδενικόν. Ἀλλὰ διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν πάλιν τὸν 43000 ἐπὶ 12, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 43 ἐπὶ 12 καὶ εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου νὰ γράφωμεν τρία μηδενικά. Ὡστε εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου 43 ἐπὶ 12, ἥτοι τοῦ 516, πρέπει νὰ γράφωμεν ἓν ὄλφ τέσσαρα μηδενικά, ἥτοι 5160000.

2ον) Εἰς τὸν πολλαπλασιασμόν δύο ἀριθμῶν πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψει καὶ τὴν ἐξῆς συντομίαν. Ὡς πολλαπλασιαστὴν νὰ λαμβάνωμεν πάντοτε τὸν ἔχοντα ὀλιγώτερα σημαντικὰ ψηφία. Διότι τότε θὰ ἔχωμεν ὀλιγώτερα μερικὰ γινόμενα.

3ον) Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν συντόμως ἀριθμὸν ἐπὶ ἄλλον, τοῦ

ὁποίου ὅλα τὰ ψηφία εἶναι 9, γράφομεν εἰς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ τόσα μηδενικά, ὅσα 9 ἔχει ὁ ἄλλος· ἔπειτα ἀφαιροῦμεν ἐκ τοῦ σχηματισθέντος ἀριθμοῦ τὸν πολλαπλασιαστέον, καὶ ἡ διαφορὰ εἶναι τὸ ζητούμενον γινόμενον.

Παραδ. χάριν, διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν 2456 ἐπὶ 999, γράφομεν εἰς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ τρία μηδενικά καὶ ἀπὸ τὸν σχηματισθέντα ἀριθμὸν 2456000 ἀφαιροῦμεν τὸν 2456, ἡ δὲ διαφορὰ 2453544 εἶναι τὸ ζητούμενον γινόμενον. Ὁ λόγος εἶναι ὁ ἑξῆς· ἀντὶ νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸν ἀριθμὸν 999 φορές, τὸν ἐπαναλαμβάνομεν 1000 φορές καὶ ἔπειτα ἀφαιροῦμεν αὐτὸν μίαν φοράν.

4ον) Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν νοερῶς διψήφιον ἀριθμὸν ἐπὶ μονοψήφιον, πολλαπλασιάζομεν τὰ μέρη του χωριστὰ ἀρχόμενοι ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς ἀνωτέρας τάξεως καὶ ἔπειτα προσθέτομεν τὰ μερικὰ γινόμενα.

Π. γ. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 87 ἐπὶ 4, πολλαπλασιάζομεν πρῶτον τὸν 80 ἐπὶ 4 καὶ εὐρίσκομεν 320, ἔπειτα τὸν 7 ἐπὶ 4 καὶ τὸ γινόμενον 28 προσθέτομεν εἰς τὸν 320 καὶ εὐρίσκομεν 348.

Κατὰ τὸν ἀνωτέρω τρόπον πολλαπλασιάζομεν νοερῶς καὶ τριψήφιον ἀριθμὸν ἐπὶ μονοψήφιον.

Γινόμενον πολλῶν παραγόντων.

42. Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον πολλῶν ἀριθμῶν, πολλαπλασιάζομεν πρῶτον τοὺς δύο πρῶτους, τὸ γινόμενον αὐτῶν πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸν τρίτον, τὸ νέον γινόμενον ἐπὶ τὸν τέταρτον καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς, μέχρις ὅτου λάβωμεν ὅλους τοὺς ἀριθμούς·

Ἔστω, ὡς παράδειγμα, τὰ εὐρεθῆ τὸ γινόμενον $8 \times 14 \times 5 \times 6$. Τὸ γινόμενον τῶν δύο πρῶτων 8 καὶ 4 εἶναι 112, τὸ γινόμενον τούτου ἐπὶ 5 εἶναι 560 καὶ τέλος τὸ γινόμενον τούτου ἐπὶ 6 εἶναι 3360.

Καὶ τὸ γινόμενον πολλῶν ἀριθμῶν δὲν μεταβάλλεται καθ' οἷανδήποτε τάξιν καὶ ἂν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ἀριθμούς· τούτου ἕνεκα προτιμῶμεν χάριν συντομίας νὰ πολλαπλασιάζομεν πρῶτον τοὺς ἀριθμοὺς ἐκείνους, τῶν ὁποίων τὸ γινόμενον εὐρίσκομεν εὐκόλως νοερῶς. Ἦτοι λέγομεν (ἀνωτέρω παράδειγμα) 5 ἐπὶ 6, 30· 30 ἐπὶ 8, 240 καὶ τέλος πολλαπλασιάζομεν τὸν 240 ἐπὶ 14 καὶ εὐρίσκομεν γινόμενον 3360.

43. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν γινόμενον πολλῶν παραγόντων (μὴ εὐρεθὲν) ἐπὶ ἀριθμὸν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἓνα τῶν παραγόντων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν.

Ἐστω νὰ πολλαπλασιασθῆ τὸ γινόμενον $2 \times 3 \times 8$ ἐπὶ 4· πολλαπλασιάζομεν ἓνα τῶν παραγόντων αὐτοῦ, καὶ ἔστω τὸν 3, ὅτε ἔχομεν $2 \times 12 \times 8$ ἢ 192.

Περὶ τῶν δυνάμεων.

44. Ἐὰν συμβῆ οἱ παράγοντες γινομένου τινὸς νὰ εἶναι ἴσοι μετὰξὺ των, ὅπως π. χ. εἰς τὰ γινόμενα 6×6 , $2 \times 2 \times 2$, $5 \times 5 \times 5 \times 5$ κτ., τότε τὰ γινόμενα ταῦτα λέγονται **δυνάμεις** ἑνὸς τῶν παραγόντων τούτων, ἤτοι τὸ γινόμενον 6×6 λέγεται δύναμις τοῦ 6, τὸ γινόμενον $2 \times 2 \times 2$ λέγεται δύναμις τοῦ 2 καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς. Ὡστε

Δύναμις ἑνὸς ἀριθμοῦ λέγεται τὸ γινόμενον παραγόντων ἴσων μὲ τὸν ἀριθμὸν τούτου.

Καὶ ἂν μὲν οἱ παράγοντες εἶναι δύο, λέγεται ἰδιαιτέρως **δευτέρα δύναμις ἢ τετράγωνον**· ἂν δὲ εἶναι τρεῖς, λέγεται **τρίτη δύναμις ἢ κύβος**· ἂν δὲ εἶναι τέσσαρες, λέγεται **τετάρτη δύναμις** καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς.

Τὰς δυνάμεις παριστῶμεν συντόμως δι' ἑνὸς τῶν παραγόντων καὶ εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ὀλίγον ἄνω αὐτοῦ γράφομεν τὸν ἀριθμὸν, ὅστις δεικνύει τὸ πλῆθος τῶν παραγόντων, καὶ λέγεται οὗτος **ἐκθέτης**. ὁ δὲ παράγων λέγεται **βάσις** τῆς δυνάμεως.

Παρ. χάριν, ἡ δύναμις 6×6 γράφεται συντόμως 6^2 καὶ ὁ μὲν 2 εἶναι ὁ ἐκθέτης, ὁ δὲ 6 εἶναι ἡ βάση, καὶ ἀπαγγέλλεται ἕξ εἰς τὴν δευτέραν δύναμιν ἢ ἡ δευτέρα δύναμις τοῦ 6 ἢ τὸ τετράγωνον τοῦ 6· ὡσαύτως ἡ δύναμις $5 \times 5 \times 5$ γράφεται 5^3 καὶ ἀπαγγέλλεται πέντε εἰς τὴν τρίτην δύναμιν ἢ ἡ τρίτη δύναμις τοῦ 5 ἢ ὁ κύβος τοῦ 5. Ὡστε εἶναι $6^2 = 6 \times 6$ καὶ $5^3 = 5 \times 5 \times 5$.

Σημ. Πᾶσα δύναμις τῆς μονάδος 1 εἶναι πάλιν ἡ μονὰς 1· διότι εἶναι π. χ. $1^3 = 1 \times 1 \times 1 = 1$. Πᾶσα δύναμις τοῦ 10 εἶναι ἡ μονὰς ἀκολουθουμένη ὑπὸ τόσων μηδενικῶν, ὅσος εἶναι ὁ ἐκθέτης τῆς δυνάμεως· διότι εἶναι π. χ. $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$.

Δοκιμὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

45. Ἡ δοκιμὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ γίνεται ὡς ἐξῆς. Ἀλλάσσομεν τὴν τάξιν τῶν παραγόντων, ἤτοι θέτομεν τὸν πολλαπλασιαστέον ὡς πολλαπλασιαστὴν καὶ τὸν πολλαπλασιαστὴν ὡς πολλαπλασιαστέον καὶ πολλαπλασιάζομεν· καὶ ἂν εὗρωμεν τὸ ἴδιον γινόμενον, ἢ πρᾶξις ἔγινε χωρὶς λάθους (ἐδάφ. 35).

Ἐφαρμογή τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἰς προβλήματα τοῦ πρακτικοῦ βίου.

1) Ὁ πῆχυς ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 5 δραχμαίς· πόσον τιμῶνται 3 πῆχεις τοῦ ἰδίου ὑφάσματος ;

Κατάταξις τῶν δεδομένων ἀριθμῶν.

1 πῆχυς	5 δραχμαίς
3	χ

ἤτοι γράφομεν εἰς μίαν ὀριζοντίαν σειρᾶν τὰς δύο ἀντιστοίχους τιμὰς (ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἐνὸς πῆχεως εἶναι 5 δραχμαί, καὶ τἀνάπαλιν ἀντίστοιχος τιμὴ τῶν 5 δραχμῶν εἶναι ὁ 1 πῆχυς), ὑποκάτω δὲ γράφομεν τὴν νέαν δοθεῖσαν τιμὴν 3 ὑπὸ τὴν ὁμοειδῆ τῆς, τὴν δὲ ἄγνωστον καὶ ἀντίστοιχον πρὸς αὐτὴν τιμὴν παριστῶμεν διὰ τοῦ γράμματος χ (').

Διὰ τὰ λύσωμεν τώρα τὸ πρόβλημα, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Διὰ τὰ ἀγοράσωμεν 1 πῆχυν, θὰ δώσωμεν 5 δραχμαίς· διὰ τὰ ἀγοράσωμεν 2 πῆχεις, θὰ δώσωμεν δύο φορὰς τὰς 5 δραχμαίς, ἤτοι $5 + 5$ ἢ 5×2 δραχμαίς (διότι δραχμαίς ἐπαναλαμβάνομεν)· καὶ διὰ τὰ ἀγοράσωμεν 3 πῆχεις, θὰ δώσωμεν τρεῖς φορὰς τὰς 5 δραχμαίς, ἤτοι $5 + 5 + 5$ ἢ 5×3 , ἤτοι 15 δραχμαίς.

2) Μὲ μίαν δραχμὴν ἀγοράζομεν 3 ὀκάδας ἐξ ἐνὸς πράγματος· πόσας ὀκάδας θὰ ἀγοράσωμεν μὲ 4 δραχμαίς ;

Κατάταξις	1 δραχ.	3 ὀκ.
	4	χ

Λύσις. Ἀφοῦ μὲ 1 δραχμὴν ἀγοράζομεν 3 ὀκάδας, μὲ 4 δραχμαίς, αἷτινες εἶναι τέσσαρας φορὰς περισσότεροι τῆς μιᾶς δραχμῆς, θὰ ἀγοράσωμεν καὶ τέσσαρας φορὰς τὰς 3 ὀκάδας, ἤτοι $3 + 3 + 3 + 3$ ἢ 3×4 , ἤτοι 12 ὀκάδας (διότι ὀκάδας ἐπαναλαμβάνομεν).

Καὶ εἰς τὰ δύο ἀνωτέρω προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα γίνεται πολλαπλασιασμός, εἶναι γνωστὴ ἢ ἀντίστοιχος τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος (ἤτοι εἰς μὲν τὸ πρῶτον πρόβλημα εἶναι γνωστὴ ἢ τιμὴ τοῦ ἐνὸς πῆχεως, εἰς

(1) Οἱ μαθηταὶ πρέπει νὰ ἐννοήσωσι τὸ ἐξῆς. Ὅταν λέγομεν ὅτι ἀριθμὸς τις εἶναι τιμὴ ἄλλου, δὲν ἔπεται ἐκ τούτου ὅτι πρέπει νὰ παριστᾷ οὗτος καὶ πάντοτε χρήματα, ἀλλὰ δύναται νὰ παριστᾷ οἰονδήποτε πρᾶγμα. Παραδ. χάριν, ἐὰν δώσωμεν 2 μῆλα εἰς τινα καὶ λάβωμεν παρ' αὐτοῦ ὡς ἀντάλλαγμα 5 καρύδια, τὰ 2 μῆλα εἶναι ἢ τιμὴ τῶν 5 καρυδίων καὶ τἀνάπαλιν τὰ 5 καρύδια εἶναι ἢ τιμὴ τῶν 2 μῆλων.

δὲ τὸ δεύτερον ἢ τιμὴ τῆς μιᾶς δραχμῆς, ἥτις εἶναι 3 ὀκάδες) καὶ ζητεῖται νὰ εὗρεθῇ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων (ἦτοι τῶν πολλῶν πήχεων, τῶν πολλῶν δραχμῶν).

46. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

Ὅταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος καὶ θέλωμεν νὰ εὗρωμεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων (ὁμοειδῶν), κάμνομεν πολλαπλασιασμόν.

Πολλαπλασιαστέος εἶναι πάντοτε ἡ *τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος* (διότι αὐτὴ ἐπαναλαμβάνεται πολλάκις) καὶ *πολλαπλασιαστῆς ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων*, ὅστις, ὡς εἶπομεν καὶ προηγουμένως, θεωρεῖται ἀφηρημένος ἀριθμὸς καὶ ἐν τῇ πράξει καὶ ἐν τῇ σκέψει. Εἰς τὸ πρῶτον λοιπὸν πρόβλημα πολλαπλασιαστέος εἶναι αἱ 5 δραχμαὶ καὶ πολλαπλασιαστῆς ὁ 3, εἰς δὲ τὸ δεύτερον πρόβλημα πολλαπλασιαστέος εἶναι αἱ 3 ὀκάδες καὶ πολλαπλασιαστῆς ὁ 4.

Ἀφοῦ δὲ μάθωμεν ποῖος εἶναι ὁ πολλαπλασιαστέος καὶ ποῖος ὁ πολλαπλασιαστής, δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν καὶ τὸν πολλαπλασιαστέον ὡς ἀφηρημένον ἀριθμὸν καὶ νὰ ἐκτελῶμεν τὸν πολλαπλασιασμόν καθ' οἷον οἰανδήποτε τάξιν θέλωμεν (διότι τὸ γινόμενον δὲν μεταβάλλεται, ἐδάφ. 35), ἀρκεῖ μόνον νὰ ἐνθυμώμεθα ὅτι τὸ γινόμενον εἶναι ὁμοειδὲς μὲ τὸν πολλαπλασιαστέον.

Παρατήρησις. Διὰ νὰ κάμωμεν πολλαπλασιασμόν, δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος καὶ νὰ θέλωμεν νὰ εὗρωμεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα τοιοῦτον, ὥστε διπλασιαζομένης, τριπλασιαζομένης κτλ. τῆς μονάδος, νὰ διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κτλ. καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ αὐτῆς. Διότι ἂν π.χ. εἷς ἐργάτης τελειώσῃ ἔργον τι εἰς 8 ὥρας, οἱ 2, οἱ 3 κτλ. ἐργάται δὲν θὰ τελειώσωσιν αὐτὸ εἰς 8×2 , 8×3 κτλ. ὥρας, ἀλλ' εἶναι φανερόν, ὅτι θὰ τὸ τελειώσωσιν εἰς ὀλιγωτέρας τῶν 8 ὥρῶν. Θὰ μάθωμεν δὲ κατωτέρω, τίνα προᾶξιν θὰ ἐκτελέσωμεν πρὸς εὐρεσιν τούτου.

Νοερὰὶ ἀσκήσεις.

1) Μία δραχμὴ ἔχει 100 λεπτά· πόσα λεπτά ἔχουν 10 δραχμαὶ Πόσα αἱ 30 καὶ πόσα αἱ 100 δραχμαὶ ;

2) Ὁ στατῆρ (καντάρι) ἔχει 44 ὀκάδας· πόσας ὀκάδας ἔχουν οἱ 10 στατῆρες καὶ πόσας οἱ 100 στατῆρες ;

3) Τὸ ἔτος ἔχει 12 μῆνας· πόσους μῆνας ἔχουν 6 ἔτη ; (ἐνθυμούμενοι νὰ πολλαπλασιάζωμεν νοερῶς πρῶτον τὰς δεκάδας καὶ ἔπειτα τὰς μονάδας).

- 4) Ὁ πῆχυς ἔχει 8 ρούπια· πόσα ρούπια ἔχουν 15 πήχεις ;
5) Μία ἐβδομάς ἔχει 7 ἡμέρας· πόσας ἡμέρας ἔχουν 18 ἐβδομάδες ;
6) Ἡ ὀκτὰ ἔχει 400 δράμια· πόσα δράμια ἔχουν αἱ 9 ὀκτάδες καὶ πόσα αἱ 70 ὀκτάδες ;
7) Μία οἰκογένεια πληρώνει ἐνοίκιον κατὰ μῆνα 70 δραχμᾶς· πόσον πληρώνει τὸ ἔτος ;

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

- 1) Ἡγόρασέ τις 60 ὀκτάδας σίτου πρὸς 80 λεπτά τὴν ὀκτὰν καὶ 40 ὀκτ. ἀραβοσίτου πρὸς 60 λ. τὴν ὀκτὰν. Πόσα λεπτά ἔδωκεν ; (7200).
2) Ἡγόρασέ τις 5000 πορτοκάλια πρὸς 40 δραχμᾶς τὴν χιλιάδα (ἦτοι τὰ 1000) καὶ 7000 λεμόνια πρὸς 28 δρ. τὴν χιλιάδα. Πόσον ἔδωκεν ; (396).
3) Παντοπώλης τις ἠγόρασε 45 ὀκτάδας βουτύρου πρὸς 12 δρ. τὴν ὀκτὰν κατόπιν ἐπώλησεν αὐτὸ πρὸς 15 δρ. τὴν ὀκτὰν. Πόσον ἐκέρδισεν ; (135 δρ).
4) Ἐμπορός τις ἠγόρασεν 60 πήχεις ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος πρὸς 7 δρ. τὸν πῆχυν· κατόπιν ἐπώλησεν ἐξ αὐτοῦ 18 πήχεις πρὸς 8 δρ. τὸν πῆχυν, 34 πήχ. πρὸς 9 δρ. τὸν πῆχυν καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 6 δρ. τὸν πῆχυν. Πόσον ἐκέρδισεν ; (78 δρ.)
5) Ἡγόρασέ τις 6 στατῆρας ἀνθρώκων πρὸς 35 λεπτά τὴν ὀκτὰν καὶ ἔδωκεν ἓν ἑκατοντάδραχμον. Πόσα λεπτά ἔλαβεν ὑπόλοιπον ;
Δύσεις. Τρέπομεν πρῶτον τοὺς στατῆρας εἰς ὀκτάδας, διὰ νὰ γίνῃ ὁ πολλαπλασιαστικὸς ὁμοειδὴς μὲ τὴν μονάδα, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν, καὶ εὐρίσκομεν 264 ὀκτάδας· ὥστε οἱ ἀνθρώκαες ἀξίζουσιν 35×264 ἢ 9240 λεπτά, ἐπομένως ἔλαβεν ὑπόλοιπον 10000—9240 ἢ 760 λ.
6) Διὰ νὰ σκάψωσι μίαν ἄμπελον 7 ἐργάται ἐργάσθησαν 6 ἡμέρας πρὸς 8 δραχ. ἕκαστος τὴν ἡμέραν. Πόσον ἔλαβον ; (336 δρ.)
7) Ἐχει τις 3 ἀγελάδας, ἕκαστη τῶν ὁποίων δίδει τὴν ἡμέραν 4 ὀκτ. γάλα· ἐὰν πωλῇ τὸ γάλα πρὸς 1 δρ. καὶ 60 λ. (ἢ 160 λ.) τὴν ὀκτὰν, πόσον θὰ λάβῃ εἰς ἓνα μῆνα ; (57600 λ.,
Σημ. Ὁ μῆν λαμβάνεται μὲ 30 ἡμ.
8) Λαμβάνει τις ἐνοίκιον ἐκ τῆς οἰκίας του κατὰ μῆνα ἐκ τοῦ ἄνω πατώματος 150 δραχμᾶς, ἐκ τοῦ μεσαίου 110 καὶ ἐκ τοῦ ὑπογείου 30· ἔχει ὅμως ἔξοδα τὸ ἔτος δι' ἐπισκευήν, φόρον οἰκοδομῶν κτλ. 390 δραχ. Ζητεῖται πόσον ἔχει καθαρὸν εἰσόδημα τὸ ἔτος ἐκ τῆς οἰκίας του. (3090).
9) Ἐμπορός τις ἠγόρασε 19 δωδεκάδας μανδύλια πρὸς 7 δραχ. τὴν δωδεκάδα· κατόπιν ἐπώλησεν αὐτὰ πρὸς 80 λεπτά ἕκαστον μανδύλιον. Πόσον ἐκέρδισεν ; (4940 λεπτά).

10) Εἰς ἓν ἐργοστάσιον ἐργάζονται 36 ἐργάται· ἐκ τούτων οἱ μὲν 8 λαμβάνουσι 9 δραχ., ἕκαστος τὴν ἡμέραν, οἱ δὲ 15 λαμβάνουσι 6 δρ., ἕκαστος, οἱ δὲ λοιποὶ 4 δρ., ἕκαστος. Ζητεῖται πόσας δραχμὰς θὰ λάβωσιν ὅλοι εἰς 5 ἑβδομάδας, ἀλλὰ τὰς Κυριακὰς δὲν ἐργάζονται. (6420).

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

47. Ὑποθέσωμεν, ὅτι πρόκειται νὰ μοιράσωμεν 12 μῆλα εἰς 4 παιδία ἕξ ἴσων, καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσα μῆλα θὰ λάβῃ ἕκαστον.

Τοῦτο δυνάμεθα νὰ πράξωμεν κατὰ τὸν ἐξῆς ἀπλοῦν τρόπον. Κατὰ πρῶτον δίδομεν ἀπὸ ἓνα μῆλον εἰς ἕκαστον, ὅτε μένουν 12—4, ἧτοι 8 μῆλα· ἔπειτα δίδομεν πάλιν ἀπὸ ἓνα μῆλον, ὅτε μένουν 8—4, ἧτοι 4 μῆλα· ἔπειτα δίδομεν πάλιν ἀπὸ ἓνα μῆλον, ὅτε δὲν μένει τίποτε, διότι εἶναι $4—4=0$. Ἐκαστὸν λοιπὸν παιδίον θὰ λάβῃ 3 μῆλα, ἧτοι τόσα, ὅσας φορὰς ἀφηρέσαμεν τὸν 4 ἀπὸ τὸν 12. Ἡ πράξις λοιπὸν αὕτη, διὰ τῆς ὁποίας ἐμοιράσαμεν τὰ 12 μῆλα εἰς τέσσαρα ἴσα μέρη (διότι εἶναι $12=3+3+3+3$), λέγεται **διαίρεσις**. Ὡστε ὁρίζομεν τὴν διαίρεσιν ὡς ἐξῆς :

Διαίρεσις λέγεται ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας μοιράζομεν ἓνα ἀριθμὸν εἰς τόσα ἴσα μέρη, ὅσας μονάδας ἔχει ἄλλος δοθεὶς ἀριθμὸς.

Ὁ ἀριθμὸς, ὅστις πρόκειται νὰ μοιρασθῇ ἢ διαιρεθῇ, λέγεται **διααιρετέος**· ὁ δὲ ἄλλος, ὅστις δεικνύει εἰς πόσα ἴσα μέρη θὰ μοιρασθῇ ὁ διααιρετέος, λέγεται **διαιρέτης**· τὸ δὲ ἐξαγόμενον τῆς διαιρέσεως, τὸ ὁποῖον παριστᾷ ἓν τῶν ἴσων μερῶν ἢ μεριδίων, λέγεται **πηλίκον**. Ὡστε εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα διααιρετέος εἶναι ὁ 12, διαιρέτης ὁ 4 καὶ πηλίκον ὁ 3.

Διὰ γὰρ δεῖξωμεν, ὅτι ἀριθμὸς τις πρόκειται νὰ διαιρεθῇ δι' ἄλλον, γράφομεν μεταξὺ αὐτῶν τὸ σημεῖον : , τὸ ὁποῖον ἀπαγγέλλεται **διὰ**, ἀλλὰ τὸν διαιρέτην γράφομεν πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ διααιρετέου. Ἡ ἀνωτέρω, παρὰ χάριν, διαίρεσις γράφεται 12 : 4 καὶ ἀπαγγέλλομεν **δώδεκα διὰ τέσσαρα**. Ἐπίσης 24 : 6 σημαίνει νὰ διαιρέσωμεν τὸν 24 διὰ τοῦ 6.

48. Εἶδομεν ἀνωτέρω ὅτι τὸ πηλίκον (ἧτοι ὁ 3) ἔχει τόσας μονάδας, ὅσας φορὰς εἶναι δυνατόν νὰ ἀφαιρεθῇ ὁ διαιρέτης ἀπὸ τὸν διααιρετέον. Ἀλλ' εἶναι φανερόν, ὅτι ὅσας φορὰς δύναται νὰ ἀφαιρεθῇ ὁ διαιρέτης ἀπὸ τὸν διααιρετέον, τόσας φορὰς χωρεῖ οὗτος εἰς ἐκεῖνον. Διὰ τοῦτο ὁρίζομεν τὴν διαίρεσιν καὶ ὡς ἐξῆς :

Διαίρεσις λέγεται ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας εὐρίσκομεν πόσας φορὰς ἀριθμὸς τις χωρεῖ εἰς ἄλλον.

Σημ. Ἐὰν ὁ διαιρέτης εἶναι ἴσος μὲ τὸν διααιρετέον, τὸ πηλίκον

εἶναι ἢ μόνος 1· ἐὰν δὲ ὁ διαιρέτης εἶναι ἢ μόνος, τὸ πηλίκον εἶναι ἴσον μὲ τὸν διαιρετέον. Παραδ. χάριν, ἂν πρόκειται νὰ μοιράσωμεν 7 δραχμὰς εἰς 7 ἀνθρώπους, θὰ δώσωμεν εἰς ἕκαστον ἀπὸ 1 δραχμὴν, ἥτοι τὸ πηλίκον τοῦ 7 διὰ 7 εἶναι 1. Ἐὰν ὅμως πρόκειται νὰ μοιράσωμεν τὰς 7 δραχμὰς εἰς ἕνα μόνον ἀνθρώπον, θὰ δώσωμεν εἰς αὐτὸν καὶ τὰς 7 δραχμὰς, ἥτοι τὸ πηλίκον τοῦ 7 διὰ 1 εἶναι 7.

Τελεία καὶ ἀτελής διαιρέσεις.

49. Ὅταν ἀριθμὸς τις δύναται νὰ διαιρηθῇ ἢ μοιρασθῇ ἀκριβῶς εἰς ἴσα μέρη, χωρὶς νὰ μείνη τίποτε, ἡ διαιρέσις τότε λέγεται **τελεία**. τοῦναντίον δὲ λέγεται **ἀτελής**.

Εἶδομεν, παραδ. χάριν, ἀνωτέρω, ὅτι ἐκ τῶν 12 μῆλων, τὰ ὁποῖα ἐμοιράσαμεν εἰς τὰ 4 παιδιά, ἔλαβεν ἕκαστον 2 μῆλα καὶ δὲν ἔμεινε τίποτε· ἡ διαιρέσις λοιπὸν αὕτη εἶναι τελεία. Ἐὰν ὅμως ἔχωμεν, παραδ. χάριν, 22 μῆλα καὶ μοιράσωμεν αὐτὰ κατὰ τὸν ἀνωτέρω τρόπον εἰς τὰ 4 παιδιά, θὰ λάβῃ ἕκαστον 5 μῆλα καὶ θὰ μείνουν 2 μῆλα. Ἡ διαίρεσις λοιπὸν αὕτη εἶναι ἀτελής· ὁ δὲ ἀριθμὸς 2 (μῆλα), ὅστις μένει, λέγεται **ὑπόλοιπον** τῆς διαιρέσεως, τὸ ὁποῖον εἶναι πάντοτε μικρότερον τοῦ διαιρέτου (διότι, ἂν εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα ἦτο ἴσον ἢ μεγαλύτερον τοῦ διαιρέτου, ἠδυνάμεθα νὰ δώσωμεν ἀκόμη εἰς ἕκαστον παιδίον ἀπὸ ἓν ἢ περισσότερα μῆλα).

50. Ὑποθέσωμεν τώρα, ὅτι εἰς τὴν ἀνωτέρω γενομένην τελείαν διαιρέσιν λαμβάνομεν ἀπὸ ἕκαστον παιδίον ὅσα μῆλα τῷ ἐδώκαμεν, τότε θὰ ἔχωμεν πάλιν τὰ 12 μῆλα· ἀλλ' ἕκαστον παιδίον ἔλαβε 3 μῆλα, ἐπομένως τὰ 4 παιδιά ἔλαβον 3×4 μῆλα. Ὅστε εἶναι $12 = 3 \times 4$.

Ἐὰν πράξωμεν τὸ αὐτὸ καὶ εἰς τὴν ἀνωτέρω γενομένην ἀτελεῆ διαίρεσιν, ἥτοι λάβωμεν ἀπὸ ἕκαστον παιδίον ὅσα μῆλα τῷ ἐδώκαμεν καὶ τὰ ἐνώσωμεν μὲ τὰ 2 μῆλα, ὅπου ἔμειναν, θὰ ἔχωμεν πάλιν τὰ 22 μῆλα· ἀλλ' ἕκαστον παιδίον ἔλαβε 5 μῆλα, ἐπομένως τὰ 4 παιδιά ἔλαβον 5×4 μῆλα. Ὅστε εἶναι $22 = 5 \times 4 + 2$.

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω ἔπεται, ὅτι

51. *Εἰς τὴν τελείαν διαιρέσιν ὁ διαιρετέος εἶναι ἴσος μὲ τὸ γινόμενον τοῦ πηλίκου καὶ τοῦ διαιρέτου, εἰς δὲ τὴν ἀτελεῆ μὲ τὸ γινόμενον τοῦτο ἠῤῥημένον κατὰ τὸ ὑπόλοιπον.*

Σημ. Τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ 0 δι' ἀριθμοῦ τινος εἶναι 0 (καθὼς καὶ τὸ ὑπόλοιπον), ἥτοι εἶναι $0 : 5 = 0$. Διότι πολλαπλασιαζομένου τοῦ πηλίκου ἐπὶ τὸν διαιρέτην, προκύπτει γινόμενον ὁ διαιρετέος 0.

Ὁ ἀνωτέρω τρόπος, διὰ τοῦ ὁποῖου εὐρίσκομεν τὸ πηλίκον δύο ἀριθμῶν διὰ τῆς ἀλλεπαλλήλου ἀφαιρέσεως τοῦ διαιρέτου ἀπὸ τὸν διαιρε-

τέον, ἀπαιτεῖ καὶ κόπον καὶ χρόνον, μάλιστα δὲ ὅταν οἱ ἀριθμοὶ εἴη
μεγάλοι. Διὰ τοῦτο θὰ μεταχειρισθῶμεν κατωτέρω ἄλλον τρόπον, ὅ
τοῦ ὁποίου συντόμως εὐρίσκομεν τὸ πληκτικὸν δύο ἀριθμῶν.

Διαίρεσις ἀριθμῶν ὧν τὸ πληκτικὸν εἶναι μονοψήφιον.

52. Κατὰ πρῶτον πρέπει νὰ μάθωμεν πότε τὸ πληκτικὸν δύο ἀριθμῶν
εἶναι μονοψήφιον καὶ πότε πολυψήφιον. Πρὸς τοῦτο πολλαπλασιάζομεν
τὸν διαιρέτην ἐπὶ 10 γράφοντες ἐν μηδενικὸν πρὸς τὰ δεξιά του, καὶ
ἂν προκύψῃ ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ διαιρετέου, τὸ πληκτικὸν θὰ εἶναι
μονοψήφιον· διότι τοῦτο σημαίνει, ὅτι ὁ διαιρέτης δὲν χωρεῖ εἰς τὸν διαιρετέον
10 φορές, ἀλλ' ὀλιγώτερον, ἐπομένως τὸ πληκτικὸν θὰ εἶναι ἐκ
ἐκ τῶν ἀριθμῶν 1, 2, 3, ..., 9, ἥτοι μονοψήφιος. Ἐὰν ὅμως προκύψῃ ἀριθμὸς
μικρότερος τοῦ διαιρετέου, τὸ πληκτικὸν θὰ εἶναι διψήφιον ἢ πολυψήφιον·
διότι τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ διαιρέτης χωρεῖ εἰς τὸν διαιρετέον
10 φορές ἢ περισσότερον.

Ἐν τῇ διαιρέσει ταύτῃ, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ πληκτικὸν εἶναι μονοψήφιο
φιον, δυνατὸν ὁ διαιρέτης νὰ εἶναι ἢ μονοψήφιος ἢ πολυψήφιος ὥστε
διακρίνομεν δύο περιπτώσεις.

1ον. **Διαιρέτης μονοψήφιος.** Ἐστω, ὡς παράδειγμα, νὰ εἶναι ὁ διαιρέτης
αἰρεθῆ ὁ ἀριθμὸς 32 διὰ 5 (τὸ πληκτικὸν ἐνταῦθα εἶναι μονοψήφιον, διότι
ὅτι τὸ δεκαπλάσιον τοῦ 5, ἥτοι ὁ 50, εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 32). Ἐὰν
νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν 5 ἀπὸ τὸν 32 ὅσας φορές εἶναι δυνατὸν καὶ
εὐρωμεν οὕτω τὸ πληκτικὸν, ὡς ἐπράξαμεν ἀνωτέρω, εὐρίσκομεν τοῦ
συντόμως ὡς ἐξῆς. Πολλαπλασιάζομεν νοερῶς τὸν διαιρέτην 5 ἐπὶ ἀριθμὸν
μόνον τοιοῦτον, ὥστε νὰ εὐρωμεν τὸ μεγαλύτερον γινόμενον, τὸ ὁποῖον
χωρεῖ εἰς τὸν 32. Τοιοῦτον γινόμενον εἶναι ἐνταῦθα ὁ ἀριθμὸς 5×6 , ἥτοι
ὁ 30 (διότι 5×7 , ἥτοι ὁ 35, εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 32)· ὁ πολλαπλασιαστικὸς
λοιοῦτον 6 δεικνύει, ὅτι ὁ 5 χωρεῖ εἰς τὸν 32 ἕξ φορές, τοῦτο σημαίνει ὅτι
ἀφαιρέσωμεν τὸν 30 ἀπὸ τὸν 32, ἥτοι εἶναι 2. Ὡστε ἡ διαίρεσις εἶναι
σύντομος ἐπαναληπτικὴ ἀφαιρέσις ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ.

Ἐστω ἐπίσης νὰ διαιρεθῆ ὁ 76 διὰ 9. Εὐρίσκομεν νοερῶς, ὅτι ὁ 9
μεγαλύτερος ἀριθμὸς, ὅστις πολλαπλασιάζων τὸν 9 δίδει τὸ μεγαλύτερον
γινόμενον, τὸ ὁποῖον χωρεῖ εἰς τὸν 76, εἶναι ὁ 8· διότι $9 \times 8 = 72$ (ἐνῶς
 $9 \times 9 = 81$). Ἄρα τὸ πληκτικὸν εἶναι 8, τὸ δὲ ὑπόλοιπον εὐρίσκομεν ἀφαιρέ-
ροῦντες τὸν 72 ἀπὸ τὸν 76, ἥτοι εἶναι 4.

Σημ. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ διαιρέτης καὶ
τὸ πληκτικὸν εἶναι μονοψήφιοι ἀριθμοί, ἀνάγεται, ὡς θὰ ἴδωμεν, πᾶς

αίρεσις, ὥστε εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζωμεν εὐχερῶς τὴν ἀπὸ μνήμης κτέλεσιν τοιούτων διαιρέσεων.

2ον. **Διαιρέτης πολυψήφιος.** Ἔστω νὰ διαιρεθῇ ὁ ἀριθμὸς 6475 διὰ 743, ἥτοι ἔστω νὰ μοιράσωμεν 6475 δραχμὰς εἰς 743 ἀνθρώπους. Διὰ νὰ εὐρώμεν τὸ πηλίκον (τὸ ὁποῖον εἶναι μονοψήφιον, διότι ὁ 6430 εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 6475), σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Ὑποθέτομεν, ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι μόνον 700 ἢ 7 ἑκατοντάδες· διὰ νὰ λάβῃ ἕκαστος ἀπὸ μίαν δραχμὴν, πρέπει νὰ μοιράσωμεν 7 ἑκατοντάδας δραχμῶν, ἀλλ' ἡμεῖς ἔχομεν νὰ μοιράσωμεν 64 ἑκατοντάδας (τόσας ἔχει ὁ ἀριθμὸς 6475)· ὥστε θὰ λάβῃ ἕκαστος τόσας δραχμὰς, ὅσας φορὰς αἱ 7 ἑκατοντάδες χωροῦν εἰς τὰς 64 ἑκατοντάδας ἢ ὁ 7 εἰς τὸν 64. Διαιροῦντες λοιπὸν τὸν 64 διὰ 7 (ἥτοι διὰ τοῦ πρώτου ψηφίου τοῦ διαιρέτου) εὐρίσκομεν πηλίκον 9· μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι καὶ τὸ πηλίκον τοῦ 6475 διὰ 743 εἶναι πάλιν 9· διότι οἱ ἄνθρωποι εἶναι περισσότεροι τῶν 64 ἑκατοντάδων, ἥτοι 743, καὶ ἐπομένως δὲν γνωρίζομεν, ἂν ὁ ἀριθμὸς τῶν 6475 χωρεῖ εἰς ἐκεῖνον 9 φορὰς.

Διὰ νὰ μάθωμεν δέ, ἂν τὸ πηλίκον τοῦ 6475 διὰ 743 εἶναι 9 ἢ μικρότερον αὐτοῦ, πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρέτην ἐπὶ 9 καὶ ἂν τὸ γινόμενον εἶναι ἴσον ἢ μικρότερον τοῦ διαιρετέου, τότε πράγματι τὸ πηλίκον εἶναι 9· ἂν δὲ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ διαιρετέου, τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ διαιρέτης δὲν χωρεῖ 9 φορὰς εἰς τὸν διαιρετέον, ἀλλ' ὀλιγώτερον. γινόμενον λοιπὸν τοῦ 743 ἐπὶ 9 εἶναι 6687. ἥτοι μεγαλύτερον τοῦ διαιρετέου 6475, διὰ τοῦτο θὰ δοκιμάσωμεν τὸν κατὰ μονάδα μικρότερον 9 ἀριθμὸν, ἥτοι τὸν 8, καὶ εὐρίσκομεν γινόμενον 743×8 ἢ 5944, ἢ μικρότερον τοῦ διαιρετέου. Ἐπομένως τὸ πηλίκον εἶναι 8, τὸ δὲ ὀλίγον τῆς διαιρέσεως εἶναι ἡ διαφορὰ 6475—5944, ἥτοι 531. Ὥστε λοιπὸν θὰ λάβῃ 8 δραχμὰς καὶ θὰ μείνουν 531 δραχμαί.

Ἡ πράξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς:

$$\begin{array}{r}
 6475 \overline{) 743} \text{ ἢ συντόμως } 6475 \overline{) 743} \\
 \underline{5944} \quad 8 \qquad \qquad \qquad 531 \quad 8 \\
 531
 \end{array}$$

γράφομεν τὸν διαιρέτην πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ διαιρετέου καὶ χωρίζομεν συνήθως αὐτοὺς διὰ μιᾶς κατακορύφου γραμμῆς, ὑποκάτω δὲ τοῦ διαιρετέου σύρομεν ὀριζοντίαν γραμμὴν καὶ ὑποκάτω αὐτῆς γράφομεν τὸ πηλίκον· τὸ δὲ γινόμενον τοῦ διαιρέτου καὶ τοῦ πηλίκου γράφομεν ὑποκάτω τοῦ διαιρετέου καὶ ἀφαιροῦμεν τοῦτο ἀπ' αὐτόν.

Χάριν ὁμῶς συντομίας δὲν γράφομεν ὑπὸ τὸν διαιρετέον τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου καὶ τοῦ πηλίκου ἀλλ' ἐνῶ πολλαπλασιάζομεν ἕνα

ρον του 5) και διαιρέσωμεν τον 42 δια 9, εύρισκομεν το πληθύνον 4.

Εάν δε συμβή το πρώτον ψηφίον του διαιρέτου να χωρή εις τον αριθμόν, ον αποτελούσιν τα δύο πρώτα ψηφία του διαιρέτου, 10 φορές ή και περισσότερον, δοκιμάζομεν άμέσως τον 9. Παράδ. γάρον, εις το άνωτέρω τρίτον παράδειγμα ο 3 χωρεί εις τον 33 ένδεκα φορές ($11 \times 3 = 33$), αρχίζομεν λοιπόν την δοκιμήν από τον 9, διότι γνωρίζομεν εκ των προτέρων ότι το πλήκρον θα είναι μονοψήφιον.

Διαιρέσεις αριθμών, ών το πλήκρον είναι πολυψήφιον.

54. Εν τη διαιρέσει ταύτη, κατά την οποίαν το πλήκρον είναι πολυψήφιον, δυνατόν πάλιν ο διαιρέτης να είναι μονοψηφιος ή πολυψηφιος· ώστε και ένταύθα διακρίνομεν δύο περιπτώσεις.

1ον. **Διαιρέτης μονοψηφιος.** Εστω να διαιρέθῃ ο αριθμός 4783 δια 7, ήτοι εστω να μοιράσωμεν 4783 δραχμάς εις 7 ανθρώπους. Το πλήκρον ένταύθα είναι πολυψηφίον (έδάφ. 52).

Διά να εύρωμεν τώρα το πλήκρον, ήτοι το μερίδιον εκάστου, αρχεί να μοιράσωμεν χωριστά τας μονάδας εκάστης τάξεως του αριθμού 4783, ήτοι χωριστά τας χιλιάδας, χωριστά τας εκατοντάδας, χωριστά τας δεκάδας και χωριστά τας μονάδας. Άλλ' αι 4 χιλιάδες αυτού δέν φθάνουν δια να λάβη έκαστος από μίαν χιλιάδα (διότι οι άνθρωποι είναι 7), δια τοῦτο τρέπομεν αυτὰς εις μονάδας της άμέσως κατωτέρας τάξεως, ήτοι εις 40 εκατοντάδας (διότι έκαστη χιλιάς έχει 10 εκατοντάδας) και 7 εκατοντάδας όπου έχει ο δοθείς αριθμός κάμνουν 47 εκατοντάδας. Άλλ' ο 47 εύρίσκειται άμέσως, εάν χωρισθωμεν από τα άριστερά του δοθέντος αριθμού τα δύο πρώτα ψηφία αυτού. Διαιρούντες τώρα τας 47 εκατοντάδας δια 7 εύρισκομεν πλήκρον 6 εκατοντάδας (διότι είναι $7 \times 6 = 42$) και μένουσιν 5 εκατοντάδες.

Τας 5 εκατοντάδας του υπολοίπου τρέπομεν εις μονάδας της άμέσως κατωτέρας τάξεως, ήτοι εις 50 δεκάδας (διότι έκαστη εκατοντάς έχει 10 δεκάδας) και 8 δεκάδας όπου έχει ο δοθείς αριθμός κάμνουν 58 δεκάδας. Άλλ' ο 58 εύρίσκειται άμέσως, εάν χωρισθωμεν εις τα δεξιά του εύρεθέντος υπολοίπου 5 το άμέσως επομενον ψηφίον 8 του διαιρέτου, ήτοι 58. Διαιρούντες τώρα τας 58 δεκάδας δια 7 εύρισκομεν πλήκρον 8 δεκάδας (διότι είναι $7 \times 8 = 56$) και μένουσιν 2 δεκάδες.

Τας 2 δεκάδας του υπολοίπου τρέπομεν εις μονάδας της άμέσως κατωτέρας τάξεως, ήτοι εις 20 μονάδας (διότι έκαστη δεκάς έχει 10 μονάδας) και 3 μονάδας όπου έχει ο δοθείς αριθμός κάμνουν 23 μονάδας.

Ἄλλ' ὁ ἀριθμὸς 23 εὐρίσκεται ἀμέσως, ἐὰν γράψωμεν εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ εὐρεθέντος ὑπολοίπου 2 τὸ ἀμέσως ἐπόμενον ψηφίον 3 τοῦ διαιρετέου, ἦτοι 23. Διαιροῦντες τώρα τὰς 23 μονάδας διὰ 7 εὐρίσκομεν πηλίκον 3 μονάδας (διότι εἶναι $7 \times 3 = 21$) καὶ μένουν 2 μονάδες. Ὡστε ἕκαστος θὰ λάβῃ ἐν ὄλῳ δραχμὰς 6 ἑκατοντάδας, 8 δεκάδας καὶ 3 μονάδας, ἦτοι θὰ λάβῃ 683 δραχμὰς καὶ θὰ μείνουν 2 δραχμαί.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω βλέπομεν, ὅτι πρὸς εὐρεσιν τοῦ πηλίκου 683 τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμοῦ 4783 διὰ 7 ἀνελύσαμεν τὴν διαίρεσιν ταύτην εἰς ἄλλας μερικὰς διαιρέσεις, ἑκάστη τῶν ὁποίων νὰ ἔχῃ πηλίκον μονοψήφιον. Καὶ κατὰ πρῶτον διηρέσαμεν τὰς 47 ἑκατοντάδας τοῦ ἀριθμοῦ διὰ 7 ὥστε διὰ νὰ εὐρίσκωμεν τὸ πρῶτον μονοψήφιον πηλίκον, πρέπει νὰ χωρίζωμεν ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ τοῦ διαιρετέου τόσα ψηφία ὅσα ἀπαιτοῦνται διὰ νὰ σχηματισθῇ ἀριθμὸς ἴσος ἢ μεγαλύτερος τοῦ διαιρετέου, ἀλλὰ μικρότερος τοῦ δεκαπλασίου αὐτοῦ, ἦτοι πρέπει νὰ χωρίζωμεν ἢ ὅσα ἔχει ὁ διαιρέτης ψηφία ἢ ἐν ἀκόμῃ.

Ἡ ἀνωτέρω προᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς :

$$\begin{array}{r} 4783 \\ 58 \\ 23 \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{|l} 7 \\ \hline 683 \end{array}$$

Ὁ χωρισμὸς τῶν ψηφίων τοῦ διαιρετέου συνηθίζεται νὰ γίνηται διὰ μιᾶς ὀξείας ('), τιθεμένης ἀνωθεν τοῦ τελευταίου ψηφίου ἐκ τῶν χωριζομένων. Καλὸν ὁμως εἶναι καὶ ἕκαστον ψηφίον τοῦ διαιρετέου, τὸ ὁποῖον γράφομεν εἰς τὰ δεξιὰ ἑκάστου εὐρισκομένου ὑπολοίπου ἢ, ὡς λέγομεν συνήθως, **καταβιβάζομεν**, νὰ τὸ σημειῶμεν διὰ μιᾶς ὀξείας (ὡς δεικνύεται ἀνωτέρω), διὰ νὰ μὴ συμβῇ λάθος καὶ καταβιβάσωμεν ἐξ ἀπροσεξίας ἄλλο ψηφίον ἀντὶ τοῦ ἀμέσως ἐπομένου.

Παρατήρησις. Ἐνῶ εἰς τὴν πρόσθεσιν, ἀφαίρεσιν καὶ πολλαπλασιασμὸν ἀρχίζομεν τὴν προᾶξιν ἐκ δεξιῶν, εἰς τὴν διαίρεσιν ὁμως ἀρχίζομεν ἐξ ἀριστερῶν, καὶ τοῦτο διὰ νὰ τρέπωμεν τὰ ἐκάστοτε εὐρισκόμενα ὑπόλοιπα εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως.

2ον. **Διαιρέτης πολυψήφιος.** Ἐστω νὰ διαιρεθῇ ὁ ἀριθμὸς 8459 διὰ 343, ἦτοι ἔστω νὰ μοιράσωμεν 8459 δραχμὰς εἰς 343 ἀνθρώπους. Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ πηλίκον, θὰ ἀναλύσωμεν καὶ ἐνταῦθα τὴν διαίρεσιν εἰς ἄλλας μερικὰς διαιρέσεις, ἑκάστη τῶν ὁποίων νὰ ἔχῃ πηλίκον μονοψήφιον. Πρὸς τοῦτο χωρίζομεν ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ τοῦ διαιρετέου τόσα ψηφία, ὅσα ἔχει ὁ διαιρέτης (ἦτοι τρία) ἢ ἐν περισσότερον,

ἂν ὁ χωρισθεὶς ἀριθμὸς εἶναι μικρότερος τοῦ διαιρέτου. Ἐνταῦθα θὰ χωρίσωμεν τρία ψηφία, διότι ὁ χωρισθεὶς ἀριθμὸς 845 εἶναι μεγαλύτερος τοῦ διαιρέτου 343. Διαιροῦμεν λοιπὸν τὸν 845 διὰ 343 (ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὸν κανόνα τοῦ ἔδαφίου 53) καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 2 δεκάδας (διότι τὰς 845 δεκάδας τοῦ διαιρέτου διηρόσαμεν) καὶ ὑπόλοιπον 159 δεκάδας.

Ἐὰν τώρα καταβιβάσωμεν εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ ὑπολοίπου 159 καὶ τὸ ἐπόμενον ψηφίον 9 τοῦ διαιρέτου, σχηματίζεται ὁ ἀριθμὸς 1599, ὅστις παριστᾷ μονάδας (διότι αἱ 159 δεκάδες κάμνουν 1590 μονάδας καὶ 9 τοιαύτας ὅπου ἔχει ὁ διαιρέτος κάμνουν 1599 μονάδας). Διαιροῦμεν λοιπὸν τὸν 1599 διὰ 343 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκιον 4 μονάδας καὶ ὑπόλοιπον 227 μονάδας.

Ὡστε τὸ πηλίκον τοῦ ἀριθμοῦ 8459 διὰ 343 εἶναι 24 καὶ τὸ ὑπόλοιπον 227, ἥτοι ἕκαστος θὰ λάβῃ 24 δραχμὰς καὶ θὰ μείνουν 227 δραχμαί.

Ἡ ἀνωτέρω προᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{r|l} 8459 & 343 \\ \hline 1599 & 24 \\ \hline & 227 \end{array}$$

55. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἑξῆς γενικὸν κανόνα.

Διὰ τὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν δι' ἄλλου, γράφομεν τὸν διαιρέτην πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ διαιρέτου καὶ χωρίζομεν αὐτοὺς διὰ μιᾶς κατακορύφου γραμμῆς, ὑποκάτω δὲ τοῦ διαιρέτου σύρομεν ὀριζήσαν γραμμὴν καὶ ὑποκάτω αὐτῆς γράφομεν τὸ πηλίκιον.

Ἐπειτα χωρίζομεν ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ τοῦ διαιρέτου τόσα ψηφία, ὅσα ἔχει ὁ διαιρέτης ἢ ἐν ἀκόμῃ, ἂν ὁ χωρισθεὶς ἀριθμὸς εἶναι μικρότερος τοῦ διαιρέτου. Τὸν οὕτω σχηματισθέντα ἀριθμὸν διαιροῦμεν διὰ τοῦ διαιρέτου καὶ τὸ εὐρεθὲν πηλίκιον ἀλλαπλασιάζομεν ἐπὶ ὄλον τὸν διαιρέτην, τὸ δὲ γινόμενον ἀφαιρούμεν ἀπὸ τὸν χωρισθέντα ἀριθμὸν καὶ εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ εὐρεθέντος ὑπολοίπου καταβιβάζομεν καὶ τὸ ἐπόμενον ψηφίον τοῦ διαιρέτου. Τὸν σχηματισθέντα ἀριθμὸν (ἐκ τοῦ ὑπολοίπου καὶ τοῦ ἐπομένου ψηφίου) διαιροῦμεν διὰ τοῦ διαιρέτου καὶ εὐρίσκομεν τὸ δεῦτερον ψηφίον τοῦ ζητουμένου πηλίκου. Καὶ οὕτως ἐκτελοῦμεν, μέχρις ὅτου καταβιβάσωμεν καὶ τὸ τελευταῖον ψηφίον τοῦ διαιρέτου.

Σημ. Συμβαίνει πολλάκις, ἀφοῦ καταβιβάσωμεν πλησίον ὑπολοί-

που τινός και τὸ ἐπόμενον ψηφίον τοῦ διαιρετέου, νὰ μὴ διαιρῆται ὁ οὕτω σχηματισθεὶς ἀριθμὸς διὰ τοῦ διαιρέτου, γράφομεν τότε 0 εἰς τὸ πηλίκον (διὰ νὰ τηρηθῆ ἡ ἀξία τῶν ψηφίων τοῦ πηλίκου) καὶ καταβιβάζομεν καὶ τὸ ἐπόμενον ψηφίον τοῦ διαιρετέου. Καὶ οὕτως ἔξακολουθοῦμεν, μέχρις ὅτου εὕρωμεν ἀριθμὸν ἴσον ἢ μεγαλύτερον τοῦ διαιρέτου.

Παραδείγματα πρὸς ἄσκησιν.

598 :	89	προκύπτει πηλίκον	6	καὶ ὑπόλοιπον	64
3456 :	398	»	»	8	» 362
68061 :	7	»	»	9723	» 0
69458 :	87	»	»	798	» 32
39506 :	78	»	»	506	» 38
77416 :	97	»	»	798	» 10
895673 :	892	»	»	1004	» 105
62401 :	79	»	»	789	» 70
705341 :	786	»	»	897	» 299

Πλῆθος ψηφίων πηλίκου.

56. Ἐὰν θέλωμεν νὰ μάθωμεν πόσα ψηφία θὰ ἔχη τὸ πηλίκον μιᾶς διαιρέσεως, χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν αὐτήν, χωρίζομεν ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ τοῦ διαιρετέου τόσα ψηφία, ὅσα χρειάζονται διὰ νὰ εὐρεθῆ τὸ πρῶτον ψηφίον τοῦ πηλίκου, ἔπειτα μετροῦμεν τὰ μὴ χωρισθέντα ψηφία τοῦ διαιρετέου καὶ ὅσα εἶναι ταῦτα καὶ ἐν ἀκόμῃ, τόσα ψηφία θὰ ἔχη τὸ πηλίκον. Τοῦτο ἐξάγεται ἐκ τοῦ ἀνωτέρω κανόνος τῆς διαιρέσεως.

Ἰδιότης τῆς διαιρέσεως.

57. Ἐὰν μοιράσωμεν 25 μῆλα εἰς 7 παιδιά, ἕκαστον παιδίον θὰ λάβῃ 3 μῆλα καὶ θὰ μείνουν 4 μῆλα. Ἐὰν πάλιν μοιράσωμεν 25 μῆλα εἰς ἄλλα 7 παιδιά, ἕκαστον θὰ λάβῃ πάλιν 3 μῆλα καὶ θὰ μείνουν 4 μῆλα. Ὡστε, ἐὰν μοιράσωμεν $25+25$ ἢ 25×2 , ἦτοι 50 μῆλα, εἰς $7+7$ ἢ 7×2 , ἦτοι εἰς 14 παιδιά, ἕκαστον παιδίον θὰ λάβῃ 3 μῆλα καὶ θὰ μείνουν $4+4$ ἢ 4×2 , ἦτοι 8 μῆλα. Ἐκ τούτου βλέπομεν ὅτι, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν διαιρετέον 25 ἐπὶ 2 καὶ τὸν διαιρέτην 7 ἐπὶ 2, τὸ πηλίκον 3 μένει τὸ αὐτό, τὸ δὲ ὑπόλοιπον 4 πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 2. Ἐπειδὴ τοῦτο ἀληθεύει, ἂν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην καὶ ἐπὶ οἰονδήποτε ἄλλον ἀριθμὸν, διὰ τοῦτο συνάγομεν τὴν ἑξῆς ἰδιότητα τῆς διαιρέσεως.

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ τὸν

αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον (ἂν ὑπάρξη) πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν.

Καὶ τὰνάπαλιν ἀληθεύει, ἦτοι

Ἐὰν διαιρέσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, τὸ πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον (ἂν ὑπάρξη) διαιρεῖται διὰ τοῦ ἰδίου ἀριθμοῦ.

Συντομίαι τῆς διαιρέσεως.

58. Ἐστω νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 18359 διὰ 400, ἦτοι ἔστω νὰ μοιράσωμεν 18359 δραχμὰς εἰς 400 ἀνθρώπους, καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἕκαστος.

Διὰ νὰ λάβῃ ἕκαστος ἀπὸ μίαν δραχμὴν, πρέπει νὰ μοιράσωμεν τόσας δραχμὰς, ὅσοι εἶναι καὶ οἱ ἀνθρώποι, ἦτοι 400 ἢ 4 ἑκατοντάδας δραχμῶν. Ὡστε ὅσας φορὰς αἱ 4 ἑκατοντάδες χωροῦν εἰς τὰς 183 ἑκατοντάδας τοῦ ἀριθμοῦ 18359 (παραλείποντες τὸν 59), τόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἕκαστος. Διαιροῦντες λοιπὸν τὸν 183 διὰ 4, εὐρίσκομεν πηλίκον 45 καὶ ὑπόλοιπον 3 ἑκατοντάδας, αἵτινες μετὰ τῶν 59 μονάδων, ἃς παρελείψαμεν, κάμνουν 359 μονάδας. Ὡστε ἕκαστος θὰ λάβῃ 45 δραχμὰς καὶ θὰ μείνουν 359 δραχμαί.

Ἡ ἀνωτέρω προᾶξι διατάσσεται ὡς ἐξῆς:

$$\begin{array}{r|l} 183(59 & 4(00 \\ 23 & 45 \\ \hline 359 & \end{array}$$

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

59. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν συντόμως ἀριθμὸν δι' ἄλλου λήγοντος εἰς μηδενικά, παραλείπομεν τὰ μηδενικά τοῦ διαιρετέου, καθὼς καὶ ἴσον ἀριθμὸν ψηφίων ἀπὸ τὰ δεξιὰ τοῦ διαιρετέου, καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν τοὺς προκύπτοντας ἀριθμούς. Τὸ εὐρεθὲν πηλίκον θὰ εἶναι τὸ ζητούμενον, ἐὰν δὲ γράψωμεν εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ εὐρεθέντος ὑπολοίπου τὰ παραλειφθέντα ψηφία τοῦ διαιρετέου, θὰ ἔχωμεν καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Τὸ πηλίκον ἐπίσης τοῦ ἀριθμοῦ 865 διὰ 10 εἶναι 86 (διότι εἶναι κατὰ τὰ ἀνωτέρω $86 : 1 = 86$) καὶ τὸ ὑπόλοιπον 5. Τὸ πηλίκον τοῦ 3596 διὰ 100 εἶναι 35 (διότι εἶναι $35 : 1 = 35$) καὶ τὸ ὑπόλοιπον 96. Τὸ πηλίκον τοῦ 370000 διὰ 1000 εἶναι 370 καὶ τὸ ὑπόλοιπον 0. Ἐκ τούτου ἔπεται

60. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν συντόμως ἀριθμὸν τινα διὰ 10, διὰ 100, διὰ 1000 καὶ γενικῶς διὰ τῆς μονάδος ἀκολουθοῦμένης

ὑπὸ μηδενικῶν, χωρίζομεν ἀπὸ τὰ δεξιά τοῦ ἀριθμοῦ ἓν, δύο, τρία κτλ. ψηφία (δηλ. τόσα, ὅσα μηδενικά ἀκολουθοῦσι τὴν μονάδα) καὶ τὰ μὲν χωρισθέντα ψηφία ἀποτελοῦσι τὸ ὑπόλοιπον, τὰ δὲ ἄλλα τὸ πηλίκον.

61. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν συντόμως ἀριθμὸν τινα διὰ 5, πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ 2 καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 10.

Ἄν π. χ. ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν 70 διὰ 5, διαιροῦμεν τὸν 70×2 , ἦτοι τὸν 140, διὰ 5×2 , ἦτοι διὰ 10, καὶ εὐρίσκομεν κατὰ τὰ ἄνωτέρω πηλίκον 14 καὶ ὑπόλοιπον 0. Διότι τὸ πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, ἂν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν (ἔδ. 57).

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν συντόμως ἀριθμὸν τινα διὰ 25, πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ 4 καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 100.

Δοκιμὴ τῆς διαιρέσεως.

62. Ἐπειδὴ ὁ διαιρετέος εἶναι ἴσος μὲ τὸ γινόμενον τοῦ πηλίκου καὶ τοῦ διαιρέτου ἠϋξημένον κατὰ τὸ ὑπόλοιπον, ἂν ὑπάρχη (ἔδαφ. 51), διὰ τοῦτο κάμνομεν τὴν δοκιμὴν τῆς διαιρέσεως ὡς ἑξῆς :

Πολλαπλασιάζομεν τὸ πηλίκον μὲ τὸν διαιρέτην καὶ εἰς τὸ γινόμενον προσθέτομεν καὶ τὸ ὑπόλοιπον (ἂν ὑπάρχη) καὶ ἂν εὗρωμεν τὸν διαιρετέον, ἡ πρᾶξις ἔγινε χωρὶς λάθος.

Σημ. Ἡ δοκιμὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ δύναται νὰ γίνῃ καὶ διὰ τῆς διαιρέσεως ὡς ἑξῆς. Διαιροῦμεν τὸ γινόμενον δι' ἐνὸς τῶν παραγόντων καὶ ἂν εὗρωμεν ὡς πηλίκον τὸν ἄλλον παράγοντα καὶ ὑπόλοιπον μηδέν, ἡ πρᾶξις ἔγινε χωρὶς λάθος. Διότι, ἂν, παραδείγματος χάριν, ὁ 35 προκύπτῃ ἐκ τοῦ 5 ἐπαναλαμβανομένου ἑπτὰ 7 φορές ἢ ἐκ τοῦ 7 ἐπαναλαμβανομένου πέντε φορές, ἔπεται ὅτι ὁ 5 χωρεῖ εἰς τὸν 35 ἑπτὰ φορές, ἢ ὁ 7 χωρεῖ εἰς τὸν 35 πέντε φορές.

Ἐφαρμογὴ τῆς διαιρέσεως εἰς προβλήματα τοῦ πρακτικοῦ βίου.

1) Ἠγόρασέ τις 4 ὀκάδας ἕξ ἐνὸς πράγματος καὶ ἔδωκε 12 δραχμὰς πόσον τιμᾶται ἡ ὀκά :

Κατάταξις	4 ὀκ.	12 δραχ.
	1	χ

Λύσις. Ἐὰν μοιράσωμεν τὰς 12 δραχμὰς εἰς τόσα ἴσα μέρη, ὅσα εἶναι αἱ ὀκάδες, ἦτοι εἰς 4, τὸ ἓν ἐκ τῶν μερῶν τούτων θὰ παριστᾷ προφανῶς τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς ὀκάς. Διαιροῦμεν λοιπὸν τὸν 12 διὰ 4 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 3, ἄρα 3 δραχμὰς τιμᾶται ἡ ὀκά (διότι δραχμὰς μοιράζομεν).

Ἐπειδὴ εἰς τὴν διαίρεσιν ταύτην μοιράζεται ὁ διαιρετέος εἰς ἴσα μέρη, διὰ τοῦτο ἡ διαίρεσις αὕτη λέγεται ἰδιαίτερος **μερισμός**, τὸ δὲ πηλίκον λέγεται **μερίδιον** καὶ εἶναι ὁμοειδὲς μὲ τὸν διαιρετέον (διότι εἶναι μέρος αὐτοῦ).

2) Μὲ 6 δραχμαῖς ἀγοράζομεν 24 πήχεις ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος· πόσον ἀγοράζομεν μὲ μίαν δραχμὴν :

Κατάταξις	6 δραχ.	24 πήχ.
	1	x

Δύσις. Ἐὰν μοιράσωμεν τοὺς 24 πήχεις εἰς τόσα ἴσα μέρη, ὅσα εἶναι αἱ δραχμαί, ἦτοι εἰς 6, τὸ ἐν τῶν μερῶν τούτων θὰ παριστᾷ τὸν ἀριθμὸν τῶν πήχεων, τοὺς ὁποίους ἀγοράζομεν μὲ μίαν δραχμὴν. Διαιοῦμεν λοιπὸν τὸν 24 διὰ 6 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 4, ἄρα 4 πήχεις ἀγοράζομεν (διότι πήχεις μοιράζομεν). Ὡστε καὶ ἡ διαίρεσις αὕτη εἶναι μερισμός.

Καὶ εἰς τὰ δύο ἀνωτέρω προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα γίνεται διαίρεσις (μερισμός), εἶναι γνωστὴ ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων (εἰς μὲν τὸ πρῶτον πολλαὶ μονάδες εἶναι αἱ 4 ὀκάδες καὶ τιμὴ αὐτῶν αἱ 12 δραχμαί, εἰς δὲ τὸ δεύτερον πολλαὶ μονάδες εἶναι αἱ 6 δραχμαὶ καὶ τιμὴ αὐτῶν οἱ 24 πήχεις) καὶ ζητεῖται νὰ εὐρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος (ἦτοι τῆς μιᾶς ὀκάς, τῆς μιᾶς δραχμῆς).

63. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

Ὅταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων καὶ θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος (ὁμοειδοῦς), κάμνομεν διαίρεσιν (μερισμόν).

Διαιετέος εἶναι πάντοτε ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων καὶ διαιρέτης ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων, ὅστις θεωρεῖται ὡς ἀφηρημένος ἀριθμὸς καὶ ἐν τῇ πράξει καὶ ἐν τῇ σκέψει. Εἰς τὸ πρῶτον λοιπὸν πρόβλημα διαιρετέος εἶναι αἱ 12 δραχμαὶ καὶ διαιρέτης ὁ 4, εἰς δὲ τὸ δεύτερον πρόβλημα διαιρετέος εἶναι οἱ 24 πήχεις καὶ διαιρέτης ὁ 6.

Εἰς τὰ ἀνωτέρω προβλήματα, καθὼς καὶ εἰς τὰ κατωτέρω, ὑποθέτομεν τὰς διαίρεσεις τελείας.

3) Ἀντήλλαξέ τις 39 ὀκάδας βουτύρου μὲ 117 ὀκάδας ἐλαίου· μὲ πόσας ὀκάδας ἐλαίου ἀντηλλάγη μία ὀκᾶ βουτύρου :

Κατάταξις	39 ὀκ. βουτ.	117 ὀκ. ἐλαίου
	1	x

Δύσις. Μονὰς ἐδῶ εἶναι ἡ 1 ὀκᾶ βουτύρου, πολλαὶ μονάδες εἶναι αἱ 39 ὀκ. βουτύρου (ὡς ὁμοειδεῖς μὲ τὴν μονάδα τοῦ προβλήματος) καὶ

τιμὴ αὐτῶν αἰ 117 ὀκ. ἐλαίου. Ὅστε γνωρίζομεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων καὶ θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν (μερισμόν), ἥτοι $117 : 39 \text{ ἢ } 3 \text{ ὀκ. ἐλαίου.}$

4) Ὁ πῆχυς ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 4 δραχμάς· πόσου; πήχεις θὰ ἀγοράσωμεν μὲ 12 δραχμάς;

Κοτάταξις.	1 πῆχ.	4 δραχ.
	χ	12

Δύσις. Ἐὰν δώσωμεν 4 δραχμάς, θὰ ἀγοράσωμεν 1 πῆχυν καὶ θὰ μείνουν 8 δραχμαί· ἐὰν δώσωμεν ἄλλας 4 δραχμάς, θὰ ἀγοράσωμεν ἄλλον 1 πῆχυν καὶ θὰ μείνουν 4 δραχμαί· ἐὰν δώσωμεν καὶ τὰς ὑπολοίπους 4 δραχμάς θὰ ἀγοράσωμεν ἄλλον 1 πῆχυν. Ὅστε θὰ ἀγοράσωμεν ἐν ὄλφ 3 πήχεις, ἥτοι τόσου, ὅσας φορὰς ἔχομεν τὰς 4 δραχμάς. Ἀλλὰ διὰ νὰ εὕρωμεν συντόμῳ; πόσας φορὰς ἔχομεν τὰς 4 δραχμάς, ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν πόσας φορὰς ὁ 4 χωρεῖ εἰς τὸν 12, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν (ἐδάφ. 48). Διαιροῦμεν λοιπὸν τὸν 12 διὰ 4 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον· 3 ὥστε 3 φορὰς ἔχομεν τὰς 4 δραχμάς, ἐπομένως 3 πήχεις θὰ ἀγοράσωμεν.

Ἐπειδὴ εἰς τὴν διαίρεσιν ταύτην δὲν μοιράζεται ὁ διαιρετέος, ἀλλ' ἀπλῶς παρατηροῦμεν πόσας φορὰς ὁ διαιρέτης χωρεῖ εἰς τὸν διαιρετέον, ἥτοι μετροῦμεν τὸν ἕνα ἀριθμὸν διὰ τοῦ ἄλλου, διὰ τοῦτο ἡ διαίρεσις αὕτη λέγεται ἰδιαιτέρως **μέτρησις**, τὸ δὲ πηλίκον λέγεται **λόγος** τοῦ διαιρετέου πρὸς τὸν διαιρέτην.

Εἰς τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα ἐδόθησαν δύο ὁμοειδεῖς τιμαὶ (ἥτοι 4 δραχμαὶ καὶ 12 δραχμαί), ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μὲν μία εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μονάδος (ἥτοι τοῦ ἐνὸς πήχεως), ἡ δὲ ἄλλη εἶναι ἡ τιμὴ τῶν ζητουμένων πολλῶν μονάδων (ἥτοι τῶν τριῶν πήχεων). Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

64. *Ὅταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος καὶ θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὰς πολλὰς μονάδας, τῶν ὁποίων τὴν ὁμοειδῆ τιμὴν ἔχομεν, κάμνομεν διαίρεσιν (μέτρησιν).*

Διαιρετέος εἶναι καὶ ἐδῶ ἡ τιμὴ τῶν ζητουμένων πολλῶν μονάδων, διαιρέτης δὲ ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος. Ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης θεωροῦνται ὡς ἀφηρημένοι ἀριθμοί, ἐπομένως καὶ τὸ πηλίκον θὰ εἶναι ἀφηρημένον· κατόπιν ὅμως κάμνομεν αὐτὸ συγκεκριμένον, ὡς ἀπαιτεῖ τὸ πρόβλημα, ἥτοι τὸ πηλίκον θὰ εἶναι ὁμοειδὲς μὲ τὴν μονάδα τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν.

5) Πόσας ὀκάδας κάμνουν 14800 δράμια;		
Κατάταξις.	1 ὀκ.	400 δράμ.
	χ	14800

Δύσις. Γνωρίζομεν ἔδῳ τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος (μονὰς εἶναι ἢ 1 ὀκά καὶ τιμὴ αὐτῆς τὰ 400 δράμια) καὶ θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὰς πολλὰς μονάδας (ἦτοι τὰς πολλὰς ὀκάδας) τὰς ἀντιστοιχοῦσας εἰς τὴν τιμὴν τῶν 14800 δραμίων, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν, μέτρησιν, καὶ ὅσας φορὰς τὰ 400 δράμια χωροῦν εἰς τὰ 14800 δράμια, τόσας ὀκάδας κάμνουν. Διαιροῦμεν λοιπὸν τὸν ἀριθμὸν 14800 διὰ 400 (ὡς ἀφηρημένους) καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 37, ὥστε 37 ὀκάδας κάμνουν (διότι ὀκάδας παριστᾷ καὶ ἡ μονὰς τοῦ προβλήματος).

Σημ. Εἰς τὰ προβλήματα τῆς μετρήσεως πρέπει ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς καθ' ὅλα, διότι ἄλλως μέτρησις δὲν γίνεται.

6) Ὁ πῆχυς ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 60 λεπτά· πόσους πῆχεις ἀγοράζομεν μὲ 3 δραχμάς;

Δύσις. Τρέπομεν πρῶτον καὶ τὰς 3 δραχμάς εἰς λεπτά, διὰ νὰ γίνουν ὁμοειδεῖς, καὶ ὅσας φορὰς τὰ 60 λεπτά (ἦτοι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος) χωροῦν εἰς τὰ 300 λεπτά, τόσους πῆχεις ἀγοράζομεν, ἦτοι $300 : 60$ ἢ 5 πῆχεις (διότι πῆχεις παριστᾷ καὶ ἡ μονὰς τοῦ προβλήματος).

Παρατήρησις. Τὰ προβλήματα τοῦ μερισμοῦ διακρίνονται τῶν προβλημάτων τῆς μετρήσεως κατὰ τοῦτο· εἰς μὲν τὰ πρῶτα ἔχει δοθῆ ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων, εἰς δὲ τὰ δεύτερα ζητεῖται οὗτος. Ὅταν ὅμως πρόκειται νὰ ἐκτελέσωμεν διαίρεσιν πρὸς λύσιν προβλήματός τινος, πρέπει πρὸς κατανόησιν αὐτοῦ νὰ κάμνωμεν διάκρισιν τῆς διαιρέσεως ταύτης, ἂν δηλ. εἶναι μερισμὸς ἢ μέτρησις. Παραδ. χάριν, τὰ ἀνωτέρω προβλήματα 1ον καὶ 4ον λύονται καὶ τὰ δύο διὰ τῆς αὐτῆς διαιρέσεως $12 : 4$, ἀλλ' εἶναι διάφορα τὴν φύσιν.

Ἐὰν ὑπάρχη ὑπόλοιπόν τι εἰς τὴν διαίρεσιν (εἴτε μερισμὸς εἶναι αὕτη εἴτε μέτρησις), τοῦτο εἶναι ὁμοειδὲς μὲ τὸν διαιρετέον.

Νοεραὶ ἰσκήσεις.

1) Οἰκογένειά τις ἐξώδευσεν εἰς 10 ἡμέρας 120 δραχμάς· πόσον ἐξώδευσε τὴν ἡμέραν; (ιδεῖ ἐδάφιον 60).

2) Πόσας δραχμάς κάμνουν 7000 λεπτά;

3) Ἡ ὀκά τοῦ καφέ τιμᾶται 8 δραχμάς· πόσας ὀκάδας ἀγοράζομεν μὲ 24 δραχμάς;

4) Ἠγόρασέ τις 9 πῆχεις ἐξ ἐνὸς ὑφάσματος καὶ ἔδωκε 54 δραχμάς· πόσον τιμᾶται ὁ πῆχυς;

5) Ἠγόρασέ τις 7 πῆχεις ἐξ ἐνὸς ὑφάσματος καὶ ἔδωκεν 28 δραχμάς· πόσον θὰ ἔδιδεν, ἂν ἠγόραζεν 9 πῆχεις; (εὐρίσκομεν πρῶτον τὴν ἀξίαν τοῦ ἐνὸς πῆχεως).

6) Ἐπώλησέ τις 5 πρόβατα ἀντὶ 240 δραμῶν πρὸς πόσον ἐπώλησεν ἕκαστον; (ιδεῖ ἐδάφ. 61).

Διαίρεσις ἀθροίσματος καὶ γινομένου δι' ἀριθμοῦ.

Πρόβλημα. Πατήρ τις ἐμοίρασεν ἕξ ἴσου εἰς τὰ 4 τέκνα του τὴν πρώτην φορὰν 20 καρύδια, τὴν δὲ δευτέραν φορὰν 28 καρύδια. Πόσα ἔλαβεν ἕκαστον τέκνον;

Λύσις. Ἐμοίρασεν ἐν ὅλῳ $20+28$ ἢ 48 καρύδια, ἐπομένως ἕκαστον τέκνον ἔλαβε $(20+28) : 4$ ἢ $48 : 4$, ἦτοι 12 καρύδια.

Τοῦτο εὐρίσκομεν καὶ ὡς ἑξῆς. Τὴν πρώτην φορὰν ἔλαβεν ἕκαστον τέκνον 20 : 4, ἦτοι 5 καρύδια, τὴν δὲ δευτέραν φορὰν ἔλαβεν 28 : 4, ἦτοι 7 καρύδια ὥστε ἕκαστον τέκνον ἔλοβεν ἐν ὅλῳ $5+7$, ἦτοι 12 καρύδια. Ἐκ τούτου βλέπομεν ὅτι

55. *Διὰ τὰ διαιρέσωμεν ἀθροισμα δι' ἀριθμοῦ, ἢ εὐρίσκομεν πρῶτον τὸ ἀθροισμα καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν αὐτό, ἢ διαιροῦμεν ἕκαστον προσθετόν χωριστὰ διὰ τοῦ ἀριθμοῦ (ἐὰν διαιρητὰ ἀκριβῶς) καὶ ἔπειτα προσθέτομεν τὰ μερικὰ πηλίκα.*

Πρόβλημα. Ἐὰν εἰς τὰ ἀνωτέρω 4 τέκνα μοιρασθῶσι τρεῖς φορὰς ἀπὸ 8 καρύδια πόσα θὰ λάβῃ ἕκαστον;

Λύσις. Ἐκαστον τέκνον θὰ λάβῃ $8 \times 3 : 4$ ἢ $24 : 4$, ἦτοι 6 καρύδια. Τὸ αὐτὸ εὐρίσκομεν καὶ ἂν διαιρέσωμεν τὸν 8 διὰ 4 καὶ τὸ πηλίκον 2 πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ 3, ἦτοι $8 \times 3 : 4 = 2 \times 3$. Ἐκ τούτου βλέπομεν ὅτι

66. *Διὰ τὰ διαιρέσωμεν γινόμενον παραγόντων δι' ἀριθμοῦ, ἢ εὐρίσκομεν πρῶτον τὸ γινόμενον καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν αὐτό, ἢ διαιροῦμεν ἕνα τῶν παραγόντων (ὅστις νὰ διαιρητὰ ἀκριβῶς) διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τούτου καὶ τὸ εὐρεθὲν πηλίκον πολλαπλασιάσωμεν μὲ τοὺς ἄλλους παράγοντας.*

Ἐὰν ὁμως συμβῇ ὃ διαιρέτης νὰ εἶναι ἴσος μὲ ἕνα τῶν παραγόντων τοῦ γινομένου, ἔξαλείφομεν τὸν παράγοντα τοῦτον, οἱ δὲ ἄλλοι παριστῶσι τὸ πηλίκον. Διότι εἶναι π.χ. $5 \times 7 \times 3 : 7 = 5 \times 1 \times 3 = 5 \times 3$.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἠγόρασέ τις 78 ὀκάδας ἀλεύρου καὶ ἔδωκε 5850 λεπτά. Πόσον τιμᾶται ἡ ὀκά ; (75 λεπτά).

2) Ἐργάτης τις λαμβάνει ἡμερομίσθιον 7 δραχμάς. Πόσας ἡμέρας πρέπει νὰ ἐργασθῇ διὰ νὰ λάβῃ 273 δραχμάς ; (39 ἡμ.)

3) Πρόκειται νὰ μοιρασθῶσιν ἕξ ἴσου 4 δραχμαὶ εἰς 5 ἀνθρώπους. Πόσας θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

Δύσις. Ἐπειδὴ αἱ 4 δραχμαὶ δὲν φθάνουν διὰ νὰ λάβῃ ἕκαστος ἀπὸ μίαν δραχμὴν, διὰ τοῦτο τρέπομεν αὐτὰς εἰς λεπτά, ἤτοι 400 λεπτά· κατόπιν διαιροῦμεν διὰ 5 καὶ εὐρίσκομεν ὅτι ἕκαστος θὰ λάβῃ 80 λεπτά.

Σημ. Τοῦτο ἐπράττομεν καὶ κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς διαιρέσεως (ἔδαφ. 54), τουτέστιν ἐτρέπομεν τοὺς ἑκάστοτε μικροτέρους τοῦ διαιρέτου ἀριθμοὺς εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως.

4) Πρόκειται νὰ μοιρασθῶσιν ἕξ ἴσον 3 ὀκάδες μῆλα εἰς 16 παιδιά. Πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστον ; (75 δράμια).

5) Ἐδωκέ τις 12 δραχμὰς καὶ ἠγόρασεν αὐτὰ πρὸς 15 λεπτά τὸ καθέν. Πόσα αὐτὰ ἠγόρασεν ; (80).

6) Ἀτμόπλοϊόν τι, διατρέχον 12 μίλια τὴν ὥραν, ἀνεχώρησεν ἀπὸ μιᾶς πόλεως καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ἀπέχουσαν 192 μίλια. Μετὰ πόσας ὥρας θὰ φθάσῃ ; Καὶ ἂν ἀνεχώρησε τὴν 7 ὥραν πρὸ μεσημβρίας, ποίαν ὥραν θὰ φθάσῃ ; (μετὰ 16 ὥρας, τὴν 11ην μ.μ.)

7) Ἠγόρασέ τις 5 στατῆρας ἀνθρώκων καὶ ἔδωκεν 77 δραχμὰς. Πόσον ἀξίζει ἡ ὀκά ;

Δύσις. Τρέπομεν πρῶτον τοὺς στατῆρας εἰς ὀκάδας, διὰ νὰ γίνῃ ὁ διαιρέτης ὁμοειδῆς μὲ τὴν μονάδα, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ζητοῦμεν, κατόπιν διαιροῦμεν καὶ εὐρίσκομεν 35 λεπτά.

8) Ἠγόρασέ τις 2 δωδεκάδας μανδήλια καὶ ἔδωκε 18 δραχμὰς. Πόσον ἀξίζει ἕκαστον μανδήλιον ; (75 λ.)

9) Ἀντήλλαξέ τις 18 ὀκ. ἐλαίου, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκά ἀξίζει 3 δραχμὰς, μὲ ἄλευρον, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκά ἀξίζει 90 λεπτά. Πόσας ὀκάδας ἀλεύρου ἔλαβεν ὡς ἀντάλλαγμα ;

Δύσις. Τὸ ἐλαῖον ἀξίζει 54 δραχμὰς, τόσον ἀξίζει καὶ τὸ ἄλευρον· ὅσας λοιπὸν φορὰς τὰ 90 λ. χωροῦν εἰς τὰς 54 δρ. ἢ 5400 λεπτά, τόσας ὀκάδας ἀλεύρου ἔλαβεν, ἤτοι $5400 : 90$ ἢ 60 ὀκ.

10) Γυνή τις ἠγόρασεν ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος 17 πήχεις καὶ ἔδωκεν 68 δραχμὰς. Πόσον θὰ ἔδιδεν, ἂν ἠγόραζεν 20 πήχεις ; (80 δρ.)

(Εὐρίσκομεν πρῶτον τὴν ἀξίαν τοῦ ἐνὸς πήχεως).

11) Ἠγόρασέ τις οἰκόπεδον 875 πήχεων (τετραγ.) πρὸς 6 δρ. τὸν πῆχυν. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸν πῆχυν αὐτοῦ διὰ νὰ κερδίσῃ ἕξ ὄλου τοῦ οἰκοπέδου 1750 δραχμὰς ; (8 δρ.)

12) Ἠγόρασέ τις σῖτον πρὸς 80 λ. τὴν ὀκᾶν, κατόπιν τὸν ἐπώλησε πρὸς 88 λεπτά τὴν ὀκᾶν καὶ ἐκέρδισεν 144 δραχμὰς. Πόσον σῖτον ἐπώλησε ;

Δύσις. Ἀπὸ ἐκάστην ὀκᾶν ἐκέρδισεν 8 λεπτά, ὅσας λοιπὸν φορὰς τὰ 8 λ. χωροῦν εἰς τὰς 144 δρ. ἢ 14400 λεπτά, τόσας ὀκάδας ἐπώλησεν, ἤτοι $14400 : 8$ ἢ 1800 ὀκ.

13) Ἐμπόρου τινὸς κοστίζει ὑφασμά τι 90 λεπτά ὁ πῆχυς, ἀλλ' ἔνεκα μικρᾶς βλάβης ἠναγκάσθη νὰ πωλήσῃ αὐτὸ πρὸς 75 λ. τὸν πῆχυν καὶ ἐζημιώθη ἐξ ὄλου τοῦ ὑφάσματος 3 δραχ. Πόσων πήχεων ἦτο τὸ ὑφασμα ; (20 πήχ.)

14) Τρεῖς ἀνθρώποι πρόκειται νὰ μοιρασθῶσιν ἐξ ἴσου 10 σάκκους σίτου, περιέχοντος ἑκάστου 54 ὀκάδας, τὸν ὁποῖον ἠγόρασαν πρὸς 70 λ. τὴν ὀκᾶν. Πόσον σῖτον θὰ λάβῃ ἕκαστος καὶ πόσον θὰ πληρώσῃ ; (180 ὀκ., 126 δραχ.)

15) Διὰ νὰ κάμῃ τις ἐν ταξειδίον, ἔλαβε μαζί του 500 δρ. καὶ ἐξώδευε κάθε ἡμέραν 18 δρ. πρὸς συντήρησίν του· ὅταν δὲ ἐπέστρεψεν εἶχε μόνον 28 δραχμάς, ἀλλ' εἶχεν ἐξοδεύσει καὶ 40 δρ. διὰ σιδηροδρομικά. Ζητεῖται πόσας ἡμέρας διήρκεσε τὸ ταξειδίον.

Λύσις. Ἐξώδευσε τὸ ὄλον 500—28 ἢ 472 δραχμάς, ἐκ τούτων δὲ ἐξώδευσε πρὸς συντήρησίν του 472—40 ἢ 432 δρ. ὅσας λοιπὸν φορὰς ὁ 18 χωρεῖ εἰς τὸν 432, τόσας ἡμέρας διήρκεσε τὸ ταξειδίον, ἦτοι 432 : 18 ἢ 24 ἡμέρας.

16) Πατὴρ τις μετὰ τῶν τριῶν υἱῶν του εἰργάσθησαν 20 ἡμ. καὶ ἔλαβον ὁμοῦ 760 δρ. Ὁ πατὴρ ἐλάμβανε τὴν ἡμέραν 15 δραχμάς, ὁ πρῶτος τῶν υἱῶν του 10 δρ. καὶ ὁ δεύτερος 8. Πόσας ἐλάμβανεν ὁ τρίτος υἱός ;

Λύσις. Καὶ οἱ τέσσαρες ἐλάμβανον τὴν ἡμέραν 750 : 20, ἦτοι 38 δραχμάς, ὁ δὲ πατὴρ μετὰ τῶν δύο υἱῶν του ἐλάμβανον τὴν ἡμέραν 15+10+8, ἦτοι 33 δραχμάς· ἐπομένως ὁ τρίτος υἱὸς ἐλάμβανε 38—33, ἦτοι 5 δραχ.

17) Διὰ τὴν καλλιέργειαν μιᾶς ἀμπέλου ἐμίσθωσέ τις τὴν αὐτὴν ἡμέραν 8 ἐργάτας πρὸς 9 δρ. τὴν ἡμέραν ἕκαστον καὶ 6 ἐργάτας πρὸς 7 δραχμάς ἕκαστον· μετὰ τὴν καλλιέργειαν ἔδωκεν ἐν ὄλῳ 570 δρ. Πόσας ἡμέρας διήρκεσεν ἡ καλλιέργεια τῆς ἀμπέλου ; (5).

18) Μήτηρ τις ἠγόρασε δύο ὑφάσματα διὰ φορέματα, ἐν διὰ τὸν ἑαυτὸν της καὶ ἐν διὰ τὴν θυγατέρα της, καὶ ἔδωκεν ἐν ὄλῳ 63 δραχμάς· ἀλλὰ διὰ τὸ ἰδικόν της ὑφασμα ἔδωκε 15 δρ. περισσότερον. Πόσον ἀξίζει ἕκαστον ὑφασμα ;

Λύσις. Ἐὰν ἡ μήτηρ ἠγόραζε καὶ τὸ ἰδικόν της ὑφασμα, ὅσον ἠγόρασε καὶ τὸ ὑφασμα τῆς θυγατρὸς της, θὰ ἔδιδεν 63—15, ἦτοι 48 δραχμάς· ἀλλὰ τότε θὰ ἦτο τὸ αὐτό, ὡς νὰ ἠγόραζε δύο ὑφάσματα τῆς θυγατρὸς της μὲ τὴν αὐτὴν τιμὴν ἕκαστον. Ὡστε τὸ ὑφασμα τῆς θυγατρὸς της ἀξίζει 48 : 2, ἦτοι 24 δραχμάς, ἐπομένως τὸ ὑφασμα τῆς μητρὸς ἀξίζει 24+15, ἦτοι 39 δραχμάς.

19) Δύο ἄδελφοὶ πρόκειται νὰ μοιρασθῶσι κληρονομίαν 27600 δραχμῶν, ἀλλ' ὁ μεγαλύτερος νὰ λάβῃ 4900 δρ. περισσότερον τοῦ μικροτέρου. Πόσα θὰ λάβῃ ἕκαστος ; (11350 καὶ 16250).

20) Χωρικός τις ἐπώλησεν 120 αὐγὰ πρὸς 45 λεπτά τὸ ζεῦγος (ἦτοι τὰ δύο), κατόπιν μὲ τὰ χρήματα, ἅτινα ἔλαβεν, ἠγόρασεν ἔλαιον πρὸς 3 δρ. τὴν ὀκτῶν. Πόσον ἔλαιον ἠγόρασεν ; (9 ὀκάδας).

Σημ. Ὁ 120 περιέχει 120 : 2 ἢ 60 ζεύγη.

21) Ἐργάτης τις λαμβάνει ἡμερομίσθιον 14 δρ., ἀλλὰ δὲν ἐργάζεται τὰς Κυριακάς, ἐξοδεύει ὅμως τὴν ἐβδομάδα 65 δραχ. πρὸς συντήρησίν του. Μετὰ πόσας ἐβδομάδας θὰ οἰκονομήσῃ 152 δραχμάς, τὰς ὁποίας χρεωστῆ εἶς τινα ; (μετὰ 8).

22) Ἐμπορὸς τις ἔλαβεν ἐκ τῆς πωλήσεως ὑφάσματος τιнос 119 δρ. ἀποτελουμένης ἀπὸ πεντάδραχμα καὶ δίδραχμα, ἀλλ' ὅσα ἦσαν τὰ πεντάδραχμα, τόσα ἦσαν καὶ τὰ δίδραχμα. Πόσα ἔλαβεν ἀπὸ ἕκαστον εἶδος ;

Δύσις. Ἐὰν λάβῃ ἐν πεντάδραχμον καὶ ἐν δίδραχμον, θὰ λάβῃ 7 δραχμάς· ὅσας λοιπὸν φορὰς ὁ 7 χωρεῖ εἰς τὸν 119, τόσα ἔλαβεν ἀπὸ κάθε εἶδος, ἦτοι 17.

23) Ἠγόρασέ τις ὑφασμα δι' ὑποκάμισα πρὸς 90 λεπτά τὸν πῆχυν καὶ ἔδωκε 37 δρ. καὶ 80 λ. (ἦτοι 3780 λεπτά). Πόσα ὑποκάμισα θὰ κατασκευάσῃ, ἐὰν διὰ μίαν δωδεκάδα ὑποκαμίσων χρειάζεται 60 πήχεις ; (8 ὑποκάμ. καὶ θὰ περισσεύσουν 2 πήχεις).

24) Ὑπάλληλός τις λογαριάζει ὅτι, ἐὰν ἐξοδεύῃ τὴν ἡμέραν 17 δρ. πρὸς συντήρησιν τῆς οἰκογενείας του, δὲν τὸν φθάνει ὁ μισθὸς του διὰ νὰ περάσῃ ἕνα μῆνα (30 ἡμ.), ἀλλὰ θὰ χρειασθοῦν ἀκόμη 20 δρ. Πόσον πρέπει νὰ ἐξοδεύῃ τὴν ἡμέραν, διὰ νὰ τοῦ μείνουν εἰς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς 70 δραχμαί ;

Δύσις. Διὰ νὰ περάσῃ 30 ἡμέρας, πρέπει νὰ ἔχη 17×30 ἢ 510 δραχμάς, ἐπομένως ὁ μισθὸς του εἶναι $510 - 20$ ἢ 490 δρ. Ἐκ τούτων πρέπει νὰ ἐξοδεύσῃ $490 - 70$ ἢ 420 δρ., ἐπομένως τὴν ἡμέραν πρέπει νὰ ἐξοδεύῃ $420 : 30$ ἢ 14 δρ.

25) Ὑελοπώλης τις ἠγόρασε 3000 ποτήρια πρὸς 30 δραχ. τὰ ἕκαστον· ἀλλὰ κατὰ τὴν μεταφορὰν των ἔσπασαν 60 ποτήρια, τὰ δὲ ἄλλα ἐπώλησε πρὸς 5 δρ. τὴν δωδεκάδα. Πόσον ἐκέρδισεν ; (325 δρ.)

Σημ. Αἱ 3000 ἔχουν 30 ἑκατοντάδας.

26) Ἠγόρασέ τις 2400 ὀκ. σίτου πρὸς 70 λεπτά τὴν ὀκτῶν ἔπειτα ἐπώλησε μέρος αὐτοῦ πρὸς 75 λ. τὴν ὀκτῶν, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ ἔμεινε κέρδος. Πόσος σίτος τοῦ ἔμεινε κέρδος ;

Δύσις. Διὰ τὴν ἀγορὰν τοῦ σίτου ἔδωκε 2400×70 , ἦτοι 168000

λεπτά. Ἄλλὰ τὰ λεπτά ταῦτα ἔλαβεν ἐκ τοῦ πωληθέντος σίτου πρὸς 75 λ. τὴν ὀκτῶν, ὥστε ἐπώλησε τόσας ὀκάδας ὅσας φορὰς ὁ 75 χωρεῖ εἰς τὸν 168000, ἦτοι $168000 : 75$ ἢ 2240 ὀκάδας, ἐπομένως τοῦ ἔμεινε κέρδος 160 ὀκ.

27) Ἐπώλησέ τις 50 πορτοκάλια καὶ ἐκέρδισε 3 δραχ. Πόσον ἐπώλησε τὸ καθέν, ἐνῶ τὰ εἶχεν ἀγοράσει πρὸς 9 δρ. τὰ 100 ; (15 λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Περὶ διαιρετότητος καὶ περὶ πρώτων ἀριθμῶν.

67. Ὄταν ἀριθμὸς τις διαιρῆται ἀκριβῶς δι' ἄλλου (χωρὶς δηλ. νὰ ἀφίνη ὑπόλοιπον), λέγεται **διαιρετὸς** δι' αὐτοῦ· ὁ δὲ ἄλλος, ὅστις διαιρεῖ αὐτὸν ἀκριβῶς, λέγεται **διαιρέτης**. Παραδείγματος χάριν, ὁ 12 εἶναι διαιρετὸς διὰ 6, ὁ δὲ 6 εἶναι διαιρέτης τοῦ 12.

68. Ὄταν ἀριθμὸς τις γίνηται ἐξ ἄλλου διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, λέγεται **πολλαπλάσιον** αὐτοῦ. Παραδ. χάριν, ὁ 15 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 3, διότι γίνεται ἐκ τοῦ 3 πολλαπλασιαζομένου ἐπὶ 5. Ἄλλὰ πᾶς ἀριθμὸς, ὅστις εἶναι πολλαπλάσιον ἄλλου, εἶναι καὶ διαιρετὸς δι' αὐτοῦ· καὶ τἀνάπαλιν, πᾶς ἀριθμὸς διαιρετὸς δι' ἄλλου εἶναι πολλαπλάσιον αὐτοῦ.

Γνωρίσματα ἀριθμῶν διαιρετῶν διὰ 10, διὰ 100, διὰ 1000 κ.τ.λ., διὰ 2 ἢ διὰ 3, διὰ 4 ἢ διὰ 25 καὶ διὰ 3 ἢ διὰ 9.

69. Ὑπάρχουσι γνωρίσματά τινα, διὰ τῶν ὁποίων δυνάμεθα νὰ μάθωμεν, ἂν ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ τῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν. Ἡ γνῶσις αὕτη, ἣτις πολλάκις θέλει μᾶς χρησιμεύσει, στηρίζεται ἐπὶ τῶν κατωτέρω.

Διὰ 10, διὰ 100 κ.τ.λ. Εἶδομεν (ἐδάφιον 60), ὅτι διὰ νὰ διαιρέσωμεν συντόμως ἀριθμὸν τινα διὰ 10, διὰ 100, διὰ 1000 κτλ. ἀρκεῖ νὰ χωρίσωμεν ἀπὸ τὰ δεξιὰ του ἓν, δύο, τρία κτλ. ψηφία, ἀτινὰ παριστῶσι τὸ ὑπόλοιπον, τὰ δὲ ἄλλα τὸ πηλίκον. Ἄν λοιπὸν τὰ χωρὶς σθέντα ψηφία εἶναι μηδενικά, τότε ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι διαιρετὸς διὰ 10, διὰ 100, διὰ 1000 κτλ. Ὡστε

70. **Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 10, ἐὰν λήγη εἰς ἓν τοῦλάχιστον μηδενικόν· διὰ 100, ἐὰν λήγη εἰς δύο τοῦλάχιστον μηδενικά· διὰ 1000, ἐὰν λήγη εἰς τρία τοῦλάχιστον μηδενικά καὶ οὕτω καθ'εξῆς.**

Διὰ 2 ἢ διὰ 5. Ἐστω π.χ. ὁ ἀριθμὸς 568· θέλομεν νὰ μάθωμεν, χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, ἂν οὗτος εἶναι διαιρετὸς διὰ 2 ἢ διὰ 5.

Παρατηροῦμεν, ὅτι, ἐὰν διαιρέσωμεν μίαν δεκάδα (ἦτοι τὸν 10) διὰ 2 ἢ διὰ 5, θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον μηδέν· ἂν λοιπὸν διαιρέσωμεν ὅλας τὰς δεκάδας τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ (ἦτοι τὰς 56) ἐκάστην χωριστὰ διὰ 2 ἢ διὰ 5, θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον μηδέν. Ἄλλ' ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς ἔχει καὶ 8 μονάδας ἀκόμῃ· ἂν λοιπὸν καὶ ὁ 8 εἶναι διαιρετὸς διὰ 2 ἢ διὰ 5, τότε καὶ ὅλος ὁ ἀριθμὸς 568 εἶναι διαιρετὸς διὰ 2 ἢ διὰ 5. Ὡστε βλέπομεν, ὅτι διὰ νὰ εἶναι διαιρετὸς ὁ 568 διὰ 2 ἢ διὰ 5, ἐξαρτᾶται τοῦτο ἀπὸ τὸ τελευταῖον ψηφίον του πρὸς τὰ δεξιὰ, καὶ ἐπομένως ὅ,τι ὑπόλοιπον θὰ δώσῃ τὸ ψηφίον τοῦτο διαιρούμενον διὰ 2 ἢ διὰ 5, τὸ αὐτὸ ὑπόλοιπον θὰ δώσῃ καὶ ὅλος ὁ ἀριθμὸς. Ὡστε

71. Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 2 ἢ διὰ 5, ὅταν τὸ τελευταῖον ψηφίον αὐτοῦ πρὸς τὰ δεξιὰ εἶναι διαιρετὸν διὰ 2 ἢ διὰ 5.

Ὁ ἀνωτέρω λοιπὸν ἀριθμὸς 568 εἶναι διαιρετὸς διὰ 2, διότι τὸ τελευταῖον ψηφίον πρὸς τὰ δεξιὰ, ἦτοι ὁ 8, εἶναι διαιρετὸν διὰ 2· διὰ 5 ὅμως δὲν εἶναι διαιρετὸς ὁ 568, διότι τὸ ψηφίον 8 δὲν εἶναι διαιρετὸν διὰ 5. Ἐὰν διαιρέσωμεν ὅμως τὸν 8 διὰ 5, θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον 3· ὥστε καὶ τὸν 568 ἂν διαιρέσωμεν διὰ 5, θὰ εὔρωμεν τὸ αὐτὸ ὑπόλοιπον. Ἄν συμβῇ τὸ δοκιμαζόμενον ψηφίον τῶν μονάδων νὰ εἶναι μικρότερον τοῦ διαιρέτου 2 ἢ 5, τότε αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως.

Ὡστε διὰ τοῦ 2 διαιροῦνται ἀκριβῶς οἱ ἀριθμοὶ ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων τὸ τελευταῖον ψηφίον εἶναι 0 ἢ 2 ἢ 4 ἢ 6 ἢ 8· διὰ τοῦ 5 δὲ ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων τὸ τελευταῖον ψηφίον εἶναι 0 ἢ 5. Οἱ διὰ τοῦ 2 διαιρετοὶ ἀριθμοὶ λέγονται *ἄρτιοι ἢ ζυγοί*, οἱ δὲ μὴ διαιρετοὶ λέγονται *περιττοὶ ἢ μονοί* καὶ οὗτοι εἶναι οἱ λήγοντες εἰς 1, 3, 5, 7, 9.

Διὰ 4 ἢ διὰ 25. Ἐστω π.χ. ὁ ἀριθμὸς 7836· θέλομεν νὰ μάθωμεν, χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, ἂν οὗτος εἶναι διαιρετὸς διὰ 4 ἢ διὰ 25.

Παρατηροῦμεν, ὅτι, ἐὰν διαιρέσωμεν μίαν ἑκατοντάδα (ἦτοι τὸν 100) διὰ 4 ἢ διὰ 25, θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον μηδέν· ἂν λοιπὸν διαιρέσωμεν ὅλας τὰς ἑκατοντάδας τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ (ἦτοι τὰς 78) ἐκάστην χωριστὰ διὰ 4 ἢ διὰ 25, θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον μηδέν. Ἄλλ' ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς ἔχει 36 μονάδας ἀκόμῃ· ἂν λοιπὸν καὶ ὁ 36 εἶναι διαιρετὸς διὰ 4 ἢ διὰ 25, τότε καὶ ὅλος ὁ ἀριθμὸς 7836 εἶναι διαιρετὸς διὰ 4 ἢ διὰ 25. Ὡστε βλέπομεν, ὅτι διὰ νὰ εἶναι διαιρετὸς ὁ ἀριθμὸς 7836 διὰ 4 ἢ διὰ 25, ἐξαρτᾶται τοῦτο ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 36, τὸν ὁποῖον ἀπο-

τελοῦσι τὰ δύο τελευταῖα ψηφία αὐτοῦ, καὶ ἐπομένως ὅ,τι ὑπόλοιπον θὰ δώσῃ οὗτος διαιρούμενος διὰ 4 ἢ διὰ 25, τὸ αὐτὸ ὑπόλοιπον θὰ δώσῃ καὶ ὅλος ὁ ἀριθμὸς. Ὡστε

72. Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 4 ἢ διὰ 25, όταν τὰ δύο τελευταῖα ψηφία αὐτοῦ πρὸς τὰ δεξιὰ ἀποτελῶσιν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ 4 ἢ διὰ 25.

Ὁ ἀνωτέρω λοιπὸν ἀριθμὸς 7836 εἶναι διαιρετὸς διὰ 4, διότι ὁ 36 εἶναι διαιρετὸς διὰ 4· διὰ 25 ὅμως δὲν εἶναι διαιρετὸς. Ἐὰν διαιρέσωμεν ὅμως τὸν 36 διὰ 25, θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον 11, τὸ αὐτὸ δὲ θὰ εὔρωμεν καὶ ἂν διαιρέσωμεν τὸν 7836 διὰ 25. Ἐὰν συμβῇ ὁ ἀποτελούμενος ἀριθμὸς ἐκ τῶν δύο τελευταίων ψηφίων νὰ εἶναι μικρότερος τοῦ διαιρέτου, τότε αὐτὸς εἶναι καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως.

Διὰ νὰ εἶναι δὲ ἀριθμὸς τις διαιρετὸς διὰ 25, πρέπει τὰ δύο τελευταῖα ψηφία αὐτοῦ νὰ εἶναι ἢ 00 ἢ 25 ἢ 50 ἢ 75.

Διὰ 3 ἢ διὰ 9. Ἐστω π.χ. ὁ ἀριθμὸς 867· θέλομεν νὰ μάθωμεν, χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, ἂν οὗτος εἶναι διαιρετὸς διὰ 3 ἢ διὰ 9.

Παρατηροῦμεν, ὅτι, ἐὰν διαιρέσωμεν μίαν δεκάδα (ἦτοι τὸν 10) ἢ μίαν ἑκατοντάδα (ἦτοι τὸν 100) ἢ μίαν χιλιάδα (ἦτοι τὸν 1000) κτλ. διὰ 3 ἢ διὰ 9, θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον μίαν μονάδα (ἀπλῆν). Ὡστε ἀπὸ τὰς 8 ἑκατοντάδας τοῦ ἀριθμοῦ 867 θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον 8 μονάδας (μίαν μονάδα ἀπὸ ἐκάστην ἑκατοντάδα χωριστά), ἀπὸ τὰς 6 δεκάδας του θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον 6 μονάδας (μίαν μονάδα ἀπὸ ἐκάστην δεκάδα χωριστά), αἵτινες μετὰ τῶν 7 μονάδων τοῦ ἀριθμοῦ ἀποτελοῦσι τὸ ὅλον $8+6+7$ μονάδας. Ἄν λοιπὸν καὶ τὸ ἄθροισμα τοῦτο $8+6+7$ ἢ 21 εἶναι διαιρετὸν διὰ 3 ἢ διὰ 9, τότε καὶ ὅλος ὁ ἀριθμὸς 867 εἶναι διαιρετὸς διὰ 3 ἢ διὰ 9. Ὡστε βλέπομεν, ὅτι διὰ νὰ εἶναι ἀριθμὸς τις διαιρετὸς διὰ 3 ἢ διὰ 9, ἐξαρτᾶται τοῦτο ἀπὸ τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του, καὶ ἐπομένως ὅ,τι ὑπόλοιπον θὰ δώσῃ τὸ ἄθροισμα τοῦτο διαιρούμενον διὰ 3 ἢ διὰ 9, τὸ αὐτὸ θὰ δώσῃ καὶ ὅλος ὁ ἀριθμὸς. Ὡστε

73. Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 3 ἢ διὰ 9, όταν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων αὐτοῦ (ὡς ἀπλῶν μονάδων θεωρουμένων) εἶναι διαιρετὸν διὰ 3 ἢ διὰ 9.

Ὁ ἀνωτέρω λοιπὸν ἀριθμὸς 867 εἶναι διαιρετὸς διὰ 3, διότι τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων του, ἦτοι ὁ 21, εἶναι διαιρετὸν διὰ 3· διὰ 9 ὅμως δὲν εἶναι διαιρετὸς. Ἐὰν διαιρέσωμεν ὅμως τὸν 21 διὰ 9, θὰ εὔρωμεν ὑπόλοιπον 3, ὥστε καὶ τὸν 867 ἂν διαιρέσωμεν διὰ 9, τὸ αὐτὸ ὑπόλοιπον θὰ εὔρωμεν.

Σημ. Ἐὰν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων ἀριθμοῦ τινος δὲν εἶναι μονο-

ψηφίος ἀριθμός, δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν καὶ εἰς τὸ ἄθροισμα τοῦτο τὰ ἀνωτέρω, ἤτοι νὰ προσθέσωμεν τὰ ψηφία αὐτοῦ, μέχρις ὅτου εὐρωμεν ἄθροισμα μονοψηφίον ἀριθμὸν.

Ὅταν ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 9, πάντοτε εἶναι διαιρετὸς καὶ διὰ 3. Τὸ ἀντίθετον ὅμως δὲν συμβαίνει πάντοτε.

Ἀσκήσεις.

Εἰς τὰς κατωτέρω ἀσκήσεις νὰ γίνῃ ἡ ἀπάντησις, χωρὶς νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ διαίρεσις.

1) Τίνες ἐκ τῶν ἀριθμῶν 273, 5075, 7194, 6952, 81568, 3216240 εἶναι διαιρετοὶ διὰ 2, διὰ 3, διὰ 4, διὰ 5, διὰ 9, διὰ 25;

2) Τὶ ὑπόλοιπον θὰ εὐρωμεν, ἂν διαιρέσωμεν τοὺς ἀριθμοὺς 64574, 57902, 46819, 714520 διὰ 2 ἢ διὰ 3 ἢ διὰ 4 ἢ διὰ 5 ἢ διὰ 9 ἢ διὰ 25;

3) Νὰ γραφῇ ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 2· ἄλλος ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 3· ἄλλο, διὰ 4· ἄλλος διὰ 5 καὶ ἄλλος διὰ 9.

4) Νὰ γραφῇ πενταψηφίος ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 9 καὶ διὰ 10.

5) Νὰ γραφῇ ἀριθμὸς διαιρετὸς διὰ 2 καὶ διὰ 3, διὰ 3 καὶ διὰ 5, διὰ 5 καὶ διὰ 9.

6) Δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν 3270 δραχμὰς μὲ μόνον δίδραγμα ἢ πεντάδραγμα ἢ δεκάδραγμα; Καὶ πόσον θὰ χρειασθῶμεν ἐξ ἐκάστου εἶδους;

7) Δυνάμεθα νὰ μοιράσωμεν ἀκριβῶς 124 δραχμὰς εἰς πτωχοὺς δίδοντες εἰς ἕκαστον ἀπὸ 3 δραχμὰς ἢ ἀπὸ 4 ἢ ἀπὸ 5 ἢ ἀπὸ 9; Καὶ ἂν δὲν δυνάμεθα πόσας πρέπει νὰ ἔχωμεν τὸ ὀλιγώτερον ἀκόμη, διὰ νὰ κατορθώσωμεν τοῦτο;

8) Εἰς ἓν σχολεῖον ὑπάρχουν 280 μαθηταί· δύνανται οὗτοι νὰ τεθῶσιν εἰς γραμμὴν κατὰ τετράδας, χωρὶς νὰ μείνη τις; Καὶ ἂν δύνανται, πόσαι τετράδες θὰ σχηματισθῶσιν;

9) Χωρική τις ἔχει 317 αὐγά· ἂν τοποθετήσῃ αὐτὰ ἐν τῷ καλαθίῳ τῆς ἀνὰ τρία ἢ ἀνὰ τέσσαρα, πόσα θὰ περισσεύσουν εἰς τὸ τέλος;

Ἀριθμοὶ πρῶτοι.

74. Ἀριθμὸς, ὅστις δὲν ἔχει ἄλλον διαιρέτην, παρὰ μόνον τὸν ἑαυτὸν του καὶ τὴν μονάδα, λέγεται **πρῶτος**. Παραδ. χάριν, οἱ ἀριθμοὶ 2, 3, 5, 7, 11, 13 κλπ. εἶναι πρῶτοι.

Ἀριθμὸς, ὅστις ἔχει διαιρέτας καὶ ἄλλους ἐκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῆς μονάδος, λέγεται **σύνθετος**. Παραδ. χάριν, οἱ ἀριθμοὶ 4, 6, 8, 9 κλπ. εἶναι σύνθετοι.

75. Ἀριθμὸς, ὅστις διαιρεῖ ἀκριβῶς δύο ἢ περισσοτέρους ἀριθμούς, λέγεται **κοινὸς διαιρέτης** αὐτῶν. Παραδ. χάριν, ὁ 2, ὅστις διαιρεῖ ἀκριβῶς τοὺς ἀριθμοὺς 6, 8, 20, εἶναι κοινὸς διαιρέτης αὐτῶν.

Δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ λέγονται **πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους**, ὅταν δὲν ἔχωσιν ἄλλον κοινὸν διαιρέτην παρὰ μόνον τὴν μονάδα (ἥτις εἶναι διαιρέτης ὅλων τῶν ἀριθμῶν).

Παραδ. χάριν, οἱ ἀριθμοὶ 4 καὶ 5 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· διότι ἐκτὸς τῆς μονάδος οὐδεὶς ἄλλος ἀριθμὸς διαιρεῖ καὶ τὸν ἕνα καὶ τὸν ἄλλον ἀκριβῶς. Ὡσαύτως οἱ ἀριθμοὶ 4, 10, 9 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἀλλ' οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν εἶναι πρῶτος.

Ἀνάλυσις συνθέτου ἀριθμοῦ εἰς πρῶτους παράγοντας.

76. Πᾶς σύνθετος ἀριθμὸς δύναται, ὡς θὰ ἴδωμεν, νὰ ἀναλυθῇ εἰς ἄλλους ἀριθμοὺς πρῶτους, τῶν ὁποίων τὸ γινόμενον νὰ εἶναι ἴσον μὲ τὸν σύνθετον τοῦτον ἀριθμὸν. Τοῦτο δὲ λέγεται **ἀνάλυσις συνθέτου ἀριθμοῦ εἰς πρῶτους παράγοντας**.

Διὰ νὰ ἀναλύσωμεν σύνθετον ἀριθμὸν εἰς πρῶτους παράγοντας, ἀκολουθοῦμεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

Διαιροῦμεν τὸν ἀριθμὸν, καθὼς καὶ τὰ ἐκάστοτε εὕρισκόμενα πηλίκα, διὰ τῶν πρῶτων ἀριθμῶν ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ 2, μέχρις ὅτου εὕρωμεν πηλίκον τὴν μονάδα 1. Τοὺς μὲν διαιρέτας γράφομεν πρὸς τὰ δεξιὰ τῶν διαιρουμένων ἀριθμῶν, χωριζομένων διὰ μιᾶς κατακορύφου γραμμῆς, τὰ δὲ πηλίκα ὑποκάτω αὐτῶν. Κατόπιν σχηματίζομεν τὸ γινόμενον ὅλων τῶν διαιρειτῶν καὶ τοῦτο εἶναι ἴσον μὲ τὸν δοθέντα ἀριθμὸν.

Σημ. Καλὸν εἶναι νὰ δοκιμάζωμεν τοὺς ὡς διαιρέτας πρῶτους ἀριθμοὺς 2, 3, 5, 7 κτλ. τὸν ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου, ἥτοι πρῶτον τὸν 2, ὡς εἶπομεν, καὶ ὅταν παύσῃ οὗτος νὰ εἶναι διαιρέτης, τότε δοκιμάζομεν τὸν ἀμέσως ἐπόμενον πρῶτον ἀριθμὸν 3.

Ἔστω, παραδ. χάριν, νὰ ἀναλυθῇ ὁ ἀριθμὸς 360 εἰς πρῶτους παράγοντας.

360	2	Διαιροῦμεν τὸν 360 διὰ 2, τὸν ὅποιον γράφομεν
180	2	πρὸς τὰ δεξιὰ του, τὸ δὲ πηλίκον 180 γράφομεν ὑπο-
90	2	κάτω τοῦ 360. Τὸ πηλίκον 180 διαιροῦμεν πάλιν διὰ
45	3	2 καὶ γράφομεν αὐτὸν πρὸς τὰ δεξιὰ του, τὸ δὲ πηλί-
15	3	κον 90 γράφομεν ὑποκάτω τοῦ 180. Τὸν 90 διαιροῦ-
5	5	μεν πάλιν διὰ 2 γράφοντες αὐτὸν δεξιὰ του καὶ τὸ
1		πηλίκον 45 ὑποκάτω. Ὁ 2 τώρα δὲν διαιρεῖ τὸν 45, διὰ τοῦτο δοκιμά-

ζομεν τὸν ἀμέσως ἐπόμενον αὐτοῦ πρῶτον ἀριθμὸν, ἦτοι τὸν 3, τὸν ὅποιον γράφομεν δεξιὰ τοῦ 45 καὶ τὸ πηλίκον 15 ὑποκάτω αὐτοῦ. Τὸν 15 διαιροῦμεν πάλιν διὰ 3 καὶ γράφομεν αὐτὸν δεξιὰ του, τὸ δὲ πηλίκον 5 ὑποκάτω αὐτοῦ. Τέλος διαιροῦμεν τὸν 5 διὰ 5 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 1. Ὡστε εἶναι $360=2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$ ἢ (κατὰ τὸ ἐδάφιον 44) $360=2^3 \times 3^2 \times 5$.

Σημ. Ὁ 5, ὅστις δὲν ἔχει ἐκθέτην, ὑποτίθεται, ὅτι ἔχει τὴν μονάδα 1. Ὁμοίως εὐρίσκεται ὅτι εἶναι $132=2^2 \times 3 \times 11$, $756=2^2 \times 3^3 \times 7$. Ἐνίοτε ἀριθμὸς τις ἀναλύεται ἀμέσως εἰς πρῶτους παραγόντας. Π. χ. εἶναι $100=10 \times 10=2 \times 5 \times 2 \times 5=2^2 \times 5^2$. Ἐπίσης εἶναι $90=9 \times 10=3^2 \times 2 \times 5$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄.

Περὶ μεγίστου κοινοῦ διαιρέτου καὶ ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου.

77. Εἵπομεν ἀνωτέρω (ἐδάφ. 75), ὅτι κοινὸς διαιρέτης δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν λέγεται ὁ ἀριθμὸς, ὅστις διαιρεῖ αὐτοὺς ἀκριβῶς.

Παραδ. χάριν, οἱ ἀριθμοὶ 12, 18 καὶ 24 ἔχουσι κοινούς διαιρέτας τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3 καὶ 6. Ὁ μεγαλύτερος τῶν κοινῶν τούτων διαιρετῶν, ἦτοι ὁ 6, λέγεται **μέγιστος κοινὸς διαιρέτης**. Ὡστε

Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν λέγεται ὁ μεγαλύτερος τῶν κοινῶν διαιρετῶν αὐτῶν.

78. Ἀριθμὸς, ὅστις εἶναι πολλαπλάσιον δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν (ἐκάστου χωριστά), λέγεται **κοινὸν πολλαπλάσιον** αὐτῶν. Παραδ. χάριν, ὁ 12 εἶναι κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν 3, 4 καὶ 6 (διότι γίνεται ἕξ ἐκάστου ἕξ αὐτῶν διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἢ διότι εἶναι διαιρετὸς δι' αὐτῶν, ἐδάφ. 68). Ἐπίσης οἱ ἀριθμοὶ 24, 36, 48 κτλ. εἶναι κοινὰ πολλαπλάσια τῶν ἀριθμῶν 3, 4 καὶ 6· διότι εἶναι διαιρετοὶ δι' αὐτῶν. Ἄλλ' ἐκ τῶν κοινῶν τούτων πολλαπλασίων 12, 24, 36, 48, τὰ ὅποια ἔχουσιν οἱ ἀριθμοὶ 3, 4 καὶ 6, τὸ μικρότερον αὐτῶν, ἦτοι ὁ 12, λέγεται **ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον**· διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλος ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ 12, ὅστις νὰ διαιρῆται ἀκριβῶς δι' αὐτῶν. Ὡστε

Ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν λέγεται ὁ μικρότερος τῶν ἀριθμῶν, τὸν ὅποιον διαιροῦσιν οὗτοι.

συμπεραίνομεν ὅτι οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

80. Ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι περισσότεροι τῶν δύο, τότε πρὸς εὕρεσιν τοῦ μεγίστου κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν πράττομεν ὡς ἑξῆς:

Γράφομεν τοὺς ἀριθμοὺς εἰς μίαν ὀριζοντίαν σειρὰν καὶ διαιροῦμεν αὐτοὺς διὰ τοῦ μικροτέρου αὐτῶν, καὶ ἂν εὕρωμεν ὑπόλοιπον μηδέν, ὁ μικρότερος οὗτος ἀριθμὸς εἶναι ὁ μέγιστος κοινὸς διαιρέτης αὐτῶν· εἰ δὲ μὴ, γράφομεν τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων εἰς ἄλλην σειρὰν καὶ ὑποκάτω τῶν ἀριθμῶν, ἐξ ὧν προέκυψαν, καθὼς καὶ τὸν μικρότερον αὐτῶν, καὶ πράττομεν εἰς τοὺς ἀριθμοὺς τούτους τῆς δευτέρας σειρᾶς, καθὼς καὶ εἰς ἐκάστην τῶν ἐπομένων, ὅ,τι καὶ εἰς τοὺς ἀριθμοὺς τῆς πρώτης σειρᾶς, μέχρις ὅτου εὕρωμεν μίαν σειρὰν ἀριθμῶν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὁ μικρότερος αὐτῶν νὰ διαιρῆ τοὺς ἄλλους ἀκριβῶς· οὗτος δὲ θὰ εἶναι καὶ ὁ μέγιστος κοινὸς διαιρέτης τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Ἐστω π. χ. νὰ εὕρεθῆ ὁ μέγιστος κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 12, 20, 46, 60· καθὼς καὶ τῶν ἀριθμῶν 8, 14, 28, 35.

Ἡ πρῶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς:

12	20	46	60	8	14	28	35
12	8	10	0	8	6	4	3
4	8	2	0	2	0	1	3
0	0	2	0	0	0	1	0

Τῶν μὲν ἀριθμῶν 12, 20, 46, 60 μέγιστος κοινὸς διαιρέτης εἶναι ὁ 2, τῶν δὲ ἀριθμῶν 8, 14, 28, 35 μ. κ. δ. εἶναι ἡ μονὰς 1, ἐπομένως οὗτοι εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

81. Τὸν μέγιστον κοινὸν διαιρέτην δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν εὐρίσκομεν καὶ ὡς ἑξῆς:

Ἀναλύομεν αὐτοὺς εἰς πρώτους παράγοντας καὶ ἐκ τῶν κοινῶν παραγόντων λαμβάνομεν ἕκαστον μὲ τὸν μικρότερον ἐκθέτην, τὸ δὲ γινόμενον αὐτῶν εἶναι ὁ μέγιστος κοινὸς διαιρέτης.

Ἐστω π. χ. νὰ εὕρεθῆ ὁ μέγ. κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 140 καὶ 600· ἀναλύοντες αὐτοὺς εἰς πρώτους παράγοντας εὐρίσκομεν ὅτι εἶναι

$$140 = 2^2 \times 5 \times 7$$

$$600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$$

Κοινὸς παράγοντας ἔχουσι μόνον τοὺς ἀριθμοὺς 2 καὶ 5, καὶ ὁ μὲν 2 εἰς τὸν ἀριθμὸν 140 ἔχει ἐκθέτην 2, ἥτοι περιέχεται δις, εἰς δὲ τὸν 600 ἔχει ἐκθέτην 3, ἥτοι περιέχεται τρις· ὁ δὲ 5 περιέχεται ἅπαξ εἰς τὸν πρῶτον καὶ δις εἰς τὸν δεύτερον. Κατὰ τὰ ἀνωτέρω λοιπὸν ἐκ

τῶν κοινῶν τούτων παραγόντων θὰ λάβωμεν ἕκαστον μὲ τὸν μικρότερον ἐκθέτην του, ἦτοι τοὺς 2^2 καὶ 5, τῶν ὁποίων τὸ γινόμενον $2^2 \times 5$ ἢ 20 εἶναι ὁ μέγ. κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 140 καὶ 600.

Ὁ μέγιστος κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν

$$630 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$$

$$5940 = 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 11$$

$$8820 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$$

εἶναι κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὁ $2 \times 3^2 \times 5$, ἦτοι ὁ 90.

Σημ. Δυνατὸν ἀριθμοὶ τινες νὰ ἔχωσιν ἓνα μόνον κοινὸν παράγοντα, ὅτε οὗτος (μὲ τὸν μικρότερον ἐκθέτην) εἶναι ὁ μ. κ. δ. αὐτῶν. Δυνατὸν πάλιν νὰ μὴ ἔχωσι κοινόν τινα παράγοντα, ὅτε οἱ ἀριθμοὶ εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· διότι ὡς κοινὸς παράγων λαμβάνεται ἡ μονάς.

Εὑρεσις τοῦ ἐλάχιστου κοινοῦ πολλαπλασίου.

82. Ἐὰν ὁ μεγαλύτερος δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν διαιρῆται ἀκριβῶς δι' ὅλων τῶν ἄλλων, οὗτος εἶναι τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Παραδ. χάριν, ἐκ τῶν ἀριθμῶν 6, 8 καὶ 24 ὁ μεγαλύτερος 24 διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τῶν ἄλλων 6 καὶ 8, οὗτος λοιπὸν εἶναι τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν 6, 8 καὶ 24. Διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλος ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ 24, ὅστις νὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ 24.

Ἐνίοτε ὅμως, ἐνῶ ὁ μεγαλύτερος τῶν δοθέντων ἀριθμῶν δὲν διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τῶν ἄλλων, δυνάμεθα διὰ μικρᾶς ἀσκήσεως νὰ διακρίνωμεν, ἂν τὸ διπλάσιον ἢ τριπλάσιον κτλ. αὐτοῦ διαιρῆται ἀκριβῶς δι' αὐτῶν· τότε αὐτὸ εἶναι τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Παραδ. χάριν, ἐκ τῶν ἀριθμῶν 3, 4, 15 καὶ 20 ὁ μεγαλύτερος 20 δὲν διαιρεῖται ἀκριβῶς δι' ὅλων τῶν ἄλλων (διότι μόνον διὰ τοῦ 4 διαιρεῖται), οὔτε τὸ διπλάσιον αὐτοῦ 40, ἐνῶ τὸ τριπλάσιον τοῦ 20, ἦτοι ὁ 60, διαιρεῖται ἀκριβῶς δι' ὅλων. Ὁ 60 λοιπὸν εἶναι τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν 3, 4, 15 καὶ 20.

Ἐὰν ὅμως καὶ τοῦτο δὲν δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν, τότε ἀκολουθοῦμεν τὸν ἑξῆς τρόπον.

83. *Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον ἀριθμῶν, γράφομεν αὐτοὺς εἰς μίαν ὀριζοντίαν σειράν, καὶ ἂν ὑπάρχωσι δύο τοῦλάχιστον ἀριθμοὶ διαιρετοὶ διὰ τινος πρώτου ἀριθμοῦ, διαιροῦμεν αὐτούς, καὶ τὸν μὲν διαιρέτην γράφομεν εἰς τὰ δεξιὰ αὐτῶν καὶ τὸν χωρίζομεν διὰ μιᾶς κατακορῦφου γραμ-*

μῆς, τὰ δὲ πηλίκᾳ γράφομεν ὑποκάτω αὐτῶν, καθὼς καὶ τοὺς μὴ διαιρετοὺς ἀριθμοὺς. Τὸ αὐτὸ πράττομεν καὶ εἰς τοὺς ἀριθμοὺς τῆς δευτέρας σειρᾶς, καθὼς καὶ εἰς ἐκάστην τῶν ἐπομένων, μέχρις ὅτου εὕρωμεν ἀριθμοὺς μὴ ἔχοντας κοινὸν διαιρέτην. Ἐπειτα σχηματίζομεν τὸ γινόμενον ὅλων τῶν διαιρετῶν καὶ τῶν ὑπαρχόντων ἀριθμῶν εἰς τὴν τελευταίαν σειρᾶν, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Σημ. Καλὸν εἶναι νὰ δοκιμάζωμεν τοὺς ὡς διαιρέτας πρώτους ἀριθμοὺς τὸν ἓνα κατόπιν τοῦ ἄλλου ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ 2.

Ἔστω π. χ. νὰ εὕρεθῇ τὸ ἐλάχ. κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν 6, 8, 15, 20. Ἡ περᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς:

6	8	15	20	2	διαιρέτης
3	4	15	10	2	»
3	2	15	5	3	»
1	2	5	5	5	»
1	2	1	1	1	

Ὡστε τὸ ἐλάχ. κ. πολλ. εἶναι ὁ $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 2$, ἧτοι ὁ 120.

84. Τὸ ἐλάχ. κοινὸν πολλαπλάσιον ἀριθμῶν καὶ μάλιστα μεγάλων εὐρίσκομεν καὶ κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον.

Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον ἀριθμῶν, ἀναλύομεν αὐτοὺς εἰς πρώτους παράγοντας καὶ ἐξ ὅλων τῶν παραγόντων τούτων (κοινῶν καὶ μὴ) λαμβάνομεν ἕκαστον μὲ τὸν μεγαλύτερον ἐκθέτην του, τὸ δὲ γινόμενον αὐτῶν εἶναι τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον.

Ἔστωσαν π. χ. οἱ ἐξῆς ἀναλελυμένοι ἀριθμοὶ εἰς πρώτους παράγοντας:

$$150 = 2 \times 3 \times 5^2$$

$$140 = 2^2 \times 5 \times 7$$

$$54 = 2 \times 3^3$$

Ἐκ τῶν διαφόρων τούτων παραγόντων (2, 3, 5, 7) θὰ λάβωμεν ἕκαστον μὲ τὸν μεγαλύτερον ἐκθέτην του, ὥστε θὰ λάβωμεν τοὺς $2^2, 3^3, 5^2, 7$, καὶ θὰ σχηματίσωμεν ἐξ αὐτῶν γινόμενον. Ὡστε τὸ ἐλάχ. κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν 150, 140 καὶ 54 εἶναι ὁ $2^2 \times 3^3 \times 5^2 \times 7$ ἢ $4 \times 27 \times 25 \times 7$ ἢ 18900.

Ὁ δὲ μέγιστος κοινὸς διαιρέτης τῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν εἶναι ὁ 2.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

- 1) Νὰ εὐρεθῇ ὁ μέγ. κοιν. διαιρέτης τῶν ἀριθμῶν 560 καὶ 72. (8).
 2) Νὰ εὐρεθῇ ὁ μ. κ. δ. καὶ τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν 56 καὶ 60. (μ. κ. δ. ὁ 4, ἐλάχ. κ. πολλ. ὁ 840).
 3) Νὰ εὐρεθῇ ὁ μ. κ. δ. καὶ τὸ ἐλάχ. κ. πολλαπλ. τῶν ἀριθμῶν 6, 20, 15, 40. (μ. κ. δ. ἡ 1, ἐλαχ. κ. πολλαπλ. ὁ 120).
 4) Νὰ εὐρεθῇ ὁ μ. κ. δ. καὶ τὸ ἐλάχ. κ. πολλ. τῶν ἀριθμῶν 28, 8, 30, 20. (μ. κ. δ. ὁ 2, ἐλάχ. κ. πολλαπ. ὁ 840).
 5) Εἰς πόσας τὸ πολὺ πτωχὰς οἰκογενείας δύνανται νὰ μοιρασθῶσιν ἕξ ἴσου 380 ὀκάδες ἀλεύρου καὶ 60 ὀκάδες ἐλαίου ; Καὶ πόσον ἄλευρον καὶ ἔλαιον θὰ λάβῃ ἐκάστη οἰκογένεια ;
 (εἰς 20 οἶκον. 19 ὀκ. ἄλ. καὶ 3 ὀκ. ἐλαίου).

6) Τρία ταχυδρομικὰ ἀτμόπλοια ἐπανέρχονται εἰς τινὰ πόλιν τὸ μὲν μετὰ 5 ἡμέρας, τὸ δὲ μετὰ 9, τὸ δὲ μετὰ 15. Μίαν τῶν ἡμερῶν ἐπανῆλθον καὶ τὰ τρία ἀτμόπλοια εἰς τὴν πόλιν ταύτην. Μετὰ πόσας τὸ ὀλιγώτερον ἡμέρας θὰ συμβῇ πάλιν τοῦτο ;

Δύσις. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ζητούμενων ἡμερῶν θὰ εἶναι διαιρετὸς διὰ 5, διὰ 9 καὶ διὰ 15 ὥστε ζητεῖται τὸ ἐλάχ. κ. πολλαπλάσιον τῶν ἀριθμῶν τούτων, τὸ ὁποῖον εἶναι 45. Μετὰ 45 λοιπὸν ἡμέρας θὰ συμβῇ τοῦτο.


7) Ἐρωτηθεῖς τις περὶ τῆς ἡλικίας του ἀπεκρίθη· εἶμαι ὀλιγώτερον τῶν 60 ἐτῶν, ἂν δὲ ἡ ἡλικία μου διαιρεθῇ εἴτε διὰ 6 εἴτε διὰ 8 εἴτε διὰ 16 προκύπτει ὑπόλοιπον 2. Ποία εἶναι ἡ ἡλικία του ;

Δύσις. Ἡ ἡλικία του ἐλαττωμένη κατὰ 2 εἶναι διαιρετὴ διὰ 6, διὰ 8 καὶ διὰ 16, ἐπομένως αὕτη εἶναι τὸ ἐλάχ. κ. πολλαπλ. τῶν ἀριθμῶν 6, 8, 16 ἠὺς ἡμέρον κατὰ 2, ἦτοι 50 ἐτῶν.

8) Χωρική τις ἐρωτηθεῖσα, πόσα αὐγὰ ἔχει ἐν τῷ καλάθῳ της, ἀπεκρίθη· δὲν ἐνθυμοῦμαι ἀκριβῶς. Ἔχω ὅμως ὀλιγώτερα τῶν 200, ὅταν δὲ ἐτοποθέτουν αὐτὰ ἐν τῷ καλάθῳ μου εἴτε ἀνὰ 3 εἴτε ἀνὰ 4 εἴτε ἀνὰ 5 εἴτε ἀνὰ 6 εἴτε ἀνὰ 8, ἐπερίσσειον πάντοτε 2. Πόσα αὐγὰ εἶχεν ; (122).

9) Ἀνθοπώλης τις ἔχει 645 γαρύφαλα, 480 τριαντάφυλλα καὶ 135 κρίνους· πόσας τὸ πολὺ ἀνθοδέσμας δύνανται νὰ κάμῃ, ὥστε ἐκάστη νὰ ἔχῃ τὸ αὐτὸ πλῆθος ἀνθέων ἕξ ἐκάστου εἶδους ;

(15 ἀνθοδέσμας, ἐκάστη θὰ ἔχῃ 43 γαρύφ., 32 τριαντ. καὶ 15 κρ.).



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

85. Ἐκαστον προᾶγμα ἀκεραῖον (ὀλόκληρον) παρίσταται, ὡς γνωστόν, διὰ τῆς μονάδος 1, ἣτις ἔνεκα τούτου λέγεται **ἀκεραία μονάς**.

Παραδ. χάριν, γράφομεν 1 μῆλον, 1 πρόβατον κ.τ.λ.

Ἐὰν λάβωμεν τώρα ἓνα προᾶγμα, ἔστω 1 μῆλον, καὶ τὸ κόψωμεν εἰς 2 ἢ 3 ἢ 4 ἢ 5 κτλ. ἴσα μέρη, ἕκαστον τῶν ἴσων τούτων μερῶν λέγεται πρὸς διάκρισιν **κλασματικὴ μονάς**. Ὡστε

Κλασματικὴ μονάς λέγεται ἕκαστον τῶν ἴσων μερῶν, εἰς τὰ ὁποῖα διαιρεῖται ἡ ἀκεραία μονάς.

Καὶ ἂν μὲν τὸ προᾶγμα τοῦτο, ἔστω ἓν μῆλον, τὸ κόψωμεν εἰς δύο ἴσα μέρη, ἕκαστον τῶν μερῶν τούτων λέγεται ἰδιαιτέρως **δεύτερον ἢ ἡμῖς** (τοῦ μῆλου)· ἂν δὲ τὸ κόψωμεν εἰς τρία ἴσα μέρη, ἕκαστον τῶν μερῶν τούτων λέγεται **τρίτον**· ἂν δὲ τὸ κόψωμεν εἰς τέσσαρα ἢ πέντε ἢ ἕξ κτλ. ἴσα μέρη, ἕκαστον τῶν μερῶν τούτων λέγεται **τέταρτον, πέμπτον, ἕκτον** κτλ.

86. Ὅπως πλήθος τι ἀκεραίων μονάδων ἀποτελεῖ **ἀριθμὸν ἀκεραῖον**, οὕτω καὶ πλήθος τι κλασματικῶν μονάδων ἀποτελεῖ **ἀριθμὸν κλασματικὸν ἢ ἀπλῶς κλάσμα**. Ἐὰν π.χ. κόψωμεν ἓν μῆλον εἰς πολλὰ ἴσα μέρη καὶ λάβωμεν 2 ἢ 3 ἢ 4 κτλ. μέρη (ἢ καὶ 1 μέρος), τὸ πλήθος τῶν μερῶν, ἅτινα θὰ λάβωμεν, ἀποτελεῖ κλάσμα. Ὡστε

Κλάσμα λέγεται πλήθος κλασματικῶν μονάδων (ἢ καὶ μία μόνη κλασματικὴ μονάς).

Γραφὴ καὶ ἀπαγγελία τῶν κλασμάτων.

87. Τὰ κλάσματα γράφομεν διὰ δύο ἀκεραίων ἀριθμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ εἰς φανερώνει εἰς πόσα ἴσα μέρη διηρέθη ἡ ἀκεραία μονάς (δηλ. ἓν προᾶγμα ἀκεραῖον) καὶ λέγεται **παρονομαστής**· ὁ δὲ ἄλλος φανερώνει πόσα μέρη τοιαῦτα λαμβάνονται καὶ λέγεται **ἀριθμητής**· καὶ οἱ δύο ὁμοῦ λέγονται μὲ ἓν ὄνομα **ὄροι** τοῦ κλάσματος. Ὁ παρονομαστής γράφεται ὑποκάτω τοῦ ἀριθμητοῦ καὶ χωρίζονται διὰ μιᾶς ὀριζοντίας γραμμῆς.

Ἐὰν π.χ. κόψωμεν ἓν μῆλον εἰς 2 ἴσα μέρη, ἄλλο μῆλον εἰς 3 ἴσα μέρη καὶ ἄλλο εἰς 4 ἴσα μέρη καὶ λάβωμεν ἓν μέρος ἕξ ἐκάστης τῶν διαιρέσεων τούτων, τὰ μέρη ταῦτα θὰ παρασταθῶσιν ὡς ἑξῆς· $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ καὶ ἀπαγγέλλομεν πρῶτον τὸν ἀριθμητὴν ὡς ἀπό-

λυτον ἀριθμητικὸν ὄνομα καὶ ἔπειτα τὸν παρονομαστὴν ὡς τακτικόν, ἦτοι *ἐν δεύτερον (ἢ ἡμῖς), ἐν τρίτον, ἐν τέταρον.*

Ἐὰν πάλιν κόψωμεν ἓν μῆλον εἰς 5 ἴσα μέρη, ἄλλο δὲ μῆλον εἰς 8 ἴσα μέρη καὶ λάβωμεν ἐξ ἐκάστης τῶν διαιρέσεων τούτων 3 μέρη, ταῦτα θὰ παρασταθῶσιν ὡς ἐξῆς· $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{8}$ καὶ ἀπαγγέλλομεν *τρία πέμπτα,*

τρία ὄγδοα. Ὡστε βλέπομεν, ὅτι διὰ τῶν δύο ἀκεραίων ἀριθμῶν, διὰ τῶν ὁποίων γράφονται τὰ κλάσματα, ὁρίζονται καὶ τὰ λαμβανόμενα μέρη καὶ τὸ μέγεθος αὐτῶν (τὰ μῆλα ὑποτίθενται τοῦ αὐτοῦ μεγέθους).

Σημ. Ἡ ἀπαγγελία τῶν κλασμάτων γίνεται ἐκ τοῦ ἀριθμητοῦ διότι αὐτὸς εἶναι κυρίως ὁ ἀριθμὸς τοῦ κλάσματος· ὁ δὲ παρονομαστής δηλοῖ ἀπλῶς τὸ εἶδος τῶν μονάδων τοῦ ἀριθμητοῦ, ἂν δηλ. αὐταὶ εἶναι π.χ. τρίτα, τέταρτα, πέμπτα κτλ., ὡς νὰ λέγωμεν π.χ. μῆλα, καρῦδια πρόβατα.

Σύγκρισις τῶν κλασμάτων πρὸς τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

88. Ἐὰν λάβωμεν πρῶτά τι παριστώμενον διὰ τῆς ἀκεραίας μονάδος 1, ἔστω 1 μῆλον, καὶ ἂς κόψωμεν αὐτὸ εἰς ἴσα μέρη, ἔστω εἰς 5. Ἐὰν ἐκ τῶν μερῶν τούτων λάβωμεν 1 ἢ 2 ἢ 3 ἢ 4 μέρη, εἶναι φανερόν, ὅτι δὲν θὰ λάβωμεν ὁλόκληρον τὸ μῆλον· τὰ δὲ μέρη ταῦτα θὰ παρασταθῶσι διὰ τῶν κλασμάτων $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$. Ἐκ τούτων βλέπομεν, ὅτι

Ὅταν ὁ ἀριθμητὴς ἐνὸς κλάσματος εἶναι μικρότερος τοῦ παρονομαστοῦ, τὸ κλάσμα εἶναι μικρότερον τῆς ἀκεραίας μονάδος 1.

Ἐὰν ὅμως λάβωμεν καὶ τὰ 5 μέρη τοῦ μῆλου, τότε θὰ λάβωμεν ὁλόκληρον τὸ μῆλον· τὰ δὲ μέρη ταῦτα θὰ παρασταθῶσι διὰ τοῦ κλάσματος $\frac{5}{5}$. Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι

Ὅταν ὁ ἀριθμητὴς ἐνὸς κλάσματος εἶναι ἴσος μὲ τὸν παρονομαστὴν, τὸ κλάσμα εἶναι ἴσον μὲ τὴν ἀκεραίαν μονάδα 1.

Ὡστε ἡ ἀκεραία μονὰς 1 δύναται νὰ παρασταθῇ δι' οἰοῦνδήποτε κλάσματος, ἔχοντος ἴσους ὄρους· π.χ. εἶναι $\frac{5}{5}=1$, $\frac{8}{8}=1$, $\frac{15}{15}=1$, κτλ.

Ἐὰν κόψωμεν τώρα καὶ ἓν ἄλλο μῆλον εἰς 5 ἴσα μέρη καὶ λάβωμεν τὰ 5 μέρη τοῦ πρώτου μῆλου (ἦτοι ὁλόκληρον τὸ μῆλον) καὶ μέρη τινὰ ἐκ τοῦ δευτέρου τούτου μῆλου, ἔστω 2 μέρη, εἶναι τότε φανερόν, ὅτι θὰ λάβωμεν περισσότερον τοῦ ἐνὸς μῆλου· τὰ δὲ 7 μέρη, τὰ ὅποια ἔλαβον, θὰ παρασταθῶσι διὰ τοῦ κλάσματος $\frac{7}{5}$. Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι

“Όταν ὁ ἀριθμητὴς ἐνὸς κλάσματος εἶναι μεγαλύτερος τοῦ παρονομαστοῦ, τὸ κλάσμα εἶναι μεγαλύτερον τῆς ἀκεραίας μονάδος 1.

Ἀσκήσεις.

1) Ἐὰν κόψωμεν ἓν μῆλον εἰς 8 ἴσα μέρη καὶ λάβωμεν τὰ 3 μέρη, τὸ μέρος τοῦ μήλου θὰ λάβωμεν ;

2) Τὸ μέρος τῆς δραχμῆς εἶναι τὰ 45 λεπτά ;

3) Τὸ μέρος τῆς ὀκτῆς εἶναι τὰ 70 δράμια ;

4) Ἐκ τῶν κλασματικῶν μονάδων $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$ (τοῦ αὐτοῦ πράγματος) ποία εἶναι μεγαλύτερα καὶ ποία μικρότερα ; Καὶ διατί ;

5) Ἐκ τῶν κατωτέρω κλασμάτων ποία εἶναι μικρότερα τῆς ἀκεραίας μονάδος, ποία ἴσα καὶ ποία μεγαλύτερα αὐτῆς ; Καὶ διατί ;

$$\frac{7}{9}, \frac{8}{5}, \frac{10}{10}, \frac{2}{3}, \frac{5}{4}$$

6) Γράψατε δύο κλάσματα ἴσα μὲ τὴν ἀκεραίαν μονάδα, δύο μεγαλύτερα αὐτῆς καὶ δύο μικρότερα αὐτῆς.

Τροπὴ ἀκεραίου ἀριθμοῦ εἰς κλάσμα.

89. Ἐστω π.χ. νὰ τραπῇ ὁ ἀκεραῖος ἀριθμὸς 5 εἰς ἑβδομα, ἥτοι εἰς κλάσμα ἔχον παρονομαστὴν τὸν 7. Ὅπως σκεπτόμεθα διὰ νὰ τρέψωμεν π.χ. 5 δραχμὰς εἰς λεπτά, ἥτοι λέγομεν ἢ 1 δραχμὴ ἔχει 100 λεπτά, ἐπομένως αἱ 5 δραχμαὶ ἔχουν 5 φορὰς τὰ 100 λεπτά, ἥτοι 100×5 ἢ 500 λεπτά, οὕτω σκεπτόμεθα καὶ διὰ νὰ τρέψωμεν τὸν ἀκεραῖον 5 εἰς ἑβδομα, ἥτοι λέγομεν ἢ 1 ἀκεραία μονὰς ἔχει 7 ἑβδομα (διότι εἶναι $\frac{7}{7} = 1$), ἐπομένως αἱ 5 ἀκεραῖαι μονάδες ἔχουν 5 φορὰς τὰ 7 ἑβδομα, ἥτοι 7×5 ἢ 35 ἑβδομα· ἀλλὰ τοῦτο γράφεται ὡς ἐξῆς $\frac{35}{7}$. Ὅστε εἶναι $5 = \frac{5 \times 7}{7} = \frac{35}{7}$. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

90. Διὰ νὰ τρέψωμεν ἀκεραῖον ἀριθμὸν εἰς κλάσμα ἔχον δοθέντα παρονομαστὴν, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀκεραῖον ἐπὶ τὸν δοθέντα παρονομαστὴν καὶ τὸ γινόμενον γράφομεν ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ τὸν ἴδιον.

Μικτὸς ἀριθμὸς.

91. Ἐὰν ἔχη τις, παραδ. χάριν, 5 δραχμὰς καὶ 3 δραχμὰς, θὰ γράψωμεν ὅτι ἔχει $5 + 3$ δραχμὰς· ἐὰν δὲ ἔχη 5 δραχμὰς καὶ $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς, θὰ γράψωμεν πάλιν ὅτι ἔχει $5 + \frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς, Ὁ ἀριθμὸς

$5 + \frac{3}{4}$ ἢ ἀπλούστερον $5 \frac{3}{4}$, ἄνευ τοῦ σημείου +, λέγεται **μικτός** ἀριθμὸς καὶ εἶναι οὗτος ἄθροισμα ἀκεραίου καὶ κλάσματος. Ὡστε

Μικτὸς ἀριθμὸς λέγεται ὁ συγκεείμενος ἀπὸ ἀκέραιον καὶ ἀπὸ κλάσμα.

Τροπὴ μικτοῦ ἀριθμοῦ εἰς κλάσμα.

92. Ἐὰν λάβωμεν, ὡς παράδειγμα, τὸν μικτὸν ἀριθμὸν $8 \frac{3}{5}$, τὸν ὁποῖον πρόκειται νὰ τρέψωμεν εἰς κλάσμα ἔχον παρονομαστὴν τὸν 5 (διότι αὐτὸν ἔχει τὸ κλάσμα τοῦ μικτοῦ). Πρὸς τοῦτο τρέπομεν πρῶτον τὸν ἀκέραιον 8 εἰς κλάσμα σκεπτόμενοι, ὅπως καὶ ἄνωτέρω, ἥτοι λέγομεν ἢ 1 ἀκεραία μονὰς ἔχει 5 πέμπτα, ἐπομένως αἱ 8 ἀκεραῖαι μονάδες ἔχουν 8 φορές τὰ 5 πέμπτα, ἥτοι 40 πέμπτα. Εἰς ταῦτα θὰ προσθέσωμεν καὶ τὰ 3 πέμπτα τοῦ μικτοῦ· ἀλλὰ καθὼς π.χ. 40 καρύδια καὶ 3 καρύδια κάμνουν 43 καρύδια, οὕτω καὶ 40 πέμπτα καὶ 3 πέμπτα κάμνουν 43 πέμπτα ἢ $\frac{43}{5}$. Ὡστε εἶναι $8 \frac{3}{5} = \frac{43}{5}$. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

Διὰ νὰ τρέψωμεν μικτὸν ἀριθμὸν εἰς κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος καὶ εἰς τὸ γινόμενον προσθέτομεν τὸν ἀριθμητὴν, τὸ δὲ ἄθροισμα γράφομεν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν τὸν ἴδιον.

Ἀσκήσεις.

- 1) Νὰ τραπῆ ὁ ἀκέραιος 7 εἰς ἔνατα, καὶ ὁ 4 εἰς ὄγδοα.
- 2) Πόσα τέταρτα κάμνουν 5 ἀκεραῖαι μονάδες ; Καὶ πόσα αἱ 9 ;
- 3) Μὲ πόσα ὄγδοα (ρούπια) ἰσοδυναμοῦν 6 πήχεις ; 8 πήχεις ;
- 4) Μὲ πόσα τετρακοσιοστὰ (δράμα) ἰσοδυναμοῦν 3 ὀκάδες ;
- 5) Ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος $\frac{5}{7}$, διὰ νὰ καταστήσωμεν αὐτὸ ἴσον μὲ μίαν, δύο, τρεῖς κτλ. ἀκεραίας μονάδας ;

- 6) Νὰ τραπῶσιν εἰς κλάσματα οἱ μικτοὶ ἀριθμοὶ $7 \frac{5}{9}$, $9 \frac{3}{8}$, $8 \frac{5}{7}$, $4 \frac{7}{15}$, $80 \frac{1}{4}$.

Ἐξαγωγή τῶν ἐν τῷ κλάσματι περιεχομένων ἀκεραίων μονάδων.

93. Ὄταν τὸ κλάσμα εἶναι μεγαλύτερον τῆς ἀκεραίας μονάδος 1,

δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν τὰς ἐν αὐτῷ περιεχομένας ἀκεραίας μονάδας. Ἡ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον πρᾶξις λέγεται **ἐξαγωγή τῶν ἀκεραίων μονάδων**.

Ἄς λάβωμεν, ὡς παράδειγμα, τὸ κλάσμα $\frac{13}{4}$. Διὰ νὰ εὑρωμεν πόσας ἀκεραίας μονάδας περιέχει τὸ κλάσμα τοῦτο, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Διὰ νὰ σχηματίσωμεν 1 ἀκεραίαν μονάδα, πρέπει ἀπὸ τὰ 13 τέταρτα νὰ λάβωμεν 4 τέταρτα (διότι εἶναι $\frac{4}{4} = 1$), ὅτε μένουν 9 τέταρτα (διότι καθὼς π. χ. ὅταν λαμβάνωμεν 4 μῆλα ἀπὸ 13 μῆλα μένουν 9 μῆλα, οὕτω καὶ ὅταν λαμβάνωμεν 4 τέταρτα ἀπὸ 13 τέταρτα μένουν 9 τέταρτα). Διὰ νὰ σχηματίσωμεν ἄλλην μίαν ἀκεραίαν μονάδα, πρέπει ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον 9 τέταρτα νὰ λάβωμεν ἄλλα 4 τέταρτα, ὅτε μένουν 5 τέταρτα. Διὰ νὰ σχηματίσωμεν ἄλλην 1 ἀκεραίαν μονάδα, πρέπει ἀπὸ τὸ νέον ὑπόλοιπον 5 τέταρτα νὰ λάβωμεν ἄλλα 4 τέταρτα, ὅτε μένει 1 τέταρτον. Ὡστε τὰ 13 τέταρτα περιέχουν 3 ἀκεραίας μονάδας, ἤτοι τόσας, ὅσας φορὰς τὰ 4 τέταρτα χωροῦν εἰς τὰ 13 τέταρτα ἢ ἀπλῶς τόσας φορὰς ὁ παρονομαστής 4 χωρεῖ εἰς τὸν ἀριθμητὴν 13, καὶ μένει ὑπόλοιπον, ὡς εἶδομεν, 1 τέταρτον. Ὡστε εἶναι $\frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

94. **Διὰ νὰ ἐξαγάγωμεν τὰς ἐν τῷ κλάσματι περιεχομένας ἀκεραίας μονάδας, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ, καὶ τὸ μὲν πηλίκον παριστᾷ τὰς ἀκεραίας μονάδας, τὸ δὲ ὑπόλοιπον (ἂν ὑπάρχη) γράφομεν ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν τὸν αὐτὸν.**

Ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς διαιρητῆται ἀκριβῶς διὰ τοῦ παρονομαστοῦ, τότε τὸ κλάσμα εἶναι ἴσον μὲ ἀκέραιον ἀριθμὸν. Π.χ. εἶναι $\frac{8}{4} = 2$, $\frac{18}{3} = 6$ κτλ.

Ἀσκήσεις.

$$\frac{29}{6} = 4\frac{5}{6}, \quad \frac{37}{8} = 4\frac{5}{8}, \quad \frac{36}{9} = 4, \quad \frac{68}{15} = 4\frac{8}{15}.$$

Πόσας ἀκεραίας μονάδας περιέχουν τὰ ἐξῆς κλάσματα :

$$\frac{14}{2}, \quad \frac{28}{7}, \quad \frac{35}{9}, \quad \frac{24}{10}, \quad \frac{70}{18}, \quad \frac{63}{9}.$$

Μὲ πόσους πῆχεις ἰσοδυναμοῦν τὰ $\frac{48}{8}$ τοῦ πῆχεως;

Μὲ πόσας ὀκάδας ἰσοδυναμοῦν τὰ $\frac{25}{6}$ τῆς ὀκάς ;

Ἰδιότητες τῶν κλάσμάτων.

95. Ἐὰν κόψωμεν π. χ. ἓν μῆλον εἰς ἴσα μέρη, ἔστω εἰς 8, καὶ ἐκ τῶν μερῶν τούτων δώσωμεν εἰς ἓν παιδίον 2 μέρη, εἰς ἄλλο παιδίον δώσωμεν τριπλάσια μέρη, ἧτοι 6, τότε τὸ πρῶτον παιδίον θὰ λάβῃ τὰ $\frac{2}{8}$ τοῦ μήλου, τὸ δὲ δεύτερον τὰ $\frac{6}{8}$ αὐτοῦ, καὶ θὰ εἶναι τὸ κλάσμα $\frac{6}{8}$ τρεῖς φορές μεγαλύτερον τοῦ κλάσματος $\frac{2}{8}$. καὶ τὰν παλιν, τὸ κλάσμα $\frac{2}{8}$ θὰ εἶναι τρεῖς φορές μικρότερον τοῦ κλάσματος $\frac{6}{8}$. Ἀλλὰ τὸ κλάσμα $\frac{6}{8}$ προκύπτει ἐκ τοῦ κλάσματος $\frac{2}{8}$, ὅταν ὁ ἀριθμητὴς αὐτοῦ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ 3· καὶ τὰνάπαλιν, τὸ κλάσμα προκύπτει ἐκ τοῦ κλάσματος $\frac{6}{8}$, ὅταν ὁ ἀριθμητὴς αὐτοῦ διαιρεθῇ διὰ τοῦ 3. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὴν ἐξῆς ἰδιότητα.

96. Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμητὴν ἐνὸς κλάσματος ἐπὶ ἓνα ἀριθμὸν, ἡ ἀξία τοῦ κλάσματος πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν, ἐὰν δὲ διαιρέσωμεν αὐτόν, διαιρεῖται.

Ἐὰν κόψωμεν πάλιν ἓν μῆλον εἰς ἴσα μέρη, ἔστω εἰς 4,



καὶ ἐκ τῶν μερῶν τούτων λάβωμεν π. χ. 3 μέρη, θὰ λάβωμεν τότε τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ μήλου. Ἐὰν ἕκαστον τῶν τεσσάρων τούτων μερῶν κόψωμεν πάλιν εἰς ἴσα μέρη, καὶ ἔστω εἰς 2, ὅτε τὸ μῆλον θὰ κοπῇ εἰς 8 ἴσα μέρη



καὶ ἐκ τῶν νέων τούτων μερῶν λάβωμεν πάλιν 3 μέρη, θὰ λάβωμεν τότε τὰ $\frac{3}{8}$ τοῦ μήλου. Ἀλλ' ἕκαστον τῶν μερῶν τούτων, ἧτοι ἕκαστον ὄγδοον, εἶναι τὸ ἡμισυ ἐκάστου τῶν προηγουμένων μερῶν ἧτοι ἐκάστου τετάρτου, ἐπομένως τὰ $\frac{3}{8}$ εἶναι τὸ ἡμισυ τῶν $\frac{3}{4}$. καὶ τὰνάπαλιν, τὰ $\frac{3}{4}$ εἶναι τὸ διπλάσιον τῶν $\frac{3}{8}$. Ἀλλὰ τὸ κλάσμα προκύπτει ἐκ τοῦ κλάσματος $\frac{3}{8}$, ὅταν ὁ παρονομαστής αὐτοῦ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ 2· καὶ τὰνάπαλιν, τὸ κλάσμα $\frac{3}{4}$ προκύπτει ἐκ τοῦ

ὅταν ὁ παρονομαστής αὐτοῦ διαιρεθῇ διὰ 2. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὴν ἑξῆς ιδιότητα.

97. Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν παρονομαστήν ἑνὸς κλάσματος ἐπὶ ἓνα ἀριθμὸν, ἡ ἀξία τοῦ κλάσματος διαιρεῖται διὰ τοῦ ἰδίου ἀριθμοῦ· ἐὰν δὲ διαιρέσωμεν αὐτὸν πολλαπλασιάζεται.

Αἱ ἀνωτέρω δύο ιδιότητες δύνανται νὰ συγχωνευθῶσιν εἰς τὴν ἑξῆς μίαν μόνην ιδιότητα.

98. Ἡ ἀξία κλάσματος πολλαπλασιάζεται, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμητὴν ἢ διαιρέσωμεν τὸν παρονομαστήν· διαιρεῖται δέ, ἐὰν διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμητὴν ἢ πολλαπλασιάσωμεν τὸν παρονομαστήν.

Σημ. Γενικῶς τὸ κλάσμα αὐξάνει, ὅταν αὐξήσωμεν τὸν ἀριθμητὴν του· π.χ. τὸ κλάσμα $\frac{5}{8}$ τοῦ πῆχους εἶναι μεγαλύτερον τοῦ $\frac{3}{8}$, διότι λαμβάνονται περισσότερα μέρη τῆς ἀκεραίας μονάδος· ἐλαττοῦται δέ, ὅταν αὐξήσωμεν τὸν παρονομαστήν του· π.χ. τὸ κλάσμα $\frac{5}{10}$ τοῦ πῆχους εἶναι μικρότερον τοῦ $\frac{5}{8}$, διότι καὶ τὸ $\frac{1}{10}$ τοῦ πῆχους εἶναι μικρότερον τοῦ $\frac{1}{8}$ αὐτοῦ κατὰ μέγεθος.

99. Ἄνωτέρω ἐκόψαμεν ἓν μῆλον εἰς 4 ἴσα μέρη ἢ 4 τέταρτα· ἔπειτα ἕκαστον τέταρτον ἐκόψαμεν εἰς δύο ἴσα μέρη καὶ ἐπομένως τὸ μῆλον ἐκόπη εἰς 8 ἴσα μέρη ἢ 8 ὄγδοα. Ὡστε 1 τέταρτον κάμνει 2 ὄγδοα, 2 τέταρτα κάμνουν 4 ὄγδοα, 3 τέταρτα κάμνουν 6 ὄγδοα κτλ. Τὸ ἴδιον λοιπὸν εἶναι εἴτε λάβωμεν π.χ. τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ μήλου εἴτε λάβωμεν τὰ $\frac{6}{8}$ αὐτοῦ, τουτέστι τὰ κλάσματα ταῦτα ἔχουν τὴν αὐτὴν ἀξίαν. Ἀλλὰ τὸ κλάσμα $\frac{6}{8}$ προκύπτει ἐκ τοῦ κλάσματος $\frac{3}{4}$, ὅταν οἱ ὄροι αὐτοῦ πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ 2· καὶ τἀνάπαλιν, τὸ κλάσμα $\frac{3}{4}$ προκύπτει ἐκ τοῦ $\frac{6}{8}$, ὅταν οἱ ὄροι αὐτοῦ διαιρεθῶσι διὰ 2. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὴν ἑξῆς ιδιότητα.

100. Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν καὶ τοὺς δύο ὄρους ἑνὸς κλάσματος ἐπὶ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν ἢ διαιρέσωμεν αὐτοὺς διὰ τοῦ ἰδίου ἀριθμοῦ (ἐὰν εἶναι διαιρετοί), ἡ ἀξία τοῦ κλάσματος δὲν μεταβάλλεται.

101. Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἔχομεν νὰ μοιράσωμεν 3 μῆλα εἰς 4 παιδιά

ἔξ ἴσου καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσον θὰ λάβῃ τὸ καθέν. Κατὰ πρῶτον κόπτομεν τὸ ἓν μῆλον εἰς 4 ἴσα μέρη καὶ δίδομεν εἰς ἕκαστον παιδίον ἓν μέρος, ἦτοι 1 τέταρτον τοῦ μήλου. Τὸ αὐτὸ πράττομεν καὶ διὰ τὰ δύο ἄλλα μῆλα δίδοντες εἰς ἕκαστον παιδίον ἀπὸ 1 τέταρτον ἀκόμη. Ὡστε ἕκαστον παιδίον θὰ λάβῃ τὸ ὅλον 3 τέταρτα τοῦ μήλου (διότι 1 τέταρτον καὶ 1 τέταρτον καὶ 1 τέταρτον κάμνουν 3 τέταρτα). Ἀλλὰ τὰ 3 μῆλα παριστῶσι τὸν διαιρετέον, τὰ 4 παιδιά τὸν διαιρέτην, τὸ δὲ μερίδιον ἑκάστου, ἦτοι τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ μήλου, παριστᾷ τὸ πηλίκον. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὴν ἑξῆς ιδιότητα.

102. *Πᾶν κλάσμα παριστᾷ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ του διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του.*

103. Διὰ τῶν κλασμάτων γίνεται τώρα ἡ διαίρεσις τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν πάντοτε τελεία, ἀρκεῖ νὰ γράψωμεν τὸν διαιρετέον ὡς ἀριθμητὴν καὶ τὸν διαιρέτην ὡς παρονομαστήν.

Παραδ. χάριν, ἐὰν ἔχωμεν νὰ μοιράσωμεν 7 δραχμὰς εἰς 2 ἀνθρώπους, ἕκαστος θὰ λάβῃ 3 δραχ. καὶ θὰ μείνῃ 1 δραχμὴ, ἦτοι ἡ διαίρεσις εἶναι ἀτελής. Διὰ τῶν κλασμάτων ὁμοῦς γίνεται ἡ διαίρεσις τελεία διότι τὸ πηλίκον τοῦ 7 διὰ 2 εἶναι κατὰ τὰ ἀνωτέρω $\frac{7}{2}$ ἢ $3\frac{1}{2}$. Τὸ ἀκριβὲς λοιπὸν πηλίκον σύγκειται, ὡς βλέπομεν, ἀπὸ τὸν ἀκέραιον 3, ὅστις δεικνύει ποσάκις ὁ διαιρέτης 2 χωρεῖ εἰς τὸν διαιρετέον 7, καὶ ἀπὸ τὸ κλάσμα $\frac{1}{2}$, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀριθμητὴν τὸ ὑπόλοιπον 1 τῆς διαιρέσεως καὶ παρονομαστήν τὸν διαιρέτην 2. Ὡστε δυνάμεθα εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν νὰ γράψωμεν τὸ ὑπόλοιπον (ἂν ὑπάρχῃ) ὡς ἀριθμητὴν καὶ τὸν διαιρέτην ὡς παρονομαστήν καὶ νὰ ἐνώσωμεν τὸ κλάσμα τοῦτο μὲ τὸ ἀκέραιον πηλίκον. Ἀρκεῖ μόνον νὰ τὸ ἐπιτρέπη ἡ φύσις τοῦ προβλήματος. Διότι ἂν ἔχωμεν π.χ. τὸ ἑξῆς πρόβλημα:

Πατὴρ τις εἶχεν 20 μῆλα καὶ ἔδωκεν εἰς ἕκαστον τέκνον του 3 μῆλα πόσα τέκνα εἶχεν ;

Εἶναι φανερόν, ὅτι εἶχε τόσα τέκνα, ὅσος φορὰς ὁ 3 χωρεῖ εἰς τὸν 20· διαιροῦμεν λοιπὸν τὸν 20 διὰ 3 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 6 καὶ ὑπόλοιπον 2. Ὡστε εἶχε 6 τέκνα καὶ τοῦ ἔμειναν 2 μῆλα· δὲν δυνάμεθα ὁμοῦς νὰ εἴπωμεν, ὅτι εἶχεν 6 τέκνα καὶ $\frac{2}{3}$ τοῦ τέκνου.

Σημ. Γνωρίζομεν, ὅτι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ἀκεραίου ἀριθμοῦ διὰ τῆς μονάδος 1 εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ ἀριθμὸς, ἦτοι εἶναι $5 : 1 = 5$. Ἀλλὰ τὸ πηλίκον δύο ἀκεραίων ἀριθμῶν δύναται, ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω,

νά παρασταθῆ καὶ ὡς κλάσμα· ὥστε εἶναι $\frac{5}{1} = 5$. Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι πᾶς ἀκέραιος ἀριθμὸς δύναται νὰ παρασταθῆ καὶ ὡς κλάσμα, ἀρκεῖ νὰ γράψωμεν αὐτὸν ὡς ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν τὴν μονάδα 1.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ γίνωσι τὰ κλάσματα $\frac{4}{9}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{5}{6}$ τρεῖς φορὰς μεγαλύτερα καὶ κατὰ τοὺς δύο τρόπους.

2) Νὰ γίνωσι τὰ κλάσματα $\frac{6}{7}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{8}{9}$ δύο φορὰς μικρότερα καὶ κατὰ τοὺς δύο τρόπους.

3) Νὰ τραπῆ τὸ κλάσμα $\frac{2}{3}$ εἰς ἄλλα ἰσοδύναμα κλάσματα ἔχοντα παρονομαστὰς 9, 15, 24.

4) Τὸ κλάσμα $\frac{1}{2}$ μὲ πόσα τέταρτα ἰσοδυναμεῖ ; Μὲ πόσα ὄγδοα ; Μὲ πόσα δέκατα ἕκτα ; Καὶ μὲ πόσα τριακοστὰ δεύτερα ;

Ἀπλοποιήσεις τῶν κλασμάτων.

104. Ἀπλοποιήσεις ἑνὸς κλάσματος λέγεται ἡ εὕρεσις ἄλλου κλάσματος ἔχοντος τὴν αὐτὴν ἀξίαν καὶ ὄρους μικροτέρους.

Διὰ νὰ ἀπλοποιηθῆ ἓν κλάσμα, ἦτοι νὰ γίνῃ ἀπλούστερον ἄλλου, χωρὶς ἡ ἀξία του νὰ μεταβληθῆ, πρέπει οἱ ὄροι του νὰ διαιρηθῶσι διὰ τοῦ κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν (ἂν ἔχωσιν, ἔκτος τῆς μονάδος)· διότι τότε θὰ προκύψῃ κλάσμα ἔχον ὄρους μικροτέρους τοῦ δοθέντος, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἀξίαν (ἐδάφ. 100).

Ἐστω, ὡς παράδειγμα τὸ κλάσμα $\frac{15}{20}$. Ἐπειδὴ οἱ ὄροι του ἔχουσι κοινὸν διαιρέτην τὸν 5, διαιροῦμεν αὐτοὺς διὰ 5 καὶ εὐρίσκομεν τὸ πρὸς αὐτὸ ἴσον κλάσμα $\frac{3}{4}$.

Ἐστω προσέτι τὸ κλάσμα $\frac{36}{48}$. Οἱ ὄροι του ἔχουσι κοινὸν διαιρέτα τὸς 2, 4, 6, 12· διαιροῦμεν λοιπὸν αὐτοὺς δι' ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, ἔστω διὰ τοῦ 2, καὶ εὐρίσκομεν τὸ πρὸς αὐτὸ ἴσον κλάσμα $\frac{18}{24}$. Ἀλλὰ καὶ τοῦτο δύναται νὰ ἀπλοποιηθῆ, διότι οἱ ὄροι του ἔχουσι κοινὸν διαιρέτα τὸς 2, 3, 6· διαιροῦμεν λοιπὸν αὐτοὺς δι' ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, ἔστω διὰ τοῦ 2, καὶ εὐρίσκομεν τὸ πρὸς αὐτὸ ἴσον $\frac{9}{12}$. Τούτου πάλιν οἱ

ὄροι ἔχουσι κοινὸν διαιρέτην τὸν 3· διαιροῦμεν λοιπὸν αὐτοὺς διὰ 3 καὶ εὐρίσκομεν τὸ κλάσμα $\frac{3}{4}$, τὸ ὁποῖον ἔχει τὴν αὐτὴν ἀξίαν πρὸς τὸ δοθὲν $\frac{36}{48}$.

Τὸ κλάσμα τώρα $\frac{3}{4}$ δὲν ἀπλοποιεῖται (διότι οἱ ὄροι του εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους), ἤτοι δὲν ἀνάγεται εἰς ἄλλο κλάσμα ἀπλούστερον αὐτοῦ, διὰ τοῦτο λέγεται **ἀνάγωγον**. Ὡστε ἀνάγωγον κλάσμα λέγεται ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου οἱ ὄροι εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐπομένως δὲν ἔχουσι κοινὸν διαιρέτην (ἐκτὸς τῆς μονάδος), καθὼς εἶναι τὰ $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{8}{15}$ κτλ.

Σημ. Ἡδυνάμεθα συντόμως, ἤτοι μὲ ὀλιγωτέρας διαιρέσεις, νὰ εὐρωμεν τὸ κλάσμα $\frac{3}{4}$, ἐὰν ἐλαμβάνομεν ἐκ τῶν κοινῶν διαιρετῶν, τοὺς ὁποίους ἔχουσιν οἱ ὄροι τοῦ κλάσματος $\frac{36}{48}$, τοὺς μεγαλυτέρους τοῦ 2. Ὡστε καλὸν εἶναι νὰ προτιμῶμεν ἐν τῇ ἀπλοποιήσει τοὺς μεγαλυτέρους γνωστοὺς κοινούς διαιρέτας. Δυνάμεθα καὶ διὰ μιᾶς μόνης διαιρέσεως νὰ εὐρωμεν τὸ ἴσον πρὸς τὸ δοθὲν κλάσμα καὶ ἔχον ὄρους πρῶτους πρὸς ἀλλήλους, ἐὰν διαιρέσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος διὰ τοῦ μεγίστου κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν.

Διὰ τῆς ἀπλοποιήσεως τῶν κλασμάτων προξενεῖται διπλῆ ὠφέλεια. 1ον) Λαμβάνομεν σαφεστέραν ἰδέαν τῶν κλασμάτων, ἤτοι ἐννοοῦμεν καλύτερον τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς παρὰ τὰ $\frac{36}{48}$ αὐτῆς. 2ον) Σμικρυνόμενων τῶν ὄρων τῶν κλασμάτων, εὐκολυνόμεθα πολὺ εἰς τὰς πράξεις αὐτῶν, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω.

Νὰ ἀπλοποιηθῶσι τὰ κλάσματα $\frac{4}{8}$, $\frac{5}{15}$, $\frac{8}{20}$, $\frac{16}{24}$, $\frac{420}{560}$.

Ὁμώνυμα καὶ ἑτερόνυμα κλάσματα.

105. Ὁμώνυμα κλάσματα λέγονται, ὅσα ἔχουσι τὸν αὐτὸν παρονομαστικὴν καὶ ἐπομένως γίνονται ἐκ τῆς αὐτῆς κλασματικῆς μονάδος διὰ τῆς ἐπαναλήψεως. Παρ. χάριν, τὰ κλάσματα $\frac{5}{7}$ καὶ $\frac{6}{7}$ εἶναι ὁμώνυμα καὶ γίνονται ἐκ τῆς κλασματικῆς μονάδος $\frac{1}{7}$ ἐπαναλαμβανομένης πολλάκις. Ὡσαύτως τὰ κλάσματα $\frac{2}{9}$, $\frac{5}{9}$ καὶ $\frac{7}{9}$ εἶναι ὁμώνυμα καὶ γίνονται ἐκ τῆς κλασματικῆς μονάδος $\frac{1}{9}$ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως.

Ἐτερόνυμα κλάσματα λέγονται, ὅσα δὲν ἔχουσι τὸν αὐτὸν παρονομαστὴν καὶ ἐπομένως δὲν γίνονται ἐκ τῆς αὐτῆς κλασματικῆς μονάδος. Π.χ. τὰ κλάσματα $\frac{6}{7}$ καὶ $\frac{3}{10}$ εἶναι ἐτερόνυμα· ὡσαύτως τὰ $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$ καὶ $\frac{3}{8}$.

Ἐροπὴ ἐτερονύμων κλασμάτων εἰς ὁμόνυμα.

106. Ἐὰν λάβωμεν κατὰ προῶτον δύο ἐτερόνυμα κλάσματα,

$$\frac{2}{3} \quad \text{καὶ} \quad \frac{4}{5}.$$

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος $\frac{2}{3}$ ἐπὶ τὸν παρονομαστὴν 5 τοῦ ἄλλου κλάσματος, προκύπτει τὸ κλάσμα $\frac{10}{15}$, τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ τὸ $\frac{2}{3}$ (κατὰ τὸ ἐδάφιον 100). Ἐὰν ἔπειτα πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος $\frac{4}{5}$ ἐπὶ τὸν παρονομαστὴν 3 τοῦ ἄλλου, προκύπτει τὸ κλάσμα $\frac{12}{15}$, τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ τὸ $\frac{4}{5}$ διὰ τὸν αὐτὸν λόγον.

Ἀντὶ λοιπὸν τῶν δοθέντων κλασμάτων $\frac{2}{3}$ καὶ $\frac{4}{5}$ δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὰ πρὸς αὐτὰ ἴσα $\frac{10}{15}$ καὶ $\frac{12}{15}$, τὰ ὁποῖα εἶναι τώρα ὁμόνυμα. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

107. **Διὰ νὰ τρέψωμεν δύο ἐτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμόνυμα, πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὄρους ἑκατέρου κλάσματος ἐπὶ τὸν παρονομαστὴν τοῦ ἄλλου.**

Ἐὰν λάβωμεν τώρα περισσότερα κλάσματα,

$$\frac{3}{4} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{6}{7}.$$

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ πρώτου κλάσματος $\frac{3}{4}$ ἐπὶ τὸ γινόμενον ὅλων τῶν ἄλλων παρονομαστῶν, ἤτοι ἐπὶ 5×7 ἢ 35, εὐρίσκομεν τὸ κλάσμα $\frac{3 \times 35}{4 \times 35}$ ἢ $\frac{105}{140}$, τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ τὸ $\frac{3}{4}$ (ἐδάφιον 100).

Ἐὰν ἔπειτα πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ δευτέρου κλάσματος $\frac{2}{5}$ ἐπὶ τὸ γινόμενον ὅλων τῶν ἄλλων παρονομαστῶν, ἤτοι

ἐπὶ 4×7 ἢ 28, εὐρίσκομεν τὸ κλάσμα $\frac{2 \times 28}{5 \times 28}$ ἢ $\frac{56}{140}$, τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ τὸ $\frac{2}{5}$.

Ἐὰν τέλος πολλαπλασιάσωμεν τοὺς ὄρους τοῦ τρίτου κλάσματος $\frac{6}{7}$ ἐπὶ τὸ γινόμενον ὄλων τῶν ἄλλων παρονομαστῶν, ἤτοι ἐπὶ 4×5 ἢ 20, εὐρίσκομεν τὸ κλάσμα $\frac{6 \times 20}{7 \times 20}$ ἢ $\frac{120}{140}$, τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ τὸ $\frac{6}{7}$.

Ἀντὶ λοιπὸν τῶν δοθέντων κλασμάτων δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὰ πρὸς αὐτὰ ἴσα $\frac{105}{140}$, $\frac{56}{140}$, $\frac{120}{140}$, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁμώνυμα καὶ πρέπει νὰ εἶναι τοιαῦτα, διότι συμβαίνει νὰ εἶναι πάντοτε κοινὸς παρονομαστὴς αὐτῶν τὸ γινόμενον ὄλων τῶν παρονομαστῶν.

Ἡ ἀνωτέρω πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς :

$$\begin{array}{r} \underline{35} \\ 3 \\ \hline 4 \\ \hline 105 \\ 140 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \underline{28} \\ 2 \\ \hline 5 \\ \hline 56 \\ 140 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \underline{20} \\ 6 \\ \hline 7 \\ \hline 120 \\ 140 \end{array}$$

ἤτοι γράφομεν ὑπεράνω ἐκάστου κλάσματος τὸ γινόμενον ὄλων τῶν ἄλλων παρονομαστῶν καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν μὲ αὐτὸ τοὺς ὄρους τοῦ ἀντιστοιχοῦντος κλάσματος. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

108. Διὰ νὰ τρέψωμεν τρία ἢ περισσότερα ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμώνυμα, πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὄρους ἐκάστου κλάσματος ἐπὶ τὸ γινόμενον ὄλων τῶν ἄλλων παρονομαστῶν.

Παρατήρησις. Εἶδομεν ἀνωτέρω, ὅτι ὁ κοινὸς παρονομαστὴς 140 εἶναι τὸ γινόμενον $4 \times 5 \times 7$ τῶν παρονομαστῶν καὶ ἐπομένως εἶναι διαιρετὸς δι' ἐκάστου ἐξ αὐτῶν. Οἱ δὲ ἀριθμοὶ 35, 28 καὶ 20, μὲ τοὺς ὁποίους ἐπολλαπλασιάσαμεν τοὺς ὄρους τῶν κλασμάτων καὶ ἐτρέψαμεν αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα, εἶναι τὰ πηλικά τῆς διαιρέσεως τοῦ 140 δι' ἐκάστου τῶν παρονομαστῶν (διότι εἶναι $140 : 4 = 35$, $140 : 5 = 28$, $140 : 7 = 20$). Τοῦτο λέγομεν καὶ διὰ τὸν κοινὸν παρονομαστὴν 15 τῶν δύο κλασμάτων τοῦ ἑδαφίου 106. Ὡστε πᾶς ἀριθμὸς διαιρετὸς δι' ἐκάστου τῶν παρονομαστῶν δύναται νὰ γίνῃ κοινὸς παρονομαστὴς τῶν δοθέντων κλασμάτων. Πολλάκις ὅμως εὐρίσκεται ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ γινομένου τῶν παρονομαστῶν καὶ διαιρετὸς δι' αὐτῶν· τότε αὐτὸν πρὸς εἰκόλιαν μας κάμνομεν κοινὸν παρονομαστὴν ἀκολουθοῦντες τὸν ἐξῆς τρόπον.

109. *Εύρισκομεν τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν παρονομασιῶν (κατὰ τὰ ἐδάφια 82 καὶ 83) καὶ διαιροῦμεν τοῦτο δι' ἐκάστου τῶν παρονομασιῶν· ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὄρους ἐκάστου κλάσματος μὲ τὸ εὐρεθὲν ἀντίστοιχον πηλίκον.*

Ἔστω, ὡς παράδειγμα, νὰ τραπῶσιν εἰς ὁμώνυμα τὰ ἑξῆς κλάσματα,

$$\frac{3}{4} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{7}{24} \quad \frac{1}{3}.$$

Ἐπειδὴ ἐνταῦθα ὁ μεγαλύτερος τῶν παρονομαστῶν, ἦτοι ὁ 24, διαιρεῖται ἀκριβῶς δι' ὄλων τῶν παρονομαστῶν, ἔπεται ὅτι οὗτος εἶναι τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον αὐτῶν (ἐδάφ. 82)· διαιροῦμεν λοιπὸν αὐτὸν διὰ τῶν παρονομασιῶν 4, 8, 24, 3 καὶ εὐρίσκομεν τὰ ἑξῆς κατὰ σειρὰν πηλίκα, 6, 3, 1, 8. Ἐκαστον τούτων γράφομεν ὑπεράνω τοῦ ἀντιστοίχου κλάσματος του καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν τοὺς ὄρους ἐκάστου κλάσματος μὲ τὸ ἀντίστοιχον πηλίκον.

Ἡ δὲ προᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς :

$$\begin{array}{cccc} \frac{6}{3} & \frac{3}{5} & \frac{1}{7} & \frac{8}{1} \\ \frac{3}{4} & \frac{5}{8} & \frac{7}{24} & \frac{1}{3} \\ 18 & 15 & 7 & 8 \\ \frac{18}{24} & \frac{15}{24} & \frac{7}{24} & \frac{8}{24} \end{array}$$

Οὕτω δὲ ἐτραπήσαν τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμώνυμα συντομώτερον παρὰ διὰ τοῦ κανόνος τοῦ ἐδαφίου 108. Συμβαίνει δὲ νὰ ἔχωσι τὸν αὐτὸν παρονομαστήν, διότι ὁ παρονομαστής ἐκάστου κλάσματος λαμβάνεται ὡς διαιρέτης καὶ ἐπομένως τὸ γινόμενον αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἀντίστοιχον πηλίκον πρέπει νὰ εἶναι ἴσον μὲ τὸν διαιρέτην 24.

Ἔστω προσέτι νὰ τραπῶσιν εἰς ὁμώνυμα τὰ ἑξῆς κλάσματα,

$$\frac{4}{5} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{5}{9} \quad \frac{4}{15}.$$

Τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν παρονομαστῶν εὐρίσκεται ὅτι εἶναι ὁ 90· τὰ δὲ πηλίκα τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ διὰ τῶν παρονομαστῶν 5, 6, 9 καὶ 15 εἶναι κατὰ σειρὰν τὰ ἑξῆς· 18, 15, 10 καὶ 6. Ὅστε ἔχομεν

$$\begin{array}{cccc} \frac{18}{4} & \frac{15}{1} & \frac{10}{5} & \frac{6}{4} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{6} & \frac{5}{9} & \frac{4}{15} \\ 72 & 15 & 50 & 24 \\ \frac{72}{90} & \frac{15}{90} & \frac{50}{90} & \frac{24}{90} \end{array}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω βλέπομεν, ὅτι οὐ μόνον τρέπονται τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα συντόμως εἰς ὁμόνυμα, ἀλλὰ καὶ λαμβάνομεν ταῦτα μὲ μικροτέρους ὄρους παρὰ διὰ τοῦ κανόνος τοῦ ἔδαφ. 108· τὸ τοιοῦτον μᾶς εὐκολύνει πολὺ εἰς τὰς πράξεις, ὡς θὰ ἴδωμεν.

Σημ. Καλὸν εἶναι πρὸς εὐκολίαν μας νὰ ἀπλοποιῶμεν πρῶτον, ὅσα τῶν κλασμάτων ἀπλοποιοῦνται, καὶ ἔπειτα νὰ τρέπωμεν αὐτὰ εἰς ὁμόνυμα.

110. Ἡ τροπὴ τῶν ἑτερονύμων κλασμάτων εἰς ὁμόνυμα χρησιμεύει 1ον) εἰς τὸ νὰ μάθωμεν ἕκ δύο ἢ περισσοτέρων κλασμάτων ποῖον εἶναι τὸ μεγαλύτερον ἢ τὸ μικρότερον· πρὸς τοῦτο τρέπομεν αὐτὰ εἰς ὁμόνυμα καὶ τὸ ἔχον μεγαλύτερον ἢ μικρότερον ἀριθμητὴν εἶναι προφανῶς καὶ τὸ μεγαλύτερον ἢ μικρότερον τῶν κλασμάτων. Ἐὰν ὁμως συμβῇ τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα νὰ ἔχουν τὸν αὐτὸν ἀριθμητὴν, τότε δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τραποῦν εἰς ὁμόνυμα· διότι μεγαλύτερον εἶναι τὸ ἔχον τὸν μικρότερον παρονομαστήν. Π. χ. ἕκ τῶν κλασμάτων $\frac{3}{4}$ καὶ $\frac{3}{10}$ τοῦ μήλου μεγαλύτερον εἶναι τὸ $\frac{3}{4}$ κατὰ μέγεθος· διότι τὸ μὲν κλάσμα $\frac{3}{4}$ σημαίνει ὅτι ἐκόψαμεν τὸ μῆλον εἰς 4 ἴσα μέρη καὶ ἐλάβομεν τὰ 3 μέρη· τὸ δὲ κλάσμα $\frac{3}{10}$ σημαίνει ὅτι ἐκόψαμεν τὸ αὐτὸ μῆλον εἰς 10 ἴσα μέρη καὶ ἐλάβομεν πάλιν 3 μέρη, ἀλλὰ τὰ πρῶτα μέρη εἶναι μεγαλύτερα τῶν δευτέρων μερῶν. 2ον) Χρησιμεύει εἰς τὴν πρόσθεσιν καὶ ἀφαιρέσιν τῶν κλασμάτων, ὡς θὰ ἴδωμεν.

Ἀσκήσεις.

Νὰ τραποῦν τὰ κατωτέρω ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμόνυμα καὶ κατὰ τοὺς δύο τρόπους, ἤτοι διὰ τῶν κανόνων τῶν ἔδαφίων 107 καὶ 108, καὶ διὰ τοῦ ἐλαχίστου κοινοῦ πολλαπλασίου τῶν παρονομαστῶν :

$$\frac{2}{3} \quad \frac{7}{9} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{5}{6}, \quad \frac{2}{3} \quad \frac{5}{12} \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{2} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{2}{3} \quad \frac{5}{9} \quad \frac{7}{18},$$

$$\frac{7}{10} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{1}{4} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{5}{6}, \quad \frac{2}{5} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{4}{15} \quad \frac{3}{4}.$$

Τρεῖς κληρονόμοι ἐμοίρασαν μίαν ἄμπελον, ὃ εἷς τούτων ἔλαβε τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτῆς, ὃ ἄλλος τὰ $\frac{7}{20}$ καὶ ὃ ἄλλος τὸ $\frac{1}{4}$. Ποῖος ἔλαβε περισσότερον καὶ ποῖος ὀλιγώτερον ;

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

1ον) **Πρόσθεσις κλασμάτων.**

111. Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἠγόρασε τις τὴν πρώτην φορὰν $\frac{3}{8}$ τῆς ὀκάς βουτύρου, τὴν δευτέραν φορὰν $\frac{5}{8}$ τῆς ὀκάς καὶ τὴν τρίτην φορὰν $\frac{7}{8}$, καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσον ἠγόρασε τὸ ὅλον.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τοῦτο, θὰ κάμωμεν πρόσθεσιν, ἤτοι $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} + \frac{7}{8}$. Ἄλλὰ 3 ὄγδοα + 5 ὄγδοα + 7 ὄγδοα κάμνουν 15 ὄγδοα (καθὼς π. χ. καὶ 3 μῆλα + 5 μῆλα + 7 μῆλα κάμνουν 15 μῆλα) ἢ $\frac{15}{8}$. Ὡστε εἶναι $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} + \frac{7}{8} = \frac{15}{8}$ ἢ $1 \frac{7}{8}$. Τὸ ἀγορασθὲν λοιπὸν βούτυρον ἦτο $1 \frac{7}{8}$ τῆς ὀκάς.

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

112. *Διὰ νὰ προσθέσωμεν ὁμώνυμα κλάσματα, προσθέτομεν τοὺς ἀριθμητὰς αὐτῶν καὶ τὸ ἄθροισμα γράφομεν ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ τὴν ἴδιον.*

Ἐὰν ὁμοῦς τὰ κλάσματα εἶναι ἑτερόνυμα, τρέπομεν πρῶτον αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα καὶ ἔπειτα προσθέτομεν, ὡς ἀνωτέρω. Διότι, καθὼς δὲν δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν ἑτεροειδεῖς ἀριθμούς, π. χ. 3 μῆλα καὶ 5 πρόβατα, οὕτω δὲν δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν καὶ ἑτερόνυμα κλάσματα.

Ὑποθέσωμεν, ὅτι πρόκειται νὰ εὔρωμεν τὸ ἄθροισμα τῶν ἐξῆς ἑτερονύμων κλασμάτων,

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{6} + \frac{7}{12}.$$

Τρέπομεν πρῶτον αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα (ἔχοντες ὑπ' ὄψει, ὅτι τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν παρονομαστῶν εἶναι ὁ 12) καὶ εὐρίσκομεν τὰ πρὸς αὐτὰ ἴσα $\frac{8}{12} + \frac{10}{12} + \frac{7}{12}$, τῶν ὁποίων τὸ ἄθροισμα εἶναι $\frac{25}{12}$ ἢ $2 \frac{1}{12}$. Ὡστε εἶναι

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{6} + \frac{7}{12} = \frac{8}{12} + \frac{10}{12} + \frac{7}{12} = \frac{25}{12} = 2 \frac{1}{12}.$$

2ον) **Πρόσθεσις μικτῶν ἀριθμῶν.**

113. Ὑποθέσωμεν, ὅτι παιδίον τι ἔχει $3 \frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς, ἄλλο δὲ

παιδίον ἔχει $4\frac{1}{4}$ τῆς δραχμῆς, καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσας δραχμὰς ἔχουν καὶ τὰ δύο παιδιά.

Κατὰ πρῶτον προσθέτομεν τὰς δραχμὰς καὶ εὐρίσκομεν $3+4$ ἢ 7 δραχμὰς· κατόπιν προσθέτομεν τὰ μέρη τῆς δραχμῆς καὶ εὐρίσκομεν $\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{8}{20} + \frac{5}{20} = \frac{13}{20}$. Τὰ δύο λοιπὸν παιδιά ἔχουν 7 δραχμ. καὶ $\frac{13}{20}$ τῆς δραχμῆς ἢ $7\frac{13}{20}$. Ὡστε εἶναι

$$3\frac{2}{5} + 4\frac{1}{4} = 7\frac{13}{20}.$$

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

114. *Διὰ νὰ προσθέσωμεν μικτοὺς ἀριθμοὺς, προσθέτομεν χωριστὰ τοὺς ἀκεραίους καὶ χωριστὰ τὰ κλάσματα καὶ ἔπειτα ἐνώνομεν τὰ δύο ἀθροίσματα.*

Σημ. Δυνάμεθα καὶ νὰ τρέψωμεν τοὺς μικτοὺς εἰς κλάσματα καὶ ἔπειτα νὰ προσθέσωμεν, ἀλλ' εἶναι εὐκολώτερον νὰ προσθέτωμεν ὡς ἀνωτέρω.

Διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ ἄθροισμα $2\frac{4}{9} + 8$, εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα τῶν ἀκεραίων, τὸ ὁποῖον εἶναι 10, καὶ ἐνώνομεν αὐτὸ μὲ τὸ κλάσμα $\frac{4}{9}$ τοῦ μικτοῦ, ἥτοι εἶναι $2\frac{4}{9} + 8 = 10\frac{4}{9}$. Ὡσαύτως, διὰ νὰ εὔρω-

μεν τὸ ἄθροισμα $4\frac{2}{5} + \frac{3}{4}$, εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα τῶν κλασμάτων, τὸ ὁποῖον εἶναι $\frac{2}{5} + \frac{3}{4} = \frac{8}{20} + \frac{15}{20} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}$ καὶ ἐνώνομεν αὐτὸ μὲ τὸν ἀκέραιον 4 τοῦ μικτοῦ, ἥτοι εἶναι $4\frac{2}{5} + \frac{3}{4} = 4 + 1\frac{3}{20} = 5\frac{3}{20}$.

Ἐστὼ προσέτι νὰ εὐρεθῇ τὸ ἐξῆς ἄθροισμα,

$$2\frac{3}{5} + 3\frac{1}{2} + 4\frac{2}{3} + 6.$$

Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀκεραίων εἶναι $2+3+4+6=15$,

τὸ δὲ ἄθροισμα τῶν κλασμάτων εἶναι

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{18}{30} + \frac{15}{30} + \frac{20}{30} = \frac{53}{30} = 1\frac{23}{30}. \quad \text{Ὡστε εἶναι}$$

$$2\frac{3}{5} + 3\frac{1}{2} + 4\frac{2}{3} + 6 = 15 + 1\frac{23}{30} = 16\frac{23}{30}.$$

Ἀσκήσεις.

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{6} + \frac{7}{12} \left(= 2\frac{1}{12} \right), \quad \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{4}{15} \left(= 1\frac{31}{60} \right), \quad \frac{5}{6} + \frac{1}{12} + \frac{4}{7} + \frac{2}{3}$$

$$\left(= 2\frac{13}{84} \right), 2\frac{3}{4} + 5\frac{1}{7} \left(= 2\frac{25}{28} \right), 5\frac{2}{7} + \frac{1}{3} \left(= 5\frac{13}{21} \right).$$

$$3\frac{2}{5} + 5\frac{1}{3} + \frac{7}{10} \left(= 9\frac{13}{30} \right), \frac{2}{3} + 5\frac{3}{4} + 2\frac{7}{12} + 6 \left(= 15 \right)$$

Σημ. Ἡ ιδιότης τῆς προσθέσεως (ἐδάφ. 23) ἐφαρμόζεται καὶ εἰς τὰ κλάσματα. Ἐπίσης ὁ ὀρισμὸς τῆς προσθέσεως τῶν ἀκεραίων (ἐδάφ. 21) εἶναι καὶ εἰς τὰ κλάσματα ὁ αὐτός, μὲ τὴν παρατήρησιν ὅμως ὅτι ἐδῶ δύνανται νὰ εἶναι αἱ μονάδες ἢ κλασματικαὶ μόνον ἢ ἀκεραῖαι καὶ κλασματικαί.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Παντοπώλης τις ἐπώλησεν εἷς τινα $\frac{2}{5}$ τῆς ὀκαῦς βουτύρου, εἰς ἄλλον $\frac{1}{4}$ τῆς ὀκαῦς καὶ εἰς ἄλλον $\frac{7}{8}$ τῆς ὀκαῦς. Πόσον ἐπώλησε καὶ εἰς τοὺς τρεῖς ; $\left(1\frac{21}{40} \text{ τῆς ὀκαῦς} \right)$

2) Παιδίον τι ἔδωκε $3\frac{7}{10}$ τῆς δραχμῆς διὰ νὰ ἀγοράσῃ ἓν βιβλίον καὶ 2 δρ. διὰ νὰ ἀγοράσῃ τετράδιον· πόσον ἔδωκε τὸ ὅλον ; $\left(5\frac{7}{10} \text{ τῆς δραχ.} \right)$

3) Ὁ πῆχυς ἐνὸς ὑφάσματος κοστίζει εἰς ἔμπορον $2\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς· πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸν πῆχυν αὐτοῦ διὰ νὰ κερδίσῃ ἀπὸ κάθε πῆχυν $\frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς ; $\left(3\frac{3}{20} \text{ τῆς δρ.} \right)$

4) Γυνή τις ἔδωκε $19\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς διὰ νὰ ἀγοράσῃ ἓν ὑφασμα· μετὰ παρατήρησεν, ὅτι τῆς ἔμειναν $8\frac{1}{2}$ τῆς δραχμῆς. Πόσας δραχμὰς εἶχεν ἀπ' ἀρχῆς ; $\left(28\frac{1}{4} \text{ τῆς δρ.} \right)$

Ἐμπορός τις ἐπώλησεν ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος τὴν πρώτην φορὰν $10\frac{1}{2}$ τοῦ πήχεως, τὴν δευτέραν φορὰν $8\frac{3}{4}$ καὶ τὴν τρίτην φορὰν 9 πήχεις· ἔμειναν δὲ καὶ εἰς αὐτὸν $10\frac{1}{3}$ τοῦ πήχεως. Πόσων πήχεων ἦτο τὸ ὑφασμα ; $\left(38\frac{7}{12} \text{ τοῦ πηχ.} \right)$

ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ

1ον) Ἀφαιρέσεις κλασμάτων.

115. Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἔχει τις $\frac{9}{10}$ τῆς δραχμῆς καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσα θὰ τοῦ μείνουν, ἐὰν δώσῃ εἰς τινα τὰ $\frac{6}{10}$ τῆς δραχμῆς.

Διὰ νὰ εὗρωμεν τοῦτο, θὰ κάμωμεν ἀφαιρέσιν, ἥτοι $\frac{9}{10} - \frac{6}{10}$. Ἀλλὰ 6 δέκατα ἀπὸ 9 δέκατα μένουν 3 δέκατα (καθὼς π. χ. καὶ 6 μῆλα ἀπὸ 9 μῆλα μένουν 3 μῆλα). Ὅτε εἶναι

$$\frac{9}{10} - \frac{6}{10} = \frac{3}{10}.$$

Θὰ τοῦ μείνουν λοιπὸν τὰ $\frac{3}{10}$ τῆς δραχμῆς.

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

116. *Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν δύο κλάσματα ὁμώνυμα, ἀφαιροῦμεν τοὺς ἀριθμητὰς αὐτῶν καὶ τὴν διαφορὰν γράφομεν ἀριθμητήν, παρονομαστήν δὲ τὸν ἴδιον.*

Ἐὰν ὁμως τὰ κλάσματα εἶναι ἑτερόνυμα, τρέπομεν πρῶτον αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα καὶ ἔπειτα ἀφαιροῦμεν, ὡς ἄνωτέρω.

Ἐστω π. χ. νὰ εὗρεθῇ ἡ διαφορὰ τῶν κλασμάτων $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$.

Τρέπομεν πρῶτον αὐτὰ εἰς ὁμώνυμα καὶ εὐρίσκομεν $\frac{15}{20} - \frac{8}{20}$, τῶν

ὁποίων ἡ διαφορὰ εἶναι $\frac{7}{20}$. Ὅστε εἶναι

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}.$$

2ον) Ἀφαιρέσεις μικτῶν ἀριθμῶν.

117. Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἔχει τις $7\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσαι δραχ. θὰ τοῦ μείνουν, ἐὰν δώσῃ δι' ἀγορὰν πράγματός τινοῦ $3\frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς.

Κατὰ πρῶτον ἀφαιροῦμεν τὰς 3 δραχμάς ἀπὸ τὰς 7 δραχμάς, ὅτε μένουν 4 δραχμαί· κατόπιν ἀφαιροῦμεν τὰ $\frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς ἀπὸ τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς καὶ εὐρίσκομεν ὅτι μένουν $\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}$ τῆς

δραχμῆς. Ὡστε τοῦ ἔμειναν ἐν ὄλῳ 4 δραχμαὶ καὶ $\frac{7}{20}$ τῆς δραχμῆς ἢ $4\frac{7}{20}$ τῆς δραχμῆς.

Ἡ πράξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

$$7\frac{3}{4} - 3\frac{2}{5} = 4\frac{15}{20} - \frac{8}{20} = 4\frac{7}{20}.$$

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

118. *Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν μικτὸν ἀπὸ μικτόν, ἀφαιροῦμεν χωριστὰ τὸν ἀκέραιον ἀπὸ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ τὸ κλάσμα ἀπὸ τὸ κλάσμα τοῦ μειωτέου καὶ ἔπειτα ἐνώνομεν τὰς δύο διαφοράς.*

Σημ. Δυνάμεθα καὶ νὰ τρέψωμεν τοὺς μικτοὺς εἰς κλάσματα καὶ ἔπειτα νὰ ἀφαιρέσωμεν, ἀλλ' εἶναι εὐκολώτερον νὰ ἀφαιρῶμεν ὡς ἄνωτέρω.

119. Ἐὰν συμβῆ τὸ κλάσμα τοῦ ἀφαιρετέου νὰ μὴ ἀφαιρῆται ἀπὸ τὸ κλάσμα τοῦ μειωτέου, λαμβάνομεν ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει μίαν μονάδα ἀπὸ τὴν εὐρεθεῖσαν διαφορὰν τῶν ἀκεραίων καὶ τρέπομεν αὐτὴν εἰς κλάσμα ὁμώνυμον, τὸ ὁποῖον προσθέτομεν εἰς τὸ κλάσμα τοῦ μειωτέου, καὶ ἔπειτα ἀφαιροῦμεν, ὡς ἄνωτέρω.

Ἐστω π. χ. νὰ εὐρεθῇ ἡ διαφορὰ

$$7\frac{2}{5} - 3\frac{3}{4}.$$

Ἡ διαφορὰ τῶν ἀκεραίων εἶναι $7-3$, ἥτοι 4, ἡ δὲ διαφορὰ τῶν κλασμάτων εἶναι $\frac{2}{5} - \frac{3}{4} = \frac{8}{20} - \frac{15}{20}$. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ κλάσμα $\frac{15}{20}$ δὲν ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὸ κλάσμα $\frac{8}{20}$, διὰ τοῦτο λαμβάνομεν μίαν μονάδα ἀπὸ τὴν διαφορὰν 4 τῶν ἀκεραίων, ὅτε μένουσιν 3, καὶ τρέπομεν αὐτὴν εἰς κλάσμα ὁμώνυμον, ἥτοι εἰς $\frac{20}{20}$. τοῦτο προσθέτομεν εἰς τὸ κλάσμα $\frac{8}{20}$ τοῦ μειωτέου καὶ εὐρίσκομεν $\frac{28}{20}$. Ἐπειτα ἀφαιροῦμεν τὸ κλάσμα $\frac{15}{20}$ ἀπὸ τὸ κλάσμα $\frac{28}{20}$ καὶ εὐρίσκομεν $\frac{13}{20}$. Ὡστε ἡ διαφορὰ τῶν μικτῶν εἶναι $3\frac{13}{20}$, ἡ δὲ πράξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

$$7\frac{2}{5} - 3\frac{3}{4} = 4\frac{8}{20} - \frac{15}{20} = 3\frac{28}{20} - \frac{15}{20} = 3\frac{13}{20}.$$

Παραδείγματα μερικῶν περιπτώσεων.

$$7\frac{2}{3} - 4 = 3\frac{2}{3}$$

$$2 \frac{4}{5} - \frac{2}{3} = 2 \frac{12}{15} - \frac{10}{15} = 2 \frac{2}{15}$$

$$5 \frac{1}{2} - \frac{3}{5} = 5 \frac{5}{10} - \frac{6}{10} = 4 \frac{15}{10} - \frac{6}{10} = 4 \frac{9}{10}$$

Διὰ τὸ ἀφαιρέσωμεν μικτὸν ἢ κλάσμα ἀπὸ ἀκέραιον, λαμβάνομεν μίαν μονάδα ἀπὸ τὸν ἀκέραιον τοῦ μειωτέου καὶ τρέπομεν αὐτὴν εἰς κλάσμα ὁμώνυμον μὲ τὸ κλάσμα τοῦ ἀφαιρετέου καὶ ἔπειτα ἀφαιροῦμεν, ὡς ἀνωτέρω.

Παραδ. χάριν.

$$9 - 5 \frac{4}{7} = 8 \frac{7}{7} - 5 \frac{4}{7} = 3 \frac{3}{7}$$

$$5 - \frac{2}{3} = 4 \frac{3}{3} - \frac{2}{3} = 4 \frac{1}{3}$$

Εἰς τὸ τελευταῖον παράδειγμα δυνάμεθα καὶ νὰ τρέψωμεν τὸν ἀκέραιον εἰς κλάσμα ὁμώνυμον μὲ τὸ κλάσμα τοῦ ἀφαιρετέου καὶ ἔπειτα νὰ ἀφαιρέσωμεν. Ἦτοι

$$5 - \frac{2}{3} = \frac{15}{3} - \frac{2}{3} = \frac{13}{3} = 4 \frac{1}{3}$$

ἄλλ' ὁ ἀνωτέρω τρόπος εἶναι συντομώτερος.

Ἐσκήσεις.

$$\frac{7}{8} - \frac{2}{5} \left(= \frac{19}{40} \right), \quad \frac{5}{7} - \frac{2}{9} \left(= \frac{31}{63} \right), \quad 5 \frac{3}{4} - 2 \left(= 3 \frac{3}{4} \right),$$

$$6 \frac{3}{4} - \frac{2}{3} \left(= 6 \frac{1}{12} \right), \quad 8 \frac{2}{5} - \frac{5}{7} \left(= 7 \frac{24}{35} \right), \quad 6 - \frac{2}{9} \left(= 5 \frac{7}{9} \right),$$

$$10 - 2 \frac{5}{8} \left(= 7 \frac{3}{8} \right), \quad 6 \frac{4}{5} - 2 \frac{4}{7} \left(= 4 \frac{8}{35} \right), \quad 5 \frac{2}{3} - 2 \frac{4}{5} \left(= 2 \frac{13}{15} \right)$$

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Παντοπώλης τις ἐπώλησεν εἰς τινὰ $\frac{3}{8}$ τῆς ὀκτῆς βουτύρου, εἰς ἄλλον δὲ $\frac{2}{5}$ τῆς ὀκτῆς· εἰς ποῖον ἐπώλησε περισσότερον καὶ κατὰ πόσον;

(εἰς τὸν β' κατὰ $\frac{1}{40}$ τῆς ὀκτῆς)

2) Γυνή τις εἶχε μαζί της 5 δραχμὰς καὶ ἔξ αὐτῶν ἔδωκεν εἰς μίαν πτωχὴν $\frac{3}{20}$ τῆς δραχμῆς. Πόσαι δραχμαὶ τῆς ἔμειναν; $\left(4 \frac{17}{20} \text{ δρ.} \right)$

3) Ἀπὸ τινὰ παντοπώλην ἠγόρασέ τις διάφορα πράγματα ἀξίας $16 \frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς καὶ ἔδωκεν ἓν εἰκοσιπεντάδραχμον. Πόσας δραχμὰς ἔλαβεν ὑπόλοιπον;

$\left(8 \frac{3}{5} \text{ δρ.} \right)$

4) Ἐὰν δώσωμεν εἰς ἓν παιδίον τὸ $\frac{1}{4}$ ἐνὸς μήλου, εἰς ἄλλο δὲ παι-
 ν δώσωμεν τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτοῦ, πόσον μέρος τοῦ μήλου θὰ μᾶς μείνη ;

$$\left(\tauὰ \frac{7}{20} \right)$$

5) Ἐμπορὸς τις πωλεῖ τὸν πῆχυν ἐνὸς ὑφάσματος πρὸς $8 \frac{1}{5}$ τῆς
 καὶ κερδίζει ἀπὸ κάθε πῆχυν $1 \frac{1}{2}$ τῆς δραχμῆς. Πόσον τοῦ κοστίζει
 τῆχυν ;

$$\left(6 \frac{7}{10} \text{ τῆς δρ.} \right)$$

6) Καλάθιον περιέχον μῆλα ζυγίζει $5 \frac{1}{4}$ τῆς ὀκάς, κενὸν ζυγίζει
 τῆς ὀκάς. Πόσας ὀκάδας μῆλων περιέχει ;

$$\left(4 \frac{7}{10} \right)$$

7) Παντοπώλης τις εἶχεν $20 \frac{1}{2}$ τῆς ὀκάς καφέ· ἔξ αὐτοῦ ἐπώλησεν
 τινα $\frac{3}{8}$ τῆς ὀκάς, εἰς ἄλλον $\frac{1}{4}$ τῆς ὀκάς καὶ εἰς ἄλλον $\frac{3}{10}$ τῆς ὀκάς.
 ὅσαι ὀκάδες τοῦ ἔμειναν ;

$$\left(19 \frac{23}{40} \right)$$

8) Ἠγόρασέ τις ἀπὸ τινα παντοπώλην τὰ ἐξῆς πράγματα· βούτυρον
 ας 17 δραχμῶν, ζάχαριν ἀξίας $8 \frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς, ἔλαιον ἀξίας
 $\frac{1}{2}$ δρ. καὶ σάπωνα ἀξίας $15 \frac{1}{10}$ τῆς δρ. καὶ ἔδωκε δύο εἰκοσιπεν-
 δραχμα. Πόσον ἔλαβεν ὑπόλοιπον ;

(τίποτε).

9) Ἀμαξοστοιχία τις ἀνεχώρησεν ἀπὸ μιᾶς πόλεως ὥραν $7 \frac{1}{2}$ πρὸ
 μεσημβρίας καὶ ἔφθασεν εἰς ἄλλην πόλιν μετὰ $8 \frac{2}{3}$ τῆς ὥρας. Ποίαν
 ἀν ἔφθασεν ;

$$\left(4 \frac{1}{6} \text{ μ. μ.} \right)$$

10) Παιδίον τι ἐγεννήθη ὥραν $4 \frac{3}{4}$ πρὸ μεσημβρίας καὶ ἀπέθανεν
 ἡμέρας $9 \frac{1}{2}$ μετὰ μεσημβρίαν τῆς ἐπομένης ἡμέρας. Πόσας ὥρας
 ἔζησεν ;

$$\left(40 \frac{3}{4} \right)$$

11) Ἠγόρασέ τις αὐτὰ τὴν μὲν πρώτην φορὰν πρὸς 50 λεπτὰ τὰ
 ἑξῆς, τὴν δὲ δευτέραν φορὰν πρὸς 35 λεπτὰ τὰ δύο. Πότε ἠγόρασεν
 ἄλλοτερον καὶ κατὰ πόσον ;

(τὴν β' φορὰν κατὰ $\frac{5}{6}$ τοῦ λεπτοῦ περισσότερον τὸ καθὲν)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

1ον) Πολλαπλασιασμός κλάσματος ἢ μικτοῦ ἐπὶ ἀκεραίου.

1ον) Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἡ ὀκτὼ ἐνὸς πράγματος ἀξίζει $\frac{2}{9}$ τῆς δραχμῆς καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσον ἀξίζουν αἱ 3 ὀκτάδες.

Διὰ νὰ εὗρωμεν τοῦτο, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς. Ἀφοῦ ἡ 1 ὀκτὼ ἀξίζει $\frac{2}{9}$ τῆς δραχμῆς, αἱ 3 ὀκτάδες ἀξίζουν 3 φορὰς τὰ $\frac{2}{9}$ τῆς δραχμῆς, ἢ

$$\frac{2}{9} \times 3 = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{6}{9} \text{ ἢ } \frac{2}{3} \text{ τῆς δραχμῆς (ἀπλοποιούμεν)}$$

Ἀλλὰ τὸ κλάσμα $\frac{2}{3}$ προκύπτει καὶ ἐκ τοῦ κλάσματος $\frac{2}{9}$, διαιρέσωμεν τὸν παρονομαστὴν αὐτοῦ 9 διὰ τοῦ πολλαπλασιαστοῦ ἤτοι εἶναι $\frac{2}{9} \times 3 = \frac{2}{9:3} = \frac{2}{3}$.

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

120. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἐπὶ ἀκεραίου, λαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος ἐπὶ τὸν ἀκεραῖον καὶ τὸ γινόμενον γράφομεν ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ ἴδιον, ἢ διαιροῦμεν τὸν παρονομαστὴν διὰ τοῦ ἀκεραίου εἶναι διαιρετός).

Σημ. Τοῦτο ἐδείξαμεν καὶ ἐν τοῖς ἑδαφίοις 96 καὶ 97.

Ὡσαύτως εἶναι $\frac{7}{8} \times 8 = \frac{7 \times 8}{8} = 7$ (μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν).

Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι

Πᾶν κλάσμα πολλαπλασιάζομενον ἐπὶ τὸν παρονομαστὴν δίδει γινόμενον τὸν ἀριθμητὴν του.

2ον) Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἡ ὀκτὼ ἐνὸς πράγματος ἀξίζει $4\frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν, πόσον ἀξίζουν αἱ δύο ὀκτάδες.

Ἀφοῦ ἡ 1 ὀκτὼ ἀξίζει $4\frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς, αἱ δύο ὀκτάδες ἀξίζουν 2 φορὰς τὰς $4\frac{2}{5}$ δραχμῆς, ἤτοι $4\frac{2}{5} \times 2$. Ἐπειδὴ ὁ μικτὸς ἀριθμὸς ἄθροισμα ἀκεραίου καὶ κλάσματος (ἑδάφ. 91), διὰ τοῦτο πολλαπλασιάζομεν χωριστὰ τὰ μέρη του (ἤτοι χωριστὰ τὸν ἀκεραῖον καὶ χωριστὰ τὸ κλάσμα) καὶ ἔπειτα προσθέτομεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα (ἑδ.

Ἦτοι

$$4\frac{2}{5} \times 2 = 4 \times 2 + \frac{2}{5} \times 2 = 8 + \frac{4}{5} \text{ ἢ } 8\frac{4}{5}.$$

Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον θὰ εὕρωμεν καὶ ἂν τρέψωμεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάσωμεν, ὡς ἀνωτέρω (ἐδ. 120). Ἦτοι

$$4\frac{2}{5} \times 2 = \frac{22}{5} \times 2 = \frac{44}{5} = 8\frac{4}{5}.$$

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

121. *Διὰ τὸ νὰ πολλαπλασιάσωμεν μικτὸν ἀριθμὸν ἐπὶ ἀκεραῖον, πολλαπλασιάζομεν ἕκαστον μέρος τοῦ μικτοῦ χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἀκεραῖον καὶ ἔπειτα προσθέντομεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα, ἢ τρέψωμεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν.*

2ον) **Πολλαπλασιασμὸς ἀκεραίου ἢ κλάσματος ἐπὶ κλάσμα.**

122. Ὑποθέσωμεν πρῶτον, ὅτι ὁ πῆχυς ἑνὸς ὑφάσματος ἀξίζει 7 δραχμὰς καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσον ἀξίζουν οἱ 3 πῆχεις.

Εἶναι φανερόν, ὅτι πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰς 7 δραχμὰς ἐπὶ ἧτοι 7×3 ἢ 21 δραχ. Ἐὰν τώρα ἐν τῷ γινομένῳ 7×3 ἀλλάξωμεν τὸν ἀριθμὸν 3 καὶ θέσωμεν εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἄλλου ἀριθμοῦ μεγαλύ-
ρον ἢ μικρότερον αὐτοῦ, πάλιν πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰς 7 δραχ. ἐπὶ τὸν νέον τοῦτον ἀριθμὸν, διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ζητούμενον, πρᾶξις δηλ. δὲν πρέπει νὰ μεταβληθῇ. Ὡστε ἐὰν ἔχωμεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα:

1ον) Ὁ πῆχυς ἑνὸς ὑφάσματος ἀξίζει 7 δραχμὰς· πόσον ἀξίζουν τὰ τοῦ πῆχεως ;

Πρέπει πάλιν νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰς 7 δραχ. ἐπὶ $\frac{3}{8}$, ἧτοι $7 \times \frac{3}{8}$ · διότι μόνον ὁ ἀριθμὸς τῶν πῆχεων ἠλλάξε. Μένει τώρα νὰ ἴδωμεν, πῶς θὰ γίνῃ ὁ πολλαπλασιασμὸς τοῦ ἀκεραίου 7 ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{3}{8}$, καὶ νὰ εὕρεθῇ ἡ ἀξία τῶν $\frac{3}{8}$ τοῦ πῆχεως. Ἀλλὰ τὴν ἀξίαν τῶν $\frac{3}{8}$ τοῦ πῆχεως εὐρίσκομεν ὡς ἐξῆς:

Κατὰ πρῶτον εὐρίσκομεν πόσον ἀξίζει τὸ 1 ὄγδοον τοῦ πῆχεως καὶ ἔπειτα πόσον ἀξίζουν τὰ 3 ὄγδοα αὐτοῦ. Ἀλλὰ διὰ νὰ εὕρωμεν πόσον ἀξίζει τὸ 1 ὄγδοον, ἧτοι τὸ 1 ρούπιον (διότι ὁ πῆχυς ἔχει 8 ρούπια), πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὰς 7 δραχμὰς διὰ 8, ἧτοι $7 : 8$, ἀλλὰ τὸ πηλίκον τοῦτο νὰ γράψωμεν νὰ τὸ παραστήσωμεν καὶ ὡς κλάσμα, ἧτοι $\frac{7}{8}$ (ἐδάφ. 102).

Ἐποὺ λοιπὸν τὸ 1 ὄγδοον τοῦ πήχεως ἀξίζει $\frac{7}{8}$ τῆς δραχμῆς, τὰ ὄγδοα, ἦτοι τὰ 3 ρούπια, θὰ ἀξίζουσι 3 φορὰς περισσότερον, ἢ $\frac{7 \times 3}{8}$ (ἐδ. 96) ἢ $\frac{21}{8}$ τῆς δραχμῆς. Ἡ ἀξία λοιπὸν τῶν $\frac{3}{8}$ τοῦ πήχεως εἶναι ὡς ἑξῆς.

$$7 \times \frac{3}{8} = \frac{7 \times 3}{8} = \frac{21}{8}.$$

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

123. *Διὰ τὰ πολλπλασιασώμεν ἀκέραιον ἐπὶ κλάσμα πολλπλασιαζόμεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος καὶ τὸ γινόμενον γράφομεν ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν.*

Σημ. Ὅταν ὁ πολλπλασιαστής εἶναι οἰαδήποτε κλασματικὴ μὲν ἀξία, τότε ὁ πολλπλασιασμός κατανατᾷ εἰς τὴν διαίρεσιν τοῦ ἀκεραίου διὰ τοῦ παρονομαστοῦ. Π. χ. εἶναι $6 \times \frac{1}{3} = \frac{6}{3} = 2$.

Εἰς τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα πολλπλασιαστέος εἶναι αἱ 7 δραχμαί, ἦτοι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος (δηλ. τοῦ ἑνὸς πήχεως), καὶ πολλπλασιαστής τὸ κλάσμα $\frac{3}{8}$, ἦτοι μέρος τῆς μονάδος. Εἶδομεν δέ, ἐκ τῆς λύσεως, ὅτι τὸ γινόμενον εἶναι ὡς ἑξῆς. Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος ἐκάμαμεν δύο πράξεις, πρῶτον διαίρεσιν καὶ ἔπειτα πολλπλασιασμόν. Τὰς δύο λοιπὸν ταύτας πράξεις θὰ τὴν ὀνομάζωμεν μετὰ ὄνομα *πολλπλασιασμόν*, διὰ τὰ διατηρηθῆναι τὸν ὄνομα τῶν τοῦ πολλπλασιασμοῦ (ἐδάφ. 46) καὶ ὅταν ὁ πολλπλασιαστής εἶναι κλάσμα. Διὰ τοῦτο δὲ γενικεύομεν τὸν κανόνα ἐκεῖνον τοῦ πολλπλασιασμοῦ ὡς ἑξῆς.

124. *Ὅταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος καὶ θέλωμεν εὑρωμεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων (ὁμοειδῶν) ἢ μέρους τῆς μονάδος κάμνομεν πολλπλασιασμόν.*

Σημ. Πολλπλασιαστέος εἶναι πάντοτε ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ πολλπλασιαστής [ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων ἢ τοῦ μέρους αὐτῆς].

2ον) Ἡ ὁκᾶ ἑνὸς πράγματος ἀξίζει $\frac{7}{10}$ τῆς δραχμῆς. Πόσον ἀξίζουσι τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς ὁκᾶς ;

Γνωρίζομεν εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος (ἦτοι τοῦ ὁκᾶς) καὶ θέλομεν εὑρωμεν τὴν τιμὴν μέρους τῆς μονάδος (ἦτοι τοῦ $\frac{3}{4}$ τῆς ὁκᾶς), διὰ τοῦτο κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα πρέπει νὰ κάμωμεν πολλπλασιασμόν, ἦτοι $\frac{7}{10} \times \frac{3}{4}$. Μένει τώρα νὰ ἴδωμεν, πῶς θὰ γίνῃ.

ὁ πολλαπλασιασμός οὗτος, διὰ τὸ εὐρεθῆναι ἢ ἀξία τῶν $\frac{3}{4}$ τῆς ὀκάς.
 Ἄλλὰ τὴν ἀξίαν ταύτην εὐρίσκομεν, ὅπως καὶ εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα, ἥτοι εὐρίσκομεν πρῶτον πόσον ἀξίζει τὸ 1 τέταρτον τῆς ὀκάς καὶ ἔπειτα πόσον ἀξίζουν τὰ 3 τέταρτα αὐτῆς.

Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ 1 ὀκά ἀξίζει $\frac{7}{10}$ τῆς δραχμῆς, τὸ 1 τέταρτον, τὸ ὁποῖον εἶναι 4 φορὰς ὀλιγώτερον τῆς μιᾶς ὀκάς, θὰ ἀξίῃ καὶ 4 φορὰς ὀλιγώτερον τῶν $\frac{7}{10}$ τῆς δραχμῆς, ἥτοι $\frac{7}{10 \times 4}$ (ἐδάφ. 97), καὶ τὰ 3 τέταρτα, τὰ ὁποῖα εἶναι 3 φορὰς περισσότερα τοῦ 1 τετάρτου, θὰ ἀξίζουν καὶ 3 φορὰς περισσότερον τῶν $\frac{7}{10 \times 4}$, ἥτοι $\frac{7 \times 3}{10 \times 4}$ ἢ $\frac{21}{40}$ τῆς δραχμῆς. Ἡ ἀξία λοιπὸν τῶν $\frac{3}{4}$ τῆς ὀκάς εὐρέθη. Ὡστε πρέπει νὰ εἶναι

$$\frac{7}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{7 \times 3}{10 \times 4} = \frac{21}{40}.$$

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος συναγομένον τὸν ἑξῆς κανόνα.

125. *Διὰ τὸ πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν ἀριθμητὴν ἐπὶ ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν ἐπὶ παρονομαστὴν.*

Ὡστε εἶναι $\frac{2}{5} \times \frac{3}{7} = \frac{6}{35}.$

ὁμοίως εἶναι $\frac{4}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{28}{72} = \frac{7}{18}.$

126. Εἰς τὰ ἀνωτέρω δύο προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι κλάσμα, δὲν ἐπαναλαμβάνεται, ὡς βλέπομεν, ὁλόκληρος ὁ πολλαπλασιαστέος, ἀλλὰ μόνον μέρος αὐτοῦ καὶ τόσον μέρος, ὅσον δεικνύει ὁ παρονομαστής τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, τόσας δὲ φορὰς τὸ μέρος τοῦτο, ὅσον δεικνύει ὁ ἀριθμητὴς αὐτοῦ. Π. γ. εἰς τὸ ἀνωτέρω τελευταῖον πρόβλημα ἐπαναλαμβάνεται τὸ τέταρτον τοῦ πολλαπλασιαστέου $\frac{7}{10}$, ἥτοι τὸ $\frac{7}{10 \times 4}$, 3 φορὰς· διότι ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι ὁ $\frac{3}{4}$. Ἐκ τούτου λοιπὸν ὀδηγούμενοι δίδομεν εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τὸν ἑξῆς γενικὸν ὄρισμόν.

127. *Πολλαπλασιασμός λέγεται ἢ πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας ἐπαναλαμβάνομεν ἓνα ἀριθμὸν ἢ μέρος αὐτοῦ τόσας φορὰς ὅσας μονάδας (ἀκεραίας ἢ κλασματικὰς) ἔχει ἄλλος δοθεὶς ἀριθμὸς.*

Τὸ γινόμενον εἶναι πάντοτε ὁμοειδὲς μὲ τὸν πολλαπλασιαστέον, διότι γίνεται ἐξ αὐτοῦ ἢ ἐκ μέρους αὐτοῦ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως.

Κατὰ τὸν ἀνωτέρω λοιπὸν γενικὸν ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ διὰ νὰ εὔρωμεν π. χ. τὸ γινόμενον $8 \times \frac{5}{6}$, πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸ ἕκτον τοῦ πολλαπλασιαστέου 8, τὸ ὁποῖον εἶναι $\frac{8}{6}$, 5 φορές, ἤτοι $\frac{8}{6} \times 5$ ἢ $\frac{40}{6}$.

Ἐπίσης, διὰ νὰ εὔρωμεν τὸ γινόμενον $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$, πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸ πέμπτον τοῦ $\frac{3}{4}$, τὸ ὁποῖον εἶναι $\frac{3}{4 \times 5}$, 2 φορές, ἤτοι $\frac{3 \times 2}{4 \times 5}$ ἢ $\frac{6}{20}$.

Παρατήρησις. Τὸ γινόμενον δύο ἀριθμῶν δύναται νὰ εἶναι ἴσον ἢ μεγαλύτερον ἢ μικρότερον τοῦ πολλαπλασιαστέου. Καὶ ἴσον μὲν θὰ εἶναι, ἐὰν ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι ἡ ἀκεραία μονάς 1· μεγαλύτερον δέ, ἂν ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι μεγαλύτερος τῆς ἀκεραίας μονάδος· μικρότερον δέ, ἂν ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι μικρότερος αὐτῆς.

3ον) Πολλαπλασιασμὸς μικτῶν ἀριθμῶν.

128. Ὅταν ὁ εἷς τῶν παραγόντων εἶναι μικτὸς ἀριθμὸς, ἢ καὶ οἱ δύο παράγοντες εἶναι μικτοί, τρέπομεν αὐτοὺς εἰς κλάσματα καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν κατὰ τοὺς ἀνωτέρω κανόνας.

Ἔστωσαν π. χ. τὰ ἑξῆς γινόμενα·

$$1) 5\frac{2}{3} \times \frac{4}{7} = \frac{17}{3} \times \frac{4}{7} = \frac{68}{21} = 3\frac{5}{21}$$

$$2) 2 \times 3\frac{4}{5} = 2 \times \frac{19}{5} = \frac{38}{5} = 7\frac{3}{5}$$

$$3) \frac{2}{9} \times 2\frac{1}{3} = \frac{2}{9} \times \frac{7}{3} = \frac{14}{27}$$

$$4) 2\frac{1}{3} \times 4\frac{3}{4} = \frac{7}{3} \times \frac{19}{4} = \frac{133}{12} = 11\frac{1}{12}$$

Ἐπειδὴ ὅμως πᾶς μικτὸς ἀριθμὸς εἶναι ἄθροισμα ἀκεραίου καὶ κλάσματος, διὰ τοῦτο δυνάμεθα καὶ νὰ πολλαπλασιάζομεν ἕκαστον μέρος τοῦ μικτοῦ χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἄλλον ἀριθμὸν καὶ ἔπειτα νὰ προσθέσωμεν τὰ μερικὰ γινόμενα (ἐδάφ. 40). Τὰ ἀνωτέρω λοιπὸν γινόμενα εὑρίσκονται καὶ ὡς ἑξῆς·

$$1) 5\frac{2}{3} \times \frac{4}{7} = 5 \times \frac{4}{7} + \frac{2}{3} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{7} + \frac{8}{21} = \frac{60}{21} + \frac{8}{21} = \frac{68}{21} = 3\frac{5}{21}$$

$$2) 2 \times 3 \frac{4}{5} = 2 \times 3 + 2 \times \frac{4}{5} = 6 + \frac{8}{5} = 6 +$$

$$1 \frac{3}{5} = 7 \frac{3}{5}$$

$$3) \frac{2}{9} \times 2 \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \times 2 + \frac{2}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9} + \frac{2}{27} =$$

$$\frac{12}{27} + \frac{2}{27} = \frac{14}{27}$$

$$4) 2 \frac{1}{3} \times 4 \frac{3}{4} \text{ διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον τοῦτο,}$$

ὑποθέτομεν τὸν ἓνα τῶν παραγόντων, ἔστω τὸν $2 \frac{1}{3}$, ὡς ἓνα ἀριθμὸν,

τὸν δὲ ἄλλον $4 \frac{3}{4}$ ὡς ἄθροισμα δύο ἀριθμῶν· τότε ἔχομεν νὰ πολλα-

πλασιάσωμεν ἀριθμὸν ἐπὶ ἄθροισμα καὶ ἐπομένως θὰ ἔχωμεν $2 \frac{1}{3} \times 4$

+ $2 \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$. Πολλαπλασιάζοντες τώρα χωριστὰ ἕκαστον μέρος

τοῦ μικτοῦ $2 \frac{1}{3}$ ἐπὶ 4 καὶ ἔπειτα ἐπὶ $\frac{3}{4}$ καὶ προσθέτοντες τὰ τέσσαρα

μερικὰ γινόμενα εὐρίσκομεν πάλιν $11 \frac{1}{12}$.

Γινόμενον πολλῶν παραγόντων.

129. Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων, ἀποτελούμενον ἐξ ἀκεραίων καὶ κλασμάτων ἢ κλασμάτων μόνον, εὐρίσκεται ὅπως καὶ τὸ γινόμενον πολλῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Ἦτοι πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο πρώτους παράγοντας, τὸ γινόμενον αὐτῶν πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸν τρίτον παράγοντα καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς, μέχρις ὅτου λάβωμεν ὅλους τοὺς παράγοντας.

Ἐστω π. χ. νὰ εὐρεθῇ τὸ ἐξῆς γινόμενον·

$$\frac{4}{5} \times 3 \times \frac{6}{7} \times \frac{5}{8} \times 2.$$

Τὸ γινόμενον τῶν δύο πρώτων εἶναι $\frac{4 \times 3}{5}$, τὸ γινόμενον τούτου

ἐπὶ τὸν τρίτον εἶναι $\frac{4 \times 3 \times 6}{5 \times 7}$, τὸ γινόμενον τούτου ἐπὶ τὸν τέ-

ταρον εἶναι $\frac{4 \times 3 \times 6 \times 5}{5 \times 7 \times 8}$, τὸ γινόμενον τούτου ἐπὶ τὸν πέμ-

τον εἶναι $\frac{4 \times 3 \times 6 \times 5 \times 2}{5 \times 7 \times 8}$. Ὡστε εἶναι $\frac{4}{5} \times 3 \times \frac{6}{7} \times \frac{5}{8} \times 2 =$

$$\frac{4 \times 3 \times 6 \times 5 \times 2}{5 \times 7 \times 8}.$$

Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι

130. Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων εἶναι ἴσον μὲ κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸ γινόμενον ὄλων τῶν ἀριθμητῶν καὶ ὄλων τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν, παρονομαστὴν δὲ τὸ γινόμενον ὄλων τῶν παρονομαστῶν.

Καὶ ἐδῶ τὸ γινόμενον δὲν μεταβάλλεται, ἂν ἀλλάξωμεν τὴν τάξιν τῶν παραγόντων.

Σημ. Ἐὰν ἐν τῷ γινομένῳ ὑπάρχωσι καὶ μικτοὶ ἀριθμοί, τρέπομεν πρῶτον αὐτοὺς εἰς κλάσματα καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν.

Παρατήρησις. Τὸ ἀνωτέρω κλάσμα τοῦ γινομένου δύναται νὰ ἀπλοποιηθῆ. Διαιροῦντες λοιπὸν καὶ τοὺς δύο ὅρους αὐτοῦ διὰ 5, ἔπειτα διὰ 4 καὶ ἔπειτα διὰ 2 εὐρίσκομεν $\frac{18}{7}$. Ὡστε καλὸν εἶναι πρὸς εὐκολίαν τῶν πράξεών μας, προτοῦ νὰ σχηματίσωμεν τὸ γινόμενον τῶν κλασμάτων, νὰ διαιρῶμεν ἕνα οἰονδήποτε ἀριθμητὴν ἢ ἀκέραιον καὶ ἕνα οἰονδήποτε παρονομαστὴν τῶν δοθέντων κλασμάτων διὰ τοῦ κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν, ἂν ἔχωσι, καὶ ἔπειτα νὰ πολλαπλασιάζωμεν.

Ἀσκήσεις.

$$\begin{aligned} & \frac{3}{4} \times 5 \left(= 3 \frac{3}{4} \right), 4 \frac{2}{3} \times 6 \left(= 28 \right), \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \left(= \frac{3}{10} \right), \\ & 2 \frac{4}{5} \times \frac{4}{7} \left(= 1 \frac{3}{5} \right), \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{3} \left(= 1 \frac{1}{6} \right), 10 \times 5 \frac{2}{5} \left(= 54 \right) \\ & 2 \frac{3}{4} \times 3 \frac{4}{5} \left(= 10 \frac{9}{20} \right), 6 \frac{2}{3} \times 2 \frac{1}{4} \left(= 15 \right), \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \left(= \frac{2}{5} \right), \\ & \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} \left(= \frac{1}{3} \right), 2 \times \frac{1}{5} \times \frac{4}{9} \times 3 \times \frac{5}{6} \left(= \frac{4}{9} \right). \end{aligned}$$

Προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ.— Λύσεις αὐτῶν
διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

1) Ἡ ὀκτὰ ἐνὸς πράγματος τιμᾶται 4 δραχμαί· πόσον τιμῶνται τὰ $\frac{5}{6}$ τῆς ὀκτᾶς;

Κατατάσσομεν τὰς δοθείσας τιμὰς, ὅπως καὶ εἰς τοὺς ἀκεραίους ἀριθμούς, ἦτοι

1 ὀκτὰ	4 δραχ.
$\frac{5}{6}$	χ
6	

Τοιοῦτον πρόβλημα ἐλύσαμεν καὶ προηγουμένως, τὴν αὐτὴν δὲ σκέψιν θὰ κάμωμεν καὶ τώρα.

Ἀφοῦ ἡ 1 ὀκτὰ τιμᾶται 4 δραχμαί, τὸ 1 ἕκτον τῆς ὀκτᾶς, τὸ ὁποῖον

εἶναι 6 φορὰς ὀλιγώτερον τῆς μιᾶς ὀκάς, θὰ τιμᾶται καὶ 6 φορὰς ὀλιγώτερον τῶν 4 δραχμῶν, ἦτοι $\frac{4}{6}$ τῆς δραχμῆς (ἔδ. 102), καὶ τὰ 5 ἔκτα τῆς ὀκάς, τὰ ὁποῖα εἶναι 5 φορὰς περισσότερα τοῦ 1 ἔκτου, θὰ τιμῶνται καὶ 5 φορὰς περισσότερον τῶν $\frac{4}{6}$ τῆς δραχμῆς, ἦτοι $\frac{4 \times 5}{6}$ (ἔδάφ. 96) ἢ $3\frac{1}{3}$ τῆς δραχμῆς.

Ἡ ἀνωτέρω προᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς :

Ἀφοῦ ἡ 1 ὀκά τιμᾶται 4 δραχ.

τὸ $\frac{1}{6}$ τῆς ὀκάς τιμᾶται $\frac{4}{6}$ τῆς δραχμῆς

καὶ τὰ $\frac{5}{6}$ » τιμῶνται $\frac{4 \times 5}{6}$ ἢ $3\frac{1}{3}$ τῆς δραχμῆς

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα, εὔρομεν πρῶτον πόσον τιμᾶται τὸ $\frac{1}{6}$ τῆς ὀκάς καὶ ἔπειτα πόσον τιμῶνται τὰ $\frac{5}{6}$ αὐτῆς. Ὁ τρόπος οὗτος, διὰ τοῦ ὁποίου εὔρισκομεν πρῶτον τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδος (κλασματικῆς ἢ ἀκεραίας) καὶ ἔπειτα τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων, λέγεται **ἀναγωγή εἰς τὴν μονάδα**.

Τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα, καθὼς καὶ τὰ ὅμοια πρὸς αὐτό, λύομεν καὶ ἄνευ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα, ἀλλὰ μόνον δι' ἑνὸς πολλαπλασιασμοῦ, συμφώνως μὲ τὸν κανόνα τοῦ ἑδαφίου 124. Ἦτοι ἔχομεν $4 \times \frac{5}{6} = \frac{20}{6}$ (ἔδάφ. 123) ἢ $3\frac{1}{3}$.

2) Ὁ πῆχυς ἑνὸς ὑφάσματος τιμᾶται $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς· πόσον τιμῶνται τὰ $\frac{7}{8}$ τοῦ πῆχεως :

Κατάταξις. 1 πῆχ. $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς
 $\frac{7}{8}$ » χ

Λύσις. Διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

Ἀφοῦ ὁ 1 πῆχυς τιμᾶται $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς

τὸ $\frac{1}{8}$ τοῦ πῆχ. τιμᾶται $\frac{3}{4 \times 8}$ »

κατὰ τὰ $\frac{7}{8}$ » τιμῶνται $\frac{3 \times 7}{4 \times 8}$ ἢ $\frac{21}{32}$ »

Λύσις. Διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. $\frac{3}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{21}{32}$ (ἔδ. 125).

Σημ. Ἐὰν δοθῶσι μικτοὶ ἀριθμοὶ, τρέπομεν πρῶτον αὐτοὺς εἰς κλάσματα χάριν εὐκολίας.

3) Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν $2\frac{1}{4}$ τῆς ὀκάς ἕξ ἐνὸς πράγματος, δίδομεν 1 δραχμὴν πόσον θὰ ἀγοράσωμεν μὲ $3\frac{1}{2}$ τῆς δραχμῆς ;

Κατάταξις.	$\frac{9}{4}$ ὀκ.	1 δραχμὴ
	χ	$\frac{7}{2}$

Μετὰ τὴν κατάταξιν τῶν δοθέντων ἀριθμῶν, ὅταν πρόκειται νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα, πρέπει νὰ ἀρχίζωμεν πάντοτε ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν ἐκεῖνον τῆς πρώτης ὀριζοντίας σειρᾶς, ὑποκάτω τοῦ ὁποίου δὲν ὑπάρχει ἡ ἄγνωστος τιμὴ τοῦ χ . Εἰς τὸ ἀνωτέρω λοιπὸν πρόβλημα θὰ ἀρχίσωμεν ἀπὸ τὴν 1 δραχμὴν καὶ θὰ μεταβῶμεν εἰς τὰ $\frac{9}{4}$ τῆς ὀκάς. Ἦτοι,

ἀφοῦ μὲ 1 δραχμὴν ἀγοράζομεν	$\frac{9}{4}$	τῆς ὀκάς
μὲ $\frac{1}{2}$ τῆς δραχ.	» $\frac{9}{4 \times 2}$	»
καὶ μὲ $\frac{7}{2}$	» $\frac{9 \times 7}{4 \times 2}$ ἢ $7\frac{7}{8}$	»

Λύσις. Διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. $2\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2} = \frac{9}{4} \times \frac{7}{2} = \frac{63}{8} = 7\frac{7}{8}$ τῆς ὀκάς.

4) Νὰ εὐρεθῶσι τὰ $\frac{2}{5}$ τοῦ ἀριθμοῦ 135.

Λύσις. Ἀφοῦ τὰ $\frac{5}{5}$, ἦτοι ὅλος ὁ ἀριθμὸς, εἶναι 135,

τὸ $\frac{1}{5}$ αὐτοῦ εἶναι

$$\frac{135}{5}$$

κατὰ τὰ $\frac{2}{5}$ » »

$$\frac{135 \times 2}{5} \text{ ἢ } 54.$$

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

131. Ὅταν θέλωμεν νὰ εὕρωμεν μέρος οἰουδήποτε ἀριθμοῦ, κάμνομεν πολλαπλασιασμόν.

Παλλαπλασιαστέος εἶναι ὁ ἀριθμὸς, τοῦ ὁποίου ζητοῦμεν τὸ μέρος.

5) Πόσον εἶναι τὰ $\frac{6}{7}$ τοῦ ἀριθμοῦ 28 ;

Λύσις. $28 \times \frac{6}{7}$, ἦτοι 24. Τοῦτο εὐρίσκομεν καὶ νοερώς ὡς ἑξῆς*

διαιροῦμεν πρῶτον τὸν ἀριθμὸν 28 διὰ τοῦ παρονομαστοῦ 7 καὶ κατόπιν πολλαπλασιάζομεν τὸ πηλίκον 4 ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν 6.

Νοεραὶ ἀσκήσεις. — 1) Πόσον εἶναι τὰ $\frac{5}{9}$ τοῦ 45 ; Καὶ πόσον τὰ $\frac{4}{5}$ αὐτοῦ ;

2) Πόσα λεπτὰ εἶναι τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς ; Καὶ πόσον τὰ $\frac{9}{20}$ αὐτῆς ;

3) Πόσα δράμια εἶναι τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς ὀκάς ; Καὶ πόσον τὰ $\frac{7}{8}$ αὐτῆς ;

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἐργάτης τις λαμβάνει τὴν ἡμέραν $7\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς. Πόσον λαμβάνει εἰς 12 ἡμέρας ; (98 δρ.)

2) Ἡ ὀκά τοῦ καφέ ἀξίζει 5 δραχμάς· πόσον ἀξίζουν τὰ 180 δράμια ;
($5 \times \frac{180}{400}$ ἢ $2\frac{1}{4}$ δρ.)

3) Μία λάμπα καίει εἰς μίαν ὥραν 45 δράμια πετρελαίου. Πόσον καίει εἰς $3\frac{1}{3}$ τῆς ὥρας ; (150 δράμια)

4) Μὲ μίαν δραχμὴν ἀγοράζομεν $\frac{3}{8}$ τῆς ὀκάς ἕξ ἐνὸς πράγματος. Πόσον ἀγοράζομεν μὲ $5\frac{1}{2}$ τῆς δραχμῆς ; ($2\frac{1}{16}$ τῆς ὀκάς)

5) Ὁ πῆχυς ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται $2\frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς. Πόσον τιμῶνται $9\frac{1}{2}$ τοῦ πῆχεως ; ($22\frac{4}{5}$ τῆς δρ.)

6) Ἡγόρασε τις 3 ὀκ. ἔλαιου πρὸς $3\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς τὴν ὀκᾶν καὶ ἔδωκεν ἕν ἑκατοντάδραχμον. Πόσον ἔλαβεν ὑπόλοιπον ; ($88\frac{3}{4}$ τῆς δρ.)

7) Γυνή τις ἠγόρασε παρ' ἐμπόρου $5\frac{1}{2}$ τοῦ πῆχεως ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος πρὸς $4\frac{3}{5}$ τῆς δραχμῆς τὸν πῆχυν καὶ ἔδωκεν ἕν εἰκοσιπεντάδραχμον. Πόσον ὀφείλει ἀκόμη ; ($\frac{3}{10}$ τῆς δρ.)

8) Παντοπώλης τις ἠγόρασε 1600 ὀκάδας ἔλαιου πρὸς $3\frac{3}{4}$ τῆς δρ. τὴν ὀκᾶν κατόπιν ἐπώλησεν αὐτὸ καὶ ἐκέρδισεν ἀπὸ ἐκάστην ὀκᾶν $\frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς. Πόσον ἔλαβεν ἐκ τῆς πωλίσσεως αὐτοῦ ;

Δύσις Ἐπώλησε τὴν ὀκᾶν πρὸς $3\frac{3}{4} + \frac{2}{5}$ ἢ $4\frac{3}{20}$ τῆς δραχμῆς, ὥστε ἔλαβε $1600 \times 4\frac{3}{20}$ ἢ 6640 δρ.

9) Ἡγόρασέ τις $19\frac{1}{2}$ τῆς ὀκᾶς βουτύρου καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐκράτησε διὰ τὴν οἰκογένειάν του $6\frac{5}{8}$ τῆς ὀκᾶς, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἐπώλησε πρὸς 12 δρ. τὴν ὀκᾶν. Πόσον ἔλαβεν ἐκ τοῦ πωληθέντος βουτύρου ;

($154\frac{1}{2}$ δραχ.)

10) Ἐμπορός τις ἠγόρασεν 60 πήχεις ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος πρὸς $7\frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς τὸν πῆχυν, κατόπιν ἐπώλησεν αὐτὸ πρὸς $8\frac{1}{2}$ τῆς δρ. τὸν πῆχυν. Πόσον ἐκέρδισεν ;

(66 δρ.)

11) Πατήρ τις εἶχε μαζί του $60\frac{1}{2}$ τῆς δραχμῆς καὶ ἐξ αὐτῶν ἔδωκε τὰ $\frac{4}{5}$ καὶ 3 δρ. ἀκόμη διὰ νὰ ἀγοράσῃ βιβλία τοῦ υἱοῦ του. Πόσας δραχμὰς ἔδωκε καὶ πόσαι τοῦ ἔμειναν ;

Δύσις. Ἐδωκεν $60\frac{1}{2} \times \frac{4}{5}$ (ἔδ. 131) ἢ $48\frac{2}{5}$ καὶ 3 δρ. ἀκόμη, ἦτοι $51\frac{2}{5}$, ἐπομένως τοῦ ἔμειναν $60\frac{1}{2} - 51\frac{2}{5}$ ἢ $9\frac{1}{10}$ τῆς δρ.

12) Μήτηρ τις εἶχε 42 καρύδια καὶ ἐξ αὐτῶν ἔδωκεν εἰς μὲν τὴν θυγατέρα της τὰ $\frac{3}{14}$ καὶ 1 ἀκόμη, εἰς δὲ τὸν υἱόν της τὰ $\frac{3}{8}$ τοῦ ὑπολοίπου. Πόσα καρύδια ἔδωκεν εἰς ἕκαστον τέκνον καὶ πόσα τῆς ἔμειναν ;

(10, 12, 20)

Δ Ι Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ

132. Ἐπειδὴ διὰ τῶν κλασμάτων γίνεται ἡ διαίρεσις δύο ἀκεραίων ἀριθμῶν πάντοτε τελεία (ἔδάφ. 103), διὰ τοῦτο ὁ διαιρετέος εἶναι ἴσος μὲ τὸ γινόμενον τοῦ πηλίκου καὶ τοῦ διαιρέτου (ἔδάφ. 51). Ὡστε δίδομεν εἰς τὴν διαίρεσιν τὸν ἕξῃς γενικὸν ὀρισμὸν.

Διαίρεσις λέγεται ἡ πρᾶξις διὰ τῆς ὁποίας, δοθέντων δύο ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν τρίτον ἀριθμὸν, ὅστις πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν δεῦτερον δίδει τὸν πρῶτον.

Οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ εἶναι ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης· καὶ πρῶτον μὲν ἀριθμὸν λέγομεν τὸν διαιρετέον, δεῦτερον δὲ τὸν διαιρέτην, τρίτον δὲ τὸ ζητούμενον πηλίκον.

1ον) Διαίρεσις κλάσματος ἢ μικτοῦ δι' ἀκεραίου.

133. Ὑποθέσωμεν, ὅτι μὲ $\frac{6}{7}$ τῆς δραχμῆς ἀγοράζομεν 3 ὀκάδας

ἑνὸς πράγματος καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν, πόσον ἀξίζει ἡ 1 ὀκά.

Πρὸς τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς. Ἀφοῦ διὰ τὰς 3 ὀκάδας δίδομεν $\frac{6}{7}$ τῆς δραχμῆς, διὰ τὴν 1 ὀκᾶν θὰ δώσωμεν 3 φορὰς ὀλιγώτερον τῶν

$\frac{6}{7}$. Ἀλλὰ διὰ νὰ καταστήσωμεν τὸ κλάσμα $\frac{6}{7}$ τρεῖς φορὰς μικρότερον, πρέπει νὰ τὸ διαιρέσωμεν διὰ 3· ὥστε (κατὰ τὸ ἐδάφιον 98) ἢ θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν παρονομαστήν του ἐπὶ 3 ἢ θὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμητήν του διὰ 3. Ἦτοι εἶναι

$\frac{6}{7} : 3 = \frac{6}{21}$ ἢ ἀπλοποιούμενον $\frac{2}{7}$ τῆς δραχμῆς

ἢ $\frac{6}{7} : 3 = \frac{6:3}{7} = \frac{2}{7}$ τῆς δραχμῆς. Ὡστε

134. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν κλάσμα δι' ἀκεραίου, πολλαπλασιάζομεν τὸν παρονομαστήν τοῦ κλάσματος ἐπὶ τὸν ἀκεραίου ἢ διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητήν αὐτοῦ διὰ τοῦ ἀκεραίου (ἂν εἶναι διαιρετός).

Τὸ ἀνωτέρω εὐρεθὲν κλάσμα $\frac{2}{7}$ εἶναι πράγματι τὸ πηλίκον τῆς

διαίρεσεως $\frac{6}{7} : 3$ · διότι, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τοῦτο ἐπὶ τὸν διαιρέ-

την 3, εὐρίσκομεν τὸν διαιρετέον $\frac{6}{7}$.

135. Διὰ νὰ διαιρέσωμεν μικτὸν δι' ἀκεραίου, τρέπομεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν ὡς ἀνωτέρω·

π. χ. $6\frac{3}{4} : 5 = \frac{27}{4} : 5 = \frac{27}{20}$ ἢ $1\frac{7}{20}$.

Διαιροῦμεν ἕκαστον μέρος τοῦ μικτοῦ χωριστὰ διὰ τοῦ ἀκεραίου καὶ ἔπειτα προσθέτομεν τὰ μερικὰ πηλίκια (ἐδ. 65).

Ἦτοι $6\frac{3}{4} : 5 = \frac{6}{5} + \frac{3}{20} = \frac{24}{20} + \frac{3}{20} = \frac{27}{20}$ ἢ $1\frac{7}{20}$.

2ον) Διαίρεσις οἴουδῆποτε ἀριθμοῦ διὰ κλάσματος.

136. Ὑποθέσωμεν πρῶτον, ὅτι μὲ 6 δραχμὰς ἀγοράζομεν 3 ὀκάδας

ἑνὸς πράγματος καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν, πόσον ἀξίζει μία ὀκά.

Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὰς 6 δραχμὰς (ἦτοι τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν μονάδων) διὰ 3, ἦτοι 6 : 3 ἢ 2 δρ. Ἐὰν τώρα ἀλλάξωμεν τὸν ἀριθμὸν 3 καὶ θέσωμεν εἰς τὴν θέσιν του ἄλλον ἀριθμὸν μεγαλύ-

τερον ἢ μικρότερον αὐτοῦ, πάλιν πρέπει νὰ διαιρέσωμεν τὰς 6 δραχμὰς διὰ τοῦ νέου τούτου ἀριθμοῦ, διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ζητούμενον, ἢ πρῶ-
 ξις δηλ. δὲν πρέπει νὰ μεταβληθῆ διὰ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ διαιρέτου 3.
 Ὡστε, ἐὰν ἔχωμεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα·

1ον) Μὲ 6 δραχμὰς ἀγοράζομεν $\frac{3}{8}$ τῆς ὁκᾶς ἕξ ἑνὸς πράγματος πόσον ἀξιίζει μία ὁκᾶ;

Πρέπει πάλιν νὰ διαιρέσωμεν τὰς 6 δραχμὰς διὰ $\frac{3}{8}$, ἥτοι $6 : \frac{3}{8}$, διότι μόνον ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁκάδων ἠλλάξε. Μένει τώρα νὰ ἴδωμεν πῶς θὰ γίνῃ ἡ διαίρεσις τοῦ ἀκεραίου 6 διὰ τοῦ κλάσματος $\frac{3}{8}$, διὰ νὰ εὐρεθῆ τὸ πηλίκον, ἥτοι ἡ ἀξία τῆς μιᾶς ὁκᾶς. Ἀλλὰ τὴν ἀξίαν τῆς μιᾶς ὁκᾶς εὐρίσκομεν ὡς ἐξῆς·

Ἐφοῦ τὰ $\frac{3}{8}$ τῆς ὁκᾶς ἀξιίζουν 6 δραχμὰς,

$$\text{τὸ } \frac{1}{8} \quad \gg \quad \text{ἀξιίζει } \frac{6}{3} \quad \gg$$

$$\text{καὶ τὰ } \frac{8}{8}, \text{ ἥτοι ἡ 1 ὁκᾶ } \gg \frac{6 \times 8}{3} \text{ ἢ } 6 \times \frac{8}{3} \text{ δραχ.}$$

Ὡστε πρέπει νὰ εἶναι $6 : \frac{3}{8} = 6 \times \frac{8}{3}$ ἢ 16 δραχμ.

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος βλέπομεν ὅτι πολλαπλασιάζεται διαιρετέος 6 ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{3}{8}$ τοῦ διαιρέτου ἀντεστραμμένον.

Σημ. Ἡ ἀνωτέρω εὐρεθεῖσα ἀξία τῆς μιᾶς ὁκᾶς, ἥτοι ὁ $6 \times \frac{8}{3}$ εἶναι πράγματι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $6 : \frac{3}{8}$, διότι, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τοῦτο ἐπὶ τὸν διαιρέτην $\frac{3}{8}$, εὐρίσκομεν τὸν διαιρετέον 6 ἥτοι εἶναι $6 \times \frac{8}{3} \times \frac{3}{8}$ ἢ 6 μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν.

Εἰς τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα ὁ διαιρέτης $\frac{3}{8}$ εἶναι μέρος τῆς μονάδος (ἥτοι τῆς μιᾶς ὁκᾶς), διὰ τοῦτο δὲ γενικεύομεν τὸν κανόνα τῆς διαιρέσεως τοῦ ἑδαφίου 63 ὡς ἐξῆς·

137. Ὄταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων ἢ μέρος τῆς μονάδος καὶ θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος (ὁμοειδοῦς), κάμνομεν διαίρεσιν (μερισμόν).

Διαιρετέος εἶναι πάντοτε ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων ἢ τοῦ μέρος τῆς μονάδος.

2ον) Με $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς ἀγοράζομεν $\frac{5}{6}$ τῆς ὀκῆς ἐξ ἑνὸς πράγμα-
τος· πόσον ἀξίζει ἡ ὀκῆ :

Ἐπειδὴ εἶναι γνωστὴ ἡ τιμὴ μέρους τῆς μονάδος καὶ ζητεῖται ἡ
τιμὴ μιᾶς μονάδος, διὰ τοῦτο κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα θὰ κάμωμεν
διαίρεσιν (μερισμόν), ἥτοι $\frac{3}{4} : \frac{5}{6}$. Μένει τώρα νὰ ἴδωμεν, πῶς θὰ
γίνῃ ἡ διαίρεσις αὕτη, διὰ νὰ εὐρεθῇ τὸ πηλίκον, ἥτοι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς
ὀκῆς. Ἀλλὰ τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς ὀκῆς εὐρίσκομεν πάλιν ὡς ἐξῆς·

Ἀφοῦ τὰ $\frac{5}{6}$ τῆς ὀκῆς ἀξίζουν $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς,

τὸ $\frac{1}{6}$ » ἀξίζει $\frac{3}{4 \times 5}$ »

καὶ τὰ $\frac{6}{6}$, ἥτοι ἡ 1 ὀκῆ » $\frac{3 \times 6}{4 \times 5}$ ἢ $\frac{3}{4} \times \frac{6}{5}$ τῆς δο.

Ὅστε πρέπει νὰ εἶναι $\frac{3}{4} : \frac{5}{6} = \frac{3}{4} \times \frac{6}{5}$ ἢ $\frac{9}{10}$ τῆς δραχμῆς.

Ἐκ τούτου πάλιν βλέπομεν, ὅτι ὁ διαιρετέος $\frac{3}{4}$ πολλαπλασιάζεται
ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{5}{6}$ τοῦ διαιρέτου ἀντεστραμμένον.

Σημ. Ἡ ἀνωτέρω εὐρεθεῖσα ἀξία τῆς μιᾶς ὀκῆς, ἥτοι ὁ $\frac{3}{4} \times \frac{6}{5}$,
εἶναι πράγματι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $\frac{3}{4} : \frac{5}{6}$ · διότι, ἂν πολλαπλα-
σιάσωμεν τοῦτο ἐπὶ τὸν διαιρέτην $\frac{5}{6}$, εὐρίσκομεν τὸν διαιρετέον $\frac{3}{4}$.
ἥτοι εἶναι $\frac{3}{4} \times \frac{6}{5} \times \frac{5}{6}$ ἢ $\frac{3}{4}$ μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν.

Καὶ τὸ πηλίκον μικτοῦ ἀριθμοῦ διὰ κλάσματος εὐρίσκεται κατὰ τὸν
αὐτὸν τρόπον, ἥτοι εἶναι $2\frac{4}{5} : \frac{3}{4} = 2\frac{4}{5} \times \frac{4}{3}$.

Ἐκ τῆς λύσεως τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων συνάγομεν τὸν ἐξῆς
γενικὸν κανόνα.

138. *Διὰ νὰ διαιρέσωμεν οἷονδήποτε ἀριθμὸν διὰ κλάσματος,
πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα ἀντεστραμμένον.*

Παρατήρησις. Ἐκ τοῦ τρόπου τῆς διαιρέσεως δύο ἀριθμῶν ἔπεται,
ὅτι τὸ πηλίκον δύναται νὰ εἶναι ἴσον ἢ μεγαλύτερον ἢ μικρότερον τοῦ
διαιρέτου. Καὶ ἴσον μὲν θὰ εἶναι, ἂν ὁ διαιρέτης εἶναι ἡ ἀκεραία
μονὰς 1· μεγαλύτερον δέ, ἂν ὁ διαιρέτης εἶναι μικρότερος τῆς ἀκεραίας
μονάδος· μικρότερον δέ, ἂν ὁ διαιρέτης εἶναι μεγαλύτερος τῆς ἀκεραίας
μονάδος.

139. Διὰ τὰ διαιρέσωμεν οἰονδήποτε ἀριθμὸν διὰ μικτοῦ, τρέπομεν πάντοτε τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν διότι ἄλλος τρόπος δὲν ὑπάρχει.

Ἀσκήσεις.

$$\begin{aligned} \frac{2}{5} : 3 \left(= \frac{2}{15} \right), & 2 : \frac{3}{8} \left(= 5 \frac{1}{8} \right), & 8 : \frac{1}{2} \left(= 16 \right), & \frac{3}{7} : \frac{4}{5} \left(= \frac{15}{28} \right) \\ \frac{5}{6} : \frac{2}{3} \left(= 1 \frac{1}{4} \right), & 5 \frac{1}{3} : \frac{2}{3} \left(= 8 \right), & 5 : 2 \frac{3}{4} \left(= 1 \frac{9}{11} \right), & \frac{4}{5} : 1 \frac{1}{5} \left(= \frac{2}{3} \right) \\ \frac{6}{7} : 3 \frac{1}{2} \left(= \frac{12}{49} \right), & 2 \frac{1}{3} : 3 \frac{2}{5} \left(= \frac{35}{51} \right), & 3 \frac{1}{5} : 2 \frac{2}{5} \left(= 1 \frac{1}{3} \right) \\ 5 \frac{1}{3} : 1 \frac{1}{3} \left(= 4 \right), & \frac{2}{3} \times \frac{5}{7} \times \frac{3}{5} : \frac{2}{7} \left(= 1 \right), \end{aligned}$$

Σύνθετα κλάσματα.

140. Εἶδομεν (ἐδάφ. 102), ὅτι πᾶν κλάσμα παριστᾷ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ του διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του. Ὡστε τὰ πηλίκια τῶν διαιρέσεων $\frac{3}{5} : 6$, $2 \frac{5}{8} : 3$, $3 : \frac{4}{5}$, $\frac{4}{7} : \frac{2}{3}$ κλπ. δύνανται νὰ γραφῶσι καὶ ὡς κλάσματα, ἥτοι

$$\frac{\frac{3}{5}}{6}, \frac{2 \frac{5}{8}}{3}, \frac{3}{\frac{4}{5}}, \frac{\frac{4}{7}}{\frac{2}{3}} \text{ κλπ.}$$

Τὰ τοιαῦτα κλάσματα, τῶν ὁποίων ὁ εἷς τῶν ὄρων ἢ καὶ οἱ δύο ὄροι δὲν εἶναι ἀκεραῖοι ἀριθμοί, ὀνομάζομεν **σύνθετα κλάσματα**, τὰ δὲ ἔχοντα ὄρους ἀκεραίους ὀνομάζομεν πρὸς διάκρισιν **ἀπλά**.

Τὰ σύνθετα κλάσματα ἔχουσι πάσας τὰς ιδιότητες τῶν ἀπλῶν κλασμάτων καὶ αἱ ἐπ' αὐτῶν πράξεις ἐκτελοῦνται κατὰ τοὺς αὐτοὺς γνωστοὺς κανόνας.

Διὰ τὰ τρέψωμεν σύνθετον κλάσμα εἰς ἀπλοῦν, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν του διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του. Ἦτοι εἶναι

$$\begin{aligned} \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{5}} = \frac{3}{4} : 5 = \frac{3}{4 \times 5} = \frac{3}{20}, & \frac{2}{\frac{3}{7}} = 2 : \frac{3}{7} = 2 \times \frac{7}{3} = \frac{14}{3} \\ 9 \times \frac{\frac{2}{5}}{\frac{4}{4}} = 9 \times \frac{2}{5} : \frac{3}{4} = 9 \times \frac{2}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{24}{5} \text{ κλπ.} \end{aligned}$$

141. Δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν σύνθετον κλάσμα εἰς ἀπλοῦν καὶ ὡς ἐξῆς. Ἐὰν ὁ εἷς μόνον τῶν ὄρων του εἶναι κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν

μφοτέρους τούς ὄρους του ἐπὶ τὸν παρονομαστήν τοῦ κλάσματος τούτου· ἔαν δὲ καὶ οἱ δύο ὄροι του εἶναι κλάσματα, πολλαπλασιάζομεν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν των (ἔδ. 100). Ἦτοι εἶναι

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{7}} = \frac{\frac{3}{4} \times 4}{5 \times 4} = \frac{3}{5 \times 4} = \frac{3}{20} \text{ (μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν)}$$

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{7}{7}} = \frac{2 \times 7}{3 \times 7} = \frac{2 \times 7}{3} = \frac{14}{3} \quad \gg \quad \gg \quad \gg$$

$$9 \times \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{4}} = 9 \times \frac{\frac{2}{5} \times 5 \times 4}{\frac{3}{4} \times 5 \times 4} = 9 \times \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{24}{5}$$

Σημ. Ἐὰν συμβῆ νὰ ἔχωσι καὶ οἱ δύο ὄροι τὸν αὐτὸν παρονομαστήν, παραλείπομεν αὐτὸν. Ἐὰν πάλιν συμβῆ νὰ ἔχωμεν μικτοὺς ἀριθμοὺς, τρέπομεν πρῶτα αὐτοὺς εἰς κλάσματα.

Λύσεις προβλημάτων διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

1) Μὲ $\frac{3}{5}$ τῆς δραχμῆς ἀγοράζομεν $\frac{7}{9}$ τῆς ὀκᾶς ἕξ ἑνὸς πράγματος ὅσον ἀγοράζομεν μὲ μίαν δραχμὴν;

Σημ. Τοιοῦτον πρόβλημα ἐλύσαμεν καὶ προηγουμένως.

Κατάταξις.

$\frac{3}{5}$ δραχ.	$\frac{7}{9}$ ὀκ.
1	x

Λύσις. Διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

Ἐφοῦ μὲ $\frac{3}{5}$ τῆς δραχμῆς ἀγοράζομεν $\frac{7}{9}$ τῆς ὀκᾶς,

μὲ $\frac{1}{5}$ » » $\frac{7}{9 \times 3}$ »

καὶ μὲ $\frac{5}{5}$ » » $\frac{7 \times 5}{9 \times 3}$ ἢ $1 \frac{8}{27}$ τῆς ὀκᾶς

Τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα, καθὼς καὶ τὰ ὅμοια πρὸς αὐτό, λύομεν ἢ ἄνευ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα, ἀλλὰ μόνον διὰ μιᾶς διαιρέσεως συμφώνως μὲ τὸν κανόνα τοῦ ἑδαφίου 157. Ἦτοι ἔχομεν

$$\frac{3}{5} = \frac{7}{9} \times \frac{5}{3} \text{ (ἔδ. 138)} = \frac{35}{27} = 1 \frac{8}{27}.$$

2) Μὲ $6 \frac{3}{10}$ τῆς δραχμῆς ἀγοράζομεν $10 \frac{1}{2}$ τοῦ πήχεως ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος· πόσον ἀξίζει ὁ πήχυς;

Κατάταξις. $\frac{63}{10}$ δρα. $\frac{21}{2}$ πήχ.

Λύσις. Διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα. Ἐνθυμούμενοι νὰ ἀρχίζωμεν πάντοτε ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν ἐκεῖνον, ὑποκάτω τοῦ ὁποίου δὲ ὑπάρχει ἡ ἄγνωστος τιμὴ χ .

Ἀφοῦ τὰ $\frac{21}{2}$ τοῦ πήχεως ἀξίζουν $\frac{63}{10}$ τῆς δραχμῆς
 τὸ $\frac{1}{2}$ » ἀξίζει $\frac{63}{10 \times 21}$ »
 καὶ τὰ $\frac{2}{2}$, ἦτοι ὁ 1 πήχυς ἀξίζει $\frac{63 \times 2}{10 \times 21}$ ἢ $\frac{3}{5}$ τῆς δραχμῆς.

Λύσις. Διὰ τῆς διαιρέσεως.

$$6 \frac{3}{10} : 10 \frac{1}{2} = \frac{63}{10} : \frac{21}{2} = \frac{63}{10} \times \frac{2}{21} = \frac{3}{5} \text{ τῆς δρα.}$$

3) Ἡ δὲ ἀκὴ πράγματός τινος ἀξίζει $2 \frac{1}{5}$ τῆς δραχμῆς· πόσον ἀρχίζομεν μὲ $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς;

Κατάταξις. 1 δὲκὰ $\frac{11}{5}$ τῆς δραχ.

Λύσις. Θὰ εὑρωμεν πρῶτον, πόσον ἀγοράζομεν μὲ μίαν δραχμὴν καὶ ἔπειτα πόσον ἀγοράζομεν μὲ $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς, σκεπτόμενοι ὡς ἑξῆς

Ἀφοῦ μὲ $\frac{11}{5}$ τῆς δραχμῆς ἀγοράζομεν 1 δὲκὰν
 μὲ $\frac{1}{5}$ » » $\frac{1}{11}$ τῆς δὲκᾶς
 καὶ μὲ $\frac{5}{5}$ ἦτοι μὲ 1 δραχ. » $\frac{5}{11}$ »

Ἀφοῦ μὲ 1 δραχμὴν » $\frac{5}{11}$ »
 μὲ $\frac{1}{4}$ τῆς δραχμῆς » $\frac{5}{11 \times 4}$ τῆς δὲκᾶς
 καὶ μὲ $\frac{3}{4}$ » » $\frac{5 \times 3}{11 \times 4}$ ἢ $\frac{15}{44}$ »

Εἰς τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα ἐδόθησαν δύο ὁμοειδεῖς τιμαί, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία (ἦτοι $2 \frac{1}{5}$ τῆς δραχ.) εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος ἢ δὲ ἄλλη (ἦτοι τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς δραχ.) εἶναι ἡ τιμὴ τοῦ εὐρεθέντος μέτρος

τῆς μονάδος, ἦτοι τῶν $\frac{5 \times 3}{11 \times 4}$ ἢ $\frac{15}{44}$ τῆς ὀκάς. Ἄλλ' ὁ ἀριθμὸς $\frac{5 \times 3}{11 \times 4}$ εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $\frac{3}{4} : \frac{11}{5}$. Ὡστε γενικεύομεν τὸν κανόνα τῆς διαιρέσεως τοῦ ἑδαφίου 64 ὡς ἑξῆς:

142. Ὄταν γνωρίζωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος καὶ θέλωμεν νὰ εὗρωμεν τὰς πολλὰς μονάδας ἢ μέρος τῆς μονάδος, τοῦ ὁποῖου τὴν ὁμοειδῆ τιμὴν ἔχομεν, κάμνομεν διαίρεσιν (μέτρησιν).

Διαιρετέος εἶναι πάντοτε ἡ τιμὴ τῶν ζητουμένων πολλῶν μονάδων ἢ τοῦ μέρους τῆς μονάδος, διαιρετῆς δὲ ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος. Ἀμφότεροι θεωροῦνται ὡς ἀφηρημένοι ἀριθμοί, τὸ δὲ πηλίκον εἶναι ὁμοειδὲς μὲ τὴν μονάδα, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν.

4) Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν $\frac{5}{8}$ τοῦ πήχεως ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος δίδομεν μίαν δραχμὴν· πόσον θὰ δώσωμεν διὰ νὰ ἀγοράσωμεν $4 \frac{1}{2}$ τοῦ πήχεως ἕκ τοῦ ἰδίου ὑφάσματος :

<i>Κατάταξις</i>	$\frac{5}{8}$ πήχ.	1 δρα.
	$4 \frac{1}{2}$	χ

Κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα θὰ κάμωμεν διαίρεσιν (μέτρησιν) καὶ ὅσας φορὰς ὁ $\frac{5}{8}$ χωρεῖ εἰς τὸν $4 \frac{1}{2}$, τόσας δραχμὰς θὰ δώσωμεν, ἦτοι $4 \frac{1}{2} : \frac{5}{8} = \frac{9}{2} : \frac{5}{8} = \frac{9}{2} \times \frac{8}{5} = 7 \frac{1}{5}$ τῆς δραχ.

5) Τὰ $\frac{3}{8}$ ἑνὸς ἀριθμοῦ εἶναι 141· ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς οὗτος :

Λύσις. Ἀφοῦ τὰ $\frac{3}{8}$ τοῦ ζητουμένου ἀριθμοῦ εἶναι 141

τὸ $\frac{1}{8}$	»	»	»	$\frac{141}{3}$
καὶ τὰ $\frac{8}{8}$,	ἦτοι ὅλος ὁ ἀριθμὸς,	»	»	$\frac{141 \times 8}{3}$ ἢ 376.

Ἄλλ' ὁ εὗρεθεὶς ἀριθμὸς $\frac{141 \times 8}{3}$ εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $141 : \frac{3}{8}$. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

143. Ὄταν γνωρίζωμεν μέρος ἑνὸς ἀριθμοῦ καὶ θέλωμεν νὰ εὗρωμεν ὅλον τὸν ἀριθμὸν, κάμνομεν διαίρεσιν.

Διαιρετέος εἶναι πάντοτε τὸ γνωστὸν μέρος τοῦ ζητουμένου ἀριθμοῦ καὶ διαιρετῆς τὸ κλάσμα, διὰ τοῦ ὁποῖου ἐκφράζεται τὸ μέρος τοῦτο.

6) Τά $\frac{9}{16}$ τῆς ἡλικίας ἐνὸς ἀνθρώπου εἶναι 27 ἔτη· πόση εἶναι ἡλικία αὐτοῦ ; $(27 : \frac{9}{16} \text{ ἢ } 48 \text{ ἔτων})$

7) Μὲ $\frac{7}{20}$ τῆς δραχμῆς ἀγοράζομεν $\frac{3}{5}$ τῆς ὀκάς ἕξ ἐνὸς πράγματος πόσον ἀγοράζομεν μὲ $\frac{7}{9}$ τῆς δραχμῆς ;

Κατάταξις. $\frac{7}{20}$ δραχ. $\frac{3}{5}$ ὀκ.
 $\frac{7}{9}$ ζ

Λύσις. Διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

Ἀφοῦ μὲ $\frac{7}{20}$ τῆς δραχμῆς ἀγοράζομεν $\frac{3}{5}$ τῆς ὀκάς,

μὲ $\frac{1}{20}$ » » $\frac{3}{5 \times 7}$ »

καὶ μὲ $\frac{20}{20}$, ἥτοι μὲ 1 δραχ. » $\frac{3 \times 20}{5 \times 7}$ »

Ἀφοῦ μὲ 1 δραχμὴν » $\frac{3 \times 20}{5 \times 7}$ »

μὲ $\frac{1}{9}$ τῆς δραχμῆς » $\frac{3 \times 20}{5 \times 7 \times 9}$ »

καὶ μὲ $\frac{7}{9}$ » » $\frac{3 \times 20 \times 7}{5 \times 7 \times 9}$ »

ἢ $1 \frac{1}{3}$ τῆς ὀκάς μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν.

Τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα δυνάμεθα νὰ λύσωμεν καὶ ὡς ἑξῆς. Εὐρίσκομεν πρῶτον πόσον ἀγοράζομεν μὲ μίαν δραχμὴν· πρὸς τοῦτο ἐφαρμόζομεν τὸν κανόνα τοῦ ἑδαφίου 137 καὶ εὐρίσκομεν $\frac{3}{5} : \frac{7}{20} = \frac{3}{5} \times \frac{20}{7}$ ἢ $\frac{12}{7}$ τῆς ὀκάς. Ἐπειτα εὐρίσκομεν πόσον ἀγοράζομεν μὲ $\frac{7}{9}$ τῆς δραχμῆς· πρὸς τοῦτο ἐφαρμόζομεν τὸν κανόνα τοῦ ἑδαφίου 124 καὶ εὐρίσκομεν $\frac{12}{7} \times \frac{7}{9}$ ἢ $1 \frac{1}{3}$ τῆς ὀκάς.

8) Γυνὴ τις ἠγόρασεν 7 πήχεις ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος καὶ ἔδωκεν $9 \frac{4}{5}$ τῆς δραχμῆς· πόσον θὰ ἔδιδεν, ἂν ἠγόραζεν $8 \frac{1}{3}$ τοῦ πήχεως ;

Κατάταξις. 7 πήχ. $\frac{49}{5}$ τῆς δραχ.
 $\frac{25}{3}$ ζ

Λύσεις. Διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

Ἐφοῦ οἱ 7 πῆχαι ἀξίζουν $\frac{49}{5}$ τῆς δραχμῆς.

$$\delta\ \text{1 πῆχυς ἀξίζει} \frac{49}{5 \times 7} \quad \gg$$

$$\text{τὸ } \frac{1}{3} \text{ τοῦ πῆχ. } \gg \frac{49}{5 \times 7 \times 3} \quad \gg$$

$$\text{καὶ τὰ } \frac{25}{3} \quad \gg \quad \gg \frac{49 \times 25}{5 \times 7 \times 3} \quad \eta \quad 11 \frac{2}{3} \text{ τῆς δραχμῆς.}$$

Ἡ καὶ ὡς ἐξῆς. Ὁ πῆχυς ἀξίζει $9 \frac{4}{5} : 7 \eta \frac{7}{5}$ τῆς δραχμῆς (ἴδε ἐδάφ. 135), ἐπομένως οἱ $8 \frac{1}{3}$ τοῦ πῆχ. ἀξίζουν $\frac{7}{5} \times 8 \frac{1}{3} \eta 11 \frac{2}{3}$ τῆς δραχμῆς.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἠγόρασέ τις 3 πῆχαις ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος καὶ ἔδωκε $17 \frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς. Πόσον ἀξίζει ὁ πῆχυς; $(5 \frac{4}{5} \text{ τῆς δρ.})$

2) Ἠγόρασέ τις $\frac{15}{16}$ τῆς ὀκᾶς καφὲ καὶ ἔδωκεν 6 δραχμάς. Πόσον ἀξίζει ἡ ὀκᾶ; $(6 \frac{2}{5} \text{ τῆς δρ.})$

3) Μὲ $2 \frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς ἀγοράζομεν $\frac{9}{10}$ τῆς ὀκᾶς ἐξ ἑνὸς πράγματος. Πόσον ἀγοράζομεν μὲ μίαν δραχμὴν; $(\frac{3}{8} \text{ τῆς ὀκᾶς})$

4) Ἠγόρασέ τις 120 δράμια βουτύρου καὶ ἔδωκε $4 \frac{1}{5}$ τῆς δραχμῆς. Πόσον ἀξίζει ἡ ὀκᾶ; (14 δρ.)

5) Ἐὰν ἡ ὀκᾶ τοῦ κρέατος ἀξίζη $4 \frac{4}{5}$ τῆς δραχμῆς, πόσον ἀγοράζομεν μὲ 12 δραχμάς; $(2 \frac{1}{2} \text{ ὀκ.})$

6) Γυνὴ τις ἀντήλλαξεν 9 πῆχαις ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου ὁ πῆχυς ἀξίζει $5 \frac{1}{4}$ τῆς δραχμῆς, μὲ ἄλλο ὑφασμα, τοῦ ὁποίου ὁ πῆχυς ἀξίζει 6 δρ. Πόσων πῆχεων ἦτο τὸ ἄλλο ὑφασμα; $(7 \frac{7}{8})$

Σημ. Ἴδε λύσιν τοῦ 9ου προβλήματος τῆς σελίδος 49.

7) Ἠγόρασέ τις πορτοκάλια πρὸς 13 λεπτὰ τὰ δύο· κατόπιν ἐπώλη-

σεν αὐτὰ πρὸς 10 λ. ἕκαστον καὶ ἐκέρδισε 14 δρ. Πόσα πορτοκάλια ἠγόρασε ;

Λύσις. Ἐκαστον πορτοκάλιον ἠγόρασε πρὸς $\frac{13}{2}$ ἢ $6\frac{1}{2}$ λεπτά, ἐπομένως ἀπὸ ἕκαστον ἐκέρδισεν $3\frac{1}{2}$ λ. Ὅσας λοιπὸν φορὰς τὰ $3\frac{1}{2}$ λ. χωροῦν εἰς τὰς 14 δρ. ἢ 1400 λ., τόσα πορτοκάλια ἠγόρασεν, ἦτοι 400.

8) Μὲ 5 δραχ. ἀγοράζομεν 3 ὀκάδας ἐξ ἑνὸς πράγματος. Πόσον ἀγοράζομεν μὲ $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς ; $\left(\frac{9}{20}$ τῆς ὀκάς, ἦτοι 180 δράμια)

9) Διὰ τὴν ἀγοράσῃ τις 4 πήχεις ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος, δίδει 15 δραχμάς. Πόσον θὰ δώσῃ διὰ 9 πήχεις ; $\left(33\frac{3}{4}$ -δρ.)

10) Ἀτμόπλοιον διατρέχει 15 μίλια εἰς $1\frac{1}{4}$ τῆς ὥρας. Πόσον χρόνον θὰ χρειασθῆ, διὰ τὴν μεταβῆ ἀπὸ μιᾶς πόλεως εἰς ἄλλην, ἀπέχουσαν 140 μίλια ; $\left(11\frac{2}{3}$ -ῶρ.)

11) Διὰ τὴν ἀγοράσῃ τις $2\frac{1}{4}$ τῆς ὀκάς ἐλαίου, δίδει $7\frac{1}{5}$ τῆς δραχμῆς. Πόσον θὰ δώσῃ διὰ 300 δράμια ; $\left(2\frac{2}{5}$ τῆς δρ.)

12) Στρατιῶταί τινες, διὰ τὴν περάσουσαν 20 ἡμέρας, χρειάζονται 5700 ὀκ. ἄρτου, ἕκαστος τῶν ὀπείων λαμβάνει τὴν ἡμέραν $\frac{3}{4}$ τῆς ὀκάς. Πόσοι εἶναι οἱ στρατιῶται ;

Λύσις. Ἐκαστος στρατιώτης εἰς 20 ἡμ. λαμβάνει $\frac{3}{4} \times 20$ ἢ 15 ὀκ. ἄρτου, ὥστε εἶναι τόσοι στρατιῶται, ὅσας φορὰς ὁ 15 χωρεῖ εἰς τὸν 5700, ἦτοι $5700 : 15$ ἢ 380.

13) ἠγόρασέ τις $3\frac{5}{8}$ τῆς ὀκάς σάπωνος πρὸς $2\frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς τὴν ὀκᾶν καὶ $2\frac{1}{2}$ ὀκ. ἐλαίου καὶ ἔδωκεν ἐν ὅλῳ $16\frac{1}{5}$ τῆς δρ. Πόσον ἀξίζει ἡ ὀκᾶ τοῦ ἐλαίου ; (3 δρ.)

14) Παιδίον τι ἔδωκεν εἰς τινὰ πτωχὸν τὰ $\frac{2}{9}$ τῶν χρημάτων του καὶ τοῦ ἔμειναν 105 λεπτά. Πόσα λεπτά εἶχεν ;

Λύσις. Ὅλα τὰ χρήματά του θὰ παρασταθῶσι διὰ τοῦ κλάσματος $\frac{9}{9}$. Ἀφοῦ λοιπὸν ἔδωκε τὰ $\frac{2}{9}$, τοῦ ἔμειναν τὰ $\frac{7}{9}$ τῶν χρημάτων του,

τὰ ὁποῖα εἶναι 105 λεπτά, ἐπομένως τὸ $\frac{1}{9}$ εἶναι $\frac{105}{7}$ καὶ τὰ $\frac{9}{9}$ εἶναι $\frac{105 \times 9}{7}$ ἢ 135 λεπτά.

15) Γυνή τις ἔδωκε τὰ $\frac{5}{8}$ τῶν ὄσων εἶχε μαζί της χρημάτων καὶ 2 δρ. ἀκόμη, διὰ τὸ ἀγοράσῃ ὕφασμά τι, καὶ τῆς ἔμειναν 16 δραχμαί. Πόσας δραχμάς εἶχε μαζί της καὶ πόσον ἔδωκε διὰ τὸ ὕφασμα ;

Δύσις. Ἐὰν δὲν ἔδιδε τὰς 2 δραχμάς, θὰ τῆς ἔμενον 18 δρ. Ὡστε τὰ $\frac{3}{8}$ τῶν χρημάτων της, τὰ ὁποῖα ἔμειναν, εἶναι 18 δρ. καὶ ἐπομένως ὅλα τὰ χρήματά της εὐρίσκομεν ὅτι ἦσαν 48 δραχμαί, διὰ δὲ τὸ ὕφασμα ἔδωκε 48—16 ἢ 32 δρ.

16) Ἐμπορὸς τις ἐπώλησεν ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος τὰ $\frac{3}{8}$ αὐτοῦ πρὸς $3\frac{1}{2}$ τῆς δραχμῆς τὸν πῆχυν καὶ τοῦ ἔμειναν 20 πήχεις. Πόσους πήχεις ἐπώλησε καὶ πόσον ἔλαβεν ἐκ τοῦ πωληθέντος ὑφάσματος ;

Δύσις. Ἀφοῦ ἐπώλησε τὰ $\frac{3}{8}$, τοῦ ἔμειναν τὰ $\frac{5}{8}$ τοῦ ὑφάσματος, τὰ ὁποῖα εἶναι 20 πήχεις, ἐπομένως τὸ $\frac{1}{8}$ εἶναι $\frac{20}{5}$, καὶ τὰ $\frac{3}{8}$ ποῦ ἐπώλησεν εἶναι $\frac{20 \times 3}{5}$ ἢ 12 πήχεις. Ὡστε ἔλαβε $3\frac{1}{2} \times 12$ ἢ 42 δρ.

17) Ἐργάτης τις ἐξώδευε τὴν ἡμέραν τὰ $\frac{5}{7}$ τοῦ ἡμερομισθίου του καὶ μετὰ 16 ἡμερῶν ἐργασίαν εἶχεν οἰκονομήσει 64 δρ. Πόσον ἦτο τὸ ἡμερομισθίον του ;

Δύσις. Τὴν ἡμέραν ἔκαμεν οἰκονομίαν 64 : 16, ἦτοι 4 δρ. Ὡστε τὰ $\frac{2}{7}$ τοῦ ἡμερομισθίου του εἶναι 4 δρ. καὶ ἐπομένως ὅλον τὸ ἡμερομισθίον του εὐρίσκομεν ὅτι ἦτο 14 δρ.

18) Ποιμὴν τις ἐπώλησεν εἰς τινα τὰ $\frac{3}{7}$ τῶν προβάτων του, εἰς ἄλλον δὲ τὰ $\frac{2}{5}$ τοῦ ὑπολοίπου· ἔπειτα εὗρεν ὅτι τοῦ ἔμειναν 144 πρόβατα. Πόσα πρόβατα εἶχεν ἀπ' ἀρχῆς καὶ πόσα ἐπώλησεν εἰς ἕκαστον ;

Δύσις. Ἀφοῦ ἐπώλησε τὰ $\frac{3}{7}$, τοῦ ἔμειναν τὰ $\frac{4}{7}$ ἐκ τοῦ ὑπολοίπου τούτου ἐπώλησε τὰ $\frac{2}{5}$, ἐπομένως τοῦ ἔμειναν τὰ $\frac{3}{5}$ αὐτοῦ, ἦτοι $\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$ ἢ 131) ἢ $\frac{12}{35}$. Ὡστε τὰ $\frac{12}{35}$ τῶν προβάτων του εἶναι 144 καὶ ἐπομέ-

νως ὅλα τὰ πρόβατά του εὐρίσκομεν ὅτι ἦσαν 420. Εἰς τὸν πρῶτον ἐπώλησε $420 \times \frac{3}{7}$ ἦτοι 180, καὶ ἐπομένως τοῦ ἔμειναν 240· εἰς δὲ τὸν δεύτερον ἐπώλησε $240 \times \frac{2}{5}$, ἦτοι 96.

19) Δύο γυναῖκες ὑφαίνουσι χωριστὰ τὸ αὐτὸ ὕφασμα· ἡ μία τούτων ὑφαίνει εἰς μίαν ὥραν τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ πήχεως, ἡ δὲ ἄλλη τὸ $\frac{1}{3}$ τοῦ πήχεως. Ἐὰν ἀρχίσουν συγχρόνως τὴν ἐργασίαν των, μετὰ πόσας ὥρας θὰ ὑφάνουν μαζὶ 4 πήχεις ;

Λύσις. Εἰς μίαν ὥραν ὑφαίνουν μαζὶ τὰ $\frac{5}{6}$ τοῦ πήχεως, ἐπομένως διὰ τοὺς 4 πήχ. θὰ χρειασθοῦν τόσας ὥρας, ὅσας φορὰς ὁ $\frac{5}{6}$ χωρεῖ εἰς τὸν 4, ἦτοι $4 : \frac{5}{6}$ ἢ $4 \frac{4}{5}$ τῆς ὥρας.

20) Χωρική τις ἔφερεν εἰς μίαν πόλιν 240 αἰγά· ἐκ τούτων ἐπώλησεν εἷς τινα τὰ $\frac{3}{5}$ πρὸς 15 λεπτὰ ἕκαστον, τὰ δὲ ὑπόλοιπα ἐπώλησεν εἰς ἄλλον πρὸς 35 λ. τὸ ζεῦγος· κατόπιν μὲ τὰ χρήματα ἅτινα ἔλαβεν, ἠγόρασεν ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος 24 πήχεις. Ζητεῖται πόσον ἠγόρασε τὸν πῆχυν. (160 λεπτὰ)

21) Ἠγόρασέ τις 3000 λεμόνια πρὸς 35 δραχμὰς τὴν χιλιάδα· κατόπιν ἐπώλησεν εἷς τινα τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτῶν πρὸς 20 λεπτὰ τὰ τρία, εἰς ἄλλον δὲ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 70 λεπτὰ τὴν δωδεκάδα. Πόσον ἐκέρδισεν ; (80 δρ.)

22) Ἐμπορὸς τις ἐπώλησε δύο εἶδη ὑφασμάτων· ἀπὸ τὸ πρῶτον εἶδος ἐπώλησε $12 \frac{1}{2}$ πήχεις πρὸς 4 δραχ. τὸν πῆχυν, ἀπὸ δὲ τὸ δεύτερον ἐπώλησε 16 πήχεις καὶ ἔλαβεν $8 \frac{2}{5}$ τῆς δραχμῆς ὀλιγώτερον τοῦ πρώτου. Πόσον ἐπώλησε τὸν πῆχυν τοῦ δευτέρου ὑφάσματος ;

($2 \frac{3}{5}$ τῆς δρ.)

23) Τρεῖς ἀδελφοὶ ἐμοίρασαν ἓν οἰκόπεδον ὡς ἐξῆς· ὁ πρῶτος ἔλαβεν τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτοῦ, ὁ δεύτερος τὸ $\frac{1}{4}$ καὶ ὁ τρίτος τὸ ὑπόλοιπον, τὸ ὁποῖον ἦτο 350 πήχεις. Πόσων πήχεων ἦτο τὸ οἰκόπεδον καὶ πόσους πήχεις ἔλαβεν ἕκαστος τῶν ἄλλων ;

Λύσις. Οἱ δύο πρῶτοι ἔλαβον ὁμοῦ τὰ $\frac{2}{5} + \frac{1}{4}$ ἢ $\frac{13}{20}$ τοῦ οἰκοπέ

δου, επομένως ὁ τρίτος ἔλαβε τὸ ὑπόλοιπον $\frac{7}{20}$, τὸ ὁποῖον εἶναι 350 πήχεις· ὥστε ὅλον τὸ οἰκόπεδον εὐρίσκομεν ὅτι ἦτο 1000 πήχεις. Ὁ πρῶτος ἔλαβεν $1000 \times \frac{2}{5}$, ἦτοι 400 πήχεις, καὶ ὁ δεύτερος $1000 \times \frac{1}{4}$, ἦτοι 250 πήχεις.

24) Οἰκογενειάρχης τις ἐξώδευσεν εἰς ἓνα μῆνα τὸ $\frac{1}{6}$ τῆς μισθοδοσίας του δι' ἐνοίκιον, τὰ $\frac{3}{5}$ αὐτῆς διὰ τροφὴν καὶ τὸ $\frac{1}{10}$ δι' ἄλλα ἔξοδα, εἰς δὲ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς τοῦ ἔμειναν 80 δραχμαί. Ζητεῖται πόση εἶναι ἡ μηνιαία μισθοδοσία του καὶ πόσας δραχμὰς ἐξώδευσε δι' ἐνοίκιον, διὰ τροφὴν καὶ δι' ἄλλα ἔξοδα.

Λύομεν τοῦτο ὅπως καὶ τὸ ἀνωτέρω καὶ εὐρίσκομεν μισθὸν 600 δρ., ἐνοίκιον 100, τροφὴν 360 καὶ ἔξοδα ἄλλα 60 δρ.

25) Μία λάμπα καίει καθ' ὥραν 20 δράμια πετρελαίου καὶ ἐπὶ ἓνα μῆνα (30 ἡμ.) ἔμενεν ἀνημμένη καθ' ἐσπέραν ἐπὶ $3\frac{1}{2}$ ὥρας, ὁ δὲ φωτισμὸς αὐτῆς ἐκόστισε τὸν μῆνα $10\frac{1}{2}$ τῆς δραχμῆς. Πόσον ἐκόστιζεν ἡ ὀκᾶ τοῦ πετρελαίου;

Λύσις. Τὴν ἐσπέραν καίει $20 \times 3\frac{1}{2}$ ἢ 70 δράμια καὶ ἐπομένως τὸν μῆνα 70×30 ἢ 2100 δράμια, τὰ ὁποῖα ἀξίζουσιν $10\frac{1}{2}$ ἢ $\frac{21}{2}$ τῆς δραχμῆς, ὥστε τὸ 1 δράμιον ἀξίζει $\frac{21}{2 \times 2100}$ καὶ τὰ 400 δράμια ἀξίζουσιν $\frac{21 \times 400}{2 \times 2100}$ ἢ 2 δραχ.

Νοερὰὶ ἰσκήσεις.

Εὗρεσις τῆς ἀξίας δραμίων ἐκ τῆς ἀξίας τῆς ὀκᾶς.

144. Ὄταν ἡ ὀκᾶ ἑνὸς πράγματος ἀξίζῃ 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. δραχμὰς, εὐρίσκομεν διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα ὅτι τὸ ἓν δράμιον ἀξίζει $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{5}{4}$ κτλ. τοῦ λεπτοῦ. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἑξῆς πρᾶκτικὸν κανόνα.

Ὄταν ἡ ἀξία τῆς ὀκᾶς ἀποτελῆται μόνον ἀπὸ ἀκέραιον ἀριθμὸν δραχμῶν καὶ θέλωμεν νὰ εὕρωμεν νοερῶς τὴν ἀξίαν τοῦ ἑνὸς δραμίου, διαιροῦμεν τὴν ἀξίαν τῆς ὀκᾶς διὰ 4 καὶ τὸ πηλίκον παριστᾷ λεπτά.

Ευρεθείσης δὲ τῆς ἀξίας τοῦ ἑνὸς δραμίου, εὐρίσκομεν εὐκόλως καὶ νοερώς τὴν ἀξίαν πολλῶν δραμίων διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Παραδ. χάριν.

1) Ἡ δὲ ἀξία ἑνὸς πράγματος ἀξίζει 28 δραχμάς. Πόσον ἀξίζουν τὰ 9 δράμια ;

Λύσις. Τὸ ἓν δράμιον ἀξίζει 28 : 4, ἴτοι 7 λεπτά, ἐπομένως τὰ 9 δράμια ἀξίζουν 7×9 , ἴτοι 63 λεπτά.

2) Ἡ δὲ ἀξία ἑνὸς πράγματος ἀξίζει 14 δραχμάς. Πόσον ἀξίζουν τὰ 12 δράμια ;

Λύσις. Τὸ ἓν δράμιον ἀξίζει $3\frac{1}{2}$ λεπτά (διότι εἶναι $14 : 4 = 3\frac{2}{4} = 3\frac{1}{2}$), ἐπομένως τὰ 12 δράμια ἀξίζουν $12 \times 3\frac{1}{2}$, ἴτοι 42 λεπτά (πολλαπλασιάζομεν τὸν 12 πρῶτον ἐπὶ 3 καὶ εἰς τὸ γινόμενον 36 προσθέτομεν τὸ ἥμισυ τοῦ 12, τὸ ὅποιον εἶναι 6).

Παρατήρησις. Εἴτε τὴν ἀξίαν τῆς δὲ ἀξίας διαιρέσωμεν διὰ 4 καὶ μετὸ πηλίκον πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν δραμίων, εἴτε τὸν ἀριθμὸν τῶν δραμίων διαιρέσωμεν διὰ 4 καὶ μετὸ πηλίκον πολλαπλασιάσωμεν τὴν ἀξίαν τῆς δὲ ἀξίας, τὸ αὐτὸ γινόμενον εὐρίσκομεν. Διὰ τοῦτο, χάριν εὐκολίας, προτιμῶμεν νὰ διαιρῶμεν διὰ 4 τὸν ἀριθμὸν ἐκεῖνον, μετὸ τοῦ ὁποίου τὸ πηλίκον δυνάμεθα εὐκόλως νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἄλλον ἀριθμὸν. Παραδ. χάριν, εἰς τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα ἀντὶ νὰ διαιρέσωμεν τὸν 14 διὰ 4 καὶ μετὸ πηλίκον $3\frac{1}{2}$ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 12, προτιμῶμεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν 12 διὰ 4 καὶ μετὸ πηλίκον 3 νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 14, ὅτε πάλιν εὐρίσκομεν 42 λ.

3) Ἡ δὲ ἀξία ἑνὸς πράγματος ἀξίζει 7 δραχμάς. Πόσον ἀξίζουν τὰ 240 δράμια ;

Λύσις. Διαιροῦμεν τὸν 240 διὰ 4 (ὡς διαιρετὸν) καὶ μετὸ πηλίκον 60 πολλαπλασιάζομεν τὸν 7 καὶ εὐρίσκομεν 420 λ. ἢ 4 δρ. καὶ 20 λ.

Ὅταν ὁμως ἡ ἀξία τῆς δὲ ἀξίας ἀποτελεῖται μόνον ἀπὸ λεπτά καὶ θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν ἀξίαν δεκάδων τινῶν δραμίων, παραλείπομεν τὸ ψηφίον τῶν μονάδων ἀπὸ τὴν ἀξίαν τῆς δὲ ἀξίας, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν δραμίων, καὶ πράττομεν ὅπως καὶ ἀνωτέρω. Π. χ.

4) Ἡ δὲ ἀξία ἑνὸς πράγματος ἀξίζει 90 λεπτά. Πόσον ἀξίζουν τὰ 320 δράμια ;

Λύσις. Παραλείπομεν τὸ ψηφίον 0 τῶν μονάδων τῶν καὶ ἔχομεν τότε τοὺς ἀριθμοὺς 9 καὶ 32. Τὸν ἓνα τούτων διαιροῦμεν διὰ 4, προτιμῶμεν τὸν 32 ὡς διαιρετὸν, καὶ μετὸ πηλίκον 8 πολλαπλασιάζομεν τὸν

ἄλλον, ἦτοι τὸν 9, καὶ εὐρίσκομεν 72 λ. Τὸ αὐτὸ εὐρίσκομεν καὶ ἂν διαιρέσωμεν τὸν 9 διὰ 4 καὶ μὲ πηλίκον $2\frac{1}{4}$ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 32.

Ἐὰν ἡ ἀξία τῆς ὀκᾶς ἀποτελεῖται ἀπὸ δραχμᾶς καὶ λεπτά, τρέπομεν τότε καὶ τὰς δραχμᾶς εἰς λεπτά καὶ πράττομεν ὡς ἀνωτέρω.

Σημ. Ἐὰν συμβῆ τὸ παραλειφθὲν ψηφίον τῶν μονάδων ἐκ τῆς ἀξίας τῆς ὀκᾶς νὰ εἶναι 5, κάμνομεν τότε λάθος 1 λεπτὸν εἰς κάθε 80 δράμια. Ἀλλὰ τοιαύτην ἀκριβείαν δὲν παρατηροῦμεν συνήθως εἰς τὰ καθ' ἑκάστην ἀγοραζόμενα πράγματα. Ἐὰν πάλιν συμβῆ τὸ παραλειφθὲν ψηφίον τῶν μονάδων ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δραμιῶν νὰ εἶναι 5, κάμνομεν τότε λάθος $1\frac{1}{4}$ τοῦ λεπτοῦ εἰς κάθε μίαν δραμὴν τῆς ἀξίας τῆς ὀκᾶς καὶ ἐπομένως μίαν πεντάραν εἰς κάθε 4 δρ.

Τύποι πρὸς λύσιν στοιχειωδῶν προβλημάτων.

145. Πότε στοιχειῶδες πρόβλημά τι λύεται δι' ἑνὸς μόνου πολλαπλασιασμοῦ ἢ διὰ μιᾶς μόνης διαιρέσεως (μερισμοῦ ἢ μετρήσεως), ἔχομεν τοὺς γνωστοὺς κανόνας τῶν ἑδαφίων 124, 137 καὶ 142, οἱ ὅποιοι ἐξήχθησαν κατόπιν συλλογισμοῦ. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ αὐτοὶ συλλογισμοὶ γίνονται δι' οἰουσδήποτε ἀριθμοῦς, διὰ τοῦτο πρὸς συντομίαν παριστῶμεν τοὺς ἀριθμοὺς διὰ τῶν γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου, ἀλλ' ἕκαστον ἀριθμὸν πρέπει πρὸς διάκρισιν νὰ τὸν παριστῶμεν καὶ δι' ἰδίου γράμματος. Παραδ. χάριν, ἀντὶ νὰ εἴπωμεν, ὅτι μὲ 20 δραχ. ἀγοράζομεν 4 ὀκ. ἐξ ἑνὸς πράγματος, λέγομεν μὲ α δραχμᾶς ἀγοράζομεν β ὀκάδας ἢ ἀντὶ α καὶ β δυνάμεθα νὰ λάβωμεν οἰαδήποτε ἄλλα γράμματα, ἀλλὰ διάφορα. Ἐκ τῆς λύσεως λοιπὸν τῶν στοιχειωδῶν τούτων προβλημάτων, εἰς τὰ ὅποια οἱ ἀριθμοὶ παρίστανται διὰ γραμμάτων, θὰ μάθωμεν ἄλλον τρόπον σύντομον, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ λύωμεν τὰ τοιαῦτα προβλήματα.

Πρόβλημα. Ἡ ὀκᾶ ἑνὸς πράγματος τιμᾶται α δραχμᾶς. Πόσον τιμῶνται β ὀκάδες;

Λύσις. Ἐὰν ἠγοράζομεν π.χ. 5 ὀκάδας, θὰ ἐσκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς ἄφοῦ ἡ 1 ὀκᾶ τιμᾶται α δραχμᾶς, αἱ 5 ὀκ. θὰ τιμῶνται 5-φορὰς περισσότερον, ἦτοι $\alpha \times 5$ δρ. Οὕτω σκεπτόμεθα καὶ διὰ τὰς β ὀκάδας λέγοντες ἄφοῦ ἡ 1 ὀκᾶ τιμᾶται α δραχμᾶς, αἱ β ὀκ. θὰ τιμῶνται β-φορὰς περισσότερον, ἦτοι $\alpha \times \beta$ δραχμᾶς.

Ἡ σημείωσις ἀριθμητικῆς πράξεως ἐπὶ γραμμάτων, ὡς εἶναι ἡ $\alpha \times \beta$, λέγεται *τύπος*. Ἐὰν τώρα μᾶς δοθῶσιν οἰοιδήποτε ἀριθμοὶ ὁμοίου προβλήματος πρὸς τὸ ἀνωτέρω καὶ θέσωμεν αὐτοὺς ἐν τῷ τύπῳ

$\alpha \times \beta$ ἀντὶ τῶν γραμμάτων α καὶ β , εὐρίσκομεν μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τὸ ζητούμενον, χωρὶς νὰ ἐπαναλάβωμεν τοὺς ἀνωτέρω συλλογισμοὺς. Παρ. χάριν, ἡ δὲκὰ ἐνὸς πράγματος τιμᾶται 4 δρα., πόσον τιμῶνται $9 \frac{1}{2}$ δκάδες; Θέτομεν ἐν τῷ τύπῳ $\alpha \times \beta$ ἀντὶ τοῦ α τὸν 4 καὶ ἀντὶ τοῦ β τὸν $9 \frac{1}{2}$ καὶ ἔχομεν $4 \times 9 \frac{1}{2}$, ἦτοι 38 δραχμάς.

Πρόβλημα. Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν β δκάδας ἕξ ἐνὸς πράγματος, δίδομεν α δραχμάς. Πόσον θὰ δώσωμεν διὰ νὰ ἀγοράσωμεν μίαν δκᾶν;

Λύσις. Ἐὰν μὲ τὰς α δραχ. ἠγοράζομεν π. χ. 5 δκάδας, θὰ ἐσκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς· ἀφοῦ διὰ 5 δκ. δίδομεν α δραχμάς, διὰ τὴν 1 δκᾶν θὰ δώσωμεν 5 φορὰς ὀλιγώτερον, ἦτοι $\frac{\alpha}{5}$ ἢ $\alpha : 5$. Οὕτω σκεπτόμεθα καὶ διὰ τὰς β δκάδας λέγοντες· ἀφοῦ διὰ β δκάδας δίδομεν α δραχμάς, διὰ 1 δκᾶν θὰ δώσωμεν β φορὰς ὀλιγώτερον, ἦτοι $\frac{\alpha}{\beta}$ ἢ $\alpha : \beta$. Ἐὰν τώρα μᾶς δοθῶσιν οἰοιδίηποτε ἀριθμοὶ ὁμοίου προβλήματος πρὸς τὸ ἀνωτέρω καὶ θέσωμεν αὐτοὺς ἐν τῷ τύπῳ $\frac{\alpha}{\beta}$ ἢ $\alpha : \beta$ ἀντὶ τῶν γραμμάτων α καὶ β , εὐρίσκομεν μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς διαιρέσεως τὸ ζητούμενον.

Πρόβλημα. Ὁ πῆχυς ἐνὸς ὑφάσματος ἀξιῶει β δραχμάς. Πόσους πήχεις ἀγοράζομεν μὲ α δραχμάς;

Λύσις. Ἐὰν ὁ πῆχυς ἦξιζε π. χ. 2 δραχμάς, θὰ ἐσκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς· ὅσας φορὰς αἱ 2 δραχμαὶ χωροῦν εἰς τὰς α δραχμάς, τόσους πήχεις ἀγοράζομεν, ἦτοι $\frac{\alpha}{2}$ ἢ $\alpha : 2$. Οὕτω σκεπτόμεθα καὶ διὰ τὰς β δραχμάς λέγοντες· ὅσας φορὰς αἱ β δραχμαὶ χωροῦν εἰς τὰς α δραχμάς, τόσους πήχεις ἀγοράζομεν, ἦτοι $\frac{\alpha}{\beta}$ ἢ $\alpha : \beta$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

146. Εἴπομεν (ἐδάφ. 85), ὅτι *κλασματικὴ μονὰς λέγεται ἐν τῶν ἴσων μερῶν, εἰς τὰ ὁποῖα διαιρεῖται ἡ ἀκεραία μονὰς, δηλ. ἐν πρᾶγμα ἀκέραιον*. Ὅσαι ὅμως τῶν κλασματικῶν μονάδων ἔχουν παρονομαστὴν τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ὑπὸ μηδενικῶν, ὡς εἶναι αἱ ἑξῆς

ατὰ σειρὰν $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$, $\frac{1}{10000}$ κτλ., λέγονται **δεκαδικαὶ κλασματικαὶ μονάδες** ἢ ἁπλῶς **δεκαδικαὶ μονάδες**· διότι ἐκάστη εἶναι δεκαπλασία τῆς ἀμέσως ἐπομένης τῆς. Τὸ δέκατον εἶναι δεκαδικὴ μονὰς *πρώτης τάξεως*, τὸ ἑκατοστὸν *δευτέρας τάξεως* καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς.

Δεκαδικὸν κλάσμα λέγεται πλῆθος δεκαδικῶν κλασματικῶν μονάδων (ἢ καὶ μία δεκαδικὴ κλασματικὴ μονάς). Παρ. χάριν, οἱ ἀριθμοὶ $\frac{5}{10}$, $\frac{7}{100}$, $\frac{375}{1000}$ κτλ. εἶναι δεκαδικὰ κλάσματα. Τὰ δὲ ἄλλα κλάσματα, ἂ μὴ ἔχοντα παρονομαστήν τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ὑπὸ μηδενικῶν, λέγονται πρὸς διάκρισιν *κοινὰ κλάσματα*.

Γραφὴ τῶν δεκαδικῶν κλασμάτων ὡς ἰσρααίων.

147. Εἶδομεν εἰς τὸν σχηματισμὸν τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν, ὅτι μία μονὰς τάξεώς τινος, ἐπαναλαμβανομένη δέκα φορὰς, γίνεται μονὰς τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως. Ἐπειδὴ δὲ τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὰς ἀνωτέρω δεκαδικὰς κλασματικὰς μονάδας, διὰ τοῦτο τὰ δεκαδικὰ κλάσματα δυνάμεθα νὰ γράφωμεν, καθὼς καὶ τοὺς ἀκεραίους, στηριζόμενοι εἰς τὴν αὐτὴν συνθήκην τοῦ ἔδαφιου 15, ἦτοι· *πᾶν ψηφίον, τὸ ποῖον γράφεται πρὸς τὰ δεξιὰ ἄλλου, παριστᾷ μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως, καὶ τὰνάπαλιν*.

Κατὰ τὴν συνθήκην λοιπὸν ταύτην μετὰ τὴν γραφὴν τῶν ἁπλῶν μονάδων πρέπει νὰ γράφωμεν πρὸς τὰ δεξιὰ αὐτῶν τὰ δέκατα τῆς μονάδος ὡς δεκάκις μικρότερα αὐτῆς (διότι τὸ $\frac{1}{10}$ εἶναι δέκα φορὰς μικρότερον τῆς ἀκεραίας μονάδος 1), μετὰ τὰ δέκατα νὰ γράφωμεν τὰ ἑκατοστὰ αὐτῆς ὡς δεκάκις μικρότερα τῶν δεκάτων, μετὰ τὰ ἑκατοστὰ νὰ γράφωμεν τὰ χιλιοστὰ καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς. Ἐκάστη δὲ τάξις δὲν θὰ ἔσται μονάδας περισσοτέρας τῶν 9· διότι δέκα μονάδες τάξεώς τινος κάνουν μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως. Ἐὰν δὲ μονάδες τάξεώς τινος ἔλλείπωσι, νὰ ἀναπληρῶμεν τὰς θέσεις τῶν διὰ μηδενικῶν, ὡς πρῶτον καὶ εἰς τοὺς ἀκεραίους. Ἀλλὰ διὰ νὰ διακρίνωμεν τὰς ἀκεραίας μονάδας ἀπὸ τὰς δεκαδικὰς, γράφομεν μετὰ τὸν ἀκέραιον ὑποδιαστολὴν (·)· ἐὰν ὅμως δὲν ὑπάρχῃ ἀκέραιος, γράφομεν 0 εἰς τὴν θέσιν του.

Παραδ. χάριν, ὁ ἀριθμὸς, ὅστις ἔχει 5 ἀκεραίας μονάδας, 3 δέκατα καὶ 6 ἑκατοστὰ τῆς ἀκεραίας μονάδος, γράφεται ὡς ἑξῆς· 5,36, ἀντὶ νὰ

γραφή ὡς ἐξῆς· $5 + \frac{3}{10} + \frac{6}{100}$ ἢ $5 + \frac{30}{100} + \frac{6}{100}$ ἢ $5 \frac{36}{100}$ ἢ $\frac{536}{100}$. Ὡστε εἶ-
 ναι $5,36 = \frac{536}{100}$.

Ὡσαύτως ὁ ἀριθμὸς 2 δέκατα καὶ 4 χιλιοστὰ γράφεται ὡς ἐξῆς·
 0,204 (ἐγράψαμεν 0 εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἀκεραίου καὶ 0 εἰς τὴν θέσιν
 τῶν ἑκατοστῶν, διότι δὲν ἐδόθησαν τοιαῦτα), ἀντὶ νὰ γραφῆ ὡς ἐξῆς·
 $\frac{2}{10} + \frac{4}{1000}$ ἢ $\frac{200}{1000} + \frac{4}{1000}$ ἢ $\frac{204}{1000}$. Ὡστε εἶναι $0,204 = \frac{204}{1000}$.

Ὅταν τὰ δεκαδικὰ κλάσματα γράφονται ὑπὸ μορφὴν ἀκεραίων
 ἀριθμῶν, ὡς εἶναι οἱ 5,36 καὶ 0,204, τότε οὗτοι λέγονται ἰδιαιτέρως
δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ (ἀντὶ δεκαδικὰ κλάσματα). Πᾶς λοιπὸν δεκαδι-
 κὸς ἀριθμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη, ἀπὸ τὸ ἀκέραιον (ἂν ἔχη) καὶ
 ἀπὸ τὸ δεκαδικόν. Τὰ ψηφία τοῦ δεκαδικοῦ μέρους λέγονται πρὸς διά-
 κρισιν **δεκαδικὰ ψηφία**.

Εἶδομεν ἀνωτέρω, ὅτι εἶναι $5,36 = \frac{536}{100}$ καὶ $0,204 = \frac{204}{1000}$.

Ἐκ τούτου ἐπεταί, ὅτι

148. Πᾶς δεκαδικὸς ἀριθμὸς δύναται νὰ γραφῆ καὶ ὡς κλά-
 σμα, ἀρκεῖ νὰ παραλείψωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν καὶ νὰ γράψω-
 μεν τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν ὡς ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ
 νὰ γράψωμεν τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ τόσα μηδενικά
 ὅσα δεκαδικὰ ψηφία ἔχει ὁ ἀριθμὸς. Καὶ τὰνάπαλιν.

149. Πᾶν κλάσμα, ἔχον παρονομαστὴν τὴν μονάδα ἀκολου-
 θουμένην ὑπὸ μηδενικῶν, γράφεται καὶ ὡς δεκαδικὸς ἀριθμὸς
 ἀρκεῖ νὰ γράψωμεν τὸν ἀριθμητὴν χωριστὰ καὶ νὰ χωρίσωμεν
 ἀπὸ τὰ δεξιὰ αὐτοῦ δι' ὑποδιαστολῆς τόσα ψηφία ὡς δεκαδικὰ
 ὅσα μηδενικά ἔχει ὁ παρονομαστής.

Ἐάν ὁμως συμβῆ νὰ μὴ φθάνωσι τὰ ψηφία διὰ νὰ χωρίσωμεν
 ὅσα χρειάζονται, γράφομεν τότε πρὸς τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ μηδενικά
 τόσα, ὅσα χρειάζονται ἀκόμη ψηφία καὶ ἓν ἀκόμη μηδενικὸν διὰ τὸ
 ἀκέραιον μέρος.

Παραδ. χάριν, τὸ κλάσμα $\frac{35}{1000}$ γράφεται ὡς ἐξῆς 0,035· διότι δὲν
 νάμεθα νὰ γράψωμεν εἰς τὰ ἀριστερὰ τοῦ ἀριθμητοῦ μηδενικά, τοῦτ'
 δὲν βλάπτει τὸν ἀριθμὸν, ἦτοι 0035· τὴν ἄρα χωρίζομεν τρία ψηφία
 ἦτοι 0,035.

Ἰδιότης τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

150. Ἐστω, παραδ. χάριν, ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 5,26· ἐὰν γράψωμεν εἰς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ μηδενικά, ἦτοι 5,260 ἢ 5,2600 κτλ., οἱ νέοι οὗτοι ἀριθμοὶ εἶναι ἴσοι μὲ τὸν 5,26. Διότι ἡ ἀξία ἐκάστου δεκαδικοῦ ψηφίου ἐξορτᾶται ἐκ τῆς θέσεως, τὴν ὁποίαν ἔχει ὡς πρὸς τὴν ὑποδιαστολήν, ἦτοι τὸ πρῶτον ψηφίον 2 μετὰ τὴν ὑποδιαστολήν παριστᾷ δέκατα, τὸ δεύτερον ψηφίον 6 παριστᾷ ἑκατοστὰ καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς· ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν γραφὴν τῶν μηδενικῶν ἡ θέσις τῶν δεκαδικῶν τούτων ψηφίων δὲν ἠλλάξεν, ἐπομένως παριστᾷσι τὴν αὐτὴν ἀξίαν. Τοῦτο γίνεται φανερὸν καὶ ἂν γράψωμεν τοὺς δεκαδικοὺς τούτους ἀριθμοὺς ὡς κλάσματα· διότι εἶναι $\frac{526}{100} = \frac{5260}{1000} = \frac{52600}{10000}$ κτλ. (ἐδάφ. 100). Ἐκ τούτου συνάγομεν τὴν ἐξῆς ἰδιότητα.

Ἡ ἀξία δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ δὲν μεταβάλλεται, ὅσαδήποτε μηδενικά καὶ ἂν γράψωμεν εἰς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ, ἢ παραλείψωμεν τοιαῦτα ἀπὸ τὰ δεξιὰ αὐτοῦ (ἂν ὑπάρχωσιν).

Ἐνεκα τῆς ἰδιότητος ταύτης δυνάμεθα νὰ γράψωμεν οἰονδήποτε ἀκέραιον ἀριθμὸν καὶ ὡς δεκαδικόν, ἀρκεῖ νὰ γράψωμεν ὡς δεκαδικὰ ψηφία αὐτοῦ μηδενικά. Παραδ. χάριν, ὁ ἀκέραιος 5 γράφεται καὶ ὡς ἐξῆς 5,0 ἢ 5,00 κτλ.

Ἀπαγγελία δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ.

151. Ἐστω ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 8,375· ἐπειδὴ εἶναι $8,375 = 8 + \frac{3}{10} + \frac{7}{100} + \frac{5}{1000}$ ἢ $8 \frac{375}{1000}$ (μετὰ τὴν πρόθεσιν τῶν κλασμάτων) ἢ $\frac{8375}{1000}$ (μετὰ τὴν τροπὴν τοῦ μικτοῦ εἰς κλάσμα), διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ ἀπαγγείλωμεν αὐτὸν κατὰ τοὺς ἐξῆς τρόπους.

1ον) Ἀπαγγέλλομεν χωριστὰ τὸ ἀκέραιον μέρος καὶ χωριστὰ ἕκαστον δεκαδικὸν ψηφίον μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων του, ἦτοι 8 ἀκέραιαι μονάδες ἢ ἀπλῶς 8 ἀκέραια, 3 δέκατα, 7 ἑκατοστὰ καὶ 5 χιλιοστὰ. 2ον) Ἀπαγγέλλομεν χωριστὰ τὸ ἀκέραιον μέρος καὶ χωριστὰ τὸ δεκαδικὸν μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τοῦ τελευταίου δεκαδικοῦ ψηφίου, ἦτοι 8 ἀκέραια καὶ 375 χιλιοστὰ· καὶ 3ον) Ἀπαγγέλλομεν ὅλον τὸν ἀριθμὸν ὡς ἀκέραιον, χωρὶς δηλ. νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὴν ὑποδιαστολήν, καὶ εἰς τὸ τέλος λέγομεν τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τοῦ τελευταίου δεκαδικοῦ ψηφίου· ἦτοι 8375 χιλιοστὰ.

Συνήθως μεταχειριζόμεθα τοὺς δύο τελευταίους τρόπους πρὸς ἀπαγγελίαν δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ, ὅταν τὸ δεκαδικὸν μέρος δὲν ἔχη πολλὰ δε-

καδικὰ ψηφία. Ὅταν ὁμοῦς ἔχη, χωρίζομεν αὐτὸ εἰς τριψήφια (συνήθως) τμήματα, ἀρχόμενοι ἀπὸ τῆς ὑποδιαστολῆς· ἔπειτα δὲ ἀπαγγέλλομεν χωριστὰ τὸ ἀκέραιον μέρος (ἂν ἔχη) καὶ χωριστὰ ἕκαστον τμήμα μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τοῦ τελευταίου ψηφίου. Τὸ τελευταῖον τμήμα δυνατὸν νὰ εἶναι μονοψήφιον ἢ διψήφιον.

Ἐστω π. χ. ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 15,3465895. Χωρίζομεν αὐτὸν εἰς τριψήφια τμήματα διὰ στιγμῶν (.), ἦτοι 15,346.539.5 καὶ ἀπαγγέλλομεν ὡς ἑξῆς· 15 ἀκέραια, 346 χιλιοστά, 589 ἑκατομμυριοστά καὶ 5 δεκάκις ἑκατομμυριοστά.

Σημ. Ἐπειδὴ ἡ ἀξία δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ δὲν μεταβάλλεται, ὅταν γράψωμεν μηδενικά εἰς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ (ἔδ. 150), διὰ τοῦτο τὸ τελευταῖον τμήμα τοῦ ἀνωτέρω ἀριθμοῦ ἀπαγγέλλεται καὶ ὡς ἑξῆς· 50 ἑκατοντάκις ἑκατομμυριοστά ἢ 500 δισεκατομμυριοστά.

Γραφὴ ἀπαγγελλομένου δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ.

152. Διὰ νὰ γράψωμεν εὐκόλως δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἀπαγγελλόμενον κατὰ τὸν ἀνωτέρω συνήθη δευτέρου ἢ τρίτου τρόπου, πρέπει νὰ ἐνθυμώμεθα τοῦτο. Ὅσα μηδενικά ἔχει ὁ παρονομαστῆς τοῦ ὡς κλάσματος ἀπαγγελλομένου ἀριθμοῦ, τόσα δεκαδικὰ ψηφία πρέπει νὰ ἔχωμεν. Ἐὰν ὁμοῦς τὰ ψηφία τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ δὲν φθάνουν, γράφομεν εἰς τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ τόσα μηδενικά, ὅσα χρειάζονται ἀκόμη, καὶ ἐν μηδενικὸν ἀκόμη διὰ τὸ ἀκέραιον μέρος.

Ἐστω π. χ. νὰ γραφῆ ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 6 ἀκέραια καὶ 5 χιλιοστά. Γράφομεν πρῶτον τὸν ἀκέραιον 6 καὶ χωρίζομεν τοῦτον δι' ὑποδιαστολῆς· ἔπειτα ἐνθυμούμεθα, ὅτι ὁ χίλια γράφεται μὲ τρία μηδενικά, ἐπομένως τρία δεκαδικὰ ψηφία πρέπει νὰ ἔχωμεν, ἐπειδὴ ὁμοῦς μᾶς ἐδόθη ἐν μόνον ψηφίον, ἦτοι ὁ 5, διὰ τοῦτο γράφομεν εἰς τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ δύο μηδενικά, ἦτοι 6,005.

Ὡσαύτως διὰ νὰ γράψωμεν τὸν δεκαδικὸν ἀριθμὸν 15 ἑκατοντάκις χιλιοστά, πρέπει νὰ ἐνθυμηθῶμεν, ὅτι ὁ ἀριθμὸς ἑκατὸν χιλιάδες γράφεται μὲ πέντε μηδενικά (ὁ ἑκατὸν μὲ δύο μηδενικά καὶ ὁ χίλια μὲ τρία, ἐν ὄλῳ πέντε μηδενικά), ἐπειδὴ ὁμοῦς μᾶς ἐδόθησαν δύο μόνον ψηφία, ἦτοι ὁ 15, διὰ τοῦτο θὰ γράψωμεν εἰς τὰ ἀριστερὰ τοῦ 15 τρία μηδενικά καὶ ἐν ἀκόμῃ διὰ τὸ ἀκέραιον μέρος, ἦτοι 0,00015.

Ὡσαύτως ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 8 ἑκατομμυριοστά γράφεται ὡς ἑξῆς 0,000008· διότι τὸ ἑκατομμύριον γράφεται μὲ ἕξ μηδενικά.

Π Ρ Ο Σ Θ Ε Σ Ι Σ

153. Διὰ νὰ προσθέσωμεν δεκαδικοὺς ἀριθμούς, προσθέτομεν

αυτούς, όπως και τους άκεραίους, προσέχοντες όμως να γράφωμεν αυτούς τὸν ἕνα ὑποκάτω τοῦ ἄλλου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως, νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην· εἰς δὲ τὸ ἄθροισμα θέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὴν αὐτὴν στήλην τῶν ὑποδιαστολῶν, ἥτοι χωρίζομεν τὸ δεκαδικὸν μέρος ἀπὸ τὸ ἀκέραιον.

Ἔστω π. χ. νὰ προστεθῶσιν οἱ ἀριθμοὶ 2,723, 54,6 καὶ 0,1256. Ἡ προᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς·

2,723

54,6

0,1256

57,4486

Σημ. Ἡ δοκιμὴ τῆς προσθέσεως, καθὼς καὶ τῶν λοιπῶν πράξεων, γίνεται ὅπως καὶ ἡ τῶν ἀκεραίων.

Α Φ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ

154. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἀπὸ ἄλλον, ἀφαιροῦμεν ὅπως καὶ τοὺς ἀκεραίους, προσέχοντες όμως νὰ γράφωμεν τὰς μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην· εἰς δὲ τὴν διαφορὰν θέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὴν αὐτὴν στήλην τῶν ὑποδιαστολῶν, ἥτοι χωρίζομεν τὸ δεκαδικὸν μέρος ἀπὸ τὸ ἀκέραιον.

Ἔστω π. χ. νὰ ἀφαιρηθῇ ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 3,567 ἀπὸ τὸν 23,7. Ὡσαύτως ὁ 0,6234 ἀπὸ τὴν ἀκεραίαν μονάδα 1.

Ἡ προᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς·

23,700

1,0000

3,567

0,6234

20,133

0,3766

Ἐγράψαμεν μηδενικὰ εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ μειωτέου, διὰ νὰ ἔχωσιν ἰσάριθμα δεκαδικὰ ψηφία μὲ τὸν ἀφαιρετέον· τοῦτο δὲν βλάπτει (ἔδ. 150). Δυνάμεθα όμως καὶ νὰ παραλείψωμεν ταῦτα, ἀρκεῖ μόνον νὰ φανταζώμεθα ταῦτα ὡς γεγραμμένα.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Μαθητὴς τις ἠγόρασε τρία βιβλία· διὰ τὸ ἓν ἔδωκε δρ. 2,85, διὰ τὸ ἄλλο ἔδωκε δρ. 1,60 περισσότερον τοῦ πρώτου καὶ διὰ τὸ ἄλλο 3 δραχμάς. Πόσον ἔδωκε τὸ ὅλον ; (δρ. 10,30)

2) Ἡ θερμοκρασία ἀσθενοῦς τινος ἦτο 37 βαθμῶν, ἔπειτα ἦτο 39,1. Πόσον ἠῤῥῆθη ; (2,1)

3) Ἐμπορός τις ἐπώλησεν ὕφασμά τι πρὸς 7 δραχμὰς τὸν πῆχυν καὶ ἐκέρδισεν 0,85 τῆς δραχμῆς ἀπὸ κάθε πῆχυν. Πόσον τοῦ ἐκόστιζεν ὁ πῆχυς ; (δρ. 6,15)

4) Τὸ ἀνάστημα ἐνὸς ἀνθρώπου εἶναι 1,68 τοῦ μέτρου, τῆς δὲ συζύγου του εἶναι κατὰ 0,295 τοῦ μέτρου μικρότερον αὐτοῦ. Πόσον εἶναι τὸ ἀνάστημα τῆς συζύγου του ; (1,385 τοῦ μ.)

5) Ἐκ τεμαχίου ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος ἦτο 30 μέτρα· ἐπώλησέ τις εἷς τινα 5,45 μ., εἷς ἄλλον 6,30 καὶ εἷς ἄλλον 12,6. Πόσον ὕφασμα ἔμεινεν ; (5,65 μ.)

6) Ἐὰν δώσωμεν εἷς τινα τὰ 7 δέκατα ἐνὸς πράγματος καὶ εἷς ἄλλον τὰ 85 χιλιοστὰ αὐτοῦ, τὴν μέρη τοῦ πράγματος μένει ; (τὰ 0,215)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

155. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο δεκαδικὸν ἀριθμοὺς, πολλαπλασιάζομεν αὐτοὺς, ὅπως καὶ τοὺς ἀκεραίους (χωρὶς δηλ. νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὴν ὑποδιαστολὴν), εἰς δὲ τὸ γινόμενον χωρίζομεν τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουσι καὶ οἱ δύο παράγοντες.

Ἐστω π. χ. νὰ πολλαπλασιασθῇ ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 32,205 ἐπὶ 4,2. Ἡ πρᾶξι διατάσσεται ὡς ἑξῆς:

$$\begin{array}{r}
 32,205 \\
 \quad 4,2 \\
 \hline
 64410 \\
 128820 \\
 \hline
 135,2610
 \end{array}$$

Ὁ λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον χωρίζομεν εἰς τὸ γινόμενον τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουσι οἱ παράγοντες, εἶναι ὁ ἑξῆς. Διότι, ἂν γράψωμεν τοὺς δεκαδικὸν ἀριθμοὺς ὡς κλάσματα, τὸ γινόμενον αὐτῶν εἶναι $\frac{32205}{1000} \times \frac{42}{10} = \frac{1352610}{10000}$ ἢ 135,2610 (ἔδ. 149). Τὸν ἀριθμὸν

τοῦτον εὔρομεν, ἀφοῦ ἐπολλαπλασιάσαμεν τοὺς ἀριθμητὰς, ἦτοι τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς, ἄνευ ὑποδιαστολῆς, καὶ ἐχωρήσαμεν ἀπὸ τὰ δεξιὰ α' τοῦ τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα μηδενικὰ ἔχει ὁ παρονομαστής, ἦτοι ὅσα δεκαδικὰ ψηφία ἔχουν καὶ οἱ δύο παράγοντες.

Ὁ ἀνωτέρω κανὼν ἐφαρμόζεται καὶ ὅταν ὁ εἷς μόνον τῶν παραγόντων ἔχη δεκαδικὰ ψηφία.

Σημ. Ἐὰν συμβῇ τὰ ψηφία τοῦ γινομένου νὰ μὴ φθάνωσι, διὰ νὰ χωρίσωμεν ὅσα χρειάζονται, γράφομεν τότε εἰς τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ

πόσα μηδενικά, ὅσα χρειάζονται ἀκόμη, καὶ ἓν μηδενικὸν ἀκόμη διὰ τὸ ἀκέραιον μέρος.

Ἀσκήσεις.

$1,24 \times 6 (= 7,44)$, $35 \times 4,5 (= 157,5)$, $0,72 \times 0,9 (= 0,648)$, $1,89 \times 2,87 (= 5,4243)$, $6,79 \times 0,006 (= 0,04074)$, $0,003 \times 0,05 (= 0,00015)$.

Συντομίαι πολλαπλασιασμοῦ.

156. Ἐστω ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 7,24· μεταθέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν αὐτοῦ μίαν θέσιν πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ προκύπτει ὁ ἀριθμὸς 72,4.

Ἐὰν τοὺς ἀριθμοὺς τούτους γράψωμεν ὡς κλάσματα, ἦτοι $\frac{724}{100}$ καὶ $\frac{724}{10}$ βλέπομεν, ὅτι ὁ παρονομαστής τοῦ δευτέρου κλάσματος εἶναι δέκα φορὰς μικρότερος τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ πρώτου κλάσματος, ἐπομένως τὸ δεύτερον τοῦτο κλάσμα εἶναι δεκαπλάσιον τοῦ πρώτου (ἔδ. 97), ὥστε καὶ ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 72,4 εἶναι δεκαπλάσιος τοῦ 7,24. Ὅταν λοιπὸν εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν μεταθέτωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν μίαν θέσιν πρὸς τὰ δεξιὰ, ὁ ἀριθμὸς οὗτος πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 10.

Ἐστω ἀκόμη ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 3,256· μεταθέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν αὐτοῦ δύο θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ προκύπτει ὁ ἀριθμὸς 325,6. Ἐὰν τοὺς ἀριθμοὺς τούτους γράψωμεν πάλιν ὡς κλάσματα, θὰ ἴδωμεν, ὅτι ὁ ἀριθμὸς 325,6 εἶναι 100 φορὰς μεγαλύτερος τοῦ 3,256. Ὄστε, ὅταν εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν μεταθέτωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν δύο θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ, ὁ ἀριθμὸς οὗτος πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 100.

Ἐστω ἀκόμη ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 5,6· ὁ ἀριθμὸς οὗτος δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν γράψωμεν μηδενικά εἰς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ (ἔδ. 150), ἦτοι 5,600. Ἐὰν μεταθέσωμεν τώρα τὴν ὑποδιαστολὴν αὐτοῦ τρεῖς θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ, προκύπτει ὁ ἀκέραιος ἀριθμὸς 5600, ὅστις εἶναι 1000 φορὰς μεγαλύτερος τοῦ 5,600 ἢ $\frac{5600}{1000}$. Ὄστε, ὅταν εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν μεταθέτωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν τρεῖς θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ, ὁ ἀριθμὸς οὗτος πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 1000.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὴν ἐξῆς συντομίαν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

157. Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, ἐπὶ 100, ἐπὶ 1000 καὶ γενικῶς ἐπὶ τὴν μονάδα ἀκολουθουμένην ἀπὸ μηδενικά, μεταθέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν τόσας θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ, ὅσα μηδενικά ἀκολουθοῦν τὴν μονάδα.

Ἐὰν τὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ δὲν φθάνουν διὰ νὰ μετατεθῇ ἡ ὑπο-

διαστολή, γράφομεν εἰς τὸ δεξιὰ αὐτοῦ τόσα μηδενικά, ὅσα χρειάζονται ἀκόμη.

158. *Διὰ τὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ ἀκέραιον λήγοντα εἰς μηδενικά, παραλείπομεν τὰ μηδενικά τοῦ ἀκεραίου καὶ μεταθέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν τοῦ δεκαδικοῦ τόσας θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ, ὅσοι μηδενικά πορελίψαμεν ἀπὸ τὸν ἀκέραιον, καὶ κατόπιν πολλαπλασιάζομεν.*

Παραδ. χάριν, εἶναι $0,482 \times 400 = 48,2 \times 4 = 192,8$. Διότι ἀντὶ τὰ πολλαπλασιάσωμεν διὰ μιᾶς ἐπὶ 400, πολλαπλασιάζομεν πρῶτον ἐπὶ 100 καὶ ἔπειτα ἐπὶ 4.

Ἀσκήσεις.

$4,567 \times 10 (=46,67)$, $0,750 \times 100 (=75)$, $0,004 \times 1000 (=4)$.
 $3,4 \times 10000 (=34000)$, $7,856 \times 70 = 78,56 \times 7 = 549,92$, $0,456 \times 3000 = 456 \times 3 = 1368$.

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

159. [Εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν διακρίνομεν δύο περιπτώσεις 1ον) Ὅταν ὁ διαιρετέος εἶναι δεκαδικὸς καὶ ὁ διαιρέτης ἀκέραιος, καὶ 2ον) Ὅταν ὁ διαιρετέος εἶναι οἰοσδήποτε ἀριθμὸς καὶ ὁ διαιρέτης δεκαδικός.

1ον) Διαιρέτης ἀκέραιος.

Ὑποθέσωμεν, παραδ. χάριν, ὅτι ἔχομεν τὰ διαιρέσωμεν τὸν δεκαδικὸν ἀριθμὸν 29,82 διὰ 6. Διαιροῦμεν κατὰ πρῶτον τὸ ἀκέραιον μέρος αὐτοῦ 29 διὰ 6 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 4 (ἀκεραίας μονάδας) καὶ ὑπόλοιπον 5· αἱ 5 αὗται ἀκέραιαι μονάδες κάμνουν 50 δέκατα (διότι 1 ἀκεραία μονὰς ἔχει 10 δέκατα) καὶ 8 δέκατα, ὅπου ἔχει ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς, κάμνουν 58 δέκατα. Διαιροῦντες ταῦτα διὰ 6 εὐρίσκομεν πηλίκον 9 (δέκατα) καὶ ὑπόλοιπον 4 δέκατα· ταῦτα πάλιν κάμνουν 40 ἑκατοστὰ (διότι 1 δέκατον ἔχει 10 ἑκατοστὰ) καὶ 2 ἑκατοστὰ, ὅπου ἔχει ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς, κάμνουν 42 ἑκατοστὰ. Διαιροῦντες τέλος καὶ ταῦτα διὰ 6 εὐρίσκομεν πηλίκον 7 (ἑκατοστὰ) καὶ ὑπόλοιπον 0. Ἡ πρῶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς:

$$\begin{array}{r|l} 29,82 & 6 \\ \hline 58 & 4,97 \\ 42 & \\ 0 & \end{array}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

160. *Διὰ τὰ διαιρέσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν δι' ἀκεραίου, δι-*

αιρουµεν πρῶτον τὸ ἀκέραιον μέρος αὐτοῦ καὶ ἔπειτα τὸ δεκαδικόν, προσέχοντες ὅμως νὰ θέσωµεν τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὸ πηλίκον μετὰ τὸ πέρας τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀκεραίου μέρους.

Σημ. Ἐὰν συμβῇ τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ διαιρετέου νὰ μὴ διαιρηταί διὰ τοῦ διαιρετέου ἢ ὁ διαιρετέος νὰ μὴ ἔχη ἀκέραιον μέρος, γράφοµεν τότε 0 εἰς τὸ πηλίκον καὶ χωρίζοµεν τοῦτο δι' ὑποδιαστολῆς· ἔπειτα δὲ ἐξακολουθοῦµεν τὴν διαίρεσιν, ὅπως καὶ εἰς τοὺς ἀκεραίους.

Παραδ. χάριν·

$$\begin{array}{r|l} 0,893 & 7 \\ 19 & 0,127 \\ 53 & \\ 4 & \end{array}$$

Παρατήρησις. Εἰς τὸ ἀνωτέρω πρῶτον παράδειγμα ἡ διαίρεσις εἶναι τελεία καὶ ἐπομένως τὸ ἀκριβὲς πηλίκον εἶναι 4,97. Εἰς δὲ τὸ δεύτερον παράδειγμα ἡ διαίρεσις εἶναι ἀτελής καὶ ἐπομένως τὸ πηλίκον 0,127 δὲν εἶναι τὸ ἀκριβὲς, διότι μένει καὶ ὑπόλοιπον 4 χιλιοστά· τὸ ἀκριβὲς δὲ πηλίκον εἶναι 0,127 καὶ $\frac{4}{7}$ τοῦ χιλιοστοῦ. Ἐὰν λοιπὸν παρα-

λείψωµεν τὸ κλάσμα $\frac{4}{7}$ καὶ λάβωµεν ὡς πηλίκον τὸν ἀριθμὸν 0,127,

τὸ πηλίκον τότε θὰ εἶναι μικρότερον τοῦ ἀληθοῦς κατὰ $\frac{4}{7}$ τοῦ χιλιο-

στοῦ καὶ ἐπομένως μικρότερον τοῦ ἑνὸς χιλιοστοῦ· ἐν τοιαύτῃ περιπτώ-

σει λέγοµεν, ὅτι τὸ πηλίκον εἶναι **κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς χιλιοστοῦ.**

Ἐὰν δὲ λάβωµεν τὸ πηλίκον μέχρι τοῦ ψηφίου τῶν ἑκατοστῶν, ἦτοι

0,12, ἢ μέχρι τοῦ ψηφίου τῶν δεκάτων, ἦτοι 0,1, λέγοµεν τότε, ὅτι τὸ

πηλίκον εἶναι κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς ἑκατοστοῦ ἢ κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς δεκάτου· τουτέστι τὸ λάθος, τὸ ὁποῖον κάµοµεν εἰς τὸ πηλίκον, εἶναι μικρότερον τοῦ ἑνὸς ἑκατοστοῦ ἢ ἑνὸς δεκάτου.

Εἶναι ὅμως φανερόν, ὅτι, ὅσα περισσότερα ψηφία λαμβάνοµεν εἰς

τὸ πηλίκον, τόσῳ περισσότερον πλησιάζοµεν εἰς τὸ ἀληθὲς πηλίκον, διὰ

τοῦτο, ὁσάκις δὲν εὐρίσκοµεν ὑπόλοιπον μηδέν, δυνάµεθα νὰ ἐξακολου-

θῶµεν τὴν διαίρεσιν καὶ νὰ προσεγγίζωµεν εἰς τὸ ἀληθὲς πηλίκον, ὅσον θέλοµεν· ἀρκεὶ νὰ τρέπωµεν ἕκαστον ὑπόλοιπον εἰς μονάδας τῆς ἀμέ-

σως κατωτέρας τάξεως (γράφοντες πρὸς τοῦτο ἐν μηδενικὸν εἰς τὰ δεξιά του) καὶ νὰ διαιρῶµεν τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν διὰ τοῦ διαιρετέου.

Τὸ αὐτὸ δυνάµεθα νὰ πράττωµεν καὶ εἰς τὴν διαίρεσιν δύο ἀκεραίων ἀριθμῶν, ὁσάκις δὲν εὐρίσκοµεν ὑπόλοιπον 0.

Ἐὰν εἰς τὴν ἀνωτέρω διαίρεσιν λάβωµεν ὡς πηλίκον τὸν ἀριθμὸν

0,12 ἀντὶ τοῦ 0,127, θὰ ἔχωμεν τὸ πηλίκον κατὰ 7 χιλιοστὰ ὀλιγώτερον τοῦ ἀληθοῦς· ἐὰν ὁμως λάβωμεν τὸν 0,13 ἀντὶ τοῦ 0,127, θὰ ἔχωμεν τὸ πηλίκον κατὰ 3 χιλιοστὰ περισσότερον. Ὡστε προτιμότερον εἶναι νὰ λάβωμεν ὡς πηλίκον τὸν ἀριθμὸν 0,13 παρὰ τὸν 0,12. Ὅταν λοιπὸν θέλωμεν νὰ κρατήσωμεν τὸ πηλίκον μὲ ὀλιγώτερα δεκαδικὰ ψηφία, καλὸν εἶναι νὰ αὐξάνωμεν τὸ τελευταῖον κρατηθὲν ψηφίον κατὰ 1, ὅταν τὸ παραλειφθὲν ἐπόμενον ψηφίον εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 5· διότι πλησιάζομεν τότε περισσότερον εἰς τὸ ἀληθὲς πηλίκον.

Παραδείγματα. Ἐστω νὰ εὑρεθῇ τὸ πηλίκον τοῦ 25,5 διὰ 11 κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς δεκάκις χιλιοστοῦ (ἦτοι νὰ εὔρωμεν τὸ πηλίκον μέχρι τοῦ ψηφίου τῶν δεκάκις χιλιοστῶν). Ἐπειδὴ ὁ διαιρετέος παριστᾷ δέκατα γράφομεν τρία μηδενικά εἰς τὰ δεξιά αὐτοῦ, διὰ νὰ παριστᾷ δεκάκις χιλιοστὰ (τοῦτο δὲν βλάπτει τὸν ἀριθμὸν) καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν. Ἦτοι

$$\begin{array}{r} 25,5000 \quad | \quad 11 \\ \underline{2,3181} \\ 20 \\ 90 \\ 20 \\ 9 \end{array}$$

Ὡστε εὔρωμεν τὸ πηλίκον κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς δεκάκις χιλιοστοῦ.

Ἐστω προσέτι νὰ εὑρεθῇ τὸ πηλίκον τοῦ 32 διὰ 15 κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς ἑκατοστοῦ. Διὰ νὰ παριστᾷ ὁ διαιρετέος ἑκατοστὰ, γράφομεν δύο μηδενικά ὡς δεκαδικὰ ψηφία αὐτοῦ καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν. Ἦτοι

$$\begin{array}{r} 32,00 \quad | \quad 15 \\ \underline{2,13} \\ 20 \\ 50 \\ 5 \end{array}$$

161. Καὶ κλάσμα τρέπεται εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν εἴτε ἀκριβῶς εἴτε κατὰ προσέγγισιν οἵασδήποτε τάξεως, ἂν διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμητὴν αὐτοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ (διότι πᾶν κλάσμα εἶναι πηλίκον τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ). Παραδ. χάριν, τὸ κλάσμα $\frac{3}{4}$ τρέπεται ἀκριβῶς εἰς τὸν δεκαδικὸν 0,75.

Τὸ δὲ κλάσμα $\frac{5}{7}$ δὲν τρέπεται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν, ὅσον καὶ ἂν ἐξακολουθήσωμεν τὴν διαίρεσιν, διὰ τοῦτο τρέπομεν αὐτὸ κατὰ προσέγγισιν δεκαδικῆς τινος τάξεως, καὶ ἔστω κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς ἑκατομμυριοστοῦ, ὅτε εὐρίσκομεν 0,714285.

Ἀσκήσεις.

5,67 : 3 (=1,89), 0,475 : 5 (=0,095), 332,50 : 38 (=8,75),
 596,622 : 78 (=7,649), 3,47 : 9 (=0,38 κατά προσέγγισιν ἑνὸς ἑκα-
 τοστοῦ), 73,4 : 87 (=0,843 κατά προσέγγισιν ἑνὸς χιλιοστοῦ), $\frac{1}{2}$
 (=0,5), $\frac{1}{4}$ (=0,25), $\frac{1}{5}$ (=0,20), $\frac{1}{8}$ (=0,125), $\frac{7}{8}$ (=0,875), $\frac{16}{11}$
 (=1,45 κατά προσέγγισιν ἑνὸς ἑκατοστοῦ).

2ον) Διαιρέτης δεκαδικός.

162. Γνωρίζομεν, ὅτι, ἂν πολλαπλασιάσωμεν διαιρετέον καὶ διαι-
 ρήτην ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ πηλίκον δὲν μεταβάλλεται (ἔδ. 57).
 Εἰς τὴν ιδιότητα ταύτην στηριζόμενοι δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν
 διαίρεσιν ἀριθμοῦ τινος διὰ δεκαδικοῦ. Πρὸς τοῦτο ἀκολουθοῦμεν τὸν
 ἑξῆς κανόνα.

*Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ὀνονδήπτει ἀριθμὸν διὰ δεκαδικοῦ, πολ-
 λαπλασιάσωμεν πρῶτον αὐτοὺς (διαιρετέον καὶ διαιρέτην) ἐπὶ 10
 ἢ 100 ἢ 1000 κτλ., ὥστε νὰ γίνῃ ὁ διαιρέτης ἀκέραιος, καὶ
 ἔπειτα διαιροῦμεν.*

Ἐπιθέσωμεν, παραδ. χάριν, ὅτι πρόκειται νὰ διαιρεθῇ ὁ ἀριθμὸς
 93,8 διὰ 0,4. Πολλαπλασιάζομεν καὶ τοὺς δύο ἐπὶ 10 (διότι ἐπὶ 10 ἂν
 πολλαπλασιασθῇ ὁ διαιρέτης 0,4 γίνεται ἀκέραιος) καὶ ἔχομεν νὰ διαι-
 ρέσωμεν τὸν δεκαδικὸν 938 διὰ τοῦ ἀκεραίου 4 (ἔδ. 160).

Ἐστω νὰ διαιρεθῇ ὁ ἀριθμὸς 6 διὰ 8,56. Πολλαπλασιάζομεν καὶ
 τοὺς δύο ἐπὶ 100 (διότι ἐπὶ 100 ἂν πολλαπλασιασθῇ ὁ διαιρέτης 8,56
 γίνεται ἀκέραιος) καὶ ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν 600 διὰ 856. Τὸ πη-
 λίκον τῆς διαίρεσεως αὐτῶν κατὰ προσέγγισιν ἑνὸς δεκάτου εἶναι 0,7.

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν τὸν 8,42 διὰ 6,125, πολλαπλασιάζομεν αὐτοὺς
 ἐπὶ 1000 καὶ ἔχομεν τότε νὰ διαιρέσωμεν τὸν 8420 διὰ 6125. Τὸ πη-
 λίκον αὐτῶν εὐρίσκομεν μὲ ὄσσην προσέγγισιν θέλομεν.

Ἐστω προσέτι νὰ διαιρεθῇ τὸ κλάσμα $\frac{7}{8}$ διὰ 0,5. Πολλαπλασιάζο-
 μεν καὶ τοὺς δύο ἐπὶ 10 καὶ ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν τότε τὸ κλάσμα
 $\frac{70}{8}$ διὰ 5. Δυνάμεθα καὶ νὰ τρέψωμεν τὸ κλάσμα $\frac{7}{8}$ εἰς δεκαδικὸν
 ἀριθμὸν ἢ τὸν δεκαδικὸν 0,5 εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα νὰ διαιρέσωμεν ἢ
 καὶ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν παρονομαστήν τοῦ κλάσματος $\frac{7}{8}$ ἐπὶ 0,5.

Συντομίας διαιρέσεως.

163. Ἐστω ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 25,6· μεταθέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν αὐτοῦ μίαν θέσιν πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ προκύπτει ὁ ἀριθμὸς 2,56. Ἐὰν τοὺς ἀριθμοὺς τούτους γράψωμεν ὡς κλάσματα, ἦτοι $\frac{256}{10}$ καὶ $\frac{256}{100}$, βλέπομεν ὅτι ὁ παρονομαστὴς τοῦ δευτέρου κλάσματος εἶναι δέκα φορὰς μεγαλύτερος τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ πρώτου κλάσματος, ἐπομένως τὸ δεύτερον τοῦτο κλάσμα εἶναι δέκα φορὰς μικρότερον τοῦ πρώτου (ἐδ. 97), ὥστε καὶ ὁ δεκαδικὸς 2,56 εἶναι δέκα φορὰς μικρότερος τοῦ 25,6. Ὅταν λοιπὸν εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν μεταθέτωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν μίαν θέσιν πρὸς τὰ ἀριστερὰ, ὁ ἀριθμὸς οὗτος διαιρεῖται διὰ 10.

Ἐστω ἐπίσης ὁ ἀριθμὸς 4,5· οὗτος δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν γράψωμεν μηδενικὰ εἰς τὰ ἀριστερὰ τοῦ ἀκεραίου μέρους, ἦτοι 004,5· μεταθέτομεν τώρα τὴν ὑποδιαστολὴν δύο θέσεις πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ προκύπτει ὁ ἀριθμὸς 0,045. Ἐὰν τοὺς ἀριθμοὺς τούτους γράψωμεν πάλιν ὡς κλάσματα, θὰ ἴδωμεν, ὅτι ὁ ἀριθμὸς 0,045 εἶναι 100 φορὰς μικρότερος τοῦ 4,5. Ὡστε, ὅταν εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν μεταθέτωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν δύο θέσεις πρὸς τὰ ἀριστερὰ, ὁ ἀριθμὸς οὗτος διαιρεῖται διὰ 100. Καὶ οὕτω καθεξῆς.

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὴν ἑξῆς συντομίαν τῆς διαιρέσεως.

164. *Διὰ νὰ διαιρέσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν διὰ 10, διὰ 100, διὰ 1000 καὶ γενικῶς διὰ τῆς μονάδος ἀκολουθουμένης ἀπὸ μηδενικά, μεταθέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν τόσας θέσεις πρὸς τὰ ἀριστερὰ, ὅσα μηδενικά ἀκολουθοῦν τὴν μονάδα.*

Ἐὰν τὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ δὲν φθάνουν διὰ νὰ μετατεθῆ ἡ ὑποδιαστολή, γράφομεν εἰς τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ τόσα μηδενικά, ὅσα χρειάζονται ἀκόμη, καὶ ἐν μηδενικὸν ἀκόμη διὰ τὸ ἀκεραῖον μέρος.

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν δι' ἀκεραίου λήγοντος εἰς μηδενικά, παραλείπομεν τὰ μηδενικά τοῦ ἀκεραίου καὶ μεταθέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν τοῦ δεκαδικοῦ τόσας θέσεις πρὸς τὰ ἀριστερὰ, ὅσα μηδενικά παρελείψαμεν ἀπὸ τὸν ἀκεραῖον, καὶ κατόπιν διαιροῦμεν.

Παραδ. χρῆσιν, εἶναι $257,6 : 700 = 2,576 : 7 = 0,368$. Διότι, ἂν διαιρέσωμεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, τὸ πηλίκον δὲν μεταβάλλεται (ἐδάφ. 57).

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινα διὰ 0,5 ἢ διὰ 0,50 ἢ διὰ 0,500 κτλ., πολλαπλασιάσωμεν τὸν διαιρετέον ἐπὶ 2.

Παραδείγματος χάριν, $64 : 0,5 = 64 \times 2 = 128$ (διότι διὰ νὰ διαιρέσωμεν διὰ $\frac{5}{10}$ ἢ $\frac{50}{100}$ ἢ $\frac{500}{1000}$ κτλ., ἤτοι διὰ $\frac{1}{2}$, θὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸ κλάσμα ἀντεστραμμένον, ἤτοι ἐπὶ $\frac{2}{1}$ ἢ 2).

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινα διὰ 0,25 ἢ διὰ 0,250 κτλ. πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρετέον ἐπὶ 4.

Παραδ. χάριν, $45,6 : 0,25 = 45,6 \times 4 = 182,4$ (διότι εἶναι $0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$).

Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινα διὰ 0,1, διὰ 0,01, διὰ 0,001 κτλ., πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρετέον ἐπὶ 10, ἐπὶ 100, ἐπὶ 1000 κτλ.

Ἀσκήσεις.

273 : 0,3 (=910), 3,15 : 0,7 (=4,5), 522,6 : 6,7 (=78),
59,595 : 6,85 (=8,7), 7,8473 : 0,97 (=8,09), 63,45 : 10 (=6,345),
5,03 : 10 (=0,503), 437,2 : 100 (=4,372), 0,4 : 100 (=0,004).
290,3 : 1000 (=0,2903), 12,6 : 30 (=0,42), 43,2 : 600 (=0,072),
130,475 : 8,5 (=15,35), 435,75 : 12,37 (=35,22 κατὰ προσέγγισιν ἑκατοστοῦ).

Πράξεις δεκαδικῶν καὶ κοινῶν κλασμάτων.

165. Ἡ πρόσθεσις ἢ ἡ ἀφαιρέσις δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ καὶ κοινοῦ κλάσματος γίνεται ὡς ἑξῆς. Ἡ τρέπομεν τὸ κλάσμα εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν (ἂν τρέπηται ἀκριβῶς· εἰ δὲ μὴ, κατὰ προσέγγισιν δεκαδικῆς τινος μονάδος) καὶ ἔπειτα προσθέτομεν ἢ ἀφαιροῦμεν τοὺς δύο δεκαδικούς ἀριθμούς. Ἡ τρέπομεν τὸν δεκαδικὸν ἀριθμὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα προσθέτομεν ἢ ἀφαιροῦμεν τὰ δύο κλάσματα.

Ἐστω π. χ. νὰ εὔρεθῇ τὸ ἄθροισμα $2,35 + \frac{3}{4}$. Κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον ἔχομεν $2,35 + \frac{3}{4} = 2,35 + 0,75 = 3,10$ · κατὰ τὸν δεῦτερον δὲ τρόπον ἔχομεν $2,35 + \frac{3}{4} = \frac{235}{100} + \frac{3}{4} = \frac{310}{100} = 3,10$.

Τὸ αὐτὸ πράττομεν καὶ διὰ τὴν ἀφαιρέσιν.

Ὁ πολλαπλασιασμὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ καὶ κοινοῦ κλάσματος ἢ ἡ διαίρεσις δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ διὰ κοινοῦ κλάσματος γίνεται, ὅπως ὁ πολλαπλασιασμὸς καὶ ἡ διαίρεσις ἀκεραίου καὶ κλάσματος. Δυνάμεθα ὁμῶς καὶ νὰ τρέψωμεν τὸν δεκαδικὸν εἰς κλάσμα ἢ τὸ κλάσμα εἰς δεκαδικὸν καὶ ἔπειτα νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἢ διαιρέσωμεν.

Ἀσκήσεις.

$$\frac{7}{8} - 0,4372 = 0,875 - 0,4372 = 0,4378$$

$$\frac{2}{3} \times 3,45 (= 2,30), 0,175 : \frac{5}{8} (= 0,280),$$

$$2,4 \times \frac{2}{3} (= 1,6), 0,65 - \frac{3}{7} = 0,65 - 0,42 \dots = 0,23 \text{ κατὰ}$$

$$\text{προσέγγισιν ἑκατοστοῦ, } 0,002 + 3\frac{3}{4} + 0,7 + \frac{5}{8} + 6 (= 11,077).$$

Νοεραὶ ἀσκήσεις.

1) Ἐάν ἡ ὀκά τοῦ ἐλαίου ἀξίζῃ δρ. 2,90, πόσον ἀξίζουν 10 ὀκάδες καὶ πόσον 100 ὀκάδες ;

2) Ἐγόρασέ τις μὲ 6 δραχμὰς 100 πορτοκάλια. Πόσον κοστίζει τὸ ἕν καὶ πόσον τὰ 1000 ;

3) Ἐγόρασέ τις λεμόνια πρὸς 45 δρ. τὴν χιλιάδα. Πόσον κοστίζει τὸ ἕν, πόσον τὰ 10 καὶ πόσον τὰ 100 ;

4) Ἐγόρασέ τις 100 ὀκ. ἀνθρώκων καὶ ἔδωκε δρ. 29,50, Πόσον κοστίζουν 10 ὀκάδες ;

5) Ἐγόρασέ τις 240 δράμα καφὲ πρὸς δρ. 4,50 τὴν ὀκάν καὶ ἔδωκεν ἕν πεντάδραχμον. Πόσον ἔλαβεν ὑπόλοιπον ;

(Ἴδε νοερὰς ἀσκήσεις ἔδαφιόν 144).

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ὁ πῆχυς ἑνὸς ὑφάσματος ἀξίζει δρ. 7,80. Πόσον ἀξίζουν 19 πῆχεις ; (δρ. 148,20)

2) Τὸ μέτρον ἑνὸς ὑφάσματος ἀξίζει δρ. 3,75. Πόσον ἀξίζουν 6,80 μ. ; (δρ. 25,50)

3) Ἐγόρασέ τις 66 ὀκάδας ἀλεύρου καὶ ἔδωκε δρ. 45,50. Πόσον ἀξίζει ἡ ὀκά ; (0,70 τῆς δρ.)

4) Ὁ πῆχυς ἑνὸς ὑφάσματος ἀξίζει δρ. 4,60. Πόσον ἀξίζουν $8\frac{3}{4}$ τοῦ πῆχεως ; (δρ. 40,25)

5) Ἐάν ἡ ὀκά ἑνὸς πράγματος ἀξίζει δρ. 3,50. Πόσον ἀξίζουν τὰ 280 δράμα ; $(3,50 \times \frac{280}{400} \text{ ἢ } 2,45)$

6) Ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος εἶναι 14 μέτρα, πρόκειται νὰ κοπῶσι πετσέται, τῶν ὁποίων τὸ μῆκος νὰ εἶναι 0,40 τοῦ μέτρον. Πόσαι πετσέται θὰ κοπῶσι ; (35)

- 7) Ἡγόρασέ τις ἔλαιον πρὸς δρ. 3,20 τὴν ὀκτῶν καὶ ἔδωκε δρ. 28,80.
Πόσον ἔλαιον ἠγόρασεν ; (9 ὀκ.)
- 8) Ἀπὸ τοῦ προαυλίου μιᾶς οἰκίας ἀναβαίνει τις εἰς τὸ πρῶτον πάτωμα αὐτῆς διὰ κλίμακος, τῆς ὁποίας ἐκάστη βαθμὶς (σκαλοπάτι) εἶναι ὑψηλοτέρα τῆς προηγουμένης τῆς κατὰ 0,18 τοῦ μέτρου· τὸ δὲ ὕψος τοῦ πατώματος ἀπὸ τοῦ προαυλίου εἶναι 6,30 τοῦ μ. Πόσας βαθμίδας ἔχει ἡ κλίμαξ ; (6,30 : 0,18 ἢ 35)
- 9) Γυνὴ τις ἠγόρασε 5 ρούπια ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου ὁ πῆχυς ἀξίζει δρ. 14,80. Πόσον ἔδωκεν ; (9,25)
- 10) Ἡγόρασέ τις 360 δράμια ἕξ ἑνὸς πράγματος καὶ ἔδωκε δρ. 3,15. Πόσον ἀξίζει ἡ ὀκτῶν ; (3,50)
- 11) Ἐδωκέ τις δρ. 9,15 καὶ ἠγόρασεν $7 \frac{5}{8}$ τοῦ πήχεως ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος. Πόσον ἀξίζει ὁ πῆχυς ; (δρ. 1,20)
- 12) Ἡγόρασέ τις 8 ζεύγη κάλτσας πρὸς δρ. 33,60 τὴν δωδεκάδα. Πόσον ἔδωκεν ; (22,40)
- 13) Ἡγόρασέ τις 3 δωδεκάδας μανδήλια πρὸς δρ. 1,30 ἕκαστον μανδήλιον καὶ ἔδωκε δύο εἰκοσιπεντάδραχμα. Πόσον ἔλαβεν ὑπόλοιπον ; (δρ. 3,20)
- 14) Ἀπὸ τινος παντοπώλην ἠγόρασέ τις $4 \frac{1}{2}$ ὀκτάδας ἐλαίου πρὸς δρ. 3,60 τὴν ὀκτῶν καὶ 360 δρᾶμια βενιτύσου πρὸς 14 δρ. τὴν ὀκτῶν καὶ ἔδωκεν ἓν εἰκοσιπεντάδραχμον. Πόσον τοῦ χρεωστῆ ἀκόμη ; (δρ. 3,80)
- 15) Ἐμπορὸς τις ἐπώλησεν $8 \frac{1}{2}$ πήχεις ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος ἀντιδρ. 72,15 καὶ ἐκέρδισε δρ. 9,25. Πόσον τοῦ ἐκόστιζεν ὁ πῆχυς ; (δρ. 7,40)
- 16) Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 240 δράμια ἕξ ἑνὸς πράγματος, δίδομεν δρ. 1,50. Πόσον θὰ δώσωμεν διὰ νὰ ἀγοράσωμεν $2 \frac{2}{5}$ τῆς ὀκτῶν ; (6 δρ.)
- 17) Μία ἀτμομηχανὴ σιδηροδρόμου ἔχει ταχύτητα 32 χιλιόμετρα τὴν ὥραν καὶ καίει εἰς μίαν ὥραν ἀνθρακας ἀξίας δρ. 25,80. Πόση εἶναι ἡ ἀξία τῶν ἀνθράκων, τοὺς ὁποίους θὰ καύσῃ, διὰ νὰ διατρέξῃ 160 χιλιόμετρα ; (129 δρ.)
- 18) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε ποτήρια πρὸς δρ. 5,40 τὴν δωδεκάδα κατόπιν ἐπώλησεν αὐτὰ πρὸς 65 λ. ἕκαστον καὶ ἐκέρδισεν 96 δρ. Πόσα ποτήρια ἠγόρασε ; (480)
- Ἴδε λύσιν τοῦ 7ου προβλήματος τῆς σελίδος 103.
- 19) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε 35 πήχεις ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος πρὸς δρ. 4,80 τὸν πῆχυν· ἕξ αὐτοῦ ἐκράτησεν $8 \frac{1}{3}$ τοῦ πήχεως διὰ φόρεμα τῆς

συζύγου του, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἐπώλησε καὶ παρετήρησεν ὅτι τοῦ ἔμεινε κέρδος τὸ ὕφασμα τῆς συζύγου του. Ζητεῖται πρὸς πόσον ἐπώλησε τὸν πῆχυν τοῦ ὑπολοίπου ὑφάσματος.

Δύσις. Διὰ τὸν μείνη κέρδος τὸ ὕφασμα τῆς συζύγου του ἔπεται ὅτι ἔλαβεν ἐκ τοῦ πωληθέντος ὑφάσματος τόσας δραχμάς, ὅσας εἶχε δώσει διὰ τοὺς 35 πήχεις, ἥτοι 168 δρ. Ταύτας διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑπολοίπων πήχεων καὶ εὐρίσκομεν 6,30.

20) Εἶχε τις μαζί του 40 δρ. καὶ ἠγόρασεν 8 πήχεις ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος καὶ 9 μανδήλια πρὸς δρ. 13,80 τὴν δωδεκάδα· κατόπιν παρετήρησεν ὅτι τοῦ ἔμειναν 85 λεπτά. Πόσον ἠγόρασε τὸν πῆχυν τοῦ ὑφάσματος ; (3,60 δρ.)

21) Ἠγόρασε τις 6 δεσιμίδας χάρτου πρὸς δρ. 9,20 τὴν δεσιμίδα, ἐκάστη δεσιμὶς περιεῖχε 400 φύλλα· κατόπιν ἐπώλησεν αὐτὸν πρὸς 10 λεπτά τὰ 3 φύλλα. Πόσον ἐκέρδισεν ; (24,80 δρ.)

22) Ἐμπρός τις ἠγόρασε 200 πήχεις ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος πρὸς δρ. 2,60 τὸν πῆχυν· ἐκ τούτου ἐπώλησεν εἰς τινα τὰ $\frac{2}{5}$ πρὸς 2,80 τὸν πῆχυν. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸν πῆχυν τοῦ ὑπολοίπου, διὰ νὰ κερδίσῃ ἕξ ὄλου τοῦ ὑφάσματος 58 δραχμάς ;

Δύσις. Ἐδωκε $2,60 \times 200$ ἢ 520 δραχμάς, ὥστε πρέπει νὰ λάβῃ ἐκ τῆς πωλήσεως ὄλου τοῦ ὑφάσματος $520 + 58$ ἢ 578 δρ. Ἐπώλησε $200 \times \frac{2}{5}$ ἢ 80 πήχεις καὶ ἔλαβεν $2,80 \times 80$ ἢ 224 δραχμάς, ὥστε ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους 120 πήχεις πρέπει νὰ λάβῃ $578 - 224$ ἢ 354 δρ. καὶ ἐπομένως πρέπει νὰ πωλήσῃ τὸν πῆχυν $354 : 120$ ἢ 2,95.

23) Τί εἶναι προτιμότερον, νὰ ἀγοράσῃ τις μίαν δωδεκάδα ὑποκαμίσεων πρὸς δρ. 12,80 ἕκαστον ὑποκάμισον ἢ νὰ ἀγοράσῃ ὕφασμα πρὸς 1,40 τὸν πῆχυν καὶ νὰ πληρώσῃ διὰ ραπτικά καὶ λοιπὰ ὑλικά 2,80 δι' ἕκαστον ὑποκάμισον ; Δι' ἕκαστον ὑποκάμισον χρειάζονται 5 πήχεις.

(τὸ δεύτερον, διότι θὰ ἔχῃ κέρδος 36 δρ.)

24) Παντοπώλης τις ἠγόρασε 340 ὀκ. σάπωνος πρὸς δρ. 2,60 τὴν ὀκᾶν, ἐξώδευσεν ἀκόμη 56 δρ. διὰ τὴν μεταφορὰν του· κατόπιν ἐπώλησε τὴν ὀκᾶν πρὸς 3,20, ἀλλὰ παρετήρησεν ὅτι ὁ σάπων εἶχε χάσει τὸ εἰκοστὸν τοῦ βάρους του. Πόσον ἐκέρδισεν ;

Δύσις. Ὁ σάπων τοῦ ἐκόστισεν 940 δρ. (ἀγορὰ καὶ μεταφορὰ μαζί). Ἀφοῦ ἐχάθη τὸ εἰκοστὸν τοῦ βάρους του, ἥτοι $340 : 20$ ἢ 17 ὀκάδες, ἔμειναν 323 ὀκάδες· ἐκ τούτων ἔλαβε $323 \times 3,20$ ἢ 1033,60 δραχ. καὶ ἐπομένως ἐκέρδισεν 93,60 δρ.

25) Γυνή τις ἔπλεξε 17 ζεύγη κάλτσας, τὰς ὁποίας ἐπώλησε πρὸς δρ. 3,20 τὸ ζεῦγος· πόσον ἐκέρδισεν, ἐὰν δι' ἕκαστον ζεῦγος ἐχρειάσθῃ 35 δράμια νήματος, τοῦ ὁποίου ἡ ὄκτ' ἀξίζει 24 δραχ. ; (δρ. 18,70)

23) Μήτηρ τις μετὰ τῆς θυγατρὸς τῆς ἐργάζονται εἰς ἓν ὑφαντήριον καὶ ὑφαίνουν τὴν ἡμέραν ἐκ τοῦ ἰδίου ὑφάσματος ἢ μὲν μήτηρ 3 πήχεις, ἢ δὲ θυγάτηρ $2\frac{1}{2}$. Μετὰ 15 ἡμερῶν ἐργασίαν ἔλαβεν ἡ μήτηρ δρ.

16,50 περισσότερον τῆς θυγατρὸς τῆς. Πόσον ἐπληρώνοντο τὸν πῆχυν ;
Δύσις. Εἰς τὰς 15 ἡμ. ἡ μήτηρ ὕρανε περισσότερον τῆς θυγατρὸς τῆς $7\frac{1}{2}$ πήχεις, ὥστε ὁ πῆχυς ἐπληρώνετο 16,50 : $7\frac{1}{2}$ ἢ 2,20 δραχ.

27) Γυνή τις ἠγόρασεν ἀπὸ τινα ἔμπορον 9 πήχεις ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος πρὸς δρ. 3,60 τὸν πῆχυν καὶ $6\frac{1}{2}$ πήχ. ἕξ ἄλλου ὑφάσματος πρὸς 2 δραχ. τὸν πῆχυν· κητόπιν παρατήρησεν, ὅτι ἐκ τῶν ὄσων δραχμῶν εἶχε μαζί τῆς, τῆς ἔμειναν 60 λεπτά, ἀλλ' ἔμεινε καὶ χρέος εἰς τὸν ἔμπορον 6 δραχ. Πόσας δραχμάς εἶχε μαζί τῆς ;

Δύσις. Τὰ δύο ὑφάσματα ἀξίζουν δρ. 45,40. Ἐὰν ἔδιδεν εἰς τὸν ἔμπορον καὶ τὰ 60 λεπτά, θὰ ἔμεινε χρέος εἰς αὐτὸν 6—0,60 ἢ 5,40· ὥστε εἶχε μαζί τῆς 45,40—5,40 ἢ 40 δραχ.

28) Εἷς τινα ἐξοχὴν μετέβησαν 9 ἄτομα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, καὶ ἐξώδευσαν διὰ τὴν τροφήν των δρ. 50,40, τὰς ὁποίας ἔπρεπε νὰ πληρῶσουν ὅλοι ἕξ ἴσου· ἀλλ' αἱ γυναῖκες δὲν εἶχον μαζί τῶν χρήματα, διὰ τοῦτο ἕκαστος τῶν ἀνδρῶν ἐπλήρωσεν ἀκόμη δρ. 1,60. Πόσοι ἦσαν οἱ ἄνδρες καὶ πόσαι αἱ γυναῖκες ;

Δύσις. Ἐκαστον ἄτομον ἔπρεπε νὰ πληρώσῃ 50,40 : 9, ἦτοι 5,60, καὶ ἐπειδὴ ἕκαστος τῶν ἀνδρῶν ἐπλήρωσε 5,60 + 1,60 ἢ 7,20, ἔπεται ὅτι ἦσαν τόσοι ἄνδρες ὅσας φορὰς ὁ 7,20 χωρεῖ εἰς τὸν 50,40, ἦτο 7, ἐπομένως αἱ γυναῖκες ἦσαν 2.

29) Παντοπώλης τις ἠγόρασεν ἔλαιον, τὸ ὁποῖον ἐπρόκειτο νὰ πωλήσῃ πρὸς 4 δρ. τὴν ὀκτῶν· ἐπειδὴ ὅμως κατὰ τὴν μεταφορὰν αὐτοῦ ἐχύθησαν 25 ὀκάδες, ἐσκέφθη ὅτι, ἂν πωλήσῃ τὸ ὑπόλοιπον ἔλαιον πρὸς δρ. 4,20 τὴν ὀκτῶν, θὰ λάβῃ ὅσα καὶ πρὶν χρήματα. Ζητεῖται πόσας ὀκάδας ἔλαιου ἠγόρασεν.

Δύσις. Ἀπὸ τὰς 25 ὀκ. ἐξημιώθη 100 δρ. Τὴν ζημίαν ὅμως ταύτην θὰ κερδίσῃ ἀπὸ τὰς ὑπολοίπους ὀκάδας, ἂν πωλήσῃ ἕκαστην ὀκτῶν 0,20 τῆς δραχμῆς περιπλέον· ὥστε αἱ ὑπόλοιποι ὀκάδες εἶναι τόσαι, ὅσας φορὰς τὰ 0,20 χωροῦν εἰς τὰς 100 δραχμάς, ἦτοι 500, ἐπομένως εἶχεν ἀγοράσει 525 ὀκ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

Μέτρησις ποσῶν.

166. Πᾶν ὅ,τι δύναται νὰ εἶναι μεγαλύτερον ἢ μικρότερον ἄλλου ὁμοίου, ἦτοι τὸ δυνόμενον νὰ εὐξηθῆ ἢ νὰ ἐλαττωθῆ, λέγεται *ποσόν*.

Παρ. χάριν, τὸ ὕψος ἐνὸς ἰσίδρου, τὸ ἀνόσιμα ἐνὸς ἀνθρώπου, τὸ βῆρος αὐτοῦ, τὸ μῆκος ἐνὸς ὑφάσματος κτλ. εἶναι ποσά. Διότι ἑπὶ τῶν δένδρα, ἀνθρώποι, ὑφάσματα κτλ. μεγαλύτερα ἢ μικρότερα αὐτῶν.

Διὰ νὰ μετρήσῃμεν ποσόν τι, πρέπει νὰ ἔχωμεν ἄς μονάδα ἐν ἄλλο ποσὸν ἄρισμένον καὶ ἑμοειδές, πρὸς τὸ ἐποῖεν νὰ τὸ συγκρίνωμεν, καὶ νὰ εἶσωμεν οὕτως ὁπὸ πῶς τοιοῦτος μονάδας ἢ μέτρα αὐτῆς ὁποτελείται.

Παρ. χάριν, διὰ νὰ μέσωμεν τὸ βῆρος ἐνὸς πράγματος, πρέπει νὰ τὸ συγκρίνωμεν πρὸς ἄλλο βῆρος ἄρισμένον, τοιοῦτον δὲ βῆρος ἔχομεν ὡς μονάδα τὴν ὀκᾶν.

Ἡ σύγκρισις ἐνὸς ποσοῦ πρὸς τὴν ἑμοειδῆ του μονάδα λέγεται *μέτρησις* αὐτοῦ. Τὰ δὲ γνωστὰ καὶ ἄρισμένα ἔργα, τὰ ἐποῖα λαμβάνομεν ὡς μονάδας καὶ μετροῖμεν τὰ διάφορα ποσά, λέγονται *μέτρα* (καθὼς εἶναι ἡ ὀκᾶ, ὁ πήχυς κτλ.).

Εἶναι φανερόν, ὅτι διὰ τὴν μέτρησιν τῶν διαφορῶν ποσῶν πρέπει νὰ ἔχωμεν καὶ διαφορῶς μονάδας ἑμοειδεῖς πρὸς αὐτά. Ὡστε πρέπει νὰ ἔχωμεν ἰδίαν μονάδα διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ βῆρους, ἰδίαν μονάδα διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ μήκους κτλ. Ἄλλ' ἐπειδὴ ὅλα τὰ κράτη εἶναι ἔχουσι τὰς αὐτὰς μονάδας, διὰ τοῦτο εὐάγερα γίνονται λόγοι περὶ τῶν μονάδων ἐκείνων, τῶν ὁποίων μεγαλύτερα χεῖρισ γίνεται πορ' ἑμῖν.

Μονάδες μήκους ἢ γραμμικαί.

167. Διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ μήκους λαμβάνομεν ἄς μονάδα τὸ *Γαλλικὸν μέτρον*, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ $\frac{1}{40\,000\,000}$ τῆς περιφερείας τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς Γῆς· ὥστε 40 000 000 τοιοῦτα μέτρα ὁποιοῦνται τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς Γῆς.

Τὸ μέτρον διαιρεῖται εἰς 10 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα καλοῦνται *ὑποδεκάμετρα* ἢ *δεκατόμετρα*· ἕκαστον ὑποδεκάμετρον διαιρεῖται εἰς 10 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα καλοῦνται *ὑφεκατόμετρα* ἢ *ἐκατοστομέτρα*.

ἕκαστον ὑφεκατόμετρον διαιρεῖται πάλιν εἰς 10 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα καλοῦνται *ὑποχιλιόμετρα* ἢ *χιλιοστόμετρα*.

Τὸ Γαλλικὸν μέτρον ὠνομάσθη ἐν Ἑλλάδι *Βασιλικὸς πῆχυς*, ἀλλὰ τοῦ ὀνόματος τούτου σπανίως γίνεται χρῆσις, τὸ δέκατον τοῦ μέτρου ὠνομάσθη *παλάμη*, τὸ ἑκατοστὸν τοῦ μέτρου *δάκτυλος* καὶ τὸ χιλιοστὸν αὐτοῦ *γραμμὴ* (1).
 Ὡστε εἶναι

$$\begin{aligned} 1 \text{ B. πῆχυς} &= 10 \text{ παλάμας} = 100 \text{ δακτύλ.} = 1000 \text{ γραμμ.} \\ 1 \text{ παλάμη} &= 10 \text{ δακτύλ.} = 100 \text{ γραμμ.} \\ 1 \text{ δάκτυλ.} &= 10 \text{ γραμμ.} \end{aligned}$$

Ἐκάστη τῶν ἀνωτέρω μονάδων εἶναι, ὡς βλέπομεν, δεκαπλασία τῆς ἀμέσως κατωτέρας τῆς. Ὡστε δυνάμεθα νὰ γράφωμεν αὐτάς, ὅπως καὶ τοὺς δεκαδικούς, ἀρκεῖ νὰ γράφωμεν ὡς ἀκέραιον μέρος τὰ μέτρα ἢ Β. πήχεις, ὡς δέκατα τὰς παλάμας, ὡς ἑκατοστὰ τοὺς δακτύλους καὶ ὡς χιλιοστὰ τὰς γραμμάς. Παραδ. χάριν, ὁ ἀριθμὸς, ὅστις ἔχει 8 μέτρα 7 παλ. 5 δακτ. 6 γραμ. γράφεται ὡς ἐξῆς 8,756 μ. Εὐκόλως δὲ τρέπομεν καὶ ἀριθμὸν μέτρων εἰς μονάδας οἰασοδήποτε τάξεως διὰ τῆς μεταθέσεως τῆς ὑποδιαστολῆς.


Ὅπως λαμβάνομεν μέρη τινὰ τοῦ μέτρου ὡς νέας μονάδας (ἦτοι τὴν παλάμην, τὸν δάκτυλον καὶ τὴν γραμμὴν), οὕτω λαμβάνομεν καὶ πολλαπλασιά τινα αὐτοῦ ὡς νέας μονάδας, ἦτοι τὸ *δεκάμετρον* (10 μέτρα), τὸ *ἑκατόμετρον* (100 μ.), τὸ *χιλιόμετρον* ἢ *στάδιον* (1000 μ.) καὶ τὸ *μυριάμετρον* (10000 μ.).

Ἡ μονὰς ἐκ τῆς ὁποίας σχηματίζονται ἄλλαι μονάδες μικρότεραι ἢ μεγαλύτεραι αὐτῆς, λέγεται *ἀρχικὴ μονὰς*. Ὡστε τὸ μέτρον εἶναι ἀρχικὴ μονὰς.

Σημ. Τὸ χιλιόμετρον καὶ τὸ μυριάμετρον εἶναι ὁδοιοπορικαὶ μονάδες. Τὴν ἀπόστασιν 5 χιλιομέτρων ἢ σταδίων δύναται τις νὰ διατρέξῃ μὲ σύνηθες βᾶδισμα εἰς μίαν ὥραν.

Ἐκτὸς τοῦ Γαλλικοῦ μέτρου ἔχομεν καὶ τὰς ἐξῆς μονάδας μήκους, ἀλλ' ἄνευ δεκαδικῆς ὑποδιαίρεσεως.

Τὸν ἐμπορικὸν πῆχυν, τὸν ὁποῖον μεταχειρίζομεθα διὰ τὴν



(1) Οἱ τεχνῖται τὸ μέτρον ὀνομάζουσι *πασσέτο*, τὰ δὲ ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου ὀνομάζουσι *πόντους*.

μέτρῃσιν τῶν ὑφασμάτων, διαιρεῖται δὲ οὗτος εἰς 8 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα λέγονται **ρούπια**, καὶ εἶναι ἴσος μὲ 0,648 τοῦ μέτρου. Ἐπειδὴ ὅμως εἰς τὸ ἐμπόριον λαμβάνεται ἴσος μὲ 0,64 τοῦ μέτρου, διὰ τοῦτο τὴν σχέσιν ταύτην θὰ λαμβάνωμεν κατωτέρω.

Τὸν τεκτονικὸν πῆχυν, τὸν ὁποῖον μεταχειρίζομεθα διὰ τὴν μέτρῃσιν τοῦ μήκους τῶν οἰκοπέδων καὶ οἰκοδομῶν καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι ἴσος μὲ 0,75 ἢ $\frac{3}{4}$ τοῦ μέτρου.

Οἱ Ἄγγλοι ὡς ἀρχικὴν μονάδα τοῦ μήκους μεταχειρίζονται τὴν **ὑάρδα**, ἣτις διαιρεῖται εἰς 3 **πόδας (φούτ)** καὶ ἕκαστος πούς εἰς 12 **δακτύλους (ἴντσας)**. Ἡ ὑάρδα εἶναι ἴση μὲ 0,914 τοῦ μέτρου περίπου. Ὁ δὲ ἐμπορικὸς πῆχυς εἶναι τὰ $\frac{7}{10}$ τῆς ὑάρδας κατὰ μεγίστην προσέγγισιν.

Σημ. Οἱ Γάλλοι πρὸ τῆς παραδοχῆς τοῦ μέτρου μεταχειρίζοντο ὡς ἀρχικὴν μονάδα τοῦ μήκους τὴν **δργυιάν**, ἣτις διαιρεῖται εἰς 6 **πόδας**, ἕκαστος πούς εἰς 12 **δακτύλους** καὶ ἕκαστος δάκτυλος εἰς 12 **γραμμάς**. Ἡ δργυιὰ εἶναι ἴση μὲ 1,95 τοῦ μέτρου] περίπου ἢ μὲ 3 πῆχεις ἐμπορίου.


Διὰ τὴν μέτρῃσιν μεγάλων ἀποστάσεων λαμβάνονται προσέτι ὡς μονάδες μήκους καὶ τὰ **μίλια**, τὰ ὁποῖα διακρίνονται εἰς τὰ ἑξῆς εἶδη :

Γεωγραφικὸν ἢ Γερμανικὸν μέλιον ἴσον μὲ 7420,44 μ.,
Ναυτικὸν μέλιον δι' ὅλα τὰ ἔθνη ἴσον μὲ 1852 μέτρα (1) καὶ **Ἀγγλικὸν μέλιον** ἴσον μὲ 1760 ὑάρδας ἢ 1608,64 τοῦ μέτρου.

Μονάδες ἐπιφανείας.

168. Διὰ τὴν καταμέτρῃσιν τῶν ἐπιφανειῶν λαμβάνεται ὡς ἀρχικὴ μονάς τὸ **τετραγωνικὸν μέτρον**, ἧτοι τὸ τετράγωνον, τοῦ ὁποίου ἡ πλευρὰ εἶναι ἴση μὲ ἓν μέτρον.

Ὑποθέσωμεν, ὅτι τὸ τετράγωνον ΑΒΓΔ παριστᾷ τετραγωνικὸν μέτρον. Ἐὰν διαιρέσωμεν τὰς πλευρὰς αὐτοῦ ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ εἰς 10 ἴσα μέρη ἑκάστην καὶ ἐνώσωμεν δι' εὐθειῶν τὰ ἀπέναντι σημεῖα τῆς διαιρέσεως τῶν παραλλήλων πλευρῶν ΑΔ καὶ ΒΓ, ΑΒ καὶ ΔΓ, θὰ διαιρεθῇ τὸ τετράγωνον ΑΒΓΔ εἰς 100 **τετραγωνικὰς παλάμας**,



(1) Τὸ ναυτικὸν μέλιον εἶναι τὸ μῆκος ἑνὸς πρώτου λεπτοῦ τῆς μοίρας τῆς περιφερείας τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς Γῆς.

διότι ἡ πλευρὰ ἐκάστου τετραγωνιδίου θὰ εἶναι τὸ δέκατον τοῦ μέτρου, ἦτοι μία παλάμη. Ὡστε ἡ τετραγωνικὴ παλάμη εἶναι τὸ $\frac{1}{100}$ τοῦ τετραγ. μέτρου.

Ἐὰν τὸ αὐτὸ πράξωμεν καὶ εἰς μίαν τετραγωνικὴν παλάμην, τότε αὕτη θὰ διαιρεθῇ εἰς 100 **τετραγ. δακτύλους**: διότι ἡ πλευρὰ ἐκάστου τετραγωνιδίου θὰ εἶναι τὸ δέκατον τῆς παλάμης, ἦτοι εἷς δάκτυλος.

Ὡστε ὁ τετραγ. δάκτυλος εἶναι τὸ $\frac{1}{100}$ τῆς τετρ. παλάμης, καὶ ἐπειδὴ τὸ τετρ. μέτρον περιέχει 100 τετρ. παλάμας, ἄρα περιέχει 100×100 ἢ 10000 τετρ. δακτύλους, ἐπομένως ὁ τετραγ. δάκτυλος εἶναι τὸ $\frac{1}{10000}$ τοῦ τετραγ. μέτρου.

Ἐὰν τὸ αὐτὸ πράξωμεν καὶ εἰς ἓνα τετραγ. δάκτυλον, θὰ διαιρεθῇ οὗτος εἰς 100 **τετρ. γραμμὰς** καὶ θὰ εἶναι ἡ τετρ. γραμμὴ ἢ τὸ τετρ. χιλιοστόμετρον τὸ $\frac{1}{100}$ τοῦ τετρ. δακτύλου ἢ τὸ $\frac{1}{10000}$ τῆς τετραγ. παλάμης ἢ τὸ $\frac{1}{1000000}$ τοῦ τετρ. μέτρου.

Ἐπειδὴ ἐκάστη τῶν ἀνωτέρω μονάδων εἶναι ἑκατονταπλασία τῆς ἀμέσως κατωτέρας τῆς, διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ γράφωμεν τοὺς τοιούτους ἀριθμοὺς καὶ ὡς δεκαδικούς, ἀρκεῖ νὰ γράφωμεν ὡς ἀκέραιον μέρος τὰ τετραγωνικὰ μέτρα, ὡς ἑκατοστὰ τὰς τετρ. παλάμας, ὡς δεκάκις χιλιοστὰ τοὺς τετρ. δακτύλους καὶ ὡς ἑκατομμυριοστὰ τὰς τετρ. γραμμὰς. Π. χ. ὁ ἀριθμὸς, ὅστις ἔχει 5 τετρ. μέτρα 7 τετρ. παλάμας καὶ 15 τετρ. δακτύλους, γράφεται ὡς ἐξῆς 5,0715 τ. μ.

Ἐν Ἑλλάδι διὰ τὰς κτηματικὰς γαίας λαμβάνεται ὡς μονὰς τὸ **Βασιλικὸν στρέμμα**, τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ 1000 τετρ. μέτρα, καὶ ἂν νοηθῇ τοῦτο ὡς τετράγωνον, θὰ ἔχη πλευρὰν ἴσην μὲ 31,62 μ. περίπου. Τὸ δὲ παλαιὸν στρέμμα εἶναι ἴσον μὲ 1,27 τοῦ Β. στρέμματος, ἦτοι 1270 τετρ. μέτρα. Δι' ἀκόμη μεγαλυτέρας ἐκτάσεις, ἦτοι διὰ τὰς γεωγραφικὰς, λαμβάνεται ὡς μονὰς τὸ **τετρ. χιλιόμετρον** (ἦτοι τετράγωνον ἔχον πλευρὰν 1000 μέτρων), τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ 1000 Β. στρέμματα.


Ἐν Γαλλίᾳ καὶ εἰς ἄλλα τινὰ Κράτη λαμβάνουσιν ὡς μονάδα διὰ τὴν καταμέτρησιν τῶν κτηματικῶν γαιῶν τὸ τετραγ. δεκάμετρον, τὸ ὁποῖον λέγεται ἄριον (are), ἦτοι τετράγωνον ἔχον πλευρὰν 10 μέτρων, καὶ ἐπομένως εἶναι ἴσον μὲ 10×10 ἢ 100 τετρ. μέτρα, καὶ τὸ τετραγ. ἑκατόμετρον (**ἐκτάριον**), τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ 100 ἄρια ἢ 10000 τετρ. μέτρα.

Διὰ τὴν καταμέτρησιν τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων λαμβάνεται συνήθως ὡς μονὰς ὁ **τετραγωνικὸς τεκτονικὸς πῆχυς**, ἥτοι τετράγωνον τοῦ ὁποίου ἡ πλευρὰ εἶναι ἴση μὲ ἓνα τεκτονικὸν πῆχυν ὅστις εἶναι ἴσος μὲ τὰ $\frac{9}{16}$ τοῦ τετρ. μέτρου (διότι ὁ τεκτονικὸς πῆχυς εἶναι τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ μέτρου, ἐπομένως τὸ τετράγωνον αὐτοῦ εἶναι $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ ἢ $\frac{9}{16}$).

Μονάδες ὄγκου ἢ χωρητικότητος.

169. Διὰ τὴν καταμέτρησιν τοῦ ὄγκου ἢ τῆς χωρητικότητος λαμβάνεται ὡς ἀρχικὴ μονὰς τὸ **κυβικὸν μέτρον** (ἥτοι κύβος τοῦ ὁποίου ἡ πλευρὰ εἶναι ἴση μὲ ἓν μέτρον).

Ἐὰν ὑποθέσωμεν, ὅτι τὸ κατωτέρω σχῆμα εἶναι κυβικὸν μέτρον καὶ διαιρέσωμεν αὐτὸ κατὰ μῆκος εἰς 10 ἴσα μέρη, ἔπειτα κατὰ πλάτος εἰς 10 ἴσα μέρη καὶ ἔπειτα κατὰ ὕψος εἰς 10 ἴσα μέρη, θὰ προκύψωσι 1000 **κυβικοὶ παλάμαι**, διότι ἐκάστη θὰ ἔχη πλευρὰν ἴσην μὲ μίαν παλάμην· ὥστε ἡ κυβικὴ παλάμη εἶναι τὸ $\frac{1}{1000}$ τοῦ κυβικοῦ μέτρου.



Ἐὰν τὸ αὐτὸ πράξωμεν καὶ εἰς μίαν κυβικὴν παλάμην, θὰ προκύψωσι 1000 **κυβικοὶ δάκτυλοι**, διότι ἡ πλευρὰ ἐκάστου θὰ εἶναι ἴση μὲ ἓνα δάκτυλον· ὥστε ὁ κυβ. δάκτυλος εἶναι τὸ $\frac{1}{1000}$ τῆς κυβ. παλάμης καὶ ἐπομένως τὸ $\frac{1}{1000000}$ τοῦ κυβ. μέτρου.

Ἐπειδὴ ἐκάστη τῶν ἀνωτέρω μονάδων εἶναι χλιοπλασία τῆς ἀμείνων κατωτέρας, διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ γράφωμεν τοὺς τοιοῦτους ἀριθμοὺς καὶ ὡς δεκαδικούς, ἀρκεῖ νὰ γράφωμεν ὡς ἀκέραιον μέρος τὰ κυβικὰ μέτρα, ὡς χλιοστά τὰς κυβικὰς παλάμας καὶ ὡς ἑκατομμυριοστὰς τοὺς κυβικοὺς δακτύλους.


Διὰ τὴν καταμέτρησιν μεγάλων ὄγκων λαμβάνεται ὡς μονὰς ὁ **κυβικὸν χιλιόμετρον**, ἥτοι κύβος, τοῦ ὁποίου ἡ πλευρὰ εἶναι ἴση μὲ 1000 μέτρα.

Διὰ τὴν καταμέτρησιν τῶν τοίχων τῶν οἰκοδομῶν λαμβάνεται συνήθως ὁ **κυβικὸς τεκτονικὸς πῆχυς** ἴσος πρὸς τὰ $\frac{27}{64}$ τοῦ κυβικοῦ μέτρου (διότι εἶναι $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ ἢ $\frac{27}{64}$).

Διὰ τὴν καταμέτρησιν τῶν ὑγρῶν λαμβάνεται ὡς μονὰς ἡ **λίτρα**, ἧτοι ἡ χωρητικότης μιᾶς κυβικῆς παλάμης.


Ἐπειδὴ ὅμως τὸ κυβικὸν σχῆμα δὲν εἶναι κατάλληλον διὰ τὴν χρῆσιν τοῦ ἐμπορίου, διὰ τοῦτο κατασκευάζουσι τὴν λίτραν κυλινδρικήν καθὼς καὶ ἄλλα τοιαῦτα μέτρα χωρητικότητος. Τὰ μέτρα ταῦτα τῶν ὑγρῶν ἔχουν ὕψος διπλάσιον τῆς ἐσωτερικῆς διαμέτρου αὐτῶν· ἡ λίτρα π. χ. ἔχει ἐσωτερικὴν διάμετρον 0,086 τοῦ μέτρου καὶ ὕψος διπλάσιον, ἧτοι 0,172 τοῦ μέτρου.

Τὸ δὲ παρ' ἡμῖν ἐν χρῆσει κυλινδρικὸν δοχεῖον, τὸ λεγόμενον **ὀκᾶ**, χωρεῖ μίαν ὀκᾶν βάρους ὕδατος (καθαροῦ εἰς ὠρισμένην θερμοκρασίαν)· ὥστε, ἂν πληρωθῇ τοῦτο ἐλαίου, τὸ βάρος τοῦ περιεχομένου ἐλαίου θὰ εἶναι ὀλιγώτερον μιᾶς ὀκᾶς, ὡς ἀραιότερου τοῦ ὕδατος.



Λίτρα.

Διὰ τὴν καταμέτρησιν τῶν δημητριακῶν καρπῶν λαμβάνεται ὡς μονὰς τὸ **κοιλόν**, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ δέκατον τῆς χωρητικότητος τοῦ κυβικοῦ μέτρου, ἧτοι ἡ χωρητικότης αὐτοῦ εἶναι 100 κυβ. παλάμαι. Τὸ κοιλὸν ἔχει ἐσωτερικὴν διάμετρον καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἧτοι 0,5033 τοῦ μέτρου. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα τοιαῦτα μέτρα μικρότερα τοῦ κοιλοῦ.



Κοιλόν.

✕ Μονάδες βάρους.

170. Ὡς ἀρχικὴ μονὰς τοῦ βάρους λαμβάνεται τὸ **γραμμάριον**, ἧτοι τὸ βάρος ὕδατος (καθαροῦ καὶ εἰς θερμοκρασίαν 4 βαθμῶν τοῦ Κελσίου), τὸ ὁποῖον χωρεῖ εἰς ἓνα κυβικὸν δάκτυλον.

Διὰ τὰ μεγάλα βάρη λαμβάνεται συνήθως ὡς μονὰς τὸ **χιλιόγραμμον** (ἢ **κελόγραμμον** ἢ συντόμως **κελόν**), τὸ ὁποῖον εἶναι ἴσον μὲ 1000 γραμμάρια (ἧτοι τὸ βάρος καθαροῦ ὕδατος τὸ ὁποῖον χωρεῖ εἰς μίαν κυβικὴν παλάμην). Δι' ἀκόμη μεγαλύτερα βάρη λαμβάνεται ὡς μονὰς ὁ **τόννος** (ἧτοι τὸ βάρος καθαροῦ ὕδατος τὸ ὁποῖον χωρεῖ εἰς ἓν κυβ. μέτρον). Χρῆσις αὐτοῦ γίνεται συνήθως εἰς τὰ φορτία τῶν πλοίων καὶ βαγονίων.

Ἐν Ἑλλάδι καὶ Τουρκίᾳ λαμβάνεται συνήθως ὡς ἀρχικὴ μονὰς τοῦ βάρους ἡ **ὀκᾶ**, ἧτις διαιρεῖται εἰς 400 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα καλοῦνται **δράμια**, ὥστε τὸ δράμιον εἶναι τὸ $\frac{1}{400}$ τῆς ὀκᾶς. Διὰ μεγαλύτερα δὲ βάρη λαμβάνεται ὡς μονὰς ὁ **στατήρ** (κοινῶς **καντάρι**), ὅστις εἶναι ἴσος μὲ 44 ὀκάδας.

Μία ὀκά εἶναι ἴση μὲ 1,280 τοῦ χιλιογράμμου ἢ 1280 γραμμαρίου καὶ ἐπομένως ἐν δραμίον εἶναι ἴσον μὲ $1280 : 400$ ἢ 3,2 τοῦ γραμμαρίου. Ἐν χιλιόγραμμον (ἢ κιλόγραμμον ἢ κιλὸν) εἶναι ἴσον μὲ 312,5 τοῦ δραμίου καὶ εἰς τόννος (ἦτοι 1000 χιλιόγραμμα) εἶναι ἴσος μὲ $312,5 \times 1000$ δραμία ἢ 781 ὀκ. καὶ 100 δραμία.

Σημ. Εἰς τὸ ἐμπόριον τὸ χιλιόγραμμον λαμβάνεται ἴσον μὲ 312 δραμία ἢ 0,78 τῆς ὀκάς καὶ ἐπομένως ὁ τόννος ἴσος μὲ 780 ὀκ. Ὡστε 100 κιλά εἶναι 78 ὀκάδες καὶ 1000 κιλά εἶναι 780 ὀκάδες.

Διὰ τὴν ζύγισιν τῶν φαρμάκων εἶναι ἐν χρήσει παρ' ἡμῖν αἱ ἑξῆς μονάδες.

Κόκκος (γκράνουμ) ἀρχικὴ μονάς. **Γράμμον** (σκούρπουλον) = 20 κόκκοις. **Δραχμὴ** = 3 γράμματα = 60 κόκκοις. **Ὀγγία** = 8 δραχμάς. **Λίτρα** = 12 ὀγγίας ἢ 112 δραμία περίπου.

Πρὸ πολλοῦ ὅμως γίνεται χρῆσις καὶ τῶν Γαλλικῶν μονάδων, ἦτοι λαμβάνεται ὡς ἀρχικὴ μονάς τὸ γραμμαρίον, τὰ πολλαπλάσια αὐτοῦ **δεκάγραμμον**, **ἐκατόγραμμον** κτλ., καθὼς καὶ αἱ ὑποδιαίρεσεις αὐτοῦ, ἦτοι τὸ δέκατον, τὸ ἑκατοστὸν καὶ τὸ χιλιοστὸν τοῦ γραμμαρίου.

Εἰς τὰ σταφιδοφόρα μέρη τῆς Ἑλλάδος πρὸς στάθμισιν τῆς σταφίδος γίνεται χρῆσις τῆς **Ἐνετικῆς λίτρας**, ἴσης μὲ 150 δραμία ἢ $\frac{3}{8}$ τῆς ὀκάς· ὥστε 1000 λίτραι εἶναι 375 ὀκ. Εἰς δὲ τὰ Ἑπτάνησα ὡς μονάς βάρους εἶναι ἐν χρήσει ἡ Ἀγγλικὴ λίτρα, ἴση μὲ 142 δραμία περίπου.

Διὰ τοὺς πολυτίμους λίθους ὡς μονάς βάρους λαμβάνεται τὸ **καράτιον**, ἴσον μὲ 0,2 τοῦ γραμμαρίου περίπου, ὥστε 16 καράτια ἀποτελοῦσι 3,2 τοῦ γραμ., ἦτοι 1 δραμίον.

Μονάδες νομισμάτων.

171. Εὐρωπαϊκὰ τινὰ κράτη παρεδέχθησαν διὰ συμβάσεως νὰ κόπωσι νομίσματα ὅμοια καὶ ἴσης ἀξίας πρὸς εὐκολίαν τοῦ ἐμπορίου. Τὰ κράτη ταῦτα εἶναι τὰ ἑξῆς : Γαλλία, Ἰταλία, Ἑλλάς, Ἑλβετία καὶ Βέλγιον, εἰς ταῦτα δὲ προσετέθησαν κατόπιν καὶ ἄλλα κράτη. Κατὰ τὴν σύμβασιν ταύτην, ἣτις ὠνομάσθη **Δοτινικὴ νομισματικὴ σύμβασις**, παρεδέχθησαν ὡς μονάδα τῶν νομισμάτων τὸ **φράγκον**, τὸ ὁποῖον ἐν Ἑλλάδι λέγεται **δραχμὴ**, εἶναι δὲ ἀργυροῦν νόμισμα, ἔχον βάρους 5 γραμμαρίων (ἢ $1 \frac{9}{16}$ τοῦ δραμίου). Ἀργυρᾶ νομίσματα παρεδέχθησαν καὶ τὰ ἑξῆς.

Τὸ *δίφραγκον* (ἔχον βάρος 10 γραμμαρίων), τὸ *πεντάφραγκον* (ἔχον βάρος 25 γραμμ.), τὸ *ἡμισον* τοῦ φράγκου (ἔχον βάρος 2,5 τοῦ γρ.), καὶ τὸ *πέμπτον* τοῦ φράγκου (ἔχον βάρος 1 γραμ.).

Χρυσᾶ δὲ τὰ ἐξῆς. Τὸ *πεντάφραγκον*, τὸ *δεκάφραγκον*, τὸ *εἰκοσάφραγκον*, τὸ *πεντηκοντάφραγκον* καὶ τὸ *ἐκατοντάφραγκον*.

Τὸ φράγκον ἢ δραχμὴ διαιρεῖται εἰς 100 ἴσα μέρη, τὰ ὅποια παρ' ἡμῖν λέγονται *λεπτά*.

Χαλκᾶ δὲ νομίσματα εἶναι τὰ ἐξῆς. Τὸ *μονόλεπτον* (ἔχον βάρος 1 γραμ.), τὸ *δίλεπτον* (ἔχον βάρος 2 γραμ.), τὸ *πεντάλεπτον ἢ ὀβολός*, κοινῶς *πεντάρα*, (ἔχον βάρος 5 γραμ.), καὶ τὸ *δεκάλεπτον ἢ διώβολον*, κοινῶς *δεκάρα*, (ἔχον βάρος 10 γρ.). Ὡστε, ὅσον εἶναι τὸ βάρος εἰς γραμμᾶρια χαλκίνων νομισμάτων, τόση εἶναι ἡ ἀξία αὐτῶν εἰς λεπτά. Καὶ τὰνάπαλιν.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω νομισμάτων ἔχομεν ἐν χρήσει καὶ τὰ νικέλινά νομίσματα τῶν 5, τῶν 10 καὶ τῶν 20 λεπτῶν, πρὸς δὲ καὶ τὰ τραπεζικὰ γραμμᾶτια ἢ χαρτονομίσματα τῶν 50 λεπτῶν, τῆς 1 δραχμῆς, τῶν 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 καὶ 1000 δραχμῶν.

172. Ἐπειδὴ ὁ καθαρὸς χρυσὸς καὶ ὁ ἀργυρὸς εἶναι φύσει μαλακὰ μέταλλα, διὰ τοῦτο πρὸς κατασκευὴν νομισμάτων (καὶ ἐν γένει κοσμημάτων) ἐκ τοιούτων μετάλλων συγχωνεύουσι μετ' αὐτῶν διὰ τῆς τήξεως καὶ χαλκὸν (συνήθως), ἵνα ἀποκτήσωσι ταῦτα μεγαλυτέραν σκληρότητα καὶ ἐπομένως νὰ μὴ καταστρέφονται ταχέως διὰ τῆς τριβῆς. Ὡστε τὰ ἀνωτέρω νομίσματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ εἶναι κράμα χρυσοῦ ἢ ἀργύρου μετὰ χαλκοῦ.

Τὸ ποσὸν τοῦ πολυτίμου μετάλλου (ὡς εἶναι ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἀργυρὸς), τὸ ὁποῖον περιέχεται εἰς μίαν μονάδα τοῦ κράματος, λέγεται *βαθμὸς καθαρότητος ἢ τίτλος* καὶ ὀρίζεται συνήθως εἰς χιλιοστά. Ὄταν π. χ. λέγωμεν ὅτι ὁ βαθμὸς καθαρότητος χρυσοῦ νομίσματος ἢ κοσμημάτων εἶναι 0,900, ἐνοοῦμεν ὅτι εἰς 1 γραμμαρίον ἢ δράμιον μόνον τὰ $\frac{900}{1000}$ αὐτοῦ εἶναι καθαρὸς χρυσός, τὰ δὲ λοιπὰ $\frac{100}{1000}$ εἶναι ἄλλο μέταλλον μὴ πολυτίμον, ὡς εἶναι ὁ χαλκός.

Διὰ τῆς ἀνωτέρω συμβάσεως ὠρίσθη ὁ βαθμὸς καθαρότητος τῶν μὲν χρυσῶν νομισμάτων 0,900, τῶν δὲ ἀργυρῶν 0,835, πλὴν τοῦ ἀργυροῦ πενταφράγκου, ὀρισθέντος εἰς 0,900. Τὰ χαλκᾶ νομίσματα εἶναι κράμα χαλκοῦ, κασσιτέρου καὶ ψευδαργύρου.

Σημ. Ὁ βαθμὸς καθαρότητος τῶν χρυσῶν κοσμημάτων ἐκφράζεται

καὶ εἰς εἴκοστὰ τέταρτα, ἅτινα λέγονται *καράτια* (1). Ὄταν π.χ. ὁ χρυσὸς εἶναι καθαρὸς, λέγομεν ὅτι εἶναι 24 καρατίων, ὅταν ὁμοῦς λέγομεν ὅτι εἶναι 18 καρατίων, ἐννοοῦμεν ὅτι εἰς μίαν μονάδα βάρους μόνον τὰ $\frac{18}{24}$ αὐτῆς εἶναι καθαρὸς χρυσός, τὰ δὲ λοιπὰ $\frac{6}{24}$ εἶναι ἄλλο μέταλλον.

Ἐν Τουρκίᾳ ὡς ἀρχικὴ μονὰς τῶν νομισμάτων λαμβάνεται τὸ *γρόσιον*, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀργυροῦν καὶ διαιρεῖται εἰς 4 *μεταλλίκια* (χαλκᾶ) καὶ ἕκαστον μεταλλίκιον εἰς 10 *παράδες*. Ἡ *Τουρκικὴ λίρα* εἶναι χρυσοῦν νόμισμα ἔχον βάρους 7,216 τοῦ γραμμαρίου καὶ βαθμὸν καθαρότητος 0,916, διαιρεῖται δὲ εἰς 5 *μετζίτια* (ἀργυρᾶ), ἕκαστον τῶν ὁποίων διαιρεῖται εἰς 4 *πεντάγροσα* (ἀργυρᾶ), ἐπομένως ἡ λίρα ἔχει 100 γρόσια. Ἐκτὸς τούτων ὑπάρχουν καὶ ἄλλα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ νομίσματα.

Ἐν Ἀγγλίᾳ ὡς ἀρχικὴ μονὰς λαμβάνεται ἡ *Ἀγγλικὴ λίρα Στερλίνα*, ἣτις διαιρεῖται εἰς 20 *σελίγια*, ἕκαστον σελίγιον εἰς 12 *πέννας* καὶ ἑκάστη πέννα εἰς 4 *φαρδίνια*. Καὶ ἡ μὲν Ἀγγλικὴ λίρα εἶναι χρυσοῦν νόμισμα (ἔχον βάρους 7,988 τοῦ γραμμ. καὶ βαθμὸν καθαρότητος 0,916), τὸ δὲ σελίγιον ἀργυροῦν, ἡ δὲ πέννα καὶ τὸ φαρδίνιον χαλκᾶ. Ἐκτὸς τούτων ἔχουν καὶ ἄλλα νομίσματα χρυσᾶ, ἀργυρᾶ καὶ χαλκᾶ.

Ἐν τῇ Γερμανίᾳ ὡς ἀρχικὴ μονὰς λαμβάνεται τὸ *μάρκον* (ἀργυροῦν). Ἐν τῇ Αὐστρίᾳ τὸ *φιορίνιον* (ἀργυροῦν) καὶ ἐν τῇ Ἀμερικῇ τὸ *δολλάριον* (ἀργυροῦν).

Εὗρεσις τῆς ἀξίας νομισμάτων ἐκ τοῦ βάρους αὐτῶν καὶ τὴν ἀνάπαλιν.

173. Εἶδομεν ἀνωτέρω, ὅτι 1 δραχμὴ ἢ φράγκον ἔχει βάρους 5 γραμμάρια, 2 δραχμαὶ ἔχουν βάρους 5×2 γραμ. καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς. Ἐκ τούτου συναγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

Ὄταν γνωρίζωμεν τὸ βᾶρος ἀργυρῶν νομισμάτων εἰς γραμμάρια καὶ θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὴν ἀξίαν αὐτῶν εἰς δραχμάς, διαίκομεν τὸ βᾶρος αὐτῶν διὰ 5. Καὶ τὴν ἀνάπαλιν, ὅταν γνωρίζωμεν τὴν ἀξίαν ἀργυρῶν νομισμάτων εἰς δραχμάς καὶ θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὸ βᾶρος αὐτῶν εἰς γραμμάρια, πολλαπλασιάζομεν τὴν ἀξίαν ἐπὶ 5.

(1) Τὸ καράτιον τοῦτο δὲν πρέπει νὰ συγχέεται μὲ τὸ καράτιον βάρους, δι' οὗ ζυγίζονται οἱ πολῦτιμοι λίθοι.

Παραδ. χάριν, ἐὰν ἔχωμεν ἀργυρᾶ νομίσματα, τὰ ὅποια ἔχουν βάρος 178 γραμμάρια, ἢ ἀξία αὐτῶν εἶναι 178:5, ἦτοι 35,60 δρ. Καὶ τᾶνάπαλιν, ἐὰν ἔχωμεν π. χ. 80 δραχμὰς ἀργυρᾶς, τὸ βάρος αὐτῶν εἶναι 80×5 ἢ 400 γραμμ.

Εἰς ἴσον ἀξίαν δραχμῶν τὰ χρυσᾶ νομίσματα ἔχουν βάρος $15 \frac{1}{2}$ φραρὰς ὀλιγώτερον τῶν ἀργυρῶν, τὰ δὲ ἀργυρᾶ 20 φραρὰς ὀλιγώτερον τῶν χαλκῶν. Τᾶνάπαλιν συμβαίνει εἰς ἴσον βάρος γραμμαρίων.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΤΑ-

α') Μέτρα και σταθμά δεκα-

Κράτη ἔχοντα ἐν χρῆσει τὸ δεκ. μετρ. σύστημα	Μονάδες μήκους	Μονάδες ἐπιφανείας
Γαλλία, Βέλγιον, Ἑλβετία, Γερμανία, Ἀυστρία, Ἰταλία, Ἰσπανία, Πορτογαλλία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ἑλλάς.	Μυριάμετρον=10000 μ. Χιλιόμετρον=1000 μ. Ἑκατόμετρον=100 μ. Δεκάμετρον=10 μ. Μέτρον (ἄρχικὴ μονὰς) Ἐποκάμετρον=0,1 μ. Ἐφεκατόμετρον=0,01 μ. Ἐποχιλιόμετρον=0,001 μ.	Τετραγ. μυριάμετρον= 100.000.000 τετρ. μ. Τετραγ. χιλιόμετρον= 1.000.000 τετρ. μ. Ἄρουρ (διὰ τὰς γαίας)= 100 τ. μ. Ἐκτάριον=100 ἄρια Τετρ. μέτρον (ἄρχικὴ μονὰς) Τετ. ἑποκάμετρον=0,01 τ. μ. Τετ. ἑφεκατ.=0,0001 τ. μ. Τετ. ἑποχ.=0,000001 τ. μ.
Ἄλλαι μονάδες ἐν χρῆσει Ἐν Ἑλλάδι, Τουρκίᾳ καὶ Βουλγαρίᾳ.	Πήγυς ἔμποριον=0,64 μ. Ρούλιον= $\frac{1}{8}$ τοῦ πήγ. Τεκτ. πήγυς=0,75 μ.	Τετ. τεκτ. π.= $\frac{9}{16}$ τ. μ. Βασιλ. στρέμμα=1000 τ.μ. Παλαιὸν > =1270 τ.μ.
Ἐν Ἀγγλίᾳ	Ἐάρδα=0,914 μ. Πόνος= $\frac{1}{3}$ ἔαρδας Δάκτυλος= $\frac{1}{12}$ ποδὸς Μίλιον=1760 ἔαρδ.	Τετρ. ἔαρδα=0,836 τ. μ. Ἄκουρ (διὰ τὰς γαίας)= 40,50 τ. μ.
Ἐν Ρωσίᾳ	Ἄροισιν=0,71 μ. Βέριτσιον=1500 ἄροισιν	Τετρ. ἄροισιν=0,505 τ. μ.
Ἐν Ἠνωμέναις Πολιτείαις	Μέτρα καὶ σταθμά ἔχον τὰ Ἀγγλικά.	

β') Μονάδες

Κράτη ἔχοντα νομίσματα τῆς Δαιν. νο- μισμ. συμβάσεως. Ὀνομασία τῆς μονά- δος τῶν νομισμάτων καὶ διαίρεσις αὐτῆς	Ἀγγλία	Γερμανία
Γαλλία, Βέλγιον, Ἑλβετία..... } Φράγκον=100 ἑκατοσιὰ Ἑλλάς..... } Δραχμὴ=100 λεπτὰ Ἰταλία..... } Λίρα =100 τσεντέσιμα Ρουμανία..... } Λεῖ =100 μπάνι Βουλγαρία..... } Λέβι =100 οιοτιγκ Σερβία..... } Δηνάριον=100 παρά Ἰσπανία..... } Πεσέτα =100 ἑκατοσιὰ	Λίρα στερλίνα= 20 σελίνα 1 σελ.=12 πέν- νας, 1 πέννα =4 φαρδίνια Ἀξία λίρας= 25,22 φράγκα	Μάρκον=100 πφηνγκ Ἀξία μάρκον =1,25 φράγκ.

ΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

δικοῦ μετρικοῦ συστήματος.

Μονάδες ὄγκου	Μονάδες χωρητικότητος	Μονάδες βάρους
Κυβικὸν χιλιόμετρον= 1,000,000,000 κυβ. μ. Κυβ. μέτρον (ἀρχικὴ μονάς) Κυβ. ἑποδεκάμετρον= 0,001 κ. μ. Κυβ. ἑφεκατόμετρον= 0,000001 κ. μ. Κυβ. ἑποχιλιόμετρον= 0,000000001 κ. μ.	Ἐκατόλιτρον ἢ κιλὸν (διὰ τὰ σιτηρὰ)=100 λίτ. Λίτρα (χωρητικότητος μιας κυβ. παλάμης).	Τέννος=1000 χιλιόγραμμα Χιλιόγραμμον=1000 γραμμά- ρια. Γραμμάριον (ἀρχικὴ μονάς)= 0,001 τοῦ χιλιογράμ.
Κυβ. τεκτ. πήχης = $\frac{27}{64}$ κυβ. μ.	Ἵοκᾶ (διὰ τὰ ὑγρά) χωρητικότητος μιας ὀκᾶς βάρους ὕδατος.	Στατήρ=44 ὀκ. Ἵοκᾶ (ἀρχικὴ μονάς) Δράμιον = $\frac{1}{400}$ ὀκᾶς Ἄγγλικὴ λίτρα (ἐν Ἐπιανή- σῳ)=142 δράμ.
Κυβ. ἑάροδα	Γαλλόνιον=4,543 τῆς Γαλλικῆς λίτρας	Λίτρα=453,5 γραμ. Ὀγγία = $\frac{1}{16}$ λίτρας Στατήρ=112 λίτρ.=50 χιλιό- γραμ.

νομισμάτων.

Ἀυστρία	Ρωσσία	Τουρκία	Ἑνωμένα Πολιτεῖαι	Ὁλλανδία
Φιορίνιον=100 κροΐτσερ Ἄξια φιορινίου =2,50 φράγ.	Ροῦβλιον = 100 καπίκια Ἄξια ρομβλιον =2,65 φρ.	Γρόσιον= 40 πα- ράδες. Λίτρα= 100 γρόσ. Ἄξια λίρας = 22,80 φράγ.	Δολλάριον=100 σέντς Ἄξια δολ. =5,78 φράγ.	Φλωρίνιον = 100 ἑ- κατο. Ἄξια = 2,10 φράγ.

Μονάδες χρόνου.

174. Ὡς ἀρχικὴν μονάδα τοῦ χρόνου λαμβάνουσιν ὅλα τὰ πεπολιτισμένα Ἐθνη τὴν *ἡμέραν* (ἦτοι τὸ ἡμερονύκτιον), ἣτις εἶναι ὠρισμένη ὑπὸ τῆς φύσεως καὶ παριστᾷ τὸν χρόνον, τὸν ὁποῖον χροιάζεται ἡ Γῆ, διὰ τὰ ἐκτελέσει μίαν περιστροφὴν περὶ τὸν ἄξονά της. Ἡ ἡμέρα διαιρεῖται εἰς 24 ὥρας, ἐκάστη ὥρα εἰς 60 πρῶτα λεπτὰ καὶ ἕκαστον πρῶτον λεπτὸν εἰς 60 δεύτερα λεπτὰ. Τὰ πρῶτα λεπτὰ σημειοῦνται διὰ τοῦ γράμματος λ., ἦτοι 5 λ., τὰ δὲ δεύτερα λεπτὰ διὰ τοῦ γράμματος δ., ἦτοι 36 δ.,

Ἡ ἡμέρα λογίζεται ἀρχομένη ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου καὶ διαιρεῖται εἰς δύο ἴσα μέρη, ἕκαστον ἐκ τῶν ὁποίων περιλαμβάνει 12 ὥρας, ἦτοι ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου μέχρι τῆς μεσημβρίας εἶναι 12 ὥραι καὶ λέγονται *πρὸ μεσημβρίας*, καὶ ἀπὸ τῆς μεσημβρίας μέχρι τοῦ ἐπομένου μεσονυκτίου εἶναι ἄλλαι 12 ὥραι καὶ λέγονται *μετὰ μεσημβρίαν*.

Τὸ ἔτος διαιρεῖται εἰς 12 μῆνας, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι γνωστά. Ἐκ τούτων ὁ μὲν Ἀπρίλιος, Ἰούνιος, Σεπτέμβριος καὶ Νοέμβριος ἔχουν 30 ἡμέρας, οἱ δὲ λοιποὶ 31, ἐκτὸς τοῦ Φεβρουαρίου, ὅστις ἔχει ἄλλοτε 28 καὶ ἄλλοτε 29 ἡμ. Ὡστε τὸ ἔτος ἀποτελεῖται ἀπὸ 365 ἡμ. καὶ κάθε τετραετίαν ἀπὸ 366, ὅτε ὁ Φεβρουάριος ἔχει 29 ἡμέρας, λέγεται δὲ τότε τὸ ἔτος *δίσεκτον*. Δίσεκτα ἔτη εἶναι ὅσα διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ 4, ὡς εἶναι τὰ ἔτη 1916, 1920, 1924 κτλ.

Διὰ τὰ εὐρίσκωμεν δὲ εὐκόλως τίνες μῆνες ἔχουσι 30 ἡμέρας καὶ τίνες 31, ὅταν δὲν ἐνθυμώμεθα, πράττομεν ὡς ἑξῆς. Σχηματίζομεν διὰ τῆς χειρὸς μας πυγμὴν καὶ ἐπὶ τῶν τελευταίων κονδύλων ἢ κόμβων ἀπαγγέλλομεν κατὰ σειρὰν τὰ ὀνόματα τῶν μηνῶν ἀρχόμενοι ἀπὸ τὸν κόμβον τοῦ δείκτου (πρῶτος μὴν θεωρεῖται ὁ Ἰανουάριος), καὶ ἀφοῦ φθάσωμεν εἰς τὸν κόμβον τοῦ μικροῦ δακτύλου, ἐπανερχόμεθα εἰς τὸν κόμβον τοῦ δείκτου καὶ ἐξακολουθοῦμεν τὴν ἀρίθμησην. Ὅσων μηνῶν τὰ ὀνόματα πέσωσιν ἐπὶ τῶν κόμβων ἔχουν 31 ἡμέρας, ὅσων δὲ ἐπὶ τῶν κοιλασμάτων μεταξὺ δύο κόμβων ἔχουν 30 ἡμ. (πλὴν τοῦ Φεβρουαρίου).

Σημ. Εἰς τὸ ἐμπόριον οἱ μῆνες λογίζονται μὲ 30 ἡμέρας καὶ ἐπομένως τὸ ἔτος μὲ 360 ἡμ. Ἡ *ἐβδομάς* ἔχει 7 ἡμέρας. Τὸ χρονικὸν διάστημα 100 ἐτῶν λέγεται *ἐκατονταετηρὶς ἢ αἰών*, τῶν δὲ 1000 ἐτῶν *χιλιετηρὶς*.

Ἐῦρεσις τῆς ἡμέρας ἐκ τῆς χρονολογίας.

175. Πολλάκις εἶναι χρήσιμον νὰ γνωρίζωμεν ποία εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος, ὅταν δοθῇ τὸ ἔτος, ὁ μὴν καὶ ἡ ἡμερομηνία. Πρὸς τοῦτο ἀκολουθοῦμεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

Ἐλαττώνομεν τὸ δοθὲν ἔτος κατὰ μίαν μονάδα καὶ διαιροῦμεν αὐτὸ διὰ 4 (λαμβάνοντες μόνον τὸ ἀκέραιον μέρος τοῦ πηλίκου), ἔπειτα ἀφαιροῦμεν 28 ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν ἐκάστου τῶν προηγουμένων μηνῶν τοῦ δοθέντος (ἀρχῆς γινομένης ἀπὸ τοῦ Ἰανουαρίου)· τέλος ἀφαιροῦμεν καὶ ἀπὸ τὴν ἡμερομηνίαν τοῦ δοθέντος μηνὸς μίαν μονάδα. Ἐπειτα προσθέτομεν τὸ κατὰ μονάδα ἐλαττωθὲν ἔτος, τὸ τέταρτον αὐτοῦ καὶ τὰς εὐρεθείσας διαφορὰς· τὸ δὲ ἄθροισμα διαιροῦμεν διὰ 7, καὶ ἂν εὐρεθῇ ὑπόλοιπον 1, ἡ ἡμέρα εἶναι Κυριακή· ἂν 2, Δευτέρα· ἂν 3, Τρίτη· ἂν 4, Τετάρτη· ἂν 5, Πέμπτη· ἂν 6, Παρασκευή· καὶ ἂν 0, Σάββατον.

Ἐστω π. χ. νὰ εὐρεθῇ ποία ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος ἦτο ἡ 18ῃ Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1900.

Ἀριθμὸς ἔτους ἠλαττωμένους κατὰ μονάδα	1899
Ἀριθμὸς ἀκεραίου πηλίκου τοῦ 1899 διὰ 4	474
Ἰανουάριος ἔχει 31 ἡμ., διαφορὰ $31 - 28 =$	3
Φεβρουάριος εἶχεν 29, διαφορὰ $29 - 28 =$	1
Μάρτιος ἔχει 31, διαφορὰ $31 - 28 =$	3
Ἡμερομηνία Ἀπριλίου ἠλαττωμένη κατὰ 1	17

ἄθροισμα 2397

Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἄθροίσματος 2397 διὰ 7 εἶναι 3, ἐπομένως ἡ 18ῃ Ἀπριλίου τοῦ 1900 ἦτο Τρίτη (1).

Ἀσκήσεις.

- 1) Ποία ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος ἦτο ἡ 25 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1821;
- 2) Ποία ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος ἦτο ἡ 5ῃ Μαρτίου τοῦ ἔτους 1913, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐδολοφονήθη ἔν Θεσσαλονίκη ὁ βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Γεώργιος Α΄;
- 3) Ποία ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος θὰ εἶναι ἡ 23ῃ Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1930;

Διαιρέσεις τῆς περιφερείας κύκλου.

176. Πᾶσα περιφέρεια κύκλου διαιρεῖται εἰς 360 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα λέγονται **μοῖραι**· ἐκάστη μοῖρα διαιρεῖται εἰς 60 ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα λέγονται **πρῶτα λεπτά** τῆς μοίρας· καὶ ἕκαστον πρῶτον λεπτὸν τῆς μοίρας διαιρεῖται εἰς 60 **δεύτερα λεπτά** τῆς μοίρας. Ὁ ἀριθμὸς τῶν μοιρῶν σημειοῦται δι' ἐνὸς μηδενικοῦ, γραφομένου εἰς τὰ δεξιὰ

(1) Ἡ ἡμερομηνία αὕτη, ὡς καὶ αἱ κατωτέρω, εἶναι τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου.

αὐτοῦ καὶ ὀλίγον ἄνω· ὁ ἀριθμὸς τῶν πρώτων λεπτῶν σημειοῦται δι' ἑνὸς τόνου καὶ ὁ τῶν δευτέρων διὰ δύο τόνων. Π. γ. τὸ τόξον 50 μοιρῶν 40 πρ. λεπτῶν καὶ 30 δευτέρων γράφεται ὡς ἐξῆς 50° 40' 30''.

Δεκαδικὸν μετρικὸν σύστημα.

177. Ὅσαι τῶν ἀνωτέρω μονάδων διαιροῦνται εἰς δέκατα, ἑκατοστά κτλ., ἦτοι ἔχουν δεκαδικὴν ὑποδιαίρεσιν, καὶ τοιαῦται εἶναι ἐκεῖναι, αἵτινες ἔχουν ὡς βάσιν τὸ Γαλλικὸν μέτρον, ἀποτελοῦν τὸ καλούμενον **δεκαδικὸν μετρικὸν σύστημα**. Διὰ τῆς δεκαδικῆς ὑποδιαίρεσεως τῶν μονάδων τούτων καὶ τῶν δεκαδικῶν πολλαπλασιῶν αὐτῶν ἐκτελοῦνται αἱ ἐπ' αὐτῶν πράξεις εὐκόλως καὶ συντόμως.

Προβλήματα τροπῆς μονάδων συστήματός τινος εἰς μονάδας ἄλλου συστήματος.

178. Πολλάκις εἶναι χρήσιμον νὰ γνωρίζωμεν, παραδ. χάριν, πῶς τρέπονται οἱ πήχεις εἰς μέτρα καὶ τανάπαλιν, ἢ πῶς αἱ ὀκάδες τρέπονται εἰς χιλιόγραμμα κτλ. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ ἐνθυμώμεθα τὴν πρὸς ἀλλήλας σχέσιν τῶν μονάδων τούτων· ἡ δὲ τροπὴ γίνεται δι' ἑνὸς πολλαπλασιασμοῦ ἢ διὰ μιᾶς διαιρέσεως (μετροῦσεως), ὡς φαίνεται ἐκ τῶν κατωτέρω προβλημάτων.

1) Νὰ τραποῦν 35 ἐμπορικοὶ πήχεις εἰς μέτρα.

Κατάταξις. 1 πήχ. ἰσοῦται μὲ 0,64 τοῦ μ.
35 χ

Λύσις. Κατὰ τὸν κανόνα τοῦ ἕδαφίου 46 θὰ κάμωμεν πολλαπλασιασμόν, ἦτοι $0,64 \times 35$ ἢ 22,40 τοῦ μέτρου.

2) Νὰ τραποῦν 60 μέτρα εἰς τεκτον. πήχεις.

Κατάταξις (¹). 1 τεκτ. π. ἰσοῦται μὲ 0,75 τοῦ μ.
χ 60

Λύσις. Κατὰ τὸν κανόνα τοῦ ἕδαφίου 64 θὰ κάμωμεν διαίρεσιν (μέτρησιν), ἦτοι $60 : 0,75$ ἢ 80 τεκτ. πήχεις.

Νοερῶς. Ἐπειδὴ εἶναι $1 \mu. = 1 \frac{1}{3}$ τοῦ τεκτ. πήχεως, διὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ τρέπωμεν ἀπὸ μνήμης ἀκέραιον ἀριθμὸν μέτρων εἰς τεκτ. πήχεις ὡς ἐξῆς·

Προσθέντομεν εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν μέτρων τὸ τρίτον αὐτοῦ.

(1) Καλὸν εἶναι νὰ γίνεται ἡ τοιαύτη κατάταξις τῶν ἀριθμῶν, ἵνα εὐκόλως διακρίνωσιν οἱ μαθηταὶ ποίαν πρᾶξιν θὰ ἐκτελέσωσιν.

Παραδ. χάριν, εἰς τὸν ἀνωτέρω ἀριθμὸν 60 προσθέτομεν τὸ τρίτον αὐτοῦ 20 καὶ εὐρίσκομεν 80.

3) Νὰ τραποῦν 40 μέτρα εἰς πήχεις ἔμπορίου. Εὐρίσκομεν, ὅτι εἶναι $40 : 0,64$ ἢ $62 \frac{1}{2}$ πήχεις.

Νοερῶς. Διὰ τὰ τρέπωμεν ἀπὸ μνήμης ἀκέραιον ἀριθμὸν μέτρων εἰς πήχεις ἔμπορίου, πρῶττομεν ὡς ἑξῆς·

Εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν μέτρων προσθέτομεν τὸ ἡμισυ αὐτοῦ καὶ τόσα ὄγδοα ἢ ρούπια ἀκόμη, ὅσον εἶναι τὸ ἡμισυ τοῦτο.

Παραδ. χάριν, εἰς τὸν ἀνωτέρω ἀριθμὸν 40 προσθέτομεν τὸ ἡμισυ αὐτοῦ 20, ὅτε ἔχομεν 60, καὶ ἀκόμη 20 ρούπια ἢ $2 \frac{1}{2}$ πήχεις καὶ εὐρίσκομεν $62 \frac{1}{2}$ π.

Σημ. Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς τῶν μέτρων εἶναι περιττός, τότε πρὸς εὐκολίαν μας ἀφαιροῦμεν ἀπ' αὐτὸν 1 μέτρον καὶ τὸ ὑπόλοιπον τρέπομεν εἰς πήχεις, ὅπως ἀνωτέρω, εἰς δὲ τὸ εὐρεθὲν ἐξαγόμενον προσθέτομεν $1 \frac{1}{2}$ τοῦ πήχεως. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ συμβαίνει λάθος ἡμισυ ρούπιον ὀλιγώτερον.

4) Νὰ τραποῦν 45 ἔμπορικὸι πήχεις εἰς ὑάρδας.

Δύσις. Ἐπειδὴ 1 ἔμπ. πήχυς εἶναι τὰ $\frac{7}{10}$ τῆς ὑάρδας, ἔπεται ὅτι οἱ 45 π. εἶναι $45 \times \frac{7}{10}$ ἢ $4,5 \times 7$, ἤτοι 31,5 τῆς ὑάρδας. Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι

Διὰ τὰ τρέψωμεν ἔμπορικὸς πήχεις εἰς ὑάρδας πολλαπλαζόμεν τὸ δέκατον αὐτῶν ἐπὶ 7.

5) Νὰ τραποῦν 300 ὑάρδαι εἰς ἔμπορικὸς πήχεις.

Δύσις. Ὅσας φορὰς ὁ $\frac{7}{10}$ ἢ 0,7 χωρεῖ εἰς τὸν 300, τόσοι πήχεις εἶναι, ἤτοι $300 : 0,7$ ἢ $3000 : 7$, ἤτοι $428 \frac{4}{7}$ τοῦ πήχεως. Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι

Διὰ τὰ τρέψωμεν ὑάρδας εἰς ἔμπορικὸς πήχεις, διαιροῦμεν τὸ δεκαπλάσιον αὐτῶν διὰ 7.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ τραποῦν 600 τεκτον. πήχεις εἰς μέτρα. (μ. 450)

2) Νὰ τραποῦν 36,56 τοῦ μέτρου εἰς ὑάρδας. (40)

3) Νὰ τραποῦν 393,75 τοῦ τετρ. μέτρου εἰς τετρ. τεκτ. πήχεις. (700)

- 4) Νὰ τραποῦν 160 δράμια εἰς γραμμάρια. (3,2×160 ἢ 512)
- 5) Νὰ τραποῦν 768 γραμμάρια εἰς δράμια. (24)
- 6) Νὰ τραποῦν 31 χιλιόγρ. καὶ 680 γραμ. (ἢ 31680 γρ.) εἰς ὀκάδας. $\left(24 \frac{3}{4} \text{ τῆς ὀκάς}\right)$
- 7) Τὸ μέτρον ὑφάσματός τινος ἀξίζει δρ. 6,50. Πόσον ἀξίζει ἔμπορικὸς πῆχυς; $(6,50 \times 0,64 \text{ ἢ } 4,16)$
- 8) Ἡ ὑάρδα ἐνὸς ὑφάσματος ἀξίζει 8 δρ. Νὰ εὑρεθῇ νοερῶς πόσον ἀξίζει ὁ ἔμπορικὸς πῆχυς.
- 9) Ἀργυρᾶ νομίσματα (τῆς Λατινικῆς συμβάσεως) ἔχουν βάρος 2500 γραμ. Ποία εἶναι ἡ ἀξία αὐτῶν; (500 δρ.)
- Ἴδε ἐδάφιον 173.
- 10) Χρυσᾶ νομίσματα (τῆς αὐτῆς συμβάσεως) ἔχουν βάρος 145,16 τοῦ γραμμαρίου. Ποία εἶναι ἡ ἀξία αὐτῶν; (450 δρ.)
- 11) Ἡγόρασε τις οἰκόπεδον 478 τετρ. μέτρων ἀντὶ 3441,60 δρ. Πόσον ἀξίζει ὁ τετραγ. τεκτον. πῆχυς; (4,05 δρ.)
- 12) Παντοπώλης τις ἠγόρασε 1440 κιλὰ καφὲ πρὸς δρ. 2,80 τὸν κίλον, πρὸς δὲ ἐδαπάνησε μέχρις ἐναποθηκείσεως αὐτοῦ δραχ. 16. Πόσον τοῦ κοστίζει ἡ ὀκά; (3,73 δρ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

179. Ὑποθέσωμεν, ὅτι ἐξυγίσαμεν προᾶγμά τι καὶ εὔρομεν αὐτὸν $142 \frac{50}{400}$ τῆς ὀκάς ἢ 3 στατῆρας 10 ὀκάδ. 50 δράμια (διότι, ἂν διαίρωμεν τὰς 142 ὀκ. διὰ 44, εὐρίσκομεν πληκτικὸν 3 στ. καὶ ὑπόλοιπον 1 ὀκάδας, τὰ δὲ τετρακοσιοστὰ τῆς ὀκάς λέγονται **δράμια**). Ὁ ἀριθμὸς 3 στατ. 10 ὀκ. 50 δράμια ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς ἀριθμούς· καὶ τὸν μὲν πρώτου ἢ μονάς, ἦτοι ὁ 1 στατῆρ, εἶνε πολλαπλάσιον τῆς ἀρχικῆς μονάδος, ἦτοι τῆς μιᾶς ὀκάς (διότι εἶναι 1 στατῆρ=44 ὀκ.), τοῦ δὲ τοῦ ἢ μονάς, ἦτοι τὸ 1 δράμιον εἶναι ὠρισμένον μέρος τῆς ἀρχικῆς μονάδος (διότι εἶναι ἓν δράμιον = $\frac{1}{400}$ τῆς ὀκάς). Ὁ τοιοῦτος ἀριθμὸς λέγεται **συμμιγῆς**· ὅθεν ὀρίζομεν τὸν συμμιγῆ ἀριθμὸν ὡς ἐξῆς.

180. **Συμμιγῆς ἀριθμὸς λέγεται ὁ συγκείμενος ἐξ ἄλλων ἀριθμῶν, τῶν ὁποίων αἱ μονάδες ἔχουσιν ἴδιον ὄνομα καὶ ἐκάστη εἶναι**

ἡ πολλαπλάσιον τῆς ἀρχικῆς μονάδος ἢ ὠρισμένον μέρος αὐτῆς.

Οἱ συμμιγεῖς ἀριθμοὶ εἶναι πάντοτε συγκεκριμένοι ἀριθμοὶ, διότι ἕκαστος ἀριθμὸς τῶν συμμιγῶν ἔχει καὶ ἴδιον ὄνομα, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀριθμοὶ (ἀκέραιοι, κλασματικοὶ καὶ δεκαδικοὶ) δύνανται νὰ εἶναι καὶ ἀφηρημένοι. Πρὸς διάκρισιν τῶν συμμιγῶν οἱ ἄλλοι οὔτοι ἀριθμοὶ λέγονται *ἀπλοῖ*.

**Τροπὴ συμμιγοῦς ἀριθμοῦ εἰς ἀπλοῦν ἀριθμόν,
ἦτοι εἰς μονάδας μιᾶς οἰασθήποτε τάξεώς του.**

181. Ἐστω, παραδ. χάριν, νὰ τραπῇ ὁ συμμιγῆς ἀριθμὸς 5 στατ. 8 ὀκ. 50 δρᾶμ. εἰς μονάδας τῆς κατωτέρας τάξεώς του, ἦτοι εἰς δράμια.

Πρὸς τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Ἐφοῦ ὁ 1 στατήρ ἔχει 44 ὀκάδας, οἱ 5 στατήρες θὰ ἔχωσι 44×5 ἢ 220 ὀκάδας καὶ 8 ὀκάδας ὅπου ἔχει ὁ δοθεὶς συμμιγῆς κάμνουν 228 ὀκάδας.

Τρέπομεν τώρα τὰς 228 ὀκάδας εἰς δράμια σκεπτόμενοι ὡς ἐξῆς. Ἐφοῦ ἡ 1 ὀκά ἔχει 400 δράμια, αἱ 228 ὀκ. ἔχουν 228×400 ἢ 91200 δράμια καὶ 50 δράμια ὅπου ἔχει ὁ δοθεὶς συμμιγῆς κάμνουν 91250 δρᾶμ. Ὡστε εἶναι 5 στατ. 8 ὀκ. 50 δρᾶμ. = 91250 δράμια.

Ἡ ἀνωτέρω προᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς.

5 στατ. 8 ὀκ. 50 δρᾶμ.

44	
220	
8	
228	ὀκάδες
400	
91200	
50	
91250	δράμια

Ἐστω προσέτι καὶ τὸ τὸ ἐξῆς παράδειγμα.

Νὰ τραπῇ ὁ συμμιγῆς 2 ἔτη 3 μῆν. 5 ἡμ. 4 ὥραι εἰς μονάδας τῆς δοθείσης κατωτέρας τάξεώς του, ἦτοι εἰς ὥρας.

Πρὸς τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς· ἀφοῦ τὸ 1 ἔτος ἔχει 12 μῆνας, τὰ δύο ἔτη ἔχουν 12×2 ἢ 24 μῆνας καὶ 3 μῆνας ὅπου ἔχει ὁ συμμιγῆς κάμνουν 27 μῆνας. Ἐπειτα τρέπομεν τοὺς μῆνας εἰς ἡμέρας σκεπτόμενοι ὡς ἐξῆς· ἀφοῦ ὁ 1 μῆν ἔχει 30 ἡμέρας, οἱ 27 μῆνες ἔχουν 27×30 ἢ 810 ἡμέρας καὶ 5 ἡμ. ὅπου ἔχει ὁ συμμιγῆς κάμνουν 815 ἡμ. Τέλος τρέπομεν τὰς ἡμέρας εἰς ὥρας σκεπτόμενοι ὡς ἐξῆς· ἀφοῦ ἡ 1 ἡμέρα

ἔχει 24 ὥρας αἱ 815 ἡμέραι ἔχουν 815×24 ἢ 19560 ὥρας καὶ 4 ὥρας ὅπου ἔχει ὁ συμμιγῆς κάμνουν 19564 ὥρας.

Ἡ ἀνωτέρω προᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

2 ἔτη 3 μῆν. 5 ἡμ. 4 ὥρ.

12

24

3

27

μῆνες

30

810

5

815

ἡμέραι

24

3260

1630

19560

4

19564

ὥραι

Ἐὰν θελήσωμεν νὰ τρέψωμεν τὸν ἀνωτέρω συμμιγῆ εἰς πρῶτα λεπτά, ἦτοι εἰς μονάδας κατωτέρας τῆς ἐν τῷ συμμιγεῖ δοθείσης τάξεως, τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς μονάδας τῆς δοθείσης κατωτέρας τάξεως, ἦτοι εἰς ὥρας, καὶ τὸ ἐξαγόμενον 19564 πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 60 (διότι 1 ὥρα ἔχει 60 λ.) καὶ εὐρίσκομεν 1173840 λεπτά.

Ἐὰν πάλιν θέλωμεν νὰ τρέψωμεν αὐτὸν εἰς δεύτερα λεπτά, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀριθμὸν τῶν πρῶτων λεπτῶν ἐπὶ 60 (διότι 1 λ. ἔχει 60 δ.) καὶ εὐρίσκομεν 70430400 δεύτερα λεπτά.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω βλέπομεν, ὅτι, ὅταν ὁ συμμιγῆς τρέπεται εἰς μονάδας τῆς δοθείσης κατωτέρας τάξεώς του ἢ καὶ ἄλλης τάξεως κατωτέρας τῆς δοθείσης, τὸ ἐξαγόμενον εἶναι ἀκέραιος ἀριθμὸς.

Ἰδῶμεν τώρα πῶς τρέπεται ὁ ἀνωτέρω συμμιγῆς ἀριθμὸς εἰς μονάδας οἰασδήποτε ἄλλης τάξεως ἀνωτέρας, ἦτοι εἰς ἡμέρας, μῆνας καὶ ἔτη.

1ον) Ἐστω νὰ τραπῇ ὁ ἀνωτέρω συμμιγῆς εἰς ἡμέρας. Πρὸς τοῦτο τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς μονάδας τῆς κατωτέρας τάξεώς του, ἦτοι εἰς ὥρας, καὶ ἔπειτα σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Ἐπειδὴ εἶναι 1 ἡμέρα = 24 ὥρας, ἄρα ἡ 1 ὥρα εἶναι τὸ $\frac{1}{24}$ τῆς ἡμέρας καὶ ἐπομένως αἱ 19564

ρα εἶναι τὰ $\frac{19564}{24}$ τῆς ἡμέρας. Ὡστε εἶναι 2 ἔτη 3 μῆν. 5 ἡμ. 4 ὥρ. = $\frac{19564}{24}$ τῆς ἡμέρας.

2ον) Ἐστω νὰ τραπῆ ὁ ἀνωτέρω συμμαγῆς εἰς μῆνας. Πρὸς τοῦτο βλέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς μονάδας τῆς κατωτέρας τάξεώς του, ἥτοι εἰς ὥρας, καὶ ἔπειτα σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Ἐπειδὴ εἶναι 1 μῆν = 30 ἡμέρας = 30×24 ἢ 720 ὥρας, ἄρα ἡ 1 ὥρα εἶναι τὸ $\frac{1}{720}$ τοῦ μηνός καὶ ὡς ἐπομένως αἱ 19564 ὥραι εἶναι τὰ $\frac{19564}{720}$ τοῦ μηνός. Ὡστε εἶναι 2 ἔτη 3 μῆν. 5 ἡμ. 4 ὥρ. = $\frac{19564}{720}$ τοῦ μηνός.

3ον) Ἐστω τέλος νὰ τραπῆ ὁ ἀνωτέρω συμμαγῆς εἰς ἔτη. Πρὸς τοῦτο βλέπομεν πάλιν αὐτὸν εἰς ὥρας καὶ ἔπειτα σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Ἐπειδὴ εἶναι 1 ἔτος = 12 μῆνας = 12×30 ἡμέρας = $12 \times 30 \times 24$ ἢ 8640 ὥρας, ἄρα ἡ 1 ὥρα εἶναι τὸ $\frac{1}{8640}$ τοῦ ἔτους καὶ ὡς ἐπομένως αἱ 19564 ὥραι εἶναι τὰ $\frac{19564}{8640}$ τοῦ ἔτους. Ὡστε εἶναι 2 ἔτη 3 μῆν. 5 ἡμ. 4 ὥρ. = $\frac{19564}{8640}$ τοῦ ἔτους.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω βλέπομεν, ὅτι ὅταν ὁ συμμαγῆς τρέπηται εἰς μονάδας οἰασδήποτε ἄλλης τάξεως ἀνωτέρας, τὸ ἐξαγόμενον εἶναι κλάσμα. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

182. Διὰ νὰ τρέσωμεν συμμαγῆ ἀριθμὸν εἰς μονάδας οἰασδήποτε τάξεως ἀνωτέρας, τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς μονάδας τῆς κατωτέρας τάξεώς του καὶ τὸ ἐξαγόμενον γράφομεν ἀριθμητὴν, παρονομασίην δὲ γράφομεν τὸν ἀριθμὸν, ὅστις φανεροῦς εἶναι πόσαι μονάδες τῆς δοθείσης κατωτέρας τάξεώς του κάμνουν τὴν μονάδα τῆς τάξεως ἐκείνης, εἰς τὴν ὁποίαν πρόκειται νὰ τραπῆ ὁ συμμαγῆς.

Τροπὴ ἀπλοῦ ἀριθμοῦ εἰς συμμαγῆ.

183. Ἐστω, παραδ. χάριν, νὰ τραπῆ ὁ ἀριθμὸς 47350 δράμια εἰς ἀπλοῦ ἀριθμὸν.

Τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, ἡ δὲ εἰς ὀκάδας, καὶ ὅσας φορὰς ὁ 400 (διότι ἡ 1 ὀκά ἔχει 400 δραμ.) περιέχεται εἰς τὸν 47350, τόσαι ὀκάδες περιέχονται ὥστε διαιροῦντες τὸν ἀριθμὸν πηλίκον 118 ὀκ. καὶ ὑπόλοιπον 150 δραμ. Τὰς 118 ὀκ.

τρέπομεν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, ἦτοι εἰς στατῆρ καὶ ὅσας φορὰς ὁ 44 (διότι ὁ 1 στατῆρ ἔχει 44 ὄκ.) χωρεῖ εἰς τὸν 1 τόσοι στατῆρες περιέχονται· ὥστε διαιροῦντες εὐρίσκομεν πηλίκον 2 καὶ ὑπόλοιπον 30 ὄκ.

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς·

$$\begin{array}{r} 473(50 \mid 400 \\ 07 \quad 118 \text{ ὄκ.} \quad \mid 44 \\ 33 \quad 30 \text{ ὄκ.} \quad \quad \quad \mid 2 \text{ στ.} \\ \hline 150 \text{ δράμ.} \end{array}$$

᾿Ωστε εἶναι 47350 δράμ. = 2 στ. 30 ὄκ. 150 δράμ.

Καὶ κλάσμα τρέπεται εἰς συμμιγῆ ἀριθμόν, ἂν διαιρέσωμεν ἀριθμητὴν του διὰ τοῦ παρονομαστοῦ του (διότι πᾶν κλάσμα εἶναι λίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ).

᾿Εστω π. χ. νὰ τραπῆ τὸ κλάσμα $\frac{35}{8}$ τῆς ὥρας εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν Διαιροῦμεν τὸν 35 διὰ 8 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 4 ὥρας καὶ ὑπόλοιπον 3 ὥρας. Τὸ ὑπόλοιπον τοῦτο τρέπομεν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατώτερας τάξεως, ἦτοι εἰς πρῶτα λεπτά, καὶ εὐρίσκομεν 60×3 ἢ 180 ἔπειτα διαιροῦμεν τὸν 180 διὰ 8 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 22 λ. ὑπόλοιπον 4 λ. Τὸ ὑπόλοιπον τοῦτο τρέπομεν εἰς δευτέρω λεπτά εὐρίσκομεν 60×4 ἢ 240 δ.· ἔπειτα διαιροῦμεν τὸν 240 διὰ 8 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 30 δ. καὶ ὑπόλοιπον 0. ᾿Ωστε εἶναι $\frac{35}{8}$ τῆς ὥρας 4 ὄρ. 22 λ. 30 δ.

Ἡ ἀνωτέρω πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς·

$$\begin{array}{r} 35 \text{ ὥραι} \mid 8 \\ 3 \quad 4 \text{ ὄρ. } 22 \text{ λ. } 30 \text{ δ.} \\ 60 \\ \hline 180 \text{ λ.} \\ 20 \\ 4 \\ 60 \\ \hline 240 \text{ δ.} \\ 0 \end{array}$$

᾿Εκ τούτου συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

184. Διὰ νὰ τρέψωμεν κλάσμα μιᾶς τάξεως (οὐχὶ τῆς κατώτης) ἐνὸς συμμιγοῦς εἰς συμμιγῆ ἀριθμόν, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ· τὸ πηλίκον θὰ εἶναι ὁμοειδὲς

κλάσμα, τὸ δὲ ὑπόλοιπον (ἂν μείνη) τρέπομεν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως καὶ διαιροῦμεν τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ· τὸ πηλίκον τῆς νέας ταύτης διαιρέσεως θὰ παριστᾷ μονάδας τῆς τάξεως ταύτης· οὕτω δὲ ἐξακολουθοῦμεν μέχρι τῆς τελευταίας τάξεως.

Σημ. Διὰ νὰ τρέσωμεν μικτὸν εἰς συμμιγῆ, τρέπομεν τὸ κλάσμα τοῦ μικτοῦ εἰς συμμιγῆ καὶ ἔπειτα ἐνώνομεν τὸν συμμιγῆ μὲ τὸν ἀκέαιον. Παραδ. χάριν, εἶναι $6\frac{3}{5}$ τῆς ὑάρδας = 6 ὑάρδ. 1 π. $9\frac{3}{5}$ δακτ. καὶ νὰ τρέσωμεν δεκαδικὸν εἰς συμμιγῆ, γράφομεν πρῶτον αὐτὸν ὡς κλάσμα καὶ ἔπειτα πρᾶττομεν ὡς ἀνωτέρω. Π. χ. εἶναι 0,28 τῆς ὥρας = $\frac{28}{100} = 16\lambda.48\delta.$ Ἐπίσης εἶναι 5,37 τῆς ὀκάς = $5\frac{37}{100} = 5\text{ ὀκάδες } 148\text{ δράμια.}$

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ τραπῆ ὁ συμμιγῆς 3 στ. 10 ὀκ. 200 δράμια εἰς δράμια, ὀκάδας καὶ στατῆρας.

$$\left(57000 \text{ δράμια, } \frac{57000}{400} \text{ τῆς ὀκάς, } \frac{57000}{17600} \text{ τοῦ στατ.} \right)$$

2) Νὰ τραπῆ ὁ συμμιγῆς 3 ἔτη 4 μῆνες 20 ἡμ. εἰς ἡμέρας, μῆνας καὶ ἔτη.

$$\left(1220 \text{ ἡμ., } \frac{1220}{30} \text{ τοῦ μηνός, } \frac{1220}{360} \text{ τοῦ ἔτους} \right)$$

3) Νὰ τραπῆ ὁ συμμιγῆς 5 μέτρα 8 παλ. 9 δάκτ. 6 γρ. εἰς μέτρα, παλάμιας, δακτύλους καὶ γραμμιάς.

$$(5,896 \mu., 58,96 \text{ παλ., } 589,6 \delta., 5896 \gamma\rho.)$$

4) Νὰ τραπῆ ὁ συμμιγῆς 2 λίραι 5 σελ. 10 πέν. εἰς λίρας καὶ σελίνια.

$$\left(\frac{550}{240} \text{ τῆς λίρας, } \frac{550}{12} \text{ τοῦ σελιν.} \right)$$

5) Νὰ τραπῆ ὁ συμμιγῆς 10 ὑάρδ. 2 πόδ. 10 δ. εἰς ὑάρδας.

$$\left(\frac{394}{36} \text{ τῆς ὑάρδας} \right)$$

6) Νὰ τραποῦν 10 ὀκ. 100 δράμ. εἰς κλάσμα τοῦ στατῆρος.

$$\left(\frac{4100}{17600} \text{ τοῦ στατῆρος} \right)$$

7) Νὰ τραποῦν 15 ἡμέραι εἰς κλάσμα τοῦ ἔτους.

$$\left(\frac{15}{360} \text{ τοῦ ἔτους} \right)$$

8) Νὰ τραποῦν 872430 δ. τῆς ὥρας εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν.

$$(10 \text{ ἡμ. } 2 \text{ ὥραι, } 20 \lambda. 30 \delta.)$$

9) Νὰ τραποῦν 56970 δραμία εἰς συμμιγῆ ἀριθμόν.

(3 στ. 10 ὀκ. 170 δρ.)

10) Νὰ τραπῆ τὸ κλάσμα $\frac{2}{5}$ τῆς ἡμέρας εἰς συμμιγῆ ἀριθμόν.

(9 ὄρ. 36)

11) Νὰ τραπῆ τὸ κλάσμα $\frac{21}{8}$ τοῦ στατήρος εἰς συμμιγῆ ἀριθμόν.

(2 στ. 27 ὀκ. 200 δρ.)

12) Νὰ τραπῆ ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 3,56 τοῦ στατήρος εἰς συμμιγῆ ἀριθμόν.

(3 στ. 24 ὀκ. 256 δρ.)

Π Ρ Ο Σ Θ Ε Σ Ι Σ

185. Διὰ νὰ προσθέσωμεν συμμιγεῖς ἀριθμοὺς (ὁμοειδεῖς προσθέτομεν αὐτοὺς, καθὼς καὶ τοὺς ἀκεραίους, ἦτοι γράφομεν τὸν ἕνα ὑποκάτω τοῦ ἄλλου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην· ἔπειτα προσθέτομεν αὐτοὺς ἀρχόμενοι ἀπὸ τὴν κατωτέραν τάξιν. Ἐὰν δὲ τὸ ἄθροισμα τῆς τάξεώς τινος ἀποτελῆ μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, διαγράφωμεν αὐτὸ διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὅστις φανερῶναι πόσαι μονάδες τῆς τάξεως τούτης κάμνουν μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, καὶ τὸ μὲν ὑπόλοιπον (ἂν μείνη) γράφομεν εἰς τὴν αὐτὴν στήλην τῶν προσθετέων, τὸ δὲ πηλίκον προσθέτομεν εἰς τὸ ἄθροισμα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως.

Παραδείγματα.

3 στ.	35 ὀκ.	250 δρ.		3 ὄρ.	20 λ.	15 δ.
8	28	360		8	12	20
35	6			45	30	
47 στ.				12 ὄρ.		
	26 ὀκ.	210 δρ.		18 λ.	5 δ.	

Εἰς τὸ πρῶτον παράδειγμα τὸ ἄθροισμα τῶν δραμίων εἶναι 61 ἦτοι 1 ὀκᾶ καὶ 210 δραμία, γράφομεν λοιπὸν 210 εἰς τὴν στήλην τῶν δραμίων καὶ μεταβαίνομεν εἰς τὰς ὀκάδας, τῶν ὁποίων τὸ ἄθροισμα εἶναι 69 καὶ 1 τὸ κρατούμενον 70 ὀκάδες· ἀλλὰ 70 ὀκάδες κάμνουν ἕνα στατήρα καὶ 26 ὀκάδας, γράφομεν λοιπὸν 26 εἰς τὴν στήλην τῶν ὀκάδων καὶ μεταβαίνομεν εἰς τοὺς στατήρας, τῶν ὁποίων τὸ ἄθροισμα εἶναι 46 καὶ 1 τὸ κρατούμενον 47, γράφομεν λοιπὸν 47 εἰς τὴν στήλην τῶν στατήρων.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον σκεπτόμενοι εὐρίσκομεν τὸ ἄθροισμα καὶ τοῦ δευτέρου παραδείγματος.

Πρόβλημα. Ἐνθροπός τις ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1858 Ἰουλίου 24 καὶ ἔζησε 49 ἔτη 9 μῆνας 15 ἡμέρας. Πότε ἀπέθανε;

Δύσις. Ὁ Ἰούλιος εἶναι ὁ ἕβδομος μὴν τοῦ ἔτους, διὰ τοῦτο γράφομεν ἀντ' αὐτοῦ τὸν εἰς αὐτὸν ἀντιστοιχοῦντα ἀριθμὸν 7 καὶ κατόπιν προσθέτομεν. Ἦτοι

1858 ἔτ. 7 μ. 24 ἡμ.

49 9 15

1908 ἔτ. 5 μ. 9 ἡμ.

Ὡστε ἀπέθανε τὸ ἔτος 1908 Μαΐου 9.

Α Φ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ

186. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν συμμιγῆ ἀπὸ συμμιγῆ, γράφομεν πρῶτον οὐτούς, ὅπως καὶ εἰς τὴν πρόσθεσιν· ἔπειτα ἀρχόμενοι ἀπὸ τὴν κατωτέραν τάξιν ἀφαιροῦμεν ἕκαστον ἀριθμὸν τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχον ἀριθμὸν τοῦ μειωτέου. Ἐὰν δὲ συμβῇ ἀριθμὸς τις τοῦ μειωτέου νὰ εἶναι μικρότερος τοῦ ἀντιστοίχου ἀριθμοῦ τοῦ ἀφαιρετέου, προσθέτομεν εἰς αὐτὸν τόσας μονάδας, ὅσαι χρειάζονται, διὰ νὰ ἀποτελεσθῇ μία μονὰς τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, προσέχοντες ἔπειτα νὰ προσθέσωμεν καὶ εἰς τὸν ἀριθμὸν τοῦ ἀφαιρετέου τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως μίαν μονάδα, διὰ νὰ μὴ μεταβληθῇ ἡ διαφορὰ (ἐδ. 28).

Ἐστω π. χ. νὰ ἀφαιρεθῇ ὁ συμμιγῆς 5 στ. 30 ὀκ. 300 δρᾶμ. ἀπὸ τὸν συμμιγῆ 8 στ. 40 ὀκ. 100 δρᾶμ.

8 στ. 40 ὀκ. 100 δρ.

5 30 300

3 στ. 9 ὀκ. 200 δρ.

Ἐπειδὴ ὁ 300 δὲν ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὸν 100, προσθέτομεν 400 δρᾶμα εἰς τὸν 100 (διότι εἶναι μία ὀκᾶ=400 δρᾶμ.) καὶ κατόπιν ἀφαιροῦμεν τὸν 300 ἀπὸ τὸν 500 καὶ εὐρίσκομεν διαφορὰν 200 δρᾶμ. Μεταβαίνομεν ἔπειτα εἰς τὴν ἐπομένην τάξιν λέγοντες 30 καὶ 1, 31 ἀπὸ 40 μένου 9 ὀκ. Τέλος ἀφαιροῦμεν καὶ τὸν 5 ἀπὸ τὸν 8 καὶ εὐρίσκομεν 3 στ.

Ἐστῶσαν προσέτι καὶ τὰ ἑξῆς παραδείγματα·

10 ὑάρ. 2 πόδ. 7 δακ.

9 στ.

6 1 10

4 20 ὀκ. 100 δρ.

4 ὑάρ. 0 π. 9 δ.

4 στ. 23 ὀκ. 300 δρ.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἐμπορός τις ἐπώλησεν ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος εἰς τινὰ 9 πήχεις 7

ρούπια, εἰς ἄλλον 15 πήχεις 6 ρούπια, καὶ τοῦ ἔμειναν 24 πήχεις 5 ρούπια. Πόσον ἦτο ἀπ' ἀρχῆς τὸ ὕφασμα ; (50 π. 2 ρ.)

2) Ἠγόρασέ τις σῖτον κατὰ τρεῖς διαφόρους ἐποχάς· τὴν πρώτην φορὰν ἠγόρασε 3 στ. 20 ὀκ., τὴν δευτέραν φορὰν 7 στ. 300 δράμια καὶ τὴν τρίτην φορὰν 15 στ. 40 ὀκ. 250 δρ. Πόσον ἠγόρασε τὸ ὅλον ; (26 στ. 17 ὀκ. 150 δρ.)

3) Ὅταν ἐν Ἀθήναις εἶναι μεσημβρία, ἐν Λονδίῳ εἶναι 10 ὥρ. 24 λ. 37 δ. πρὸ μεσημβρίας. Ποία εἶναι ἡ διαφορὰ τῆς ὥρας τῶν δύο τούτων πόλεων ; (1 ὥρα 35 λ. 23 δ.)

4) Γεωργός τις εἶχε χωράφια 28 στρεμμάτων καὶ ἐξ αὐτῶν ἔδωκεν εἰς τὸ ἐν τέκνον του 7 στρ. 800 τετρ. μέτρα, εἰς δὲ τὸ ἄλλο 9 στρέμ. 900 τετρ. μ. Πόσον τοῦ ἔμεινε ; (10 στρ. 300 τ. μ.)

5) Ἠγόρασέ τις 8 στ. 10 ὀκ. 300 δράμ. ἀνθράκων καὶ ἐξ αὐτῶν ἐπώλησεν εἰς τινα $2\frac{4}{5}$ τοῦ στατηῆρος. Πόσοι ἀνθρακες τοῦ ἔμειναν ; (5 στ. 19 ὀκ. 220 δρ.)

Σημ. Τρέπομεν πρῶτον τὸ κλάσμα $\frac{4}{5}$ τοῦ στατηῆρος εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν καὶ κατόπιν ἀφαιροῦμεν.

6) Τηλεγράφημά τι παρεδόθη εἰς τὸ τηλεγραφεῖον μιᾶς πόλεως τὴν 8 ὥρ. 55 λ. π. μ. καὶ διεβιβάσθη εἰς ἄλλην πόλιν μετὰ 1 ὥρ. 30 λ., εἰς δὲ τὸν παραλήπτην παρεδόθη τοῦτο τὴν 3 ὥρ. 10 λ. μ. μ. (τῆς αὐτῆς ἡμέρας). Μετὰ πόσον χρόνον ἀπὸ τῆς ἀφίξεώς του παρεδόθη ; (μετὰ 4 ὥρ. 45 λ.)

7) Μιᾶς οἰκογενείας ὁ μὲν πατὴρ ἀπέθανε τὸ ἔτος 1900 Ἰανουαρίου 8 καὶ ὥραν 1ην 15 λ. π. μ., ἡ δὲ μήτηρ ἀπέθανε μετὰ 5 ἔτη 7 μ. 13 ἡμ. 10 ὥρ. 20 λ. ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ πατρὸς, ὁ δὲ υἱὸς των ἀπέθανε τὸ ἔτος 1921 Μαΐου 22 καὶ ὥραν 5 μ. μ. Ζητεῖται πότε ἀπέθανεν ἡ μήτηρ καὶ μετὰ πόσον χρόνον ἀπὸ τοῦ θανάτου τῆς μητρὸς ἀπέθανεν ὁ υἱὸς των.

(Τὸ 1905 ἔτος 21 Αὐγ. ὥραν 11 καὶ 35 λ. π.μ. Μετὰ 15 ἔτη 9 μ. 1 ἡμ. 5 ὥρ. 25 λ.).

Σημ. Εἰς τὰς μεταμεσημβρινὰς ὥρας προσθέτομεν πάντοτε τὰς παρελθούσας 12 ὥρας μέχρι τῆς μεσημβρίας καὶ κατόπιν ἐκτελοῦμεν τὴν πράξιν.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

1ον) "Όταν ὁ πολλαπλασιαστής ἢ ὁ διαιρέτης εἶναι ἀκέραιος ἢ κλάσμα.

1) *Πρόβλημα.* Ἦγόρασέ τις 8 σάκκους ἀλεύρου, ἕκαστος τῶν ὁποίων ἔχει βάρος 1 στ. 8 ὀκ. 120 δράμια. Πόσον βάρος ἔχουν καὶ οἱ 8 σάκκοι ;

Δύσις. Ἀφοῦ ὁ 1 σάκκος ἔχει βάρος 1 στ. 8 ὀκ. 120 δράμια, οἱ ὀκτώ σάκκοι θὰ ἔχωσι βάρος ὀκτὼ φορὰς περισσότερον ὥστε θὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν συμμιγῆ ἐπὶ 8. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον ἀριθμὸν τοῦ συμμιγοῦς χωριστὰ ἐπὶ 8 ἀρχόμενοι ἀπὸ τὴν κατωτέραν του τάξιν. Ἡ δὲ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς :

1 στ.	8 ὀκ.	120 δράμ.
		8
8 στ.	64 ὀκ.	960 δράμ.
ἢ 9 στ.	22 ὀκ.	160 δράμ.

Τὸ γινόμενον τῶν 120 δραμίων ἐπὶ 8 εἶναι 960 δράμια, ἦτοι 2 ὀκ. καὶ 160 δράμια, γράφομεν λοιπὸν εἰς τὴν αὐτὴν στήλην 160 δρ. καὶ κρατοῦμεν τὰς 2 ὀκ., διὰ νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸ γινόμενον τῶν ὀκάδων. Τὸ γινόμενον τῶν 8 ὀκ. ἐπὶ 8 εἶναι 64 ὀκ. καὶ 2 (τὰ κρατούμενα) 66 ὀκάδες, ἦτοι 1 στατῆρ καὶ 22 ὀκάδες, γράφομεν λοιπὸν 22 ὀκ. καὶ κρατοῦμεν τὸν 1 στατ., διὰ νὰ τὸν προσθέσωμεν εἰς τὸ γινόμενον τῶν στατήρων. Τέλος τὸ γινόμενον τοῦ 1 στατ. ἐπὶ 8 εἶναι 8 στατ. καὶ 1 (τὸ κρατούμενον) 9 στατῆρες, γράφομεν λοιπὸν 9 στατῆρες.

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς ἔκανόνα.

187. *Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ ἀκέραιον, πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον ἀριθμὸν τοῦ συμμιγοῦς χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον ἀρχόμενοι ἀπὸ τὴν κατωτέραν τάξιν. Ἐὰν δὲ μερικὸν γινόμενόν τι ἀποτελῆ μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, ἐξάγομεν αὐτὰς (καθὼς πράττομεν καὶ εἰς τὴν πρόσθεσιν) καὶ τὰς προσθέτομεν εἰς τὸ ἐπόμενον μερικὸν γινόμενον.*

2) *Πρόβλημα.* Πρόκειται νὰ μοιρασθῶσιν 60 στατ. 23 ὀκ. 100 δράμ. σίτου εἰς 25 πτωχὰς οἰκογενείας. Πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστη ;

Δύσις. Κατὰ πρῶτον μοιράζομεν τοὺς 60 στατῆρας, ἦτοι διαιροῦμεν τὸν 60 διὰ 25 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 2 στ. καὶ ὑπόλοιπον 10 στ. Τὸ ὑπόλοιπον τοῦτο τρέπομεν εἰς ὀκάδας, ἦτοι 10×44 ἢ 440 ὀκ. καὶ 23 ὀκ. ὅπου ἔχει ὁ συμμιγῆς κάμουν 463 ὀκάδας, μοιράζομεν τώρα τὰς 463 ὀκ., ἦτοι διαιροῦμεν τὸν 463 διὰ 25 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 18

Δύσις. Ἐπειδὴ γνωρίζομεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος καὶ θέλομεν νὰ εὔρωμεν τὴν τιμὴν μέρους τῆς μονάδος, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν πολλαπλασιασμὸν (ἐδάφ. 124). Πολλαπλασιαστέος εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος, ἦτοι ὁ συμμιγῆς 2 πεντ. 4 δρ. 30 λεπτά, καὶ ἐπομένως πολλαπλασιαστῆς εἶναι τὸ κλάσμα $\frac{3}{5}$ ὥστε ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ κλάσμα.

189. *Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν τὸν συμμιγῆ ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν τοῦ κλάσματος καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ.*

Σημ. Ὁ κανὼν οὗτος ἐξάγεται ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα. Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

$$\begin{array}{r}
 2 \text{ πεντ. } 4 \text{ δρ. } 30 \text{ λ.} \times \frac{3}{5} \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 8 \text{ πεντ. } 2 \text{ δρ. } 90 \text{ λ.} \\
 3 \\
 \hline
 5 \\
 15 \\
 2 \\
 \hline
 17 \quad \text{δρα.} \\
 2 \\
 \hline
 100 \\
 \hline
 200 \\
 90 \\
 \hline
 290 \quad \text{λεπτ.} \\
 40 \\
 0
 \end{array}
 \end{array}$$

Τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα δύναται νὰ λυθῆ συντόμως ὡς ἐξῆς. Τρέπομεν τὸν πολλαπλασιαστέον 2 πεντ. 4 δρ. 30 λ. εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν τῆς δραχμῆς, ἦτοι 14,30 (διότι 2 π. 4 δρ. κάμνουν 14 δρ.) καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{3}{5}$ καὶ εὑρίσκομεν 8,58 δρ.

190. *Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ μικτὸν ἢ δεκαδικόν, τρέπομεν τὸν μικτὸν ἢ δεκαδικὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν, ὡς ἀνωτέρω.*

191. *Διὰ νὰ διαιρέσωμεν συμμιγῆ διὰ κλάσματος, πολλαπλασιάζομεν τὸν συμμιγῆ ἐπὶ τὸ κλάσμα ἀντεστραμμένον (ἐδ. 138).*

Ἐὰν δὲ ὁ διαιρέτης εἶναι μικτὸς ἀριθμὸς ἢ δεκαδικός, τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν.

* **Πολλαπλασιασμός συμμιγούς ἐπὶ ἀκέραιον κατὰ τὴν μέθοδον τῶν ἀπλῶν μερῶν.**

192. Ὅταν ὁ ἀκέραιος πολλαπλασιαστῆς εἶναι πολυψήφιος ἀριθμός, πολλαπλασιάζομεν χάριν εὐκολίας καὶ κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον.

Ἔστω π.χ. νὰ πολλαπλασιασθῇ ὁ συμμιγῆς 3 ὥρ. 30 λ. 45 δ. ἐπὶ τὸν ἀκέραιον 540.

Θὰ πολλαπλασιάσωμεν πάλιν ἕκαστον ἀριθμὸν τοῦ συμμιγούς ἐπὶ 540, ἀρχόμενοι ὁμῶς ἀπὸ τὴν ἀνωτέραν τάξιν τοῦ συμμιγούς. Καὶ ἀφοῦ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῆς ἀνωτέρας τάξεως, πρέπει νὰ παρατηρῶμεν, ὅταν θὰ μεταβαίνωμεν εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν ἐκάστου τῶν ἐπομένων ἀριθμῶν τοῦ συμμιγούς, ἂν ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι τὸ ἥμισυ ἢ τὸ τρίτον ἢ τὸ τέταρτον κτλ. μιᾶς μονάδος τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, εἰ δὲ μή, νὰ ἀναλύωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦτον εἰς τοιαῦτα ἀπλᾶ μέρη. Διὰ τοῦτο δὲ ὁ τρόπος οὗτος λέγεται **μέθοδος τῶν ἀπλῶν μερῶν.**

Τὸ γινόμενον λοιπὸν τῶν 3 ὥρῶν ἐπὶ 540 εἶναι 1620 ὥραι.

Μεταβαίνομεν ἔπειτα εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν 30 λ., ἀλλὰ παρατηροῦμεν ὅτι τὰ 30 λ. εἶναι τὸ ἥμισυ μιᾶς ὥρας (διότι εἶναι 1 ὥρα = 60 λ.)· ὅθεν σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Ἄν εἴχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν 1 ὥραν ἐπὶ 540, θὰ εὐρίσκομεν γινόμενον 540 ὥρας, ἀλλ' ἐπειδὴ ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν 30 λ., ἦτοι τὸ ἥμισυ μιᾶς ὥρας, διὰ τοῦτο θὰ εὐρωμεν γινόμενον τὸ ἥμισυ τοῦ 540, ἦτοι 270 ὥρας.

Μεταβαίνομεν ἔπειτα εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν 45 δ., ἀλλὰ πρῶτον ἀναλύομεν τὰ 45 δ. εἰς 30 δ. καὶ 15 δ. (διότι τὰ 30 δ. εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ ἐνὸς πρώτου λεπτοῦ, καὶ τὰ 15 δ. εἶναι τὸ τέταρτον αὐτοῦ ἢ τὸ ἥμισυ τῶν 30 δ.), ἔπειτα δὲ σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Ἐπειδὴ τὸ γινόμενον τῶν 30 λ. ἐπὶ 540 εἶναι 270 ὥραι, ἄρα τὸ γινόμενον τοῦ 1 λ. ἐπὶ 540 θὰ εἶναι τὸ τριακοστὸν τῶν 270 ὥρῶν, ἦτοι 9 ὥραι· ἐὰν λοιπὸν εἴχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν 1 λ. ἐπὶ 540, θὰ εὐρίσκομεν γινόμενον 9 ὥρας, ἀλλ' ἐπειδὴ ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν 30 δ., ἦτοι τὸ ἥμισυ ἐνὸς πρώτου λεπτοῦ, διὰ τοῦτο θὰ εὐρωμεν γινόμενον τὸ ἥμισυ τῶν 9 ὥρῶν, ἦτοι 4 ὥρ. 30 λ.

Ἔχομεν ἀκόμη νὰ πολλαπλασιάσωμεν καὶ 15 δ. ἐπὶ 540· πρὸς τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς. Ἐπειδὴ τὸ γινόμενον τῶν 30 δ. ἐπὶ 540 εἶναι 4 ὥρ. 30 λ., ἄρα τὸ γινόμενον τῶν 15 δ., ἦτοι τὸ ἥμισυ τῶν 30 δ., θὰ εἶναι καὶ τὸ ἥμισυ τῶν 4 ὥρ. 30 λ., ἦτοι 2 ὥρ. 15 λ.

Τὸ ἄθροισμα ὅλων τῶν μερικῶν γινομένων εἶναι τὸ ζητούμενον. Ἡ ἀνωτέρω πράξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

3 ὄρ. 30 λ. 45 δ.

540

γινόμενον 3 ὄρῶν ἐπὶ 540 1620 ὄρ.

»	30 λ. (= $\frac{1}{2}$ μιᾶς ὄρ.)	ἐπὶ 540	270		
45 {	»	30 δ. (= $\frac{1}{2}$ τοῦ 1 λ.)	ἐπὶ 540	4	30 λ. (1 δίδει γινόμενον 9 ὄρ.).
	»	15 δ. (= $\frac{1}{2}$ τῶν 30 δ.)	ἐπὶ 540	2	15 λ.

ἄθροισμα μερικῶν γινομένων 1896 ὄρ. 45 λ.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον σκεπτόμενοι εὐρίσκομεν τὸ γινόμενον τοῦ συμμιγοῦς 15 στ. 34 ὄκ. 250 δρᾶμ. ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν 26.

Ἡ προᾶξις δεατάσεται ὡς ἑξῆς·

15 στ. 34 ὄκ. 250 δρ.
26

90
30

34 ὄκ. {	γινόμεν.	22 ὄκ. (= $\frac{1}{2}$ στ.)	ἐπὶ 26...	13		
	»	11 ὄκ. (= $\frac{1}{2}$ τῶν 22 ὄκ.)	»	6	22 ὄκ.	
	»	1 ὄκ. (= $\frac{1}{11}$ τῶν 11 ὄκ.)	»	0	26	
250 δρζ. {	»	200 δρ. (= $\frac{1}{2}$ ὀκᾶς)	»	0	13	
	»	50 δρ. (= $\frac{1}{4}$ τῶν 200 δρ.)	»	0	3	100 δρ.
ἄθροισμα μερικῶν γινομ.				410 στ.	20 ὄκ.	100 δρ.

2ον) Ὅταν ὁ πολλαπλασιαστὴς ἢ ὁ διαιρέτης εἶναι συμμιγῆς

1) **Πρόβλημα.** Ὁ πήχυς ἑνὸς ὑφάσματος ἀξίζει 4 δρ. 80 λεπτά. Πόσον ἀξίζουν 9 πήχ. 5 ρούπια ἐκ τοῦ ἰδίου ὑφάσματος;

Κατάταξις. 1 πήχ. 4 δρ. 80 λεπ.
9 π. 5 ρ. χ

Λύσις. Ἐπειδὴ γνωρίζομεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος (ἦτοι τοῦ ἑνὸς πήχεως) καὶ θέλομεν νὰ εὔρωμεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων (ἦτοι πολλῶν πήχεων), διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν πολλαπλασιασμὸν (ἔδ. 124). Πολλαπλασιαστέος εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος, ἦτοι ὁ συμμιγῆς 4

δρ. 80 λ., καὶ ἐπομένως πολλαπλασιαστικῆς εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων, ἤτοι ὁ συμμιγῆς 9 πῆχ. 5 ρ. Ἀλλὰ παρατηροῦμεν ὅτι ὁ πολλαπλασιαστικῆς δὲν γίνεται ἀπὸ τὴν ἰδίαν μονάδα, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν (διότι οὗτος ἔχει καὶ ρούπια), καὶ ἐπομένως δὲν δύναται νὰ γίνῃ ὁ πολλαπλασιασμὸς (διότι ἡ ἀξία τοῦ πήχεως ἔχει δοθῆ), διὰ τοῦτο τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς πήχεις, διὰ νὰ γίνῃ ὁμοειδῆς πρὸς αὐτήν, καὶ εὐρίσκομεν ὅτι εἶναι 9 πῆχ. 5 ρ. = $\frac{77}{8}$ τοῦ πήχεως. Πολλαπλασιάζομεν τώρα τὰς 4 δρ. 80 λ. ἢ 4,80 ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{77}{8}$ (θεωροῦντες τοῦτο ὡς ἀφηρημένον) καὶ εὐρίσκομεν 46,20 δρ.

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος βλέπομεν, ὅτι

Ὅταν ὁ πολλαπλασιαστικῆς εἶναι συμμιγῆς, τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς μονάδας ὁμοειδεῖς μὲ τὴν μονάδα, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν, καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν.

2) *Πρόβλημα.* Ἡ ὁκᾶ ἐνὸς πράγματος ἀξίζει 60 λεπτά. Πόσον ἀξίζουν 2 στ. 5 ὁκ. 300 δρᾶμ. ἐκ τοῦ ἰδίου πράγματος;

<i>Κατάταξις.</i>	1 ὁκᾶ	60 λ.
	2 στ. 5 ὁκ. 300 δρ	χ

Λύσις. Θὰ κάμωμεν πολλαπλασιασμὸν διὰ τὸν αὐτὸν ἀνωτέρω λόγον. Πολλαπλασιαστικῆς εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος, ἤτοι τὰ 60 λεπτά, καὶ ἐπομένως πολλαπλασιαστικῆς εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων (τῶν πολλῶν ὁκάδων), ἤτοι ὁ συμμιγῆς 2 στ. 5 ὁκ. 300 δρ. Τρέπομεν πρῶτον τὸν πολλαπλασιαστικὴν εἰς ὁκάδας (διότι ὁκάδας παριστᾷ καὶ ἡ μονάς, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν) καὶ εὐρίσκομεν ὅτι εἶναι 2 στ. 5 ὁκ. 300 δρ. = $\frac{37500}{400}$ ἢ $\frac{375}{4}$ τῆς ὁκάς. Πολλαπλασιάζομεν τώρα τὰ 60 λεπτά ἐπὶ $\frac{375}{4}$ καὶ εὐρίσκομεν 5625 λ. ἢ 56,25 δρ.

* Τὰ ἀνωτέρω προβλήματα δυνάμεθα νὰ λύσωμεν καὶ διὰ τῆς μεθόδου τῶν ἀπλῶν μερῶν. Παραδ. χάριν, διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρῶτον πρόβλημα, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς.

Ἀφοῦ ὁ 1 πῆχυς ἀξίζει 4 δρ. 80 λεπτά, οἱ 9 πῆχεις ἀξίζουν 9 φορές περισσότερον, ἤτοι 36 δρ. 720 λ. Ἐπειτα ἀναλύομεν τὰ 5 ρούπια εἰς 4 ρ. καὶ 1 ρ. (διότι τὰ 4 ρ. εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ ἐνὸς πήχεως καὶ τὸ 1 ρ. εἶναι τὸ τέταρτον τῶν 4 ρ.) καὶ σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς. Ἀφοῦ ὁ 1 πῆχυς ἀξίζει 4 δρ. 80 λεπτά, τὰ 4 ρούπια, τὰ ὅποια εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ ἐνὸς πήχεως, ἀξίζουν καὶ τὸ ἥμισυ τῶν 4 δρ. 80 λ., ἤτοι 2 δρ. 40 λεπτά, καὶ τὸ 1 ρούπιον, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ τέταρτον τῶν 4 ρου-

πίων, ἀξίζει καὶ τὸ τέταρτον τῶν 2 δρ. 40 λ., ἦτοι 60 λ. Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀνωτέρω γινομένων εἶναι τὸ ζητούμενον.

Ἡ ἀνωτέρω πράξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς:

	4 δρ.	80 λ.
	9 π.	5 ρ.
ἀξία 9 πήχεων.....	36 δρ.	720 λ.
5 ρ. {	» 4 ρ. $\left(= \frac{1}{2} \text{ τοῦ πήχ.} \right)$	2 40
	» 1 ρ. $\left(= \frac{1}{4} \text{ τῶν 4 ρ.} \right)$	60
ἄθροισμα	46 δρ.	20 λ.

3) **Πρόβλημα.** Ἦγόρασέ τις 2 στ. 20 δκ. ἔξ ἑνὸς πράγματος καὶ ἔδωκε 4 πεντ. 1 δρ. 60 λ. Πόσον ἀξίζει ὁ στατήρ;

Κατάταξις. 2 στ. 20 δκ. 4 π. 1 δρ. 60 λ.
1 στ. χ

Λύσις. Γνωρίζομεν ἔδῳ τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων (ἦτοι πολλῶν στατήρων) καὶ θέλομεν νὰ εὑρωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος (ἦτοι ἑνὸς στατήρος), διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν, μερισμὸν (ἔδάφ. 137). Διαιρετέος εἶναι ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων, ἦτοι ὁ συμμιγῆς 4 π. 1 δρ. 60 λ., καὶ ἐπομένως διαιρέτης εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων, ἦτοι ὁ συμμιγῆς 2 στ. 20 δκ. Ἄλλ' ἐπειδὴ ὁ διαιρέτης δὲν γίνεται ἀπὸ τὴν ἰδίαν μονάδα, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ζητοῦμεν (διότι οὗτος ἔχει καὶ ὀκάδας), διὰ τοῦτο τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς στατήρας, διὰ νὰ γίνῃ ὁμοειδῆς πρὸς αὐτήν, καὶ εὐρίσκομεν ὅτι εἶναι 2 στ. 20 δκ. $= \frac{108}{44}$ ἢ $\frac{27}{11}$ τοῦ στατήρος. Διαιροῦμεν τώρα τὸν συμμιγῆ 4 π. 1 δρ.

60 λ. διὰ τοῦ κλάσματος $\frac{27}{11}$ (ἔδ. 191) καὶ εὐρίσκομεν ὅτι ὁ στατήρ ἀξίζει 1 π. 3 δρ. 80 λ.

Σημ. Δυνάμεθα νὰ συντομεύσωμεν τὴν ἀνωτέρω πράξιν, ἂν τρέψωμεν τὸν διαιρετέον εἰς δραχμάς, ἦτοι 21,60, καὶ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦτον διὰ $\frac{27}{11}$.

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος βλέπομεν πάλιν, ὅτι *Ὅταν ὁ διαιρέτης (εἰς τὸν μερισμὸν) εἶναι συμμιγῆς, τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς μονάδας ὁμοειδεῖς μὲ τὴν μονάδα, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ζητοῦμεν, καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν.*

4) **Πρόβλημα.** Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 2 στ. 20 δκ. ἔξ ἑνὸς πράγματος, δίδομεν 4 πεντ. 1 δρ. 60 λ. Πόσον ἀγοράζομεν μὲ ἓν πεντάδραχμον;

Κατάταξις. 2 στ. 20 δκ. 4 π. 1 δρ. 60 λ.

ζ

1 π.

Σημ. Ὡς παρατηροῦμεν, εἶναι οἱ ἴδιοι συμμιγεῖς τοῦ ἀνωτέρου προβλήματος.

Δύσις. Μονὰς ἐδῶ εἶναι τὸ ἐν πεντάδραχμον, πολλαὶ μονάδες, ἦτοι πολλὰ πεντάδραχμα, εἶναι ὁ συμμιγῆς 4 π. 1 δρ. 60 λ. καὶ τιμὴ αὐτῶν ὁ συμμιγῆς 2 στ. 20 δκ. Ὡστε γνωρίζομεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων καὶ θέλομεν νὰ εὗρωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν, μερισμόν. Διαιρετέος εἶναι ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων ἦτοι ὁ συμμιγῆς 2 στ. 20 δκ. καὶ διαιρέτης ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων, ἦτοι ὁ συμμιγῆς 4 π. 1 δρ. 60 λ. Τρέπομεν πρῶτον τὸν διαιρέτην εἰς πεντάδραχμα (διότι πεντάδραχμα παριστᾷ καὶ ἡ μονὰς, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ζητοῦμεν) καὶ εὐρίσκομεν ὅτι εἶναι 4 π. 1 δρ. 60 λ. = $\frac{2160}{500}$ ἢ $\frac{108}{25}$ τοῦ πεντ. Διαιροῦμεν τώρα τὸν συμμιγῆ 2 στ. 20 δκ. διὰ τοῦ κλάσματος τούτου καὶ εὐρίσκομεν ὅτι μὲ 1 πεντ. ἀγοράζομεν 25 δκ.

5) **Πρόβλημα.** Ἡ δκᾶ ἐνὸς πράγματος ἀξίζει 2 δρ. 80 λεπτά. Πόσας δκάδας ἀγοράζομεν μὲ 3 πεντ. 4 δρ. 60 λ. ἐκ τοῦ ἰδίου πράγματος

Κατάταξις. 1 δκ. 2 δρ. 80 λ.

χ

3 π. 4 δρ. 60 λ.

Δύσις. Γνωρίζομεν ἐδῶ τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος (ἦτοι μιᾶς δκᾶς) καὶ θέλομεν νὰ εὗρωμεν τὰς πολλὰς μονάδας (ἦτοι τὰς πολλὰς δκάδας) τὰς ἀντιστοιχοῦσας εἰς τὴν τιμὴν 3 π. 4 δρ. 60 λεπτά, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν, μέτρησιν (ἐδάφ. 142). Διαιρετέος εἶναι ἡ τιμὴ τῶν ζητουμένων μονάδων καὶ διαιρέτης ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος.

Ἄλλὰ διὰ νὰ γίνῃ μέτρησις τοῦ ἐνὸς ἀριθμοῦ διὰ τοῦ ἄλλου, πρέπει ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης νὰ εἶναι ἀριθμοὶ ἀπλοῖ καὶ ὁμοειδεῖς διότι ἄλλως μέτρησις δὲν γίνεται· διὰ τοῦτο τρέπομεν πρῶτον καὶ τὸν δύο εἰς μονάδας τῆς αὐτῆς κατωτέρας τάξεως, ἦτοι εἰς λεπτά, καὶ εὐρίσκομεν 2 δρ. 80 λ. = 280 λεπτά καὶ 3 π. 4 δρ. 60 λ. = 1960 λ. Διαιροῦμεν τώρα τὸν 1960 διὰ τοῦ 280 (ὡς ἀφηρημένους) καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 7 δκάδας (διότι δκάδας παριστᾷ καὶ ἡ μονὰς, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν).

Σημ. Δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν τοὺς συμμιγεῖς καὶ εἰς μονάδας ὁσδήποτε ἄλλης τάξεως (ἀλλὰ τῆς αὐτῆς πάντοτε), προτιμῶμεν ὁμολογίαν τὴν κατωτέραν τάξιν, διὰ νὰ ἔχωμεν ἐξαγόμενα ἀκεραίου ἀριθμοῦ πρὸς εὐκολίαν τῶν πράξεών μας. Ἐὰν δὲ συμβῇ οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ νὰ μὴ ἔχωσι τὴν αὐτὴν κατωτέραν τάξιν, παρατηροῦμεν ἐν τῷ αὐτῷ

περιπτώσει τις ἐκ τῶν δύο ἔχει τὴν μᾶλλον κατωτέραν τάξιν, ἐκεῖ δὲ τρέπομεν καὶ τοὺς δύο.

193. Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ἄνωτέρου προβλήματος βλέπομεν, ὅτι

Ὅταν ἡ διαίρεσις εἶναι μέτρησις, τρέπομεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην εἰς μονάδας τῆς αὐτῆς κατωτέρας τάξεως καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν (ὡς ἀφηρημένους), τὸ δὲ πηλίκον εἶναι ὁμοειδὲς μὲ τὴν μονάδα, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν.

Σημ. Εὐκόλως διακρίνομεν, ἂν ἡ διαίρεσις εἶναι μερισμὸς ἢ μέτρησις· διότι εἰς τὸν μερισμὸν δίδονται αἱ πολλαὶ μονάδες (ἢ μέρος τῆς μονάδος), ἐνῶ εἰς τὴν μέτρησιν ζητοῦνται αὐταί. Τοῦτο εἶπομεν καὶ ἐν τῇ σελίδι 47.

6) **Πρόβλημα.** Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 6 ὀκ. 100 δράμια ἕξ ἑνὸς πράγματος, δίδομεν ἓν πεντάδραχμον. Πόσον θὰ δώσωμεν, διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 2 στατῆρας ἐκ τοῦ ἰδίου πράγματος;

Κατάταξις.	6 ὀκ. 100 δρ.	1 πεντ.	
	2 στ.	χ	

Λύσις. Γνωρίζομεν καὶ ἐδῶ τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος (μονὰς εἶναι τὸ 1 πεντάδρ. καὶ τιμὴ αὐτῆς αἰ 6 ὀκ. 100 δράμ.) καὶ θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὰς πολλὰς μονάδας (ἦτοι τὰ πολλὰ πεντάδραχμα) τὰς ἀντιστοιχοῦσας εἰς τὴν τιμὴν 2 στατῆρας, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν, μέτρησιν. Τρέπομεν πρῶτον καὶ τοὺς δύο εἰς μονάδας τῆς αὐτῆς κατωτέρας τάξεως, ἦτοι εἰς δράμια, καὶ εὐρίσκομεν 6 ὀκ. 100 δράμ. = 2500 δράμ. καὶ 2 στ. = 2×44 ἢ 88 ὀκ. = $88 \times 400 = 35200$ δράμ. Διαιροῦμεν τώρα τὸν 35200 διὰ 2500 (ὡς ἀφηρημένους) καὶ εὐρίσκομεν 14 πεντ. 40 λ. (διότι πεντάδραχμα παριστᾷ καὶ ἡ μονὰς, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν).

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε τέσσαρα ὑφάσματα, ἕκαστον τῶν ὁποίων ἦτο 35 πῆχ. 7 ρούπια. Πόσων πῆχεων ἦσαν καὶ τὰ τέσσαρα ὑφάσματα; (143 πῆχ. 4 ρ.)

2) Μὲ ἓν πεντάδραχμον ἀγοράζομεν ἕξ ἑνὸς πράγματος 2 στ. 28 ὀκ. 300 δρ. Πόσον ἀγοράζομεν μὲ 7 πεντάδραχμα; (18 στ. 25 ὀκ. 100 δρ.)

3) Τρεῖς ἄνθρωποι πρόκειται νὰ μοιράσωσιν ἕξ ἴσου 8 στ. 27 ὀκ. 50 δρ. σίτου. Πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστος; (2 στ. 38 ὀκ. 250 δρ.)

4) Ἐμοίρασέ τις ἕξ ἴσου εἰς πέντε πτωχὰς οἰκογενεῖας 17 πεντ. 3 δρ. 50 λ. Πόσον ἔλαβεν ἑκάστη; (3 πεντ. 2 δρ. 70 λ.)

5) Μὲ μίαν δραχμὴν ἀγοράζομεν ἕξ ἑνὸς πράγματος 4 ὀκ. 350 δρ.

Κ. Ε. Παπανικητοπούλου, Πρακτικ. Ἀριθμητικῆ ἔκδ. δ', 9/6/927 11

Κατάταξις. 2 στ. 20 δκ. 4 π. 1 δρ. 60 λ.

χ 1 π.

Σημ. Ὡς παρατηροῦμεν, εἶναι οἱ ἴδιοι συμμιγεῖς τοῦ ἀνωτέρου προβλήματος.

Δύσις. Μονὰς ἐδῶ εἶναι τὸ ἐν πεντάδραχμον, πολλαὶ μονάδες, ἦτοι πολλὰ πεντάδραχμα, εἶναι ὁ συμμιγῆς 4 π. 1 δρ. 60 λ. καὶ τιμὴ αὐτῶν ὁ συμμιγῆς 2 στ. 20 δκ. Ὡστε γνωρίζομεν τὴν τιμὴν πολλῶν μονάδων καὶ θέλομεν νὰ εὗρωμεν τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν, μερισμόν. Διαιρετέος εἶναι ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων, ἦτοι ὁ συμμιγῆς 2 στ. 20 δκ. καὶ διαιρέτης ὁ ἀριθμὸς τῶν πολλῶν μονάδων, ἦτοι ὁ συμμιγῆς 4 π. 1 δρ. 60 λ. Τρέπομεν πρῶτον τὸν διαιρέτην εἰς πεντάδραχμα (διότι πεντάδραχμα παριστᾷ καὶ ἡ μονάς, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ζητοῦμεν) καὶ εὐρίσκομεν ὅτι εἶναι 4 π. 1 δρ. 60 λ. = $\frac{2160}{500}$ ἢ $\frac{108}{25}$ τοῦ πεντ. Διαιροῦμεν τώρα τὸν συμμιγῆ 2 στ. 20 δκ. διὰ τοῦ κλάσματος τούτου καὶ εὐρίσκομεν ὅτι μὲ 1 πεντ. ἀγοράζομεν 25 δκ.

5) **Πρόβλημα.** Ἡ δὲ ἑνὸς πράγματος ἀξίζει 2 δρ. 80 λεπτά. Πόσας δκάδας ἀγοράζομεν μὲ 3 πεντ. 4 δρ. 60 λ. ἐκ τοῦ ἰδίου πράγματος;

Κατάταξις. 1 δκ. 2 δρ. 80 λ.

χ 3 π. 4 δρ. 60 λ.

Δύσις. Γνωρίζομεν ἐδῶ τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος (ἦτοι μιᾶς δκάδας) καὶ θέλομεν νὰ εὗρωμεν τὰς πολλὰς μονάδας (ἦτοι τὰς πολλὰς δκάδας), τὰς ἀντιστοιχοῦσας εἰς τὴν τιμὴν 3 π. 4 δρ. 60 λεπτά, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν, μέτρησιν (ἐδάφ. 142). Διαιρετέος εἶναι ἡ τιμὴ τῶν ζητουμένων μονάδων καὶ διαιρέτης ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος.

Ἄλλὰ διὰ νὰ γίνῃ μέτρησις τοῦ ἑνὸς ἀριθμοῦ διὰ τοῦ ἄλλου, πρέπει ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης νὰ εἶναι ἀριθμοὶ ἀπλοῖ καὶ ὁμοειδεῖς, διότι ἄλλως μέτρησις δὲν γίνεται· διὰ τοῦτο τρέπομεν πρῶτον καὶ τοὺς δύο εἰς μονάδας τῆς αὐτῆς κατωτέρας τάξεως, ἦτοι εἰς λεπτά, καὶ εὐρίσκομεν 2 δρ. 80 λ. = 280 λεπτά καὶ 3 π. 4 δρ. 60 λ. = 1960 λ. Διαιροῦμεν τώρα τὸν 1960 διὰ τοῦ 280 (ὡς ἀφηρημένους) καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 7 δκάδας (διότι δκάδας παριστᾷ καὶ ἡ μονάς, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν).

Σημ. Δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν τοὺς συμμιγεῖς καὶ εἰς μονάδας ὁσδήποτε ἄλλης τάξεως (ἀλλὰ τῆς αὐτῆς πάντοτε), προτιμῶμεν ὅμως τὴν κατωτέραν τάξιν, διὰ νὰ ἔχωμεν ἐξαγόμενα ἀκεραίους ἀριθμοὺς πρὸς εὐκολίαν τῶν πράξεών μας. Ἐὰν δὲ συμβῇ οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ νὰ μὴ ἔχωσι τὴν αὐτὴν κατωτέραν τάξιν, παρατηροῦμεν ἐν τοιαύτῃ

επιπτώσει τις ἐκ τῶν δύο ἔχει τὴν μᾶλλον κατωτέραν τάξιν, ἐκεῖ δὲ ῥέπομεν καὶ τοὺς δύο.

193. Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος βλέπομεν, ὅτι

“Ὅταν ἡ διαίρεσις εἶναι μέτρησις, τρέπομεν διαιρετέον καὶ διαιρέτην εἰς μονάδας τῆς αὐτῆς κατωτέρας τάξεως καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν (ὡς ἀφηρημένους), τὸ δὲ πηλίκον εἶναι ὁμοειδὲς μετὰ τῆς μονάδας, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν.

Σημ. Εὐκόλως διακρίνομεν, ἂν ἡ διαίρεσις εἶναι μερισμὸς ἢ μέτρησις· διότι εἰς τὸν μερισμὸν δίδονται αἱ πολλαὶ μονάδες (ἢ μέρος τῆς μονάδος), ἐνῶ εἰς τὴν μέτρησιν ζητοῦνται αὐταί. Τοῦτο εἶπομεν καὶ ἐν τῇ σελίδι 47.

6) **Πρόβλημα.** Διὰ τὰ ἀγοράσωμεν 6 ὄκ. 100 δράμια ἕξ ἐνὸς πράγματος, δίδομεν ἕν πεντάδραχμον. Πόσον θὰ δώσωμεν, διὰ τὰ ἀγοράσωμεν 2 στατῆρας ἐκ τοῦ ἰδίου πράγματος;

Κατάταξις.

6 ὄκ.	100 δρ.	1 πεντ.
	2 στ.	χ

Λύσις. Γνωρίζομεν καὶ ἔδῳ τὴν τιμὴν μιᾶς μονάδος (μονὰς εἶναι τὸ 1 πεντάδρ. καὶ τιμὴ αὐτῆς αἰ 6 ὄκ. 100 δρᾶμ.) καὶ θέλομεν τὰ εὐρίσκωμεν τὰς πολλὰς μονάδας (ἦτοι τὰ πολλὰ πεντάδραχμα) τὰς ἀντιστοιχοῦσας εἰς τὴν τιμὴν 2 στατῆρας, διὰ τοῦτο θὰ κάμωμεν διαίρεσιν, μέτρησιν. Τρέπομεν πρῶτον καὶ τοὺς δύο εἰς μονάδας τῆς αὐτῆς κατωτέρας τάξεως, ἦτοι εἰς δράμια, καὶ εὐρίσκομεν 6 ὄκ. 100 δρᾶμ. = 2500 δρᾶμ. καὶ 2 στ. = 2×44 ἢ 88 ὄκ. = $88 \times 400 = 35200$ δρᾶμ. Διαιροῦμεν τώρα τὸν 35200 διὰ 2500 (ὡς ἀφηρημένους) καὶ εὐρίσκομεν 14 πεντ. 40 λ. (διότι πεντάδραχμα παριστᾷ καὶ ἡ μονὰς, τῆς ὁποίας τὴν τιμὴν ἔχομεν).

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε τέσσαρα ὑφάσματα, ἕκαστον τῶν ὁποίων πῆχ. 7 ρούτια. Πόσον πῆχεον ἦσαν καὶ τὰ τέσσαρα ὑφάσματα; (143 πῆχ. 4 ρ.)

2) Μὲ ἕν πεντάδραχμον ἀγοράζομεν ἕξ ἐνὸς πράγματος 2 στ. 28 ὄκ. 00 δρ. Πόσον ἀγοράζομεν μετὰ 7 πεντάδραχμα; (18 στ. 25 ὄκ. 100 δρ.)

3) Τρεῖς ἄνθρωποι πρόκειται νὰ μοιράσωσιν ἕξ ἴσου 8 στ. 27 ὄκ. 50 δρ. σίτου. Πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστος; (2 στ. 38 ὄκ. 250 δρ.)

4) Ἐμοίρασέ τις ἕξ ἴσου εἰς πέντε πτωχὰς οἰκογενείας 17 πεντ. 3 δρ. 0 λ. Πόσον ἔλαβεν ἑκάστη; (3 πεντ. 2 δρ. 70 λ.)

5) Μὲ μίαν δραχμὴν ἀγοράζομεν ἕξ ἐνὸς πράγματος 4 ὄκ. 350 δρ.

Κ. Ε. Παπανητοπούλου, Πρακτικ. Ἀριθμητικῆ ἔκδ. 8', 9/6/927 11

Πόσον ἀγοράζομεν μετὰ $2 \frac{4}{5}$ τῆς δραχμῆς ; (13 ὀκ. 260 δρ.)

6) Δύο οἰκογένειαι ἠγόρασαν 7 στ. 20 ὀκ. 300 δράμ. ἀνθρώπων καὶ ἡ μία τούτων ἔλαβε τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτῶν. Πόσον ἔλαβεν ἑκάστη ;

(2 στατ. 43 ὀκ. 200 δρ. καὶ 4 στ. 21 ὀκ. 100 δρ.)

7) Ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος ἐπώλησέ τις τὰ $\frac{3}{7}$ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἔμειναν 37 πήχ. 4 ρ. Πόσον ἦτο ὅλον τὸ ὑφασμα ; (65 πήχ. 5 ρ.)

8) Γυνή τις ἠγόρασεν ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος 7 πήχ. 5 ρ. πρὸς 12,80 δρ. τὸν πήχυν καὶ ἔδωκεν ἕν ἑκατοντάδραχμον. Πόσον ἔλαβεν ὑπόλοιπον ; (2,40 δρ.)

9) Ἡ ὑάδα ἑνὸς ὑφάσματος ἀξίζει 3 σελ. 6 πέν. Πόσον ἀξίζουν 8 ὑάδ. 2 πόδ. 3 δάκ. ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ; (30 σελ. 7 πέν. 2 φαρδ.)

10) Ἀτμόπλοιον, ἔχον ταχύτητα 15 μίλια τὴν ὥραν, διέτρεξε τὴν ἀπὸ Γιβραλτὰρ εἰς Πειραιᾶ ἀπόστασιν εἰς 4 ἡμ. 3 ὥρ. 20 λ. Πόσον εἶναι ἡ ἀπόστασις αὕτη ; (1490 μίλια)

11) Τὸ ἡμερομίσθιον μιᾶς ἐργατρίας εἶναι δρ. 4,80, ἔλαβε δὲ διὰ ἡμερομίσθιά της 8 πεντ. 3 δρ. 20 λ. (ἢ 43,20 δρ.) Πόσας ἡμέρας εἰργάσθη ; (9)

12) Μετὰ δρ. 9,90 ἀγοράζομεν 8 πήχ. 2 ρ. ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος. Πόσον ἀξίζει ὁ πήχυς ; (1,20)

13) ἠγόρασέ τις 3 στ. 20 ὀκ. 200 δρ. ἀνθρώπων καὶ ἔδωκε δρ. 45,75. Πόσον ἀξίζει ἡ ὀκᾶ ; (30 λ.)

14) Μετὰ ἕν πεντάδραχμον ἀγοράζομεν 6 πήχ. 2 ρούπια ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος. Πόσον θὰ δώσωμεν, διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 4 πήχεις 3 ρούπ. ἐκ τοῦ ἰδίου ὑφάσματος ; (3,50)

15) Γυνή τις εἰς 17 ὥρ. 40 λ. ὑφαίνει ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος 6 πήχ. 5 ρούπ. Πόσον ὑφαίνει τὴν ὥραν ; (3 ρούπια)

16) Μία ἀτμάμαξα διέτρεξε μετὰ τῆς αὐτῆς ταχύτητος 110 χιλίωμ. 250 μέτρα εἰς 3 ὥρ. 9 λ. Πόσον διέτρεχε τὴν ὥραν ; (35 χιλίωμ.)

17) Γυνή τις ἠγόρασεν ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος 7 πήχ. 5 ρ. καὶ ἔδωκε δρ. 4 πεντ. 1 δρ. 35 λ. (ἢ 21,35 δρ.). Πόσον ἀξίζει ὁ πήχυς ; (2,80)

18) Μετὰ 17,50 δρ. ἠγόρασέ τις 1 στ. 12 ὀκ. 350 δρ. ἕξ ἑνὸς πράγματος. Πόσον ἀγοράζει μετὰ μίαν δραχμὴν ; (3 ὀκ. 100 δρ.)

19) 4 ὀκ. 200 δράμ. ἕξ ἑνὸς πράγματος ἀξίζουν δρ. 43,20. Πόσον ἀξίζει τὸ χιλιόγραμμον ἢ κιλόν ;

Δύσις. Αἰ 4 ὀκ. 200 δρ. ἢ 1800 δράμ. ἀξίζουν 43,20

τὸ χιλιόγραμμον ἢ 312,5 » » ζ

Εὐρίσκομεν διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα 7,50 δραχ.

20) Ὑφασμά τι, ἔχον μῆκος 30 ὑάρδας 2 πόδ. 4 δ., κοστίζει εἰς ἔμπορον 277 δραχ. Πόσον τοῦ κοστίζει ὁ πῆχυς τοῦ ἔμπορίου ;

Λύσις. Εὐρίσκομεν ὅτι ἡ μία ὑάρδα ἀξίζει 9 δραχμάς, ἐπομένως ὁ πῆχυς τοῦ ἔμπορίου, ὅστις εἶναι τὰ 0,7 τῆς ὑάρδας, ἀξίζει $9 \times 0,7$ ἢ 6,30 δρ.

21) Ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος εἶναι 32 πῆχ. 3 ρ., ἐπωλήθησαν τὰ $\frac{4}{7}$ αὐτοῦ ἀντὶ δρ, 27,75. Πρὸς πόσον ἐπωλήθη ὁ πῆχυς καὶ πόσον ὑφασμα ἔμεινεν ; (δρ. 1,50· ἔμεινε 13 π. 7 ρ.)

22) Ἡγόρασέ τις 8 στ. 10 ὀκ. 100 δρ. σίτου καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐκράτησε διὰ τὴν οἰκογένειάν του $4\frac{5}{8}$ τοῦ στατηῆρος, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἐπώλησε πρὸς 80 λεπτὰ τὴν ὀκᾶν. Πόσον ἔλαβεν ἐκ τῆς πωλήσεως αὐτοῦ ; (127 δρ.)

23) Ἀμοιβαίως οἰχία τις ἀνεχώρησεν ἀπὸ μιᾶς πόλεως τὴν 7 ὥρ. 30 λ. π. μ. μετὰ ταχύτητα 30 χιλιομέτρων τὴν ὥραν. Πόσα χιλιόμετρα θὰ ἀπέχη ἀπὸ τῆς πόλεως ταύτης τὴν 3 ὥρ. 20 λ. μ. μ. τῆς αὐτῆς ἡμέρας ; (235 χλ.)

24) Ἀτμόπλοιον ἀνεχώρησε ἀπὸ μιᾶς πόλεως ἡμέραν Πέμπτην ὥραν 9ην 20 λ. μ. μ. μετὰ ταχύτητα 14 μίλια τὴν ὥραν καὶ ἔφθασεν εἰς ἄλλην πόλιν τὴν Τρίτην τῆς ἐπομένης ἐβδομάδος καὶ ὥραν 5ην 50 λ. π. μ. Πόση εἶναι ἡ μεταξὺ τῶν δύο πόλεων ἀπόστασις ; (1463 μίλ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄.

Π Ε Ρ Ι Μ Ε Θ Ο Δ Ω Ν

Λ ό γ ο ς καὶ ἀ ν α λ ο γ ί α .

194. **Λόγος** δύο ἀριθμῶν λέγεται τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ πρώτου ἀριθμοῦ διὰ τοῦ δευτέρου.

Παραδ. χάριν, ὁ λόγος τοῦ 12 πρὸς τὸν 4 εἶναι τὸ πηλίκον $12 : 4$ ἢ $\frac{12}{4}$ (ἔδ. 102), ἥτοι 3. Ὁ λόγος ἐπίσης τοῦ $\frac{2}{3}$ πρὸς τὸν $\frac{4}{5}$ εἶναι τὸ πηλίκον $\frac{2}{3} : \frac{4}{5}$ ἢ $\frac{10}{12}$.

Ἐὰν ἔχωμεν δύο ὁμοειδῆ ποσά, παραδ. χάριν δύο ὑφάσματα, καὶ τὸ μὲν ἔν εἶναι 20 πῆχεων, τὸ δὲ ἄλλο 5 πῆχεων, ὁ λόγος τοῦ πρώτου

πρὸς τὸ δεύτερον εἶναι $20 : 5$ ἢ $\frac{20}{5}$. Ὡστε ὁ λόγος δύο ὁμοειδῶν ποσῶν (ὅταν μετρηθῶσι διὰ τῆς αὐτῆς μονάδος) ἰσοῦται μὲ τὸν λόγον τῶν παριστάντων αὐτὰ ἀριθμῶν.

195. Δύο λόγοι ἢ δύο ἀριθμοὶ λέγονται **ἀντίστροφοι** μεταξύ των ὅταν τὸ γινόμενον αὐτῶν ἰσοῦται μὲ τὴν μονάδα 1. Παραδ. χάριν, οἱ λόγοι $\frac{12}{4}$ ἢ 3 καὶ $\frac{4}{12}$ ἢ $\frac{1}{3}$ εἶναι ἀντίστροφοι, διότι εἶναι $\frac{12}{4} \times \frac{4}{12} = 1$ ἢ $3 \times \frac{1}{3} = 1$. Ἐπίσης οἱ ἀντίστροφοι τῶν ἀριθμῶν $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{5}$ καὶ 4 ἢ $\frac{4}{1}$ (ἔδ. 103 Σημ.) εἶναι οἱ $\frac{7}{2}$, $\frac{5}{3}$ καὶ $\frac{1}{4}$, διότι εἶναι $\frac{2}{7} \times \frac{7}{2} = 1$, $\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} = 1$ καὶ $4 \times \frac{1}{4} = 1$.

196. Ἐπιλογία λέγεται ἡ ἰσότης δύο λόγων. Παραδ. χάριν, ὁ λόγος $\frac{8}{4}$ ἢ 8 : 4 εἶναι ἴσος μὲ 2, ὁ λόγος ἐπίσης $\frac{6}{3}$ ἢ 6 : 3 εἶναι ἴσος μὲ 2 ὥστε οἱ λόγοι οὗτοι εἶναι ἴσοι καὶ ἐπομένως ἡ ἰσότης $\frac{8}{4} = \frac{6}{3}$ ἢ 8 : 4 = 6 : 3 εἶναι ἀναλογία.

Οἱ ἀποτελοῦντες τὴν ἀναλογίαν ἀριθμοὶ λέγονται **ὄροι** τῆς ἀναλογίας. Ὅταν ἡ ἀναλογία γράφηται ὡς ἐξῆς 8 : 4 = 6 : 3, ἀπαγγέλλεται 8 πρὸς 4 ὡς 6 πρὸς 3 καὶ οἱ μὲν εὐρισκόμενοι εἰς τὰ ἄκρα ἀριθμοὶ 8 καὶ 3 λέγονται **ἄκροι** ὄροι τῆς ἀναλογίας, οἱ δὲ εὐρισκόμενοι εἰς τὸ μέσον 4 καὶ 6 λέγονται **μέσοι**.

197. Ἰδιότης τῆς ἀναλογίας. Ἐστω ἡ ἀναλογία 8 : 4 = 6 : 3 ἢ $\frac{8}{4} = \frac{6}{3}$. Ἐὰν ἴσους ἀριθμοὺς πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, προκύπτουν πάλιν ἴσοι ἀριθμοί. Πολλαπλασιάζομεν λοιπὸν τοὺς ἴσους ἀριθμοὺς $\frac{8}{4}$ καὶ $\frac{6}{3}$ ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν αὐτῶν 4×3 καὶ εὐρίσκομεν $\frac{8 \times 4 \times 3}{4} = \frac{6 \times 4 \times 3}{3}$ ἢ (μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν) $8 \times 3 = 6 \times 4$. Ἄλλ' οἱ ἀριθμοὶ 8 καὶ 3 εἶναι οἱ ἄκροι ὄροι τῆς ἀνωτέρω ἀναλογίας, οἱ δὲ ἀριθμοὶ 6 καὶ 4 εἶναι οἱ μέσοι ὄροι αὐτῆς. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὴν ἐξῆς ἰδιότητα τῶν ἀναλογιῶν.

Εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν τὸ γινόμενον τῶν ἄκρων ὄρων ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν μέσων.

Εἰς τὴν ἰδιότητα ταύτην στηριζόμενοι εὐρίσκομεν ἓνα τῶν ὄρων ἀναλογίας, ὅταν μᾶς δοθῶσιν οἱ ἄλλοι τρεῖς ὄροι.

Ἐστω π. χ. ἡ ἀναλογία 6 : 3 = 10 : χ, τῆς ὁποίας τὸν ἄγνωστον

ὄρον παριστῶμεν διὰ τοῦ γράμματος χ . Ἐκ τῆς ἀνωτέρω ιδιότητος ἔχομεν $6 \times \chi = 3 \times 10$. Ἄλλ' ἐὰν ἴσους ἀριθμοὺς διαιρέσωμεν διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, οἱ προκύπτοντες ἀριθμοὶ εἶναι πάλιν ἴσοι. Διαιροῦμεν λοιπὸν τοὺς ἴσους ἀριθμοὺς $6 \times \chi$ καὶ 3×10 διὰ 6 καὶ εὐρίσκομεν $\frac{6 \times \chi}{6} = \frac{3 \times 10}{6}$ ἢ $\chi = \frac{3 \times 10}{6}$, ἦτοι 5.

Ἐπίσης ἐκ τῆς ἀναλογίας $20 : \chi = 15 : 3$ ἔχομεν $15 \times \chi = 20 \times 3$ ἢ $\frac{15 \times \chi}{15} = \frac{20 \times 3}{15}$ ἢ $\chi = \frac{20 \times 3}{15}$, ἦτοι 4. Ἐκ τούτων συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

198. *Διὰ τὰ εὐρωμεν τὸν ἄγνωστον ὄρον, ἂν μὲν εἶναι ἄκρος, πολλαπλασιάζομεν τοὺς μέσους ὄρους καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ γνωστοῦ ἄκρου· ἂν δὲ εἶναι μέσος, πολλαπλασιάζομεν τοὺς ἄκρους ὄρους καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ γνωστοῦ μέσου.*

Ποσὰ ἀνάλογα καὶ ἀντίστροφα.

199. Ὑποθέσωμεν, παραδ. χάριν, ὅτι μὲ 6 δραχμὰς ἀγοράζομεν 8 ὀκάδας ἐξ ἑνὸς πράγματος· ἐὰν ὁμως δώσωμεν διπλασίας, τριπλασίας κτλ. δραχμὰς, ἦτοι 6×2 , 6×3 κτλ., θὰ ἀγοράσωμεν καὶ διπλασίας, τριπλασίας κτλ. ὀκάδας, ἦτοι 8×2 , 8×3 κτλ. Ἐὰν πάλιν δώσωμεν τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κτλ. τῶν 6 δραχμῶν, θὰ ἀγοράσωμεν καὶ τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κτλ. τῶν 8 ὀκάδων. Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι τὰ ποσὰ *δραχμαὶ* καὶ *ὀκάδες* ἔχουν τοιαύτην σχέσιν μεταξύ των, ὥστε, ὅταν ἡ τιμὴ 6 τῶν δραχμῶν διπλασιασθῇ, τριπλασιασθῇ κτλ., καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 8 τῶν ὀκάδων διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κτλ. Καὶ τὰνάπαλιν, ὅταν ἡ τιμὴ 6 τῶν δραχμῶν γίνῃ τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κτλ., καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 8 τῶν ὀκάδων γίνεται τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κτλ. Τὰ τοιαῦτα ποσὰ λέγονται *ἀνάλογα*. Ὡστε.

200. Δύο ποσὰ λέγονται *ἀνάλογα*, ὅταν, πολλαπλασιαζομένης τῆς τιμῆς τοῦ ἑνὸς ποσοῦ ἐπὶ ἓνα ἀριθμὸν, πολλαπλασιάζεται καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ ἐπὶ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν. Καὶ τὰνάπαλιν, διαιρουμένης τῆς τιμῆς τοῦ ἑνὸς ποσοῦ, διαιρεῖται καὶ ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ διὰ τοῦ ἰδίου ἀριθμοῦ.

Παρατήρησις. Ὅταν δύο ποσὰ δὲν ἔχουν μεταξύ των τὴν ἀνωτέρω σχέσιν, ἀλλ' ὁμως συναυξάνονται, ταῦτα δὲν λέγονται ἀνάλογα. Παραδ. χάριν, αὐξανομένης τῆς ἡλικίας ἑνὸς παιδίου αὐξάνεται καὶ τὸ ἀνάστημά του, ἐν τούτοις τὰ ποσὰ *ἡλικία* καὶ *ἀνάστημα* δὲν εἶναι ἀνάλογα· διότι διπλασιαζομένης, τριπλασιαζομένης κτλ. τῆς ἡλικίας

τοῦ παιδίου, δὲν διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κτλ. τὸ ἀνάστημά του.

201. Εἰς τὰ ἀνάλογα ποσὰ δύο οἰαيدήποτε τιμαὶ τοῦ ἑνὸς ποσοῦ ἔχουν τὸν αὐτὸν λόγον, τὸν ὁποῖον ἔχουν καὶ αἱ πρὸς αὐτὰς ἀντιστοιχοῦσαι τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ. Παραδ. χάριν, ἂν μὲ 6 δραχμὰς ἀγοράζωμεν 8 ὀκάδας, μὲ τριπλασίας δραχμὰς, ἦτοι 6×3 , θὰ ἀγοράσωμεν καὶ τριπλασίας ὀκάδας, ἦτοι 8×3 . ὁ λόγος τῶν 6 καὶ 6×3 δραχμῶν εἶναι $\frac{6}{6 \times 3}$ ἢ $\frac{1}{3}$, ὁ λόγος πάλιν τῶν ἀντιστοιχῶν τιμῶν αὐτῶν 8 καὶ 8×3 εἶναι $\frac{8}{8 \times 3}$ ἢ $\frac{1}{3}$, ἦτοι εἶναι ὁ αὐτός.

202. Ὑποθέσωμεν πάλιν, ὅτι 18 ἔργαται τελειώνουν ἓν ἔργον εἰς 12 ἡμέρας· ἐὰν ὅμως ἦσαν διπλάσιοι, τριπλάσιοι κτλ. ἔργαται, ἦτοι 18×2 ἢ 18×3 κτλ., θὰ τελειώσουν τὸ ἔργον εἰς τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κτλ. τῶν ἡμερῶν, ἦτοι εἰς $12 : 2$ ἢ 6 ἡμέρας, εἰς $12 : 3$ ἢ 4 ἡμέρας κτλ. Καὶ τὰνάπαλιν, τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κτλ. τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἔργατῶν θὰ τελειώσῃ τὸ ἔργον εἰς διπλάσιον, τριπλάσιον κτλ. ἀριθμὸν ἡμερῶν. Ἐκ τούτου βλέπομεν, ὅτι τὰ ποσὰ ἔργαται καὶ ἡμέραι ἔχουν τοιαύτην σχέσιν μεταξύ των, ὥστε, ὅταν ἡ τιμὴ 18 τῶν ἔργατῶν διπλασιασθῇ, τριπλασιασθῇ κτλ., ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 12 τῶν ἡμερῶν γίνεται τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κτλ. Καὶ τὰνάπαλιν, ὅταν ἡ τιμὴ 18 τῶν ἔργατῶν γίνῃ τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κτλ., ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ 12 τῶν ἡμερῶν διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κτλ. Τὰ τοιαῦτα ποσὰ λέγονται **ἀντίστροφα** ἢ **ἀντιστρόφως ἀνάλογα**. Ὡστε

203. Δύο ποσὰ λέγονται **ἀντίστροφα** ἢ **ἀντιστρόφως ἀνάλογα**, ὅταν, πολλαπλασιαζομένης τῆς τιμῆς τοῦ ἑνὸς ποσοῦ ἐπὶ ἓνα ἀριθμὸν, διαιρῆται ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ διὰ τοῦ ἰδίου ἀριθμοῦ. Καὶ τὰνάπαλιν, διαιρουμένης τῆς τιμῆς τοῦ ἑνὸς ποσοῦ, πολλαπλασιάζεται ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ ἄλλου ποσοῦ ἐπὶ τὸν ἴδιον ἀριθμὸν.

Παρατήρησις. Ὅταν δύο ποσὰ δὲν ἔχουν μεταξύ των τὴν ἀνωτέρω σχέσιν, ἀλλ' ὅμως αὐξανομένου τοῦ ἑνὸς ποσοῦ, ἐλαττοῦται τὸ ἄλλο, ταῦτα δὲν λέγονται ἀντίστροφα. Ὑποθέσωμεν, παραδ. χάριν, ὅτι χρειαζόμεθα μίαν ὥραν διὰ νὰ διανύσωμεν ἓν τῆ θαλάσση ἀπόστασιν τινα διὰ λέμβου, ἐχούσης δύο κώπας, ἐὰν ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν κωπῶν διπλασιασθῇ, τριπλασιασθῇ κτλ., θὰ χρειασθῶμεν μὲν ὀλιγώτερον χρόνον, διὰ νὰ διανύσωμεν τὴν ἀπόστασιν ταύτην, οὐχὶ δὲ καὶ τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον κτλ. τῆς μιᾶς ὥρας. Ὡστε τὰ ποσὰ **κῶπαι** καὶ **χρόνος** δὲν εἶναι ἀντίστροφα.

204. Εἰς τὰ ἀντίστροφα ποσὰ δύο αἰαιδήποτε τιμαὶ τοῦ ἑνὸς πο-

ἔχουν λόγον ἀντίστροφον τοῦ λόγου, τὸν ὁποῖον ἔχουν αἱ πρὸς τὰς ἀντιστοιχοῦσαι τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ. Παραδ. χάριν, ἂν 18 γάται τελειώνουν ἐν ἔργον εἰς 12 ἡμέρας, διπλάσιοι ἐργάται, ἤτοι 18×2 , θὰ τελειώσουν αὐτὸ εἰς τὸ ἡμισυ τῶν ἡμερῶν, ἤτοι εἰς $12 : 2$ ἢ 6 ἡμ. Ὁ λόγος τῶν 18 καὶ 18×2 ἐργατῶν εἶναι $\frac{18}{18 \times 2}$ ἢ $\frac{1}{2}$, ἐνῶ ὁ λόγος τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν αὐτῶν 12 καὶ 6 ἡμ. εἶναι $\frac{12}{6}$ ἢ $\frac{2}{1}$, ἤτοι οἱ δύο οὔτοι λόγοι εἶναι ἀντίστροφοι, διότι εἶναι $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ (ἔδ. 195).

Μέθοδος τῶν τριῶν.

1ον) **Πρόβλημα.** Μὲ 27 δραχμὰς ἀγοράζομεν 6 πήχεις ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος. Πόσους πήχεις θὰ ἀγοράσωμεν μὲ 180 δραχμὰς :

Κατάταξις.

27 δρ.	6 πήχ.
180	χ

Θὰ λύσωμεν κατὰ πρῶτον τὸ πρόβλημα διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν νάδα σκεπτόμενοι ὡς ἑξῆς.

Ἐφ' οὗ μὲ 27 δραχ. ἀγοράζομεν 6 πήχεις

μὲ 1 δραχ. » $\frac{6}{27}$ τοῦ πήχ.

καὶ μὲ 180 δραχ. » $\frac{6 \times 180}{27}$ ἢ $6 \times \frac{180}{27}$ τοῦ πήχ.

Ἐὰν τώρα χωρίσωμεν τὰς δύο δοθείσας τιμὰς 27 καὶ 180 τοῦ ἐνὸς ποῦ διὰ μιᾶς ὀριζοντίας γραμμῆς, ὡς δεικνύεται εἰς τὴν ἀνωτέρω τάταξιν τῶν ἀριθμῶν, καὶ παραβάλωμεν τὸ εὐρεθὲν ἑξαγόμενον

$\times \frac{180}{27}$ μὲ τὴν κατάταξιν ταύτην, βλέπομεν, ὅτι τοῦτο εὐρίσκεται, ἂν

πλασιασίσωμεν τὸν ὑπεράνω τοῦ ἀγνώστου ἀριθμοῦ 6 μὲ τὸ κλάσμα (ἢ λόγον), τὸ ὁποῖον ἀποτελοῦσιν αἱ δύο τιμαὶ 27 καὶ 180 τοῦ ἄλλου ποσοῦ, ἀντεστραμμένον. Εἶναι δὲ τὰ ποσὰ δραχμαὶ καὶ πήχεις ἄλογα (διότι μὲ διπλασίας, τριπλασίας κτλ. δραχμὰς ἀγοράζομεν καὶ τριπλασίους, κτλ. πήχεις).

2ον) **Πρόβλημα.** 10 ἐργάται τελειώνουν ἔργον τι εἰς 30 ἡμέρας. Ἐργάται εἰς πόσας ἡμέρας θὰ τελειώσουν τὸ αὐτὸ ἔργον :

Κατάταξις :

10 ἐργ.	30 ἡμ.
15	χ

Λύσις. Ἐφ' οὗ 10 ἐργ. τελειώνουν τὸ ἔργον εἰς 30 ἡμ.

1 ἐργάτης τελειώνει αὐτὸ εἰς 30×10 ἡμ.

καὶ οἱ 15 ἐργ. τελειώνουν αὐτὸ εἰς $\frac{30 \times 10}{15}$ ἢ $30 \times \frac{10}{15}$ ἡμ.

Ἐὰν πάλιν παραβάλωμεν τὸ εὐρεθὲν ἐξαγόμενον $30 \times \frac{10}{15}$ μὲ τὴν ἀνωτέρω κατάταξιν τῶν ἀριθμῶν, βλέπομεν, ὅτι τοῦτο εὐρίσκεται, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ὑπεράνω τοῦ ἀγνώστου ἀριθμὸν 30 μὲ τὸ κλάσμα (ἢ λόγον), τὸ ὁποῖον ἀποτελοῦσιν αἱ δύο τιμαὶ 10 καὶ 15 τοῦ ἄλλου ποσοῦ, ὅπως ἔχει. Εἶναι δὲ τὰ ποσὰ ἐργάται καὶ ἡμέραι ἀντίστροφα (διότι διπλασιαζομένου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργατῶν, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν γίνεται τὸ ἥμισυ).

Ἐκ τῆς λύσεως τῶν ἀνωτέρω δύο προβλημάτων διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα συνάγομεν τὸν ἐξῆς σύντομον κανόνα.

205. *Ὁ ἀγνώστος x εὐρίσκεται, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ὑπεράνω αὐτοῦ ἀριθμὸν μὲ τὸ κλάσμα, τὸ ὁποῖον ἀποτελοῦσιν αἱ δύο τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ (ὅταν χωρισθῶσι διὰ μιᾶς ὀριζοντίας γραμμῆς)· ἀντεστραμμένον μὲν, ἂν τὰ ποσὰ εἶναι ἀνάλογα ὅπως δ' ἔχει, ἂν τὰ ποσὰ εἶναι ἀντίστροφα.*

Τὰ ἀνωτέρω λοιπὸν προβλήματα καὶ τὰ ὅμοια τούτων δυνάμεθα νὰ λύωμεν συντόμως διὰ τοῦ ἀνωτέρω κανόνος, ἀρκεῖ μόνον νὰ διακρίνωμεν, ἂν τὰ δοθέντα ποσὰ εἶναι ἀνάλογα ἢ ἀντίστροφα· ἀλλὰ τοῦτο οὐδεμίαν δυσκολίαν παρουσιάζει.

206. Ὁ γενικὸς τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου λύομεν τοῦ αὐτοῦ εἴδους προβλήματα, λέγεται *μέθοδος*. Ἐπειδὴ δὲ εἰς τὰ ἀνωτέρω προβλήματα καὶ τὰ ὅμοια τούτων δίδονται τρεῖς ἀριθμοὶ καὶ ζητεῖται ὁ τέταρτος, διὰ τοῦτο ὁ τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου λύομεν αὐτὰ, λέγεται *μέθοδος τῶν τριῶν*. Ὡστε

Μέθοδος τῶν τριῶν λέγεται ὁ τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου λύομεν προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα δίδονται αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ δύο ποσῶν ἀναλόγων ἢ ἀντιστρόφων καὶ ζητεῖται νὰ εὐρεθῇ ποία τιμὴ τοῦ ἐνὸς ποσοῦ ἀντιστοιχεῖ εἰς νέαν τιμὴν τοῦ ἄλλου ποσοῦ.

207. Ὁ ἀνωτέρω κανὼν δύναται νὰ ἐξαχθῇ καὶ ἐκ τῆς λύσεως τῶν προβλημάτων δι' ἀναλογιῶν.

Παραδ. χάριν, εἰς τὸ πρῶτον πρόβλημα, ἐπειδὴ τὰ ποσὰ (δραχμαὶ καὶ πήχεις) εἶναι ἀνάλογα, διὰ τοῦτο ὁ λόγος τῶν δύο δοθεισῶν τιμῶν 27 καὶ 180 (δραχμαὶ) τοῦ πρώτου ποσοῦ εἶναι ἴσος μὲ τὸν λόγον τῶν πρὸς αὐτὰς ἀντιστοιχουσῶν τιμῶν 6 καὶ x (πήχεις) τοῦ δευτέρου ποσοῦ (ἐδ. 201), ἥτοι εἶναι $\frac{27}{180} = \frac{6}{x}$ ἢ $27 : 180 = 6 : x$, ἐπομένως καὶ $x = \frac{6 \times 180}{27}$ (ἐδ. 198).

Εἰς δὲ τὸ δεύτερον πρόβλημα, ἐπειδὴ τὰ ποσὰ (ἐργάται καὶ ἡμέραι)

είναι αντίστροφα, διὰ τοῦτο ὁ λόγος τῶν δύο δοθεισῶν τιμῶν 10 καὶ 15 (ἔργαται) τοῦ πρώτου ποσοῦ εἶναι ἀντίστροφος τοῦ λόγου τῶν πρὸς αὐτὰς ἀντιστοιχοῦσῶν τιμῶν 30 καὶ χ (ἡμέραι) τοῦ δευτέρου ποσοῦ (ἔδ. 204), ἥτοι εἶναι $\frac{10}{15} = \frac{\chi}{30}$ ἢ $10 : 15 = \chi : 30$, ἐπομένως καὶ $\chi = \frac{30 \times 10}{15}$.

3ον) **Πρόβλημα.** Μὲ 30,50 δρ. ἀγοράζομεν ἕξ ἑνὸς πράγματος 3 στ. 20 ὀκ. 200 δραχμια. Πόσον θὰ δώσωμεν διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 10 στ. 8 ὀκ. ἕκ τοῦ ἰδίου πράγματος;

Κατάταξις. $30,50 \text{ δρ.}$ $3 \text{ στ. } 20 \text{ ὀκ. } 200 \text{ δρ.}$
 χ $10 \text{ στ. } 8 \text{ ὀκ.}$

Λύσις. Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 3 στ. 20 ὀκ. 200 δραχμια, θὰ δώσωμεν 30,50 δρ. διὰ νὰ ἀγοράσωμεν διπλάσιον βάρους, θὰ δώσωμεν καὶ διπλασίας δραχμιάς. Τὰ ποσὰ λοιπὸν (βάρους καὶ δραχμια) εἶναι ἀνάλογα, ἐπομένως ἔχομεν $\chi = 30,50 \times \frac{10 \text{ στ. } 8 \text{ ὀκ.}}{3 \text{ στ. } 20 \text{ ὀκ. } 200 \text{ δρ.}} = 30,50 \times \frac{179200}{61000} = 89,60 \text{ δρ.}$

Σημ. Ἐπειδὴ οἱ ὅροι τοῦ ἀνωτέρω κλάσματος εἶναι συμμιγεῖς, διὰ τοῦτο ἔτρεψαμεν αὐτοὺς εἰς τὴν αὐτὴν κατωτέραν τάξιν, ἥτοι εἰς δραχμια, διὰ νὰ γίνωνται ἀπὸ τὴν ἰδίαν μονάδα. Τοῦτο πρέπει νὰ πράττωμεν πάντοτε εἰς τὰ κλάσματα ἑκείνα, τῶν ὁποίων οἱ ὅροι δὲν γίνονται ἀπὸ τὴν ἰδίαν μονάδα.

4ον) **Πρόβλημα.** Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν $\frac{5}{8}$ τῆς ὀκάς ἕξ ἑνὸς πράγματος, δίδομεν 4 δραχμιάς. Πόσον θὰ δώσωμεν διὰ 3 ὀκάδας;

Κατάταξις. $\frac{5}{8} \text{ ὀκ.}$ 4 δρ.
 χ

Λύσις. Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ ὀκάδες καὶ δραχμια εἶναι ἀνάλογα, διὰ τοῦτο ἔχομεν

$$\chi = 4 \times \frac{3}{\frac{5}{8}} = 4 \times 3 : \frac{5}{8} \text{ (ἔδ. 140)} = 4 \times 3 \times \frac{8}{5} = \frac{96}{5} = 19,20 \text{ δρ.}$$

$$\text{ἢ } \chi = 4 \times \frac{3}{\frac{5}{8}} = 4 \times \frac{3 \times 8}{\frac{5}{8} \times 8} \text{ (ἔδ. 141)} = 4 \times \frac{24}{5} = \frac{96}{5} = 19,20 \text{ δρ.}$$

ἢ καὶ ὡς ἐξῆς. Ἐπειδὴ εἶναι $\frac{5}{8} = 0,625$ ἔχομεν

$$\chi = 4 \times \frac{3}{0,625} = \frac{12}{0,625} = \frac{12000}{625} = 19,20.$$

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 12 μέτρα ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος, δίδομεν 36 δραχμιάς. Πόσον θὰ δώσωμεν διὰ νὰ ἀγοράσωμεν 8,40 τοῦ μέτρου ἕκ τοῦ ἰδίου ὑφάσματος; (25,20 δρ.)

2) Μὲ 6 δραχμὰς ἀγοράζομεν 7 ὄκ. 200 δρὰμ. ἕξ ἑνὸς πράγματος. Πόσον ἀγοράζομεν μὲ 9 δρ. ἐκ τοῦ ἰδίου πράγματος; (11 ὄκ. 100 δρ.)

3) Γυνὴ τις, διὰ τὴν ὑφάνην 5 πῆχ. ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος, χρειάζεται 9 $\frac{1}{2}$ τῆς ὥρας. Πόσον χρόνον χρειάζεται διὰ τὴν ὑφάνην 2 πῆχεις ἐκ τοῦ ἰδίου ὑφάσματος; $\left(3 \frac{4}{5} \text{ ὥρας} \right)$

4) Διὰ τὴν ἀγοράσωμεν 2 $\frac{1}{4}$ τῆς ὀκάς ἕξ ἑνὸς πράγματος, δίδομεν 9 δραχμὰς. Πόσον θὰ δώσωμεν διὰ 5 ὀκάδας ἐκ τοῦ ἰδίου πράγματος; (20 δρ.)

5) Τὰ $\frac{5}{8}$ ἔργου τινὸς ἐπερατώθησαν ὑπὸ 6 ἔργασι εἰς 15 ἡμέρας, εἰς πόσας ἡμέρας θὰ περατωθῇ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ ἔργου ὑπὸ τῶν ἰδίων ἔργασι; (εἰς 9 ἡμ.)

6) 100 στρατιῶται ἔχουν τροφὰς διὰ τὴν περάσασθαι 28 ἡμέρας. Ἐὰν ἀναχωρήσουν 30 στρατιῶται ἄνευ τροφῶν, πόσας ἡμέρας θὰ περάσουν οἱ λοιποὶ μὲ τὰς ἰδίας τροφὰς; (40)

7) Γυνὴ τις χρειάζεται διὰ φόρεμά της 7 πῆχεις ἕξ ἑνὸς ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ πλάτος εἶναι 1 πῆχ. 4 ρούπια. Πόσον χρειάζεται ἕξ ἄλλου ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ πλάτος εἶναι 1 πῆχ. 2 ρούπια; $\left(8 \frac{2}{5} \text{ πῆχ.} \right)$

8) Δωμάτιον, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος εἶναι 5,40 τοῦ μέτρου καὶ τὸ πλάτος 4 μέτρα, πρόκειται νὰ στρωθῇ δι' ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ πλάτος εἶναι 0,90 τοῦ μέτρου. Πόσον μῆκος χρειάζεται; (24 μ.)

Σημ. Ἐὰν τὸ ὑφασμα ἔχη πλάτος 4 μέτρα, χρειάζεται ἕξ αὐτοῦ μῆκος 5,40.

9) Ράβδος ὀρθὴ ἐστημένη ἔχει ὕψος 0,90 τοῦ μέτρου καὶ ῥίπτει σκιὰν ἔχουσαν μῆκος 0,50 τοῦ μέτρου. Πόσον εἶναι τὸ ὕψος κυπαρίσσου, ἣτις κατὰ τὴν αὐτὴν χρονικὴν στιγμήν ῥίπτει σκιάν, ἔχουσαν μῆκος 5,20; (9,36 μ.)

10) Οἱ ἑντὸς φρουρίου ὑπάρχοντες στρατιῶται ἔχουν τροφὰς διὰ 25 ἡμέρας· ἂν εἶναι ἀνάγκη μὲ τὰς αὐτὰς τροφὰς νὰ περάσουν 40 ἡμέρας, πόσον μέρος τοῦ ἀρχικοῦ σιτηρεσίου πρέπει νὰ λαμβάνῃ ἕκαστος στρατιώτης; Καὶ ἂν ἕκαστος ἐλάμβανε πρότερον 240 δρὰμια ἄρτου, 80 δρὰμ. κρέατος καὶ 60 δρὰμ. τυροῦ, πόσον θὰ λαμβάνῃ τώρα;

Σιτηρέσιον λέγεται τὸ μερίδιον τῆς [τροφῆς, τὸ ὁποῖον λαμβάνει ἕκαστος κάθε ἡμέραν. Τοῦτο παριστῶμεν διὰ τῆς μονάδος 1.

$\left(\text{Τὰ } \frac{5}{8} \text{ τοῦ ἀρχικοῦ σιτηρεσίου, ἧτοι } 240 \times \frac{5}{8} \text{ ἢ } 150 \text{ δρ. ἄρτου,} \right)$

Δύσις. Ἀφοῦ οἱ 120 στρατιῶται χρειάζονται 270 ἄρτους, διπλάσιοι στρατιῶται, διὰ νὰ περάσουν τὰς αὐτὰς ἡμέρας, θὰ χρειασθῶσι καὶ διπλασίους ἄρτους. Τὰ ποσὰ λοιπὸν (στρατιῶται καὶ ἄρτοι) εἶναι ἀνάλογα, ἐπομένως ἔχομεν $\chi = 270 \times \frac{160}{120}$ ἄρτους. Τόσους λοιπὸν ἄρτους χρειάζονται οἱ 160 στρατιῶται διὰ νὰ περάσουν 3 ἡμέρας. Ἄλλ' ἡμεῖς θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσους ἄρτους χρειάζονται οὐχὶ εἰς 3 ἡμέρας, ἀλλ' εἰς 5· ὥστε ἔχομεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα.

Διὰ νὰ περάσουν 3 ἡμέρας χρειάζονται $270 \times \frac{160}{120}$ ἄρτους (οἱ 160 στρατιῶται)· διὰ νὰ περάσουν 5 ἡμέρας, πόσους ἄρτους χρειάζονται;

$$\text{Κατάταξις.} \quad \frac{3 \text{ ἡμ.}}{5} \quad 270 \times \frac{160}{120} \text{ ἄρτ.} \\ \chi$$

Δύσις. Ἀφοῦ διὰ 3 ἡμέρας χρειάζονται $270 \times \frac{160}{120}$ ἄρτους, διὰ διπλάσιας ἡμέρας θὰ χρειασθῶσι καὶ διπλασίους ἄρτους. Τὰ ποσὰ λοιπὸν (ἡμέραι καὶ ἄρτοι) εἶναι ἀνάλογα, ἐπομένως ἔχομεν $\chi = 270 \times \frac{160}{120} \times \frac{5}{3}$ ἄρτ.

Ὡστε οἱ 160 στρατιῶται, διὰ νὰ περάσουν 5 ἡμέρας, χρειάζονται $270 \times \frac{160}{120} \times \frac{5}{3}$, ἧτοι 600 ἄρτους (μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν).

Τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα, ὡς βλέπομεν, ἀνελύθη εἰς δύο προβλήματα τῆς μεθόδου τῶν τριῶν (ἧτοι εἰς τόσα, ὅσα εἶναι τὰ δοθέντα ποσὰ πλὴν ἑνός), διὰ τοῦτο δὲ ἡ μέθοδος αὕτη λέγεται **σύνθετος μέθοδος τῶν τριῶν**, ἢ δὲ μέθοδος τῶν τριῶν λέγεται πρὸς διάκρισιν ἀπλῆς. Ὡστε

208. **Σύνθετος μέθοδος τῶν τριῶν λέγεται ὁ τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου λύομεν προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα δίδονται αἱ ἀντιστοιχοῦντιμαί τριῶν ἢ περισσοτέρων ποσῶν ἀναλόγων ἢ ἀντιστρόφων καὶ ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ ποία τιμὴ τοῦ ἐνὸς ποσοῦ ἀντιστοιχεῖ εἰς νέαν τιμὴν ἐκάστου τῶν ἄλλων ποσῶν.**

Δὲν εἶναι ὅμως καὶ ἀνάγκη νὰ ἀναλύωμεν τὸ πρόβλημα τῆς συνθέτου εἰς ἄλλα προβλήματα τῆς ἀπλῆς καὶ νὰ κάμνωμεν οὕτως ἰδίαν κατάταξιν δι' ἕκαστον· ἀλλ' ὅπως ἔχει διαταχθῆ ἀπ' ἀρχῆς τὸ πρόβλημα, συγκρίνομεν ἕκαστον ποσὸν πρὸς τὸ ποσόν, τοῦ ὁποίου ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ ἡ νέα τιμὴ, καὶ παρατηροῦμεν, ἂν τοῦτο εἶναι ἀνάλογον ἢ ἀντιστρόφον πρὸς αὐτὸ (ὑποθέτοντες τὰ ἄλλα ποσὰ ὡς μὴ ὑπάρχοντα).

Διὰ νὰ λύσωμεν, π. χ., τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς

Οἱ 120 στρατιῶται χρειάζονται 270 ἄρτους, διπλάσιοι στρατιῶται θὰ χρειασθῶσι καὶ διπλασίους ἄρτους. Τὰ ποσὰ λοιπὸν (στρατιῶται καὶ ἄρτοι) εἶναι ἀνάλογα, διὰ τοῦτο πολλαπλασιάζομεν τὸν ὑπεράνω τοῦ ἀγνώστου ἀριθμὸν μὲ τὸ κλάσμα ἀντεστραμμένον, ἥτοι $270 \times \frac{160}{120}$ ἄρτους (τόσους λοιπὸν ἄρτους χρειάζονται, διὰ νὰ περάσουν οἱ 160 στρατιῶται, ὅσας ἡμέρας καὶ οἱ 120, ἥτοι 3).

Ἐπειτα μεταβαίνομεν εἰς τὸ ποσὸν τῶν ἡμερῶν σκεπτόμενοι ὡς ἐξῆς. Διὰ νὰ περάσουν 3 ἡμέρας χρειάζονται $270 \times \frac{160}{120}$ ἄρτους, διὰ νὰ περάσουν διπλασίας ἡμέρας, θὰ χρειασθῶσι καὶ διπλασίους ἄρτους. Τὰ ποσὰ λοιπὸν (ἡμέραι καὶ ἄρτοι) εἶναι ἀνάλογα, διὰ τοῦτο πολλαπλασιάζομεν τὸν $270 \times \frac{160}{120}$ μὲ τὸ κλάσμα ἀντεστραμμένον, ἥτοι $270 \times \frac{160}{120} \times \frac{5}{3}$, ἥτοι 600 ἄρτους.

2ον) **Πρόβλημα.** 10 ἐργάται 9 ὥρας τὴν ἡμέραν ἐργαζόμενοι ἔσκαψαν εἰς 4 ἡμέρας 6 στρέμματα ἀμπέλου. Εἰς πόσας ἡμέρας 12 ἐργάται 8 ὥρας τὴν ἡμέραν ἐργαζόμενοι θὰ σκάψωσιν 8 στρέμματα ;

Κατάταξις. $\frac{10 \text{ ἐργ.}}{12}$ $\frac{9 \text{ ὥρ.}}{8}$ $\frac{4 \text{ ἡμ.}}{\chi}$ $\frac{6 \text{ στρ.}}{8}$

Οἱ 10 ἐργάται χρειάζονται 4 ἡμέρας, διπλάσιοι ἐργάται θὰ χρειασθῶσι τὰς ἡμισείας ἡμέρας· ἄρα τὰ ποσὰ (ἐργάται καὶ ἡμέραι) εἶναι ἀντίστροφα, ἐπομένως ἔχομεν $4 \times \frac{10}{12}$ ἡμέρας (τόσας ἡμέρας χρειάζονται οἱ 12 ἐργάται ἐργαζόμενοι 9 ὥρας τὴν ἡμέραν, διὰ νὰ σκάψωσιν 6 στρέμ.).

Ἐπειτα μεταβαίνομεν εἰς τὸ ποσὸν τῶν ὥρῶν σκεπτόμενοι ὡς ἐξῆς. Ἄν ἐργάζωνται 9 ὥρας τὴν ἡμέραν, χρειάζονται $4 \times \frac{10}{12}$ ἡμέρας· ἂν ἐργάζωνται διπλασίας ὥρας τὴν ἡμέραν, θὰ χρειασθῶσι τὰς ἡμισείας ἡμέρας· ἄρα τὰ ποσὰ (ὥραι καὶ ἡμέραι) εἶναι ἀντίστροφα, ἐπομένως ἔχομεν $4 \times \frac{10}{12} \times \frac{9}{8}$ ἡμ. (τόσας ἡμέρας χρειάζονται οἱ 12 ἐργάται ἐργαζόμενοι 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, διὰ νὰ σκάψωσιν 6 στρέμ.).

Ἐπειτα μεταβαίνομεν εἰς τὸ ποσὸν τῶν στρεμμάτων σκεπτόμενοι ὡς ἐξῆς. Διὰ νὰ σκάψωσιν 6 στρέμματα, χρειάζονται $4 \times \frac{10}{12} \times \frac{9}{8}$ ἡμέρας· διὰ νὰ σκάψωσι διπλάσια στρέμματα, θὰ χρειασθῶσι καὶ διπλασίας ἡμέρας· ἄρα τὰ ποσὰ (στρέμματα καὶ ἡμέραι) εἶναι ἀνάλογα, ἐπομένως ἔχομεν $4 \times \frac{10}{12} \times \frac{9}{8} \times \frac{8}{6}$ καὶ μετὰ τὴν ἀπλοποίησιν εὐρίσκομεν 5 ἡμέρας.

Ἐκ τῆς λύσεως τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν.

209. Ὁ ἀγνωστος χ εὐρίσκεται, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ὑπεράνω αὐτοῦ ἀριθμὸν μὲ ἕκαστον κλάσμα, τὸ ὁποῖον ἀποτελοῦσιν αἱ δύο τιμαὶ ἐκάστου ποσοῦ (ὅταν χωρισθῶσι διὰ μιᾶς ὀριζοντίας γραμμῆς) ἀντεστραμμένον μὲν, ἂν τὸ ποσὸν τοῦτο εἶναι ἀνάλογον πρὸς τὸ ποσόν, τοῦ ὁποῖου ζητεῖται ἡ τιμὴ ὅπως δ' ἔχει, ἂν εἶναι ἀντίστροφον.

Τὰ προβλήματα τῆς συνθέτου καλὸν εἶναι νὰ λύωνται καὶ διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα. Διὰ νὰ λύσωμεν, π. χ., τὸ ἀνωτέρω πρῶτον πρόβλημα, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς:

οἱ 120 στρ. χρειάζονται 270 ἄρτους (διὰ 3 ἡμ.).

ὁ 1 στρ. χρειάζεται $\frac{270}{120}$ » »

οἱ 160 στρ. χρειάζονται $\frac{270 \times 160}{120}$ » »

Ἔπειτα μεταβαίνομεν εἰς τὸ ποσὸν τῶν ἡμερῶν, σκεπτόμενοι ὡς ἐξῆς.

Διὰ νὰ περάσουν 3 ἡμ. χρειάζονται $\frac{270 \times 160}{120}$ ἄρτους

» 1 ἡμ. » $\frac{270 \times 160}{120 \times 3}$ ἄρτους

καὶ διὰ νὰ » 5 ἡμ. » $\frac{270 \times 160 \times 5}{120 \times 3}$ ἢ 600 ἄρτους

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ὀδοιπόρος, βαδίζων 7 ὥρας τὴν ἡμέραν, χρειάζεται 3 ἡμέρας διὰ νὰ διατρέξῃ ἀπόστασιν 105 χιλιομέτρων. Ἐὰν βαδίζῃ 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, εἰς πόσας ἡμέρας θὰ διατρέξῃ ἀπόστασιν 200 χιλιομέτρων; (5)

2) Ἠγόρασέ τις 3 δοχεῖα ἐλαίου, περιέχοντος ἐκάστου 18 ὀκ. 200 δρᾶμ. καὶ ἔδωκε δρ. 144,30· κατόπιν ἠγόρασεν ἕκ τοῦ αὐτοῦ ἐλαίου 5 δοχεῖα, περιέχοντος ἐκάστου 20 ὀκάδας. Πόσον ἔδωκε; (260 δραχ.)

3) Διὰ νὰ πατωθῇ δωμάτιόν τι διὰ σανίδων, τῶν ὁποίων τὸ μῆκος εἶναι 2,80 τοῦ μέτρου καὶ τὸ πλάτος 0,25, χρειάζονται 40 σανίδες· ἐὰν τὸ μῆκος αὐτῶν εἶναι 2 μέτρα καὶ τὸ πλάτος 0,20, πόσαι σανίδες χρειάζονται; (70)

4) Μία ὑφάντρια, διὰ νὰ ὑφάνῃ ἐν ὑφασμα, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος εἶναι 30 πῆχ. καὶ τὸ πλάτος 7 ρούπια, χρειάζεται 6 ὀκ. 50 δρᾶμ. νήματος. Πόσον νῆμα χρειάζεται, διὰ νὰ ὑφάνῃ ἕκ τοῦ ἰδίου ὑφάσματος μῆκος 40 πῆχ. καὶ πλάτος $1 \frac{1}{2}$ τοῦ πῆχεως; (14 ὀκ.)

5) 5 ἐργάται, ἐργαζόμενοι 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, ἔσκαψαν εἰς 20 ἡμέρας τάφρον ἔχουσαν μῆκος 100 μέτρα, πλάτος 0,80 τοῦ μέτρου καὶ βάθος 1,20. Εἰς πόσας ἡμέρας 6 ἐργάται, ἐργαζόμενοι 9 ὥρας τὴν ἡμέραν, θὰ σκάψωσιν ἄλλην τάφρον ἔχουσαν μῆκος 90 μέτρα, πλάτος 0,60 καὶ βάθος 1 μέτρο. ;

(8 ἡμ. 3 ὥρ. Διότι ἡ ἐργασία μὴ ἡμέρα ἀποτελεῖται ἐδῶ ἀπὸ 9 ὥρας).

6) Προαύλιον, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος εἶναι 6,80 τοῦ μέτρου καὶ τὸ πλάτος 5,50, πρόκειται νὰ στρωθῇ διὰ πλακῶν, τῶν ὁποίων τὸ μῆκος εἶναι 0,32 καὶ τὸ πλάτος 0,25 τοῦ μέτρου. Πόσαι πλάκες χρειάζονται :

$$\left(467 \frac{1}{2}\right)$$

Σημ. Ἐὰν ἐκάστη πλάξ ἔχη μῆκος 6,80 καὶ πλάτος 5,50, χρειάζεταιται μία πλάξ.

7) Ἔργον τι συνεφωνήθη νὰ ἐκτελεσθῇ εἰς 25 ἡμέρας· πρὸς τοῦτο ἐμισθώθησαν 6 ἐργάται, οἵτινες ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἐξετέλεσαν τὸ τρίτον τοῦ ἔργου. Ζητεῖται πόσοι ἐργάται πρέπει νὰ προσληφθῶσιν ἀκόμη, διὰ νὰ ἐκτελεσθῇ τὸ ἔργον ἐντὸς τῆς ὠρισμένης προθεσμίας. (2)

8) Εἰς ἓν φρούριον ἦσαν πολιορκημένοι 600 στρατιῶται, οἵτινες εἶχον τροφὰς διὰ 15 ἡμέρας, πρὸς αὐτοὺς δὲ ἦλθον 200 στρατιῶται ἐπικουρία ἄνευ τροφῶν· διὰ νὰ περάσωσι τότε περισσοτέρας ἡμέρας μὲ τὰς τροφὰς τῶν, ἠναγκάσθησαν νὰ ἐλαττώσωσι τὸ ἀρχικὸν σιτηρέσιον κατὰ τὰ $\frac{7}{16}$ αὐτοῦ. Πόσας ἡμέρας θὰ περάσωσιν ἀκόμη ; (5)

Προβλήματα τοῦ τόσον τοῖς ἑκατὸν ἢ τοῖς χιλίοις.

210. Εἰς τὸ ἐμπόριον καὶ εἰς ἄλλας χρηματικὰς ἐπιχειρήσεις ἐπεκράτησε συνήθεια νὰ ὑπολογίζεται τὸ κέρδος ἢ ἡ ζημία ποσοῦ τινος ἐπὶ τῇ βάσει 100 μονάδων τοῦ αὐτοῦ ποσοῦ. Ὑποθέσωμεν, π. χ., ὅτι ἔμπορός τις ἐκ τῆς πωλήσεως ὑφάσματός τινος, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀγοράσει 400 δραχμάς, ἐκέρδισε 36 δραχ. καὶ θέλομεν νὰ μάθωμεν πόσον ἐκέρδισεν ἐπὶ ὑφάσματος ἔχοντος ἀξίαν ἀγορᾶς 100 δρ. Ἐὰν διαιρέσωμεν τὰς 36 δραχ. διὰ 4 (διότι 4 ἑκατοντάδας περιέχουν αἱ 400 δρ.), εὐρίσκομεν ὅτι εἰς τὰς 100 δρ. ἐκέρδισεν 9 δραχμάς· λέγομεν δὲ τότε ὅτι ἐκέρδισεν 9 **τοῖς ἑκατὸν** ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς καὶ γράφομεν τοῦτο συμβολικῶς ὡς ἐξῆς 9^ο/₁₀₀.

Ἐνίοτε δὲ ὑπολογίζονται τὰ κέρδη ἢ αἱ ζημίαι καὶ ἐπὶ τῇ βάσει 1000 μονάδων· ὥστε, ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι ἐκέρδισέ τις 2 δρ. εἰς χιλίας δραχμάς, λέγομεν 2 ἐπὶ **τοῖς χιλίοις** καὶ γράφομεν 2^ο/₁₀₀₀. Τὸ τόσον τοῖς ἑκατὸν ἢ τοῖς χιλίοις λέγεται καὶ **ποσοστὸν**.

Τὰ προβλήματα ταῦτα τοῦ τόσον τοῖς ἑκατὸν ἢ τοῖς χιλίοις, ἦτοι τῶν ποσοστῶν, λύνονται, ὡς θὰ ἴδωμεν, διὰ τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

Προβλήματα.

1) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασεν ἔλαιον ἀντὶ 4150 δραχμῶν, κατόπιν μετεπώλησε τοῦτο καὶ ἐκέρδισεν 8% ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς του. Πόσας δραχμάς ἐκέρδισε τὸ ὅλον;

Κατάταξις. Εἰς 100 δρ. ἐκέρδισεν 8

» 4150 » χ

Λύοντες τὸ πρόβλημα διὰ τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν ἢ διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα εὐρίσκομεν ὅτι ἐκέρδισεν 332 δρ.

2) Ἐμπορὸς τις πωλεῖ τὰ ὑφάσματά του μὲ κέρδος 20% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς των. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ ὑφασμά τι, τὸ ὁποῖον τοῦ κοστίζει 65 δραχμάς;

Δύσις. Ἄν ἀξίζῃ 100 δραχμάς, θὰ κερδίσῃ 20 δρ. καὶ ἐπομένως θὰ τὸ πωλήσῃ 100+20 ἢ 120 δραχμάς· ἂν ἀξίζῃ 65, πόσον θὰ τὸ πωλήσῃ;

Κατάταξις. Ἄν ἀξίζῃ 100 δρ. θὰ τὸ πωλήσῃ 120

» 65 » χ.

Λύοντες τοῦτο εὐρίσκομεν 78 δρ. Ἡ καὶ ὡς ἐξῆς· εὐρίσκομεν πρῶτον τὸ κέρδος τῶν 65 δραχμῶν, τὸ ὁποῖον εἶναι 13 δραχμαί, καὶ κατόπιν προσθέτομεν αὐτὸ εἰς τὰς 65 δραχ.

3) Ἐπώλησέ τις μίαν οἰκίαν ἀντὶ 21600 δραχμῶν καὶ ἐκέρδισε 3600. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισεν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς της;

Δύσις. Ἡ ἀξία τῆς ἀγορᾶς της ἦτο 21600—3600, ἦτοι 18000 δρ. Ὡστε

εἰς τὰς 18000 δρ. ἐκέρδισε 3600

» 100 » χ

Εὐρίσκομεν ὅτι ἐκέρδισεν 20%.

211. Πᾶν ὅ,τι χρησιμεύει πρὸς συσκευὴν ἐμπορεύματός τινος (ἦτοι κιβώτιον, βαρέλιον, σάκκος κτλ.) διὰ τὴν εὐκολον καὶ ἀσφαλῆ μετακώμισίν του λέγεται *ἀπόβαρον* (κοινῶς *ντάρα*). Τὸ ὀλικὸν βάρος ἐμπορεύματος μετὰ τοῦ ἀποβάρου του λέγεται *μικτὸν* βάρος. Τὸ δὲ βάρος, τὸ ὁποῖον μένει, ὅταν ἀπὸ τὸ μικτὸν βάρος ἀφαιρέσωμεν τὸ ἀπόβαρον, λέγεται *καθαρὸν (νέτο)* βάρος.

4) Βαρέλια περιέχοντα ἔλαιον ζυγίζουσι 2950 ὀκάδας. Ἐὰν τὸ ἀπόβαρον εἶναι 12%, πόσον εἶναι τὸ καθ' ἑαυτὸν ἔλαιον;

Ἐάν τὸ μικτὸν βάρους εἶναι 100 ὀκ., τὸ καθαρόν. εἶναι 88 ὀκ.

» $\frac{2950}{4}$ ζ

Λύοντες τοῦτο εὐρίσκομεν 2596 ὀκ.

Ἡ ἀμοιβή, τὴν ὁποίαν λαμβάνει ὁ διαπραγματευόμενος τὴν ἀγορὰν ἢ πώλησιν ἐμπορευμάτων τινος μεταξύ ἀγοραστοῦ καὶ πωλητοῦ, λέγεται **μεσιτεία**, οὗτος δὲ λέγεται **μεσίτης**. Ἡ δὲ ἀμοιβή, τὴν ὁποίαν λαμβάνει ὁ ἀγοράζων ἢ πωλῶν ἐμπορεύματα κατ' ἐντολὴν καὶ διὰ λογαριασμὸν ἄλλου, λέγεται **προμήθεια**, οὗτος δὲ λέγεται **παρογγελιοδόχος**.

5) Ἠγόρασέ τις διὰ μεσίτου μίαν οἰκίαν ἀξίας 28560 δραχμῶν.

Πόσον θὰ πληρώσῃ διὰ μεσιτείαν πρὸς $\frac{3}{4}$ %;

Δι' ἀξίαν 100 δρ. θὰ πληρώσῃ $\frac{3}{4}$ ἢ 0,75 τῆς δραχμῆς

» 28560 » ζ

Εὐρίσκομεν ὅτι $\chi = 214,20$ δρ.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἐπώλησέ τις μίαν ἄμπελον ἀντὶ 2674 δραχμῶν καὶ ἐξημιώθη ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς τῆς 4,50 % . Πόσον τὴν εἶχεν ἀγοράσει;

(2800 δρ.)

2) Ἐμπορός τις πωλῆσας ἕφασμά τι ἀντὶ 143 δραχ. παρείρησεν ὅτι ἐκέρδισεν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς του 10 % . Πόσον τὸ εἶχεν ἀγοράσει;

(130 δρ.)

3) Ἠσφάλισέ τις τὴν οἰκίαν του πρὸς $1\frac{1}{2}$ % καὶ ἐπλήρωσεν ἀσφάλιστρα 42 δρ. Πόσον ὑπελογίσθη ἡ ἀξία τῆς οἰκίας του;

(28000)

4) Ἐπώλησέ τις μίαν οἰκίαν μὲ κέρδος 15% ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς τῆς καὶ ἐκέρδισε 2466 δρ. Πόσον τὴν ἐπώλησε;

(18906)

5) Σύνταγμα στρατιωτῶν, ἀσκούμενον εἰς τὴν σκοποβολὴν, ἔρριψε 24000 βολάς, ἡ δὲ ἐπιτυχία ἦτο 60% . Πόσαι βολαὶ ἐπέτυχον τοῦ σκοποῦ;

(14400)

6) Παγτόπώλης τις ἐπώλησε 16 ὀκ. βουτύρου πρὸς 12,75 τὴν ὀκᾶν καὶ ἐκέρδισε 34 δρ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισεν ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς του;

(20 %)

7) Ἐπὶ τῆς μισθοδοσίας τῶν πολιτικῶν ὑπαλλήλων κρατεῖται λόγῳ συντάξεως 9% . Πόση κράτησις θὰ γίνῃ ἐπὶ μισθοδοσίας 750 δραχμῶν;

(67,50)

8) Ἡ τιμὴ τοῦ ἐλαίου ἦτο πρὸ τινος χρόνου δρ. 2,50 ἢ ὀκᾶ, τὴν ὥρα δὲ εἶναι 6 δρ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ὑψώθη ἐπὶ τῆς ἀρχικῆς τιμῆς;

(140%)

9) Ἠγόρασέ τις σάκκους ἀνθράκων, τῶν ὁποίων τὸ βάρους ἦτο 450

δικάδες, πρὸς δρ. 15,40 τὸν στατήρα. Πόσον θὰ πληρώσῃ, ἐὰν τὸ ἀπόβαρον εἶναι 2 % ; ✓ (154,35)

10) Ἐμπορός τις ἐπώλησεν ὕφασμά τι ἀντὶ 120 δραχ. καὶ ἐξημώθη 4 % ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς του. Πόσον ἔπρεπε νὰ τὸ πωλήσῃ διὰ νὰ κερδίσῃ 5 % ; ✓ (131,25)

Περὶ τόκου.

212. Ὅταν ἐνοικιάζῃ τις τὴν οἰκίαν του εἰς ἄλλον, εἶναι δίκαιον νὰ λαμβάνῃ παρ' αὐτοῦ κέρδος τι, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται *ἐνοίκιον*· οὕτω καὶ ὅταν δανείζῃ τις χρήματα εἰς ἄλλον, εἶναι δίκαιον νὰ λαμβάνῃ παρ' αὐτοῦ κέρδος τι, ὡς ἐνοίκιον τρόπον τινὰ τῶν δανεισθέντων χρημάτων του, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται *τόκος*. Ὡστε

Τόκος λέγεται τὸ κέρδος τὸ προερχόμενον ἀπὸ τὰ δανειζόμενα χρήματα.

Ὁ τόκος τῶν δανειζομένων χρημάτων ὑπολογίζεται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν 100 δραχμῶν εἰς ἓν ἔτος (συνήθως). Ἄν, παραδ. χάριν, δανεισθῇ τις χρήματα παρ' ἄλλου, πρέπει νὰ συμφωνήσῃ μετ' αὐτοῦ, πόσον θὰ τῷ δίδῃ τόκον (ἦτοι κέρδος) εἰς κάθε 100 δραχμᾶς καὶ εἰς 1 ἔτος· καὶ ἂν ὑποθέσωμεν ὅτι συμφωνήσαν νὰ δίδῃ 8 δραχμᾶς, ὁ τόκος οὕτως τῶν 100 δραχμῶν λέγεται ἰδίως *ἐπιτόκιον*. Ὡστε

Ἐπιτόκιον λέγεται ὁ τόκος τῶν 100 δραχμῶν εἰς ἓν ἔτος. Τὸ ἐπιτόκιον σημειοῦται καὶ ἐδῶ διὰ τοῦ συμβόλου %, ἦτοι 8 %, καὶ ἀπαγγέλλεται *ὀκτὼ τοῖς ἑκατόν*.

Κεφάλαιον λέγεται τὸ ποσὸν τῶν δανειζομένων χρημάτων.

Μεταξὺ τοῦ δανείζοντος καὶ τοῦ δανειζομένου συμφωνεῖται προσέτι καὶ τὸ χρονικὸν διάστημα, μετὰ τὸ ὁποῖον ὀφείλει ὁ δανειζόμενος νὰ ἐπιστρέψῃ τὸ δανεισθὲν κεφάλαιον μετὰ τοῦ τόκου του εἰς τὸν δανειστήν. Τὸ χρονικὸν διάστημα, καθ' ὃ διαρκεῖ τὸ δάνειον, λέγεται *χρόνος*.

Ὁ τόκος εἶναι *ἄπλοῦς* ἢ *σύνθετος*. Ἄπλοῦς μὲν λέγεται, ὅταν τὸ κεφάλαιον μένῃ τὸ αὐτὸ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ δανείου. Σύνθετος δέ, ὅταν εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἔτους (συνήθως) προστίθεται εἰς τὸ κεφάλαιον καὶ ὁ τόκος αὐτοῦ, καὶ ἀποτελεῖται οὕτω νέον κεφάλαιον διὰ τὸ ἐπόμενον ἔτος.

Παραδ. χάριν, ἂν τοκίσῃ τις 100 δραχμᾶς πρὸς 10 %, εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους θὰ γίνωσιν 110, ἦτοι κεφάλαιον 100 καὶ τόκος 10· εἰς δὲ τὸ τέλος τοῦ δευτέρου ἔτους θὰ γίνωσιν 120, ἦτοι κεφάλαιον 100 καὶ τόκος 20, καὶ οὕτω καθεξῆς· τοῦτο λοιπὸν εἶναι *ἄπλοῦς τόκος*. Ἐὰν ὁμως εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἔτους προστεθῇ εἰς τὸ κεφάλαιον

καὶ ὁ τόκος, θὰ ἀποτελεσθῆ τότε νέον κεφάλαιον 110 δραχμῶν διὰ τὸ δεύτερον ἔτος, ἐπομένως εἰς τὸ τέλος τοῦ δευτέρου ἔτους θὰ γίνῃ μετὰ τοῦ τόκου του 121 δρ., ἦτοι 110 κεφάλαιον καὶ 11 τόκος, καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς. Ὡστε βλέπομεν ὅτι τοκίζεται καὶ ὁ τόκος τοῦτο λοιπὸν λέγεται **σύνθετος τόκος ἢ ἀνατοκισμός**. Ἐνταῦθα ὁμοῦς θέλομεν πραγματευθῆ μόνον περὶ τοῦ ἀπλοῦ τόκου.

Ἐπειδὴ εἰς τὰ προβλήματα τοῦ τόκου παρουσιάζονται τέσσαρα ποσά, ἦτοι τόκος, κεφάλαιον, ἐπιτόκιον καὶ χρόνος, ἐξ ὧν δίδονται τὰ τρία ποσὰ καὶ ζητεῖται τὸ τέταρτον, διὰ τοῦτο τὰ προβλήματα τοῦ τόκου διακρίνονται εἰς τέσσαρα εἶδη καὶ λύνονται διὰ τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν (ἢ διὰ τῆς ἀπλῆς, ὅταν ἓν ἐκ τῶν τριῶν δοθέντων ποσῶν μένῃ ἀμετάβλητον).

✓ 1ον) **Εὐρέσεις τοῦ τόκου.**

1) **Πρόβλημα.** Πόσον τόκον φέρουσι 525 δραχμαὶ εἰς 3 ἔτη πρὸς $8\frac{1}{6}\%$;

Κατάταξις. $\frac{100}{525}$ κεφ. $\frac{1}{3}$ ἔτ. $\frac{8}{\chi}$ τόκ.

Δύσις. Κεφάλαιον 100 δραχμῶν φέρει τόκον 8 δρ. (εἰς 1 ἔτος), διπλάσιον κεφάλαιον θὰ φέρῃ καὶ διπλάσιον τόκον (εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον). Ὡστε τὰ ποσὰ (κεφάλαιον καὶ τόκος) εἶναι ἀνάλογα, ἐπομένως ἔχομεν $8 \times \frac{525}{100}$.

Εἰς ἓν ἔτος φέρει τόκον $8 \times \frac{525}{100}$ (κεφάλ. 525 δραχ.), εἰς διπλάσια ἔτη θὰ φέρῃ καὶ διπλάσιον τόκον. Ὡστε τὰ ποσὰ (χρόνος καὶ τόκος) εἶναι ἀνάλογα, ἐπομένως ἔχομεν $8 \times \frac{525}{100} \times \frac{3}{1}$, ἦτοι 126 δρ.

Ἐκ τῆς εὐρεθείσης λύσεως $\frac{8 \times 525 \times 3}{100}$ βλέπομεν ὅτι πολλαπλασιάζεται τὸ κεφάλαιον 525 ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον 8 καὶ ἐπὶ τὸν χρόνον 3 καὶ τὸ γινόμενον διαιρεῖται διὰ 100. Ἐκ τούτου λοιπὸν συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

213. **Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν τόκον, πολλαπλασιάζομεν τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ ἐπὶ τὸν χρόνον καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 100.**

Σημ. Εἰς τὸν ἀνωτέρω κανόνα ὑποτίθεται ὅτι ὁ χρόνος ἔχει δοθῆ εἰς ἔτη· ἐὰν ὁμοῦς δοθῆ εἰς μῆνας ἢ ἡμέρας, ἢ καὶ εἰς ἔτη, μῆνας καὶ ἡμέρας, τρέπομεν πρῶτον αὐτὸν εἰς κλάσμα τοῦ ἔτους καὶ ἔπειτα ἐφαρμόζομεν τὸν ἀνωτέρω κανόνα (ἐνθυμούμενοι ὅτι τὸ ἔτος ἔχει 12 μῆνας

καὶ ἐπειδὴ ἕκαστος μὴν λογίζεται μὲ 30 ἡμέρας πρὸς εὐκολίαν τῶν πράξεων, διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἔτος λογίζεται μὲ 360 ἡμ.). Ἐν γένει δὲ ὁ χρόνος τρέπεται εἰς μονάδας τῆς τάξεως ἐκείνης, εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρεται καὶ ἡ χρονικὴ μονὰς τοῦ ἐπιτοκίου.

Ἐφαρμογαί. 2) Πόσον τόκον φέρουσι 360 δραχμαὶ εἰς 4 μῆνας πρὸς 10% ;

Λύσις. Τρέπομεν πρῶτον τοὺς 4 μῆνας εἰς κλάσμα τοῦ ἔτους, ἦτοι $\frac{4}{12}$ τοῦ ἔτους, ἔπειτα ἐφαρμόζοντες τὸν ἀνωτέρω κανόνα ἔχομεν

$$\frac{360 \times 10 \times \frac{4}{12}}{100} = \frac{360 \times 10 \times \frac{4}{12} \times 12}{100 \times 12} \quad (\text{ἐδάφ. 141}) =$$

$$\frac{360 \times 10 \times 4}{100 \times 12} = 12 \text{ δραχ}$$

3) Πόσον τόκον φέρουσι 3000 δραχμαὶ εἰς 2 ἔτη 3 μῆνας πρὸς 7.50% ;

Λύσις. Ἐπειδὴ εἶναι 2 ἔτη 3 μ. = $\frac{27}{12}$ τοῦ ἔτους, ἔπεται

$$\frac{3000 \times 7,50 \times \frac{27}{12}}{100} = \frac{3000 \times 7,50 \times 27}{100 \times 12} = 506,25.$$

4) Πόσον τόκον φέρουσιν 800 δρ. εἰς 3 μῆν. 15 ἡμ. πρὸς 9% ;

Λύσις. Ἐπειδὴ εἶναι 3 μ. 15 ἡμ. = $\frac{105}{360}$ τοῦ ἔτους, ἔπεται

$$\frac{800 \times 9 \times \frac{105}{360}}{100} = \frac{800 \times 9 \times 105}{100 \times 360} = 21 \text{ δρ.}$$

Εὗρεσις τοῦ τόκου διὰ τῶν τοκαρίθμων.

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω εὐρεθείσης λύσεως $\frac{800 \times 9 \times 105}{100 \times 360}$ ἢ $\frac{800 \times 9 \times 105}{36000}$ ἢ καὶ $\frac{800 \times 105}{4000}$ (διηρέσαμεν τοὺς ὅρους διὰ τοῦ ἐπιτοκίου 9) βλέπομεν ὅτι πολλαπλασιάζεται τὸ κεφάλαιον 800 ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν 105 καὶ τὸ γινόμενον διαιρεῖται διὰ 4000, ἦτοι διὰ τοῦ πηλίκου 36000 : 9. Τὸ γινόμενον τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν λέγεται **τοκαρίθμος**, τὸ δὲ πηλίκον τοῦ ἀριθμοῦ 36000 διὰ τοῦ δοθέντος ἐπιτοκίου λέγεται **σταθερὸς διαιρέτης**. Ἐκ τούτου συνάγομεν καὶ τὸν ἑξῆς σύντομον κανόνα πρὸς εὗρεσιν τοῦ τόκου, ὅταν ὁ χρόνος εἶναι δεδομένος εἰς ἡμέρας.

214. *Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν τόκον, διαιροῦμεν τὸν τοκάριθμον διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου.*

Ἐφαρμογή. Πόσον τόκον φέρουσι 1800 δραχ. εἰς 1 μ. 20 ἡμ. πρὸς 6 %;

Λύσις. Ἐπειδὴ εἶναι 1 μ. 20 ἡμ. = 50 ἡμέραι, ὁ δὲ σταθερὸς διαιρέτης εἶναι 36000 : 6, ἤτοι 6000, ἔπεται $\frac{1800 \times 50}{6000}$, ἤτοι 15 δρ.

Σημ. Ἐὰν συμβῆ ὁ ἀριθμὸς 36000 νὰ μὴ εἶναι διαιρητὸς διὰ τοῦ δοθέντος ἐπιτοκίου, ἐφαρμόζομεν τότε τὸν κανόνα τοῦ ἔδαφίου 213.

Πρόβλημα. Ἐτόκισέ τις πρὸς 9 % τὰ ἐξῆς κεφάλαια: 5000 διὰ 3 μῆνας καὶ 3000 διὰ 2 μ. 10 ἡμ. Πόσον τόκον θὰ λάβῃ τὸ ὅλον;

Λύσις. Κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα πρέπει νὰ διαιρέσωμεν ἕκαστον τοκάριθμον διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου καὶ ἔπειτα νὰ προσθέσωμεν τὰ πηλίκα. Ἄλλὰ τὸ ἴδιον εἶναι, ἂν προσθέσωμεν πρῶτον τοὺς τοκάριθμους καὶ ἔπειτα διαιρέσωμεν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου, ὅστις ἔδῳ εἶναι ὁ 4000 (διότι εἶναι 36000 : 9 = 4000). Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς:

κεφάλαια ἡμ.	τοκάριθμοι
5000 × 90	= 450000
3000 × 70	= <u>210000</u>

ἄθρ. 660000 : 4000 = 165 τόκος.

Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

215. *Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν τόκον πολλῶν κεφαλαίων πρὸς τὸ αὐτὸ ἐπιτόκιον, προσθέτομεν τοὺς τοκάριθμους αὐτῶν καὶ τὸ ἄθροισμα διαιροῦμεν διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου.*

Νοερὰ ἰσκήσεις.

1) Πόσον τόκον φέρουσιν 600 δραχμαὶ εἰς 1 μῆνα πρὸς 12 %;

Λύσις.
$$\frac{600 \times 12 \times \frac{1}{12}}{100} = \frac{600}{100} = 6,$$

ἤτοι ὁ τόκος εἶναι ἴσος μὲ τὸ ἑκατοστὸν τοῦ κεφαλαίου. Ἐκ τούτου συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

Διὰ νὰ εὐρωμεν νοερῶς πόσον τόκον φέρει κεφάλαιόν τι εἰς 1 μῆνα πρὸς 12 %, διαιροῦμεν αὐτὸ διὰ 100 (τοῦτο γίνεται, ἂν χωρίσωμεν νοερῶς ἀπὸ τὰ δεξιὰ του δύο ψηφία).

Εὐρεθέντος τοῦ τόκου εἰς 1 μῆνα, εὐρίσκομεν νοερῶς καὶ τὸν τόκον εἰς περισσοτέρους μῆνας διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ἀρκεῖ μόνον νὰ μὴ ἔχη τὸ κεφάλαιον πολλὰ σημαντικὰ ψηφία. Παραδ. χάριν·

2) Πόσον τόκον φέρουσιν 900 δρ. εἰς 8 μῆνας πρὸς 12 % ;

Λύσις. 9×8 , ἤτοι 72 δρ. (διότι εἰς ἕνα μῆνα φέρει τόκον $900 : 100$, ἤτοι 9 δρ.).

3) Πόσον τόκον φέρουσιν 640 δρ. εἰς 7 μῆνας πρὸς 12 % ;

Λύσις. $6,40 \times 7$, ἤτοι 44,80 δρ. (νοερῶς πολλαπλασιάζομεν πρῶτον τὰς 6 δρ. ἐπὶ 7 καὶ κατόπιν τὰ 40 λεπτά).

Ἔχοντες ὡς βᾶσιν τὸ ἐπιτόκιον 12 δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὸν τόκον καὶ μὲ ἄλλα τινὰ ἐπιτόκια. Παραδ. χάριν

4) Πόσον τόκον φέρουσιν 600 δρ. εἰς 5 μῆνας πρὸς 4 % ;

Λύσις. Πρὸς 12 % φέρουσι τόκον 30 δραχμάς, ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ 4 εἶναι τὸ τρίτον τοῦ 12, διὰ τοῦτο θὰ λάβωμεν καὶ τὸ τρίτον τοῦ 30, ἤτοι 10 δρ.

5) Πόσον τόκον φέρουσι 2000 δρ. εἰς 3 μ. πρὸς 9 % ;

Λύσις. Πρὸς 12 % φέρουσι τόκον 60 δραχμάς, ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ 9 ἀναλύεται εἰς 6 (ἥμισυ τοῦ 12) καὶ εἰς 3 (ἥμισυ τοῦ 6), διὰ τοῦτο θὰ λάβωμεν τὸ ἥμισυ τοῦ 60, ἤτοι 30, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ 30, ἤτοι 15, καὶ θὰ προσθέσωμεν ταῦτα. Ὡστε ὁ τόκος τῶν 2000 δραχ. εἰς 3 μ. πρὸς 9 % εἶναι 45 δρ.

6) Πόσον τόκον φέρουσιν 700 δρ. εἰς 8 μ. πρὸς 6 % ;

7) Πόσον τόκον φέρουσιν 8000 δρ. εἰς 5 μ. πρὸς 3 % ;

Ὅταν ὁμως ζητῆται ὁ ἐτήσιος τόκος κεφαλαίου τινός, μὴ ἔχοντος πολλὰ σημαντικὰ ψηφία, εὐρίσκομεν τοῦτον νοερῶς ὡς ἑξῆς. **Πολλαπλασιάζομεν τὸ ἑκατοστὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον.** Παραδ. χάριν

Ὁ τόκος τῶν 3000 δρ. δι' ἓν ἔτος πρὸς 8 % εἶναι 30×8 , ἤτοι 240 δραχ.

Ὁ ἐτήσιος τόκος τῶν 4000 δρ. πρὸς $4 \frac{1}{2}$ % εἶναι $40 \times 4 \frac{1}{2}$, ἤτοι 180 δραχμαί.

2ον) Εὗρεσις τοῦ κεφαλαίου.

Πρόβλημα. Ποῖον κεφάλαιον ἐτοκίσθη ἐπὶ 3 ἔτη πρὸς 10 % καὶ ἔφερε τόκον 84 δραχμάς ;

Κατάταξις.

100 κεφ.	$\frac{1 \text{ ἔτ.}}{3}$	$\frac{10 \text{ τόκ.}}{84}$
χ		

Λύσις. Ἐπειδὴ τὸ κεφάλαιον καὶ ὁ τόκος εἶναι ποσὰ ἀνάλογα, ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω, διὰ τοῦτο ἔχομεν $100 \times \frac{84}{10}$.

Εἰς 1 ἔτος πρέπει νὰ τοκίσωμεν κεφάλαιον $100 \times \frac{84}{10}$ (διὰ νὰ λάβω-

μεν τόκον 84 δρ.), εις διπλάσια ἔτη πρέπει νὰ τοκίσωμεν τὸ ἥμισυ τοῦ κεφαλαίου (διὰ νὰ λάβωμεν τὸν ἴδιον τόκον). Ὡστε τὰ ποσὰ (χρόνος καὶ κεφάλαιον) εἶναι ἀντίστροφα, ἐπομένως ἔχομεν $100 \times \frac{84}{10} \times \frac{1}{3}$, ἥτοι 280 δρ.

Ἐκ τῆς εὐρεθείσης λύσεως $\frac{100 \times 84}{10 \times 3}$ βλέπομεν ὅτι πολλαπλασιάζε-
ται ὁ τόκος 84 ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον διαιρεῖται διὰ τοῦ γινομένου
τοῦ ἐπιτοκίου 10 καὶ τοῦ χρόνου 3. Ἐκ τούτου λοιπὸν συνάγομεν τὸν
ἑξῆς κανόνα.

216. *Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ κεφάλαιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν
τόκον ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου
τῶν δύο ἄλλων ποσῶν, ἥτοι τοῦ ἐπιτοκίου καὶ τοῦ χρόνου.*

Ἐφαρμογή. Ποῖον κεφάλαιον ἐτοκίσθη ἐπὶ 1 ἔτος 2 μῆνας πρὸς
8% καὶ ἔφερε τόκον 42 δραχμὰς;

Λύσις. Κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα ἔχομεν

$$\frac{42 \times 100}{8 \times \frac{14}{12}} = \frac{42 \times 100 \times 12}{8 \times \frac{14}{12} \times 12} = \frac{42 \times 100 \times 12}{8 \times 14} = 450 \text{ δραχ.}$$

Νοερὰ ἀσκήσεις. Ὅταν δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν νοερῶς τὸν
ἐτήσιον τόκον κεφαλαίου τινὸς διὰ τοῦ ἐπιτοκίου, εὐρίσκομεν τὸ κεφά-
λαιον ὡς ἑξῆς.

*Διαιροῦμεν τὸν ἐτήσιον τόκον διὰ τοῦ ἐπιτοκίου καὶ τὸ πηλί-
κον πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 100.*

Παραδ. χάριν. 1) Ὁ ἐτήσιος τόκος κεφαλαίου τινὸς εἶναι 1800 δρ.
Ποῖον εἶναι τὸ κεφάλαιον πρὸς 6%;

Λύσις. Τὸ πηλίκον τοῦ 1800 διὰ 6 εἶναι 300, ἐπομένως τὸ κεφά-
λαιον εἶναι 300×100 , ἥτοι 30000 δρ.

2) Ἐχει τις καταθέσει εἰς μίαν τράπεζαν κεφάλαιόν τι πρὸς 4%
καὶ λαμβάνει ἐτήσιον τόκον 600 δρ. Ποῖον εἶναι τὸ κεφάλαιον τοῦτο;

3) Λαμβάνει τις ἐνοίκιον κατὰ μῆνα ἕκ τῆς οἰκίας του 100 δρ. Πό-
σον πρέπει νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ἀξία τῆς οἰκίας του πρὸς 6%;

3ον) Εὐρέσεις τοῦ ἐπιτοκίου.

Πρόβλημα. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐτοκίσθη κεφάλαιον 5370 δραχ-
μῶν καὶ ἔφερον εἰς δύο ἔτη τόκον 429,60 δρ.;

Κατάταξις. $\frac{5370 \text{ κεφ.}}{100} \times \frac{2 \text{ ἔτη}}{1} \times \frac{429.60}{\chi} \text{ τόκ.}$

Λύσις. Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ κεφάλαιον καὶ τόκος, χρόνος καὶ τόκος
εἶναι ἀνάλογα, ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω, διὰ τοῦτο ἔχομεν

$$\chi = 429,60 \times \frac{100}{5370} \times \frac{1}{2}, \text{ ἥτοι } 4\%.$$

Ἐκ τῆς εὐρεθείσης λύσεως τοῦ προβλήματος βλέπομεν ὅτι πολλαπλασιάζεται ὁ τόκος 429,60 ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον διαιρεῖται διὰ τοῦ γινομένου τοῦ κεφαλαίου 5370 καὶ τοῦ χρόνου 2. Ἐκ τούτου λοιπὸν συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

217. *Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ ἐπιτόκιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν δύο ἄλλων ποσῶν, ἦτοι τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ χρόνου.*

Ἐφαρμογή. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἔτοκισθη κεφάλαιον 2600 δρ., τὸ ὁποῖον ἔφερεν εἰς 7 μῆνας τόκον 68,25 δρ. ;

Λύσις. Κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα ἔχομεν

$$\frac{68,25 \times 100}{2600 \times \frac{7}{12}} = \frac{68,25 \times 100 \times 12}{2600 \times 7} = 4,50 \%$$

4ον) Εὐρεσις τοῦ χρόνου.

Πρόβλημα. Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 900 δραχμῶν, τοκίζομενον πρὸς 4,50 % , θὰ φέρῃ τόκον 128,25 δραχ. ;

Κατάταξις.

$\frac{100}{900}$ κεφ.	1 ἔτ.	$\frac{4,50}{128,25}$ τόκ.
	χ	

Λύσις. Ἐπειδὴ τὰ μὲν ποσὰ κεφάλαιον καὶ χρόνος εἶναι ἀντίστροφα, τὰ δὲ ποσὰ τόκος καὶ χρόνος εἶναι ἀνάλογα, διὰ τοῦτο ἔχομεν

$$\chi = 1 \times \frac{100}{900} \times \frac{128,25}{4,50}, \text{ ἦτοι } 3 \text{ ἔτη } 2 \text{ μῆνας.}$$

Ἐκ τῆς εὐρεθείσης πάλιν λύσεως τοῦ προβλήματος συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

218. *Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν χρόνον, πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν δύο ἄλλων ποσῶν, ἦτοι τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ ἐπιτοκίου.*

Ἐφαρμογή. Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 1200 δραχμῶν, τοκίζομενον πρὸς 9% , φέρει τόκον 48 δραχμάς ;

Λύσις. Κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα ἔχομεν $\frac{48 \times 100}{1200 \times 9} = 5 \mu. 10 \eta\mu.$

Παρατήρησις. Οἱ ἀνωτέρω εὐρεθέντες τέσσαρες κανόνες δύνανται νὰ συγχωνευθῶσιν εἰς τὸν ἑξῆς ἓνα μόνον.

219. *Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν τόκον, πολλαπλασιάζομεν τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ ἐπὶ τὸν χρόνον καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ 100. Διὰ νὰ εὐρωμεν δὲ οἰονδήποτε ἄλλο ποσὸν (ἦτοι τὸ κεφάλαιον ἢ τὸ ἐπιτόκιον ἢ τὸν χρόνον), πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν δύο ἄλλων δεδομένων ποσῶν.*

Σημ. Ἐνθυμούμενοι νὰ τρέπομεν τὸν χρόνον εἰς κλάσμα τοῦ ἔτους, εἰς δὲν ἔχη δοθῇ εἰς ἔτη.

Ἐὰν τὰ ἀνωτέρω ποσά, ἦτοι Τόκον, Κεφάλαιον, Ἐπιτόκιον καὶ Χρόνον, παραστήσωμεν συντόμως διὰ τῶν ἀρχικῶν αὐτῶν γραμμάτων T, K, E, X, ἔχομεν κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα τοὺς ἐξῆς τύπους πρὸς εὐρεσιν αὐτῶν·

$$T = \frac{K \times X \times E}{100}, \quad K = \frac{T \times 100}{X \times E}, \quad E = \frac{T \times 100}{K \times X}, \quad X = \frac{T \times 100}{K \times E}$$

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

- 1) Πόσον τόκον φέρουσι 2400 δρ. εἰς 1 ἔτος 3 μῆν. 6 ἡμ. πρὸς $6 \frac{1}{4} \%$; (190 δρ.)
- 2) Ἐπὶ πόσον χρόνον ἐτοκίσθη κεφάλαιον 1500 δρ. πρὸς 9% καὶ ἔφερε τόκον 26,25 ο]ο; (2 μῆν. 10 ἡμ.)
- 3) Ποῖον κεφάλαιον ἐτοκίσθη ἐπὶ 1 ἔτ. 3 μῆν. πρὸς $7,50 \%$ καὶ ἔφερε τόκον 56,25 δρ.; (600 δρ.)
- 4) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐτοκίσθη κεφάλαιον 3000 δρ. καὶ ἔφεραν εἰς 1 ἔτ. 1 μ. 10 ἡμ. τόκον 200 δραχμάς; (6%)
- 5) Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 400 δραχ. τοκισόμενον πρὸς 8% διπλασιάζεται;

Δύσις. Διὰ νὰ διπλασιασθῇ τὸ κεφάλαιον, πρέπει νὰ φέρῃ τόκον ἴσον μὲ τὸ κεφάλαιον, ἦτοι 400 δρ. Κατόπιν εὐρίσκομεν διὰ τοῦ κανόνος ὅτι ὁ χρόνος εἶναι 12 ἔτη 6 μ. Ἐὰν θέλωμεν νὰ τριπλασιασθῇ τὸ κεφάλαιον, πρέπει νὰ φέρῃ τόκον διπλάσιον τοῦ κεφαλαίου, ἦτοι 800 δραχ. καὶ οὕτω καθεξῆς.

Σημ. Ὅταν κεφάλαιον δὲν ἔχη δοθῆ, λαμβάνομεν οἰονδήποτε.

- 6) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκισθῇ κεφάλαιόν τι, διὰ νὰ διπλασιασθῇ μετὰ 10 ἔτη; (10%)
 - 7) Ἐδανείσθη τις 2700 δρ. τὴν 25 Μαΐου τοῦ ἔτους 1920 πρὸς 10% καὶ ἐπλήρωσε τὸ χρέος του τὴν 5ην Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1921. Πόσον ἐπλήρωσε διὰ κεφάλαιον καὶ τόκον ὁμοῦ; (3000 δρ.)
 - 8) Ἐδανείσθη τις 1200 δραχ. πρὸς 9% καὶ ἐπλήρωσε τὴν 2 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1922 διὰ κεφάλαιον καὶ τόκον ὁμοῦ 1386 δρ. Πότε ἔδανείσθη τὸ κεφάλαιον τοῦτο;
- Δύσις.** Ὁ τόκος εἶναι $1386 - 1200$, ἦτοι 186 δρ. Κατόπιν εὐρίσκομεν τὸν χρόνον τῆς διαρκείας τοῦ δανείου, τὸν ὁποῖον ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὴν χρονολογίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐπλήρωσε τὸ χρέος του, καὶ εὐρίσκομεν ὅτι ἔδανείσθη τὸ κεφάλαιον κατὰ τὸ ἔτος 1920 Μαΐου 12.
- 9) Ἠγόρασέ τις μίαν οἰκίαν ἀντὶ 20000 δραχμῶν καὶ ἐξώδευσε διὰ τὴν ἐπισκευὴν τῆς 4000 δρ. Πόσον πρέπει νὰ ἐνοικιάσῃ αὐτὴν κατὰ μῆνα, διὰ νὰ κερδίῃ ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς $6 \frac{1}{4} \%$;

Δύσις. Ζητεῖται ὁ τόκος τῶν 24000 δρ. εἰς 1 μ., ὅστις εἶναι 125 δρ.

10) Πατήρ τις κατέθεσεν εἰς μίαν τράπεζαν 6000 δρ. πρὸς 6 % ὅτε ἐγεννήθη ἡ θυγάτηρ του, ὅπως χρησιμεύσῃ τὸ κεφάλαιον τοῦτο μετὰ τῶν ἀπλῶν τόκων του ὡς μέλλουσα προἴξ αὐτῆς. Ἡ θυγάτηρ κατὰ τὸν γάμον τῆς ἔλαβεν ἐκ τῆς τράπεζης διὰ κεφάλαιον καὶ τόκου 13360 δρ. Εἰς ποίαν ἡλικίαν ἐνυμφεύθη ;

Δύσις. Ζητεῖται ὁ χρόνος, κατὰ τὸν ὁποῖον αἱ 6000 δρ. ἔφερον τόκον 13360—6000 ἢ 7360 δρ. Εὐρίσκεται ὅτι ἐνυμφεύθη εἰς ἡλικίαν 20 ἐτῶν 5 μ. 10 ἡμ.

11) Ποῖον κεφάλαιον πρέπει νὰ τοκίσῃ τις ἐπὶ 5 μῆνας 10 ἡμέρας πρὸς 9 %, διὰ νὰ λάβῃ τόσον τόκον, ὅσον φέρουν 4000 δρ. εἰς 6 μῆνας πρὸς 10 % ; (5000)

12) Ἐδανείσθη τις 2000 δρ. διὰ 9 μῆνας πρὸς 10 %, ἀλλὰ μὲ τὴν συμφωνίαν νὰ προπληρώσῃ τὸν τόκον. Ζητεῖται πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἔδανείσθη πραγματικῶς.

Δύσις. Ὁ τόκος εἶναι 150, ἐπομένως ἔλαβε 2000—150 ἢ 1850 δρ. Διὰ τὰς 1850 δρ. ἐπλήρωσε τόκον 150 διὰ 9 μῆνας, ἐπομένως τὸ ἐπιτόκιον εὐρίσκεται ὅτι εἶναι 10,81 %.

13) Ἐδανείσθη τις 1500 δρ. δι' ἓν ἔτος πρὸς 10 %, ἀλλὰ μετὰ 8 μῆνας ἔδωκεν ἀπέναντι τοῦ χρέους του 900 δρ. Πόσον χρεωστεῖ ἀκόμη νὰ δώσῃ εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους ; (720)

14) Ἡγόρασέ τις χωράφιον ἀντὶ 6000 δραχμῶν καὶ μετὰ 2 ἔτη 3 μῆνας ἐπώλησεν αὐτὸ μὲ κέρδος 10 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς του. Πόσον τὸ ἐπώλησε ;

Δύσις. Ἐκ τῆς πωλήσεως ἔλαβε τὰς 6000 δρ. καὶ τὸν τόκον αὐτῶν εἰς 2 ἔτη 3 μ. πρὸς 10 %, ὅστις εἶναι 1350 δραχμαί, ὥστε τὸ ἐπώλησεν 6000+1350, ἥτοι 7350 δρ.

15) Ἐδωκέ τις 3900 δρ. διὰ τὴν ἀγορὰν ἐνὸς ἐμπορεύματος, πρὸς δὲ καὶ 2 % διὰ μεσιτείαν· μετὰ 2 μῆνας ἐπώλησεν αὐτὸ μὲ κέρδος 20 %. Πόσον τὸ ἐπώλησε ; (4110,60).

16) Ἐμπορός τις ἠγόρασε 3000 ὀκ. ἔλαιον πρὸς δρ. 2,50 τὴν ὀκᾶν καὶ μετὰ 2 μῆνας ἐπώλησεν αὐτὸ πρὸς 2,60 τὴν ὀκᾶν. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισε ;

Δύσις. Ἀπὸ ἐκάστην ὀκᾶν ἐκέρδισεν 0,10 τῆς δραχμῆς· ταῦτα εἶναι ὁ τόκος τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς, ἥτοι τῶν 2,50 εἰς 2 μῆν., ἐπομένως τὸ ἐπιτόκιον εὐρίσκεται ὅτι εἶναι 24 %. Ἡ [καὶ ὡς ἐξῆς· εὐρίσκομεν ὅτι διὰ τὰς 3000 ὀκ. ἔδωκε 7500 δρ., ἐκ δὲ τῆς πωλήσεως αὐτῶν ἔλαβεν 7800 δρ., ὥστε ἐκέρδισε 300 δρ. Αὗται εἶναι ὁ τόκος τῶν 7500 δραχμῶν.]

εἰς 2 μῆνας, ἐπομένως τὸ ἐπιτόκιον εὐρίσκεται πάλιν ὅτι εἶναι 24 %.

17) Ἐχει τις τοκίσει εἰς τινὰ 2400 δρ. πρὸς 8 % καὶ εἰς ἄλλον 1600 πρὸς 9 %. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον πρέπει νὰ τοκίσῃ τὰ κεφάλαια ταῦτα εἰς τρίτον πρόσωπον, διὰ νὰ λαμβάνῃ καθ' ἑξαμηνίαν τὸν αὐτὸν τόκον ; (8,40 %).

18) Δύο ἄνθρωποι ἐτόκισαν τὸ αὐτὸ κεφάλαιον, ἦτοι 15000 δρ. ἕκαστος· ἀλλ' ὁ μὲν πρῶτος ἐτόκισεν αὐτὸ πρὸς 8 %, ὁ δὲ δεύτερος ἐτόκισε τὰ μὲν $\frac{3}{5}$ τοῦ κεφαλαίου του πρὸς 7 %, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πρὸς 9 %. Ποῖος κερδίζει ἐτησίως περισσότερον τοῦ ἄλλου καὶ πόσον ;

(ὁ α' 30 δρ.)

19) Εἶχέ τις 45000 δραχμάς· τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτῶν ἐτόκισεν εἰς τινὰ διὰ 8 μῆνας πρὸς 9 % τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἐτόκισεν εἰς ἄλλον καὶ μετὰ 4 μῆν. 20 ἡμ. ἔλαβε παρ' αὐτοῦ διὰ κεφάλαιον καὶ τόκου 28050 δρ. Ζητεῖται πόσον τόκον ἔλαβεν ἐκ τοῦ πρώτου κεφαλαίου καὶ πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐτόκισε τὸ δεύτερον κεφάλαιον. (1080 καὶ 10 %).

20) Χωρικός τις ἐπώλησε σῖτον πρὸς 75 λεπτά τὴν ὁκᾶν· κατόπιν ἐτόκισε τὰ $\frac{2}{3}$ τῶν ὄσων ἔλαβε χρημάτων πρὸς 10 % καὶ μετὰ 1 ἔτος 5 μ. ἔλαβε τόκον 255 δρ. Πόσον σῖτον ἐπώλησε ;

Δύσις. Τὸ τοκισθὲν κεφάλαιον εὐρίσκομεν ὅτι εἶναι 1800 δρ.

Ἐφοῦ τὰ $\frac{2}{3}$ τῶν ὄσων ἔλαβε χρήματα εἶναι 1800 δρ. τὸ $\frac{1}{3}$ εἶναι $\frac{1800}{2}$ καὶ τὰ $\frac{3}{3}$ εἶναι $\frac{1800 \times 3}{2}$ ἢ 2700 δρ. Ὅσας λοιπὸν φορὰς τὰ 75 λεπτά χωροῦν εἰς τὰς 2700 δρ. ἢ 270000 λεπτά, τόσας ὁκάδας ἐπώλησεν, ἦτοι 270000 : 75 ἢ 3600 ὁκ.

21) Ἦγόρασέ τις μίαν οἰκίαν ἀντὶ 30000 δραχμῶν καὶ ἐξώδευσε δι' ἐπισκευὴν τις 2000 δραχμάς· κατόπιν ἐνοίκιασεν αὐτὴν κατὰ μῆνα ἀντὶ 200 δραχμῶν, ἔχει ὅμως ἔξοδα τὸ ἔτος δι' ἀσφάλειαν, φόρον οἰκοδομῶν κτλ. 400 δρ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἔχει καθαρὸν εἰσόδημα ;

Δύσις. Τὸ ἔτος λαμβάνει ἐνοίκιον 2400 δρ., ἐπομένως ἔχει καθαρὸν εἰσόδημα 2400—400, ἦτοι 2000 δρ. Αὗται εἶναι ὁ ἐτήσιος τόκος τῶν 32000 δρ., ἐπομένως τὸ ἐπιτόκιον εὐρίσκεται ὅτι εἶναι 6,25 %.

22) Λαμβάνει τις ἐνοίκιον ἐκ τῆς οἰκίας του κατὰ μῆνα ἐκ μὲν τοῦ ἄνω πατώματος 120 δραχμάς, ἐκ δὲ τοῦ κάτω 70, ἔχει ὅμως ἔξοδα τὸ ἔτος δι' αὐτὴν 390 δρ. Πόσον πρέπει νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ἀξία τῆς οἰκίας του πρὸς $6\frac{3}{4}$ % ;

Λύσις. Τὸ καθαρὸν ἐτήσιον εἰσόδημα εἶναι 1890 δραγμαί, ἐπομένως τὸ ζητούμενον κεφάλαιον εἶναι 28000 δρ.

23) Ποῖον εἶναι προτιμότερον, νὰ ἀγοράσῃ τις μίαν οἰκίαν ἀξίας 16000 δραμμῶν, ἐκ τῆς ὁποίας θὰ λαμβάνῃ κατὰ μῆνα ἐνοίκιον 120 δραμμάς, ἀλλὰ θὰ ἔχη ἔξοδα τὸ ἔτος 200 δραμμάς, ἢ νὰ καταθέσῃ τὰ χρήματα ταῦτα εἰς μίαν τράπεζαν πρὸς $4\frac{1}{2}\%$;

(Τὸ πρῶτον· διότι θὰ ἔχη κέρδος τὸ ἔτος 520 δρ. περισσότερον).

24) Ἐδάνεισέ τις κεφάλαιόν τι πρὸς 9% καὶ μετὰ 10 μῆνας ἔλαβε διὰ κεφάλαιον καὶ τόκον ὁμοῦ 1032 δρ. Πόσον ἦτο τὸ δανεισθὲν κεφάλαιον καὶ πόσος ὁ τόκος;

Λύσις. Ὑποθέτομεν ὅτι τὸ δανεισθὲν κεφάλαιον ἦτο 100 δραγμαί, ὁ τόκος αὐτῶν εἰς 10 μ. πρὸς 9% εἶναι 7,50 (1). Ὡστε μετὰ 10 μ. θὰ λάβῃ κεφάλαιον καὶ τόκον ὁμοῦ 107,50.

Ἄν λοιπὸν λάβῃ 107,50, τὸ κεφάλαιον ἦτο 100

» 1032 » χ

Λύοντες τοῦτο διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα ἢ διὰ τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν εὐρίσκομεν ὅτι τὸ κεφάλαιον ἦτο 960 δρ. καὶ ἐπομένως ὁ τόκος ἦτο 1032—960, ἦτοι 72 δρ.

25) Ἐπώλησέ τις χωράφιον μετὰ 1 ἔτος 3 μ. ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς του μὲ κέρδος 15% καὶ ἔλαβε 4275 δρ. Πόσον τὸ εἶχεν ἀγοράσει;

Λύσις. Ὅμοία μὲ τὴν ἀνωτέρω. Ἦτοι ὑποθέτομεν ὅτι τὸ ἠγόρασεν 100 δρ. καὶ ἐπομένως τὸ ἐπώλησεν 118,75 (18,75 εἶναι ὁ τόκος τῶν 100 δρ.) ἂν τὸ πωλήσῃ 4275, πόσον τὸ ἠγόρασεν; Εὐρίσκομεν ὅτι τὸ ἠγόρασε 3600 δρ.

26) Ἐμπορὸς τις ἠναγκάσθη νὰ πωλήσῃ ὕφασμά τι μετὰ 3 μ. ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς του μὲ ζημίαν $8,80\%$ ἔνεκα μικρᾶς βλάβης καὶ ἔλαβεν 24,45 δρ. Πόσον τοῦ ἐκόστιζεν; (25 δρ.)

Περὶ ὕφαιρέσεως.

220. Εἶπομεν εἰς τὰ περὶ τόκου ὅτι, ὅταν δανείζῃ τις χρήματα εἰς ἄλλον, δανεῖζει συνήθως αὐτὰ δι' ὄρισμένον χρόνον καὶ μὲ ὄρισμένον ἐπιτόκιον, συμπεφωνημένα μεταξὺ τοῦ δανείζοντος καὶ τοῦ δανειζομένου. Τὸ αὐτὸ δὲ συμβαίνει καὶ εἰς τὸ ἐμπόριον, ὅταν ὁ ἀγοραστὴς δὲν πληρῶνῃ ἀμέσως τὴν ἀξίαν τῶν ἀγορασθέντων ἐμπορευμάτων.

Ὁ δανεῖζων χρήματα εἰς ἄλλον ἢ δίδων ἐμπορεύματα βασιζέται κυρίως εἰς τὴν ἐντιμότητα τοῦ δανειζομένου. Χάριν ὅμως περισσοτέρας

(1) Δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ὡς κεφάλαιον καὶ οἰονδήποτε ἄλλο ποσόν. Προτιμῶμεν ὅμως τὸν 100, διότι συντομότερον εὐρίσκομεν τὸν τόκον αὐτοῦ ἢ ἄλλου ποσοῦ.

ἀσφαλείας ὑπόσχεται ὁ δανειζόμενος ἐγγράφως ἐπὶ χαρτοσήμου νὰ πληρώσῃ εἰς τὸν δανειστήν του τὸ δανειζόμενον ποσὸν μετὰ τοῦ τόκου του (συνήθως) ἐντὸς ὀρισμένης προθεσμίας. Τὸ ἐγγραφοῦν δὲ τοῦτο λέγεται **γραμμάτιον** (¹). Ὑποθέσωμεν, παραδ. χάριν, ὅτι ὁ κ. Ἀθανασίου ἐδάνεισεν εἰς τὸν κ. Βασιλείου τὴν 20ὴν Μαρτίου 1921 δρ. 800 πρὸς 10% πληρωτέας μετὰ 3 μῆνας. Κατὰ πρῶτον εὐρίσκεται ὁ τόκος, ὅστις εἶναι 20 δραχμαί, καὶ προστίθεται οὗτος εἰς τὸ δανεισθὲν κεφάλαιον 800 δραχμῶν· κατόπιν ἐπὶ ἀναλόγου χαρτοσήμου, ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ νόμου, συντάσσεται τὸ ἐξῆς περιῖπου γραμματίου.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20 Μαρτίου 1921. Διὰ δρ. 820.

Μετὰ τρεῖς μῆνας ἀπὸ σήμερον ὑπόσχομαι νὰ πληρώσω εἰς τὸν κ. Ἀθανασίου ἢ εἰς τὴν διαταγὴν αὐτοῦ δραχμὰς ὀκτακοσίας εἴκοσιν, ἃς ἔλαβον παρ' αὐτοῦ ὡς δάνειον.

(Ὑπογραφή) **Βασιλείου.**

Ὁ μὲν δανειζόμενος ἢ ὀφειλέτης θὰ λάβῃ τὰς 800 δραχμὰς, ὁ δὲ δανειστής τὸ γραμματίον, τὸ ὁποῖον ἔνεκα τῶν λέξεων **εἰς τὴν διαταγὴν** λέγεται καὶ **γραμμάτιον εἰς διαταγὴν**.

Οἱ κάτοχοι ὁμοῦ τοιοῦτων γραμματίων ἔνεκα ἀνάγκης χρημάτων πωλοῦσι πολλάκις ταῦτα εἰς ἄλλον πρὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας των. Δίκαιον λοιπὸν εἶναι ὁ προεξοφλῶν, ἤτοι ὁ ἀγοράζων τὸ γραμματίον, ἀφοῦ δὲν θὰ λάβῃ τὰ χρήματα ἀμέσως παρὰ τοῦ ὀφειλέτου, νὰ κρατήσῃ ἐν τόσον τοῖς ἑκατὸν (²) ἐκ τοῦ ἀναφερομένου ποσοῦ ἐν τῷ γραμματίῳ καὶ νὰ δώσῃ εἰς τὸν κάτοχον τοῦ γραμματίου τὸ ὑπόλοιπον.

Τὸ χρηματικὸν ποσόν, τὸ ὁποῖον κρατεῖται ἀπὸ τὸ ἐν τῷ γραμματίῳ ἀναφερόμενον ποσόν, ὅταν τοῦτο πληρῶνῃται πρὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας του, λέγεται **ὑφαίρεσις ἢ ἔκπτωσις (σκόνη)**.

Σημ. Τῆς ὑφαίρεσεως κάμνουσι πολλὴν χρῆσιν οἱ ἔμποροι πρὸς εὐκολίαν των δίδοντες καὶ λαμβάνοντες τοιαῦτα γραμμάτια. Ὡστε ἐν γραμματίῳ τίθεται πρὸ τῆς λήξεως αὐτοῦ εἰς κυκλοφορίαν ὡς εἶδος χρημάτων μεταβιβαζομένων ἀπὸ ἐνὸς εἰς ἄλλον. Γραμμάτιον, μὴ περιέχον τὰς λέξεις **εἰς διαταγὴν**, δὲν δύναται νὰ μεταβιβασθῇ εἰς ἄλλον.

(1) Ἐκτὸς τοῦ γραμματίου μεταχειρίζονται συνήθως οἱ ἔμποροι καὶ τὴν συναλλαγματικὴν, ἣτις εἶναι ἐγγραφοῦν, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ δανεῖζων χρήματα ἢ δίδων ἔμπορεύματα ἐπὶ πιστώσει διατάσσει τὸν ὀφειλέτην του, διαμένοντα ἐν τῇ αὐτῇ πόλει ἢ ἐν ἄλλῃ, νὰ πληρώσῃ εἰς τρίτον πρόσωπον καὶ εἰς ὀρισμένον χρόνον τὸ ἐν αὐτῷ ἀναφερόμενον χρηματικὸν ποσόν.

(2) Τὸ ἐπιτόκιον τοῦτο συμφωνεῖται μεταξὺ τοῦ προεξοφλητοῦ καὶ τοῦ κατόχου τοῦ γραμματίου καὶ εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ ἐπιτοκίου, μὲ τὸ ὁποῖον ἐγένετο τὸ δάνειον. Αἱ δὲ τράπεζαι ἔχουν ὀρισμένα ἐπιτόπια διὰ τὰς προεξοφλήσεις.

Ὑφαιρέσεις διακρίνομεν δύο εἰδῶν, τὴν *ἐξωτερικὴν* καὶ τὴν *ἐσωτερικὴν*.

1ον) Ἑξωτερικὴ ὑφαίρεσις.

221. Ἑξωτερικὴ ὑφαίρεσις λέγεται ὁ τόκος τοῦ ἀναφερομένου ποσοῦ ἐν τῷ γραμματίῳ διὰ χρόνον λογιζόμενον ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς προεξοφλήσεως μέχρι τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας του (πρὸς ἐπιτόκιον συμπεφωνημένον),

Ἔστω, παραδ. χάριν, τὸ ἐξῆς πρόβλημα.

Πόση εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις γραμματίου 1640 δραχμῶν, προεξοφλουμένου 3 μῆνας πρὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας του πρὸς 10% :

Δύσις. Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τῆς ἐξωτερικῆς ὑφαιρέσεως εἶναι ὁ τό-

κος τῶν 1640 δραχ. εἰς 3 μ. πρὸς 10 ο/ο, ἦτοι $\frac{1640 \times \frac{3}{12} \times 10}{100}$ ἢ 41 δραχ.

Ἡ ἐξωτερικὴ λοιπὸν ὑφαίρεσις εἶναι 41 δραχμαί· ταύτας θὰ κρατήσῃ ὁ προεξοφλῶν τὸ γραμματίον καὶ θὰ πληρώσῃ εἰς τὸν κάτοχον τοῦ γραμματίου τὰς ὑπολοίπους 1640—41 ἢ 1599 δραχ. Ἐκ τούτου ἐπεταί ὅτι πᾶν γραμματίον ἔχει δύο ἀξίας, τὴν *ὀνομαστικὴν*, ἦτοι τὴν ἀναφερομένην ἐν τῷ γραμματίῳ, καὶ τὴν *πραγματικὴν* ἢ *παρούσαν*, ἦτοι τὴν ἐλαττωμένην κατὰ τὴν ὑφαίρεσιν. Ὡστε εἰς τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου εἶναι 1640 δραχ., ἡ ὑφαίρεσις 41 δραχ. καὶ ἡ πραγματικὴ ἀξία αὐτοῦ 1599 δραχ.

Ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία εἶναι ἄθροισμα τῆς ὑφαιρέσεως καὶ τῆς πραγματικῆς ἀξίας· ὥστε, ὅταν γνωρίζωμεν τὴν μίαν ἐξ αὐτῶν (ὑφαίρεσιν ἢ πραγματικὴν), εὐρίσκομεν τὴν ἄλλην διὰ τῆς ἀφαιρέσεως αὐτῆς ἀπὸ τὴν ὀνομαστικὴν.

Ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις εἶναι ἄδικος, διότι ὁ προεξοφλῶν τὸ γραμματίον, ἀντὶ νὰ κρατήσῃ τὸν τόκον τῶν χρημάτων του, τὰ ὁποῖα πληρώνει διὰ τὴν ἀγορὰν τοῦ γραμματίου, ἦτοι τῶν 1599 δραχ., κρατεῖ τὸν τόκον τῶν ἀναφερομένων ἐν τῷ γραμματίῳ ἦτοι τῶν 1640 δραχμῶν, τὰς ὁποίας δὲν ἔδωκεν. Ἐν τούτοις ὁμως αὐτῆς τῆς ὑφαιρέσεως κάμνουν χρῆσιν οἱ ἔμποροι, ὡς εὐρίσκομένης εὐκόλως.

2ον) Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις.

222. Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις λέγεται ὁ τόκος τῆς πραγματικῆς ἀξίας τοῦ γραμματίου, ἦτοι τῶν χρημάτων τὰ ὁποῖα πληρώνει ὁ προεξοφλῶν τὸ γραμματίον διὰ χρόνον λογιζόμενον ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς προεξοφλήσεως μέχρι τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου.

Κατὰ τὴν ὑφαίρεσιν λοιπὸν ταύτην ὁ προεξοφλῶν, ἦτοι ὁ ἀγοράζων γραμματίον, πρέπει νὰ πληρώσῃ τόσα χρήματα, ὥστε μετὰ τοῦ τόκου

1) Μετὰ πόσον χρόνον λήγει γραμματίον 480 δραχμῶν, τὸ ὁποῖον προεξωφλήθη πρὸς 9ο]ο καὶ ἐγένετο ὑφαίρεσις (ἐξωτερικὴ) 18 δραχμαί

Δύσις. Αἱ 480 δραχμαὶ εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου, ἦτο τὸ κεφάλαιον, ἡ δὲ ὑφαίρεσις 18 δρ. εἶναι ὁ τόκος. Ὡστε κατὰ τὸν γνωστὸν κανόνα τοῦ ἐδ. 218 ἔχομεν $\frac{18 \times 100}{480 \times 9}$, ἦτοι 5 μῆν.

2) Μετὰ πόσον χρόνον λήγει γραμματίον 1800 δραχμῶν, τὸ ὁποῖον προεξωφλήθη (ἐξωτερικῶς) πρὸς 6,50 ο]ο ἀντὶ 1767,50 δρ ;

Δύσις. Αἱ 1800 δρ. εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία, ἦτοι τὸ κεφάλαιον αἱ δὲ 1767,50, ἀντὶ τῶν ὁποίων προεξωφλήθη τὸ γραμματίον, εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀξία αὐτοῦ· ὥστε ἡ ὑφαίρεσις εἶναι 1800—1767,50, ἦτοι 32,50. Ἐφαρμόζοντες τώρα τὸν κανόνα ἔχομεν $\frac{32,50 \times 100}{1800 \times 6,50}$ ἢ 3 μῆν. 10 ἡμ

3) Γραμματίον προεξωφλήθη 2 μῆν. 20 ἡμ. πρὸ τῆς λήξεώς του ἀντὶ 842,80 δρ. καὶ ἐγένετο ὑφαίρεσις (ἐξωτερικὴ) 17,20 δρ. Πρὸ ὁποῖον ἐπιτόκιον προεξωφλήθη ;

Δύσις. Αἱ 842,80 δρ. εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου ἡ ὑφαίρεσις 17,20 εἶναι ὁ τόκος, κεφάλαιον δὲ εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου, ἦτις εἶναι ἀθροισμα τῆς πραγματικῆς ἀξίας καὶ τῆς ὑφαίρεσεως, ἦτοι $842,80 + 17,20$ ἢ 860 δρ. Ὡστε κατὰ τὸν γνωστὸν κανόνα ἐδ. 217 ἔχομεν $\frac{17,20 \times 100}{860 \times \frac{80}{360}}$, ἦτοι 9 %.

Σημ. Ἐὰν τὰ ἀνωτέρω προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα ζητεῖται ὁ χρόνος καὶ τὸ ἐπιτόκιον, ἦσαν τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαίρεσεως, θὰ ἐλύοντο κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, μὲ μόνην τὴν διαφορὰν ὅτι ὡς κεφάλαιον θὰ ἐλαμβάνομεν τὴν πραγματικὴν ἀξίαν τοῦ γραμματίου ἀντὶ τῆς ὀνομαστικῆς (τοῦτο ἔπεται ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαίρεσεως).

4) Γραμματίον προεξωφλήθη 6 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 8 ο]ο καὶ ἐγένετο ὑφαίρεσις (ἐξωτερικὴ) 36 δρ. Ποία εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία αὐτοῦ ;

Δύσις. Ζητεῖται τὸ κεφάλαιον· ὥστε ἐφαρμόζοντες τὸν κανόνα τοῦ ἐδ. 216 εὐρίσκομεν 900 δρ.

Σημ. Ἐὰν ἡ ἀνωτέρω ὑφαίρεσις 36 ἦτο ἐσωτερικὴ, τὸ εὐρεθὲν κεφάλαιον 900 θὰ ἦτο ἡ πραγματικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου καὶ ἐπομένως ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία αὐτοῦ θὰ ἦτο $900 + 36$ ἢ 936 δρ.

5) Ποία εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία γραμματίου προεξωφληθέντος ἐξωτερικῶς 4 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 9 ο]ο ἀντὶ 834,20 δρ.

Δύσις. Ἐνταῦθα δὲν ἔχομεν τὴν ὑφαίρεσιν, ἦτοι τὸν τόκον, διὰ νὰ εὐρῶμεν τὸ κεφάλαιον διὰ τοῦ γνωστοῦ κανόνος. Διὰ τοῦτο ὑποθέτομεν ὅτι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου ἦτο 100 δρ. Ὁ τόκος αὐτῶν εἰς 4 μ. πρὸς 9% εἶναι 3 δρ., καὶ ἐπομένως θὰ προεξωφλεῖτο ἀντὶ 97 δρ. Ὡστε

ἂν προεξοφληθῇ ἀντὶ 97 δρ., ἡ ὀνομ. ἀξία εἶναι 100

» 834,20 » » γ

εὐρίσκομεν ὅτι εἶναι 860 δρ.

Σημ. Ἐὰν τὸ ἀνωτέρω γραμμάτιον προεξωφλεῖτο ἐσωτερικῶς, εὐρίσκομεν τότε τὸν τόκον τῶν 834,20 εἰς 4 μ. πρὸς 9% καὶ προσθέτομεν αὐτὸν εἰς τὴν πραγματικὴν ἀξίαν 834,20, τὸ δὲ ἄθροισμα εἶναι ἡ ζητουμένη ὀνομαστικὴ ἀξία.

6) Ἡ πραγματικὴ ἀξία γραμματίου προεξοφληθέντος (ἐξωτερικῶς) 24 ἡμέρας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 6% εἶναι 3386,40 δραχ. Πόση εἶναι ἡ ὑφαίρεσις του ; (13,60)

7) Ἐδανείσθη τις κεφάλαιόν τι πρὸς 10% καὶ υπέγραψε γραμμάτιον διὰ 1365 δρ. πληρωτέον μετὰ 6 μῆνας. Πόσον κεφάλαιον ἔδανείσθη ;

Δύσις. Ὑποθέτομεν ὅτι ἔδανείσθη 100 δρ. Ὁ τόκος αὐτῶν πρὸς 10% εἰς 6 μ. εἶναι 5 δρ. Ὡστε

ἂν ὑπογράψῃ γραμ. διὰ 105 δρ. ἔδανείσθη 100

» » 1365 » γ

εὐρίσκομεν 1300.

8) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασεν ἐμπορεύματα ἀξίας 9000 δρ. καὶ μετὰ τὴν συμφωνίαν νὰ πληρώσῃ αὐτὰς μετὰ 2 μῆνας, ἀλλ' οὗτος ἠθέλησε νὰ πληρώσῃ τὸ ποσὸν τοῦτο ἀμέσως, διὰ τοῦτο τοῦ ἔγινεν ἔκπτωσις (σκόντο) 9%. Πόσον ἐπλήρωσεν ; (8865)

9) Γραμμάτιον 2700 δρ., λῆγον τὸ ἔτος 1921 Ἀπριλίου 5, προεξοφλήθη (ἐξωτερικῶς) πρὸς 8% ἀντὶ 2568 δρ. Πότε προεξοφλήθη ; (τὸ ἔτος 1920 Ἀύγ. 25)

10) Τραπεζίτης τις προεξώφλησε γραμμάτιον 3000 δρ. πρὸς 6% τὴν 15 Σεβρίου 1920 καὶ ἔδωκεν εἰς τὸν κάτοχον τοῦ γραμματίου 2930 δρ. Πότε ἔληγε τὸ γραμμάτιον ; (τὸ ἔτος 1921 Φεβρ. 5)

Σημ. Αἱ τράπεζαι ἐκτὸς τῆς ὑφαιρέσεως κρατοῦσι συνήθως καὶ ἓνα τόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκ τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τοῦ γραμματίου (μὴ λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν τοῦ χρόνου) ὡς ἔξοδα εἰσπραξέως αὐτοῦ· τοῦτο λέγεται **προμήθεια**.

11) Γραμμάτιον 1800 δρ., λῆγον τὸ ἔτος 1922 Φεβρ. 15, προεξοφλήθη τὸ ἔτος 1920 Νοεμβρ. 25 πρὸς 6,50% καὶ μετὰ προμήθειαν $\frac{3}{8}$ %. Πόση εἶναι ἡ ὀλικὴ κράτησις ; (149,75)

Κ. Ξ. Παπανικητοπούλου, Πρακτικ. Ἀριθμητικὴ ἔκδ. 8', 9/6/927 13

12) Τραπεζίτης τις προεξώφησε δύο γραμμάτια τὴν 8[᾽] Ἀπριλίου πρὸς 8^ο /_ο, ὧν τὸ μὲν ἐκ δραχμῶν 2700 λήγει τὴν 18 Μαΐου (τοῦ αὐτοῦ ἔτους), τὸ δὲ ἐκ δρ. 4000 λήγει τὴν 2 Σεπτεμβρίου καὶ μὲ προμήθειαν $\frac{2}{5}$ % /_ο. Πόσον ἔδωκεν ; (6521,20)

Σημ. Τὸ ἄθροισμα τῶν ὑφαιρέσεων (ἦτοι τῶν τόκων) εὐρίσκομεν συντόμως διὰ τῶν τοκαρίθμων (ἔδ. 214).

Κοινὴ λήξις γραμματίων.

223. Συμβαίνει πολλάκις νὰ ὀφείλῃ τις εἰς τὸ αὐτὸ πρόσωπον δύο ἢ περισσότερα γραμμάτια, λήγοντα εἰς διαφόρους χρόνους, καὶ θέλει χάριν εὐκολίας νὰ ἀντικαταστήσῃ ταῦτα δι' ἑνὸς μόνου γραμματίου καὶ τοιούτου, ὥστε ἡ παροῦσα ἀξία αὐτοῦ νὰ εἶναι ἴση μὲ τὴν παροῦσαν ἀξίαν τῶν ἀντικαθισταμένων γραμματίων. Ἡ τοιαύτη ἀντικατάστασις λέγεται **κοινὴ λήξις** τῶν γραμματίων. Εἰς τὰ προβλήματα ταῦτα ἢ δίδεται ὁ χρόνος τῆς λήξεως τοῦ νέου γραμματίου καὶ ζητεῖται ἢ ὀνομαστικὴ ἀξία αὐτοῦ ἢ δίδεται ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ νέου γραμματίου καὶ ζητεῖται ἢ λῆξις αὐτοῦ.

Ἔστωσαν, π. χ., τὰ ἑξῆς δύο προβλήματα.

1) Ὅφειλε τις δύο γραμμάτια εἰς τὸ αὐτὸ πρόσωπον, ὧν τὸ μὲν ἐκ δρ. 2400 λήγει μετὰ 50 ἡμέρας, τὸ δὲ ἐκ δρ. 4000 λήγει μετὰ 90 ἡμέρας, θέλει δὲ νὰ ἀντικαταστήσῃ ταῦτα δι' ἑνὸς μόνου γραμματίου λήγοντος μετὰ 40 ἡμέρας. Πόση θὰ εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου τούτου, ἐὰν τὸ ἐπιτόκιον εἶναι 9^ο /_ο;

Λύσις. Ἡ ὑφαίρεσις τοῦ πρώτου εἶναι 30 δρ., τοῦ δευτέρου 90 ἐπομένως ἡ παροῦσα ἀξία αὐτῶν εἶναι 2400—30 ἢ 2370 καὶ 4000—90 ἢ 3910, τῶν δύο δὲ ὁμοῦ εἶναι 2370+3910 ἢ 6280· τόση πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ παροῦσα ἀξία τοῦ ζητουμένου γραμματίου. Ἐχομε τώρα τὴν παροῦσαν ἀξίαν 6280, τὸν χρόνον 40 ἡμ. καὶ τὸ ἐπιτόκιον 9^ο /_ο, εὐρίσκομεν δὲ (κατὰ τὸ 5ον πρόβλημα) ὅτι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ νέου γραμματίου θὰ εἶναι 6343,43 δρ.

Σημ. Τὸ ἄθροισμα τῶν ὑφαιρέσεων δυνάμεθα νὰ εὔρωμεν συντόμως διὰ τῶν τοκαρίθμων (ἔδ. 214). Ἦτοι

$$\begin{array}{r} \text{ὀν. ἀξία} \quad \text{ἡμ.} \quad \text{τοκαρίθμοι} \\ 2400 \times 50 = 120000 \\ 4000 \times 90 = 360000 \end{array}$$

$$\text{ἄθρ. } 6400$$

$$480000 : 4000 \text{ (σταθερὸς διαιρέτης) } =$$

$$\text{ὑφαίρ. } 120$$

$$120 \text{ ὑφ.}$$

$$\text{παρ. ἀξία } 6280$$

2) Ὅφειλε τις δύο γραμμάτια, ὧν τὸ μὲν ἐν ἐκ 3000 δρ. λήγει

μετὰ 2 μῆνας, τὸ δὲ ἄλλο ἐκ 4000 δρ. λήγει μετὰ 5 μῆνας, καὶ θέλει νὰ ἀντικαταστήσῃ ταῦτα δι' ἑνὸς γραμματίου ἐκ δρ. 6974,70 πρὸς 6%. Μετὰ πόσον χρόνον θὰ λήγῃ τὸ γραμματίον τοῦτο :

Λύσις. Ἡ παροῦσα ἀξία τοῦ πρώτου εὐρίσκεται ὅτι εἶναι 2970 δρ., τοῦ δὲ δευτέρου 3900, ἐπομένως καὶ τῶν δύο ὁμοῦ εἶναι 6870. Ἡ διὰ τῶν τοκαρίθμων

$$\begin{array}{r} 3000 \times 60 = 180000 \\ 4000 \times 150 = 600000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{ὀν. ἀξία} \quad 7000 \\ \text{ὑφαίρ.} \quad 130 \\ \hline \end{array} \qquad 780000 : 6000 = 130$$

$$\text{παρ. ἀξία} \quad 6870$$

Τὸ πρόβλημα τώρα ἀνάγεται εἰς τὸ ἐξῆς.

Μετὰ πόσον χρόνον λήγει γραμματίον 6974,70, τὸ ὁποῖον προεξοφλεῖται σήμερον πρὸς 6% ἀντὶ 6870 δραχμῶν :

Λύοντες τοῦτο (ὅπως καὶ τὸ 2ον πρόβλημα) εὐρίσκομεν ὅτι λήγει μετὰ 3 μῆνας.

Περὶ μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα.

224. Δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ λέγονται **ἀνάλογοι** πρὸς ἄλλους ἴσους τὸ πλήθος, ἐὰν ἕκαστος ἐξ αὐτῶν προκύπτῃ ἐκ τοῦ ἀντιστοίχου του διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

Παραδ. χάριν, οἱ ἀριθμοὶ 8, 12, 20 εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3, 5· διότι οἱ πρῶτοι προκύπτουσιν ἐκ τῶν δευτέρων, ὅταν οὗτοι πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ 4. Καὶ τὰνάπαλιν· οἱ ἀριθμοὶ 2, 3, 5 εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 8, 12, 20· διότι οἱ πρῶτοι προκύπτουσιν ἐκ τῶν δευτέρων, ὅταν οὗτοι πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ $\frac{1}{4}$ (ἢ, ὅπερ ταῦτό, διαιρεθῶσι διὰ 4).

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπεταὶ ὅτι οἱ ἀνάλογοι ἀριθμοὶ πρὸς ἄλλους ἔχουν πρὸς τοὺς ἀντιστοίχους τῶν τὸν αὐτὸν λόγον, ἥτοι εἶναι $\frac{8}{2} = \frac{12}{3} = \frac{20}{5} = 4$. Καὶ τὰνάπαλιν εἶναι $\frac{2}{8} = \frac{3}{12} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.

225. Δύο ἢ περισσότεροι ἀριθμοὶ λέγονται **ἀντιστρόφως ἀνάλογοι** πρὸς ἄλλους ἴσους τὸ πλήθος, ὅταν εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀντιστρόφους αὐτῶν ἀριθμοὺς (ἔδ. 195).

Παραδ. χάριν, οἱ ἀριθμοὶ 4, 6, 10, οἵτινες εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3, 5, λέγονται ἀντιστρόφως ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἀντιστρόφους αὐτῶν ἀριθμοὺς $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$.

226. **Μερισμὸς ἀριθμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα δοθέντων ἀριθμῶν** λέγεται ὁ τρόπος, διὰ τοῦ ὁποῖου μερίζομεν αὐτὸν εἰς τόσα μέρη, ὅσοι εἶναι οἱ δοθέντες ἀριθμοί, καὶ τὰ μέρη ταῦτα νὰ εἶναι ἀνάλογα πρὸς αὐτούς.

1) **Πρόβλημα.** Νὰ μερισθῆ ὁ ἀριθμὸς 48 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 6, 8, 10.

Διὰ νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα, σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς. Ἐάν ὁ μεριστέος ἀριθμὸς εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν δοθέντων ἀριθμῶν, ἦτοι $6 + 8 + 10$ ἢ 24, τὰ μέρη θὰ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ 6, 8, 10 (διότι οὗτο εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς δοθέντας 6, 8, 10, καθόσον προκύπτουσιν ἕξ αὐτῶν πολλαπλασιαζομένων ἐπὶ τὴν μονάδα 1). Ἐάν ὁ μεριστέος ἀριθμὸς εἶναι 1, τὰ μέρη θὰ εἶναι $\frac{6}{24}$, $\frac{8}{24}$, $\frac{10}{24}$ (οἷτινες εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς δοθέντας, διότι προκύπτουσιν ἕξ αὐτῶν πολλαπλασιαζομένων ἐπὶ $\frac{1}{24}$). Ἐάν δὲ ὁ μεριστέος εἶναι 48, τὰ μέρη θὰ εἶναι $\frac{6 \times 48}{24}$, $\frac{8 \times 48}{24}$, $\frac{10 \times 48}{24}$, ἦτοι 12, 16, 20 (οἷτινες εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τοὺς δοθέντας 6, 8, 10, διότι προκύπτουσιν ἕξ αὐτῶν πολλαπλασιαζομένων ἐπὶ $\frac{48}{24}$, ἦτοι ἐπὶ 2).

Σημ. Εἶναι φανερόν ὅτι τὰ εὐρισκόμενα μέρη πρέπει νὰ ἔχωσιν ἄθροισμα τὸν μεριστέον ἀριθμόν.

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος συναγάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα.

227. **Διὰ νὰ μερίσωμεν ἀριθμὸν τινα εἰς μέρη ἀνάλογα δοθέντων ἀριθμῶν, πολλαπλασιάζομεν τὸν μεριστέον ἀριθμὸν ἐπὶ ἕκαστον τῶν δοθέντων καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἄθροισματος αὐτῶν.**

Παρατήρησις. Ἐὰν διαιρέσωμεν τοὺς ὅρους τῶν ἀνωτέρω εὐρεθέντων κλασμάτων $\frac{6 \times 48}{24}$, $\frac{8 \times 48}{24}$, $\frac{10 \times 48}{24}$ δι' ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ, τὰ εὐρεθέντα μέρη 12, 16, 20 δὲν μεταβάλλονται (ἔδ. 100). Διαιροῦμεν λοιπὸν αὐτοὺς διὰ 2 καὶ εὐρίσκομεν τὰ πρὸς αὐτὰ ἴσα κλάσματα $\frac{3 \times 48}{12}$, $\frac{4 \times 48}{12}$, $\frac{5 \times 48}{12}$. Διηρέσαμεν τοὺς ἀριθμοὺς 6, 8, 10, ἀναλόγως τῶν ὁποίων μερίζεται ὁ ἀριθμὸς 48, καθὼς καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν 24, διὰ τοῦ κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν 2. Ὡστε δυνάμεθα νὰ διαιρῶμεν τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς διὰ τοῦ κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν (ἂν ἔχωσι) καὶ τὰνάπαλιν, δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάζωμεν αὐτοὺς ἐπὶ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν. Ὅταν λοιπὸν οἱ δοθέντες ἀριθμοί, ἀναλόγως τῶν ὁποίων θὰ μερισθῆ ὁ ἀριθμὸς τις, εἶναι ἀκέραιοι καὶ ἔχωσι κοινόν τινα διαιρέτην, καλὸν εἶναι πρὸς εὐκολίαν μας νὰ διαιρῶμεν πρῶτον αὐτοὺς διὰ τοῦ κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν καὶ ἔπειτα νὰ ἐφαρμόζωμεν τὸν ἀνωτέρω κανόνα. Ὅταν δὲ πάλιν εἶναι κλάσματα, νὰ πολλαπλασιάζωμεν

πρῶτον ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν ἢ κάλλιον ἐπὶ τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον αὐτῶν, ἵνα γίνωσιν ἀκέρατοι πρὸς εὐκολίαν μας.

2) **Πρόβλημα.** Νὰ μερισθῇ ὁ ἀριθμὸς 320 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 40, 50, 70.

Κατάταξις.	40	ἢ	4	
Μεριστέος 320	50	ἢ	5	
	70	ἢ	7	
	ἄθροισμα			16

Διηρέσαμεν τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς διὰ τοῦ κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν 10. Ἐφαρμόζομεν τώρα τὸν ἀνωτέρω κανόνα καὶ εὐρίσκομεν τὰ ἐξῆς κατὰ σειρὰν μέρη·

$$\frac{320 \times 4}{16} \text{ ἢ } 80, \quad \frac{320 \times 5}{16} \text{ ἢ } 100, \quad \frac{320 \times 7}{16} \text{ ἢ } 140.$$

3) **Πρόβλημα.** Νὰ μερισθῇ ὁ ἀριθμὸς 105 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 2, $\frac{1}{4}$ καὶ $\frac{3}{8}$.

Κατάταξις.	2	ἢ	2×8	ἢ 16
Μεριστέος 105	$\frac{1}{4}$	ἢ	$\frac{1}{4} \times 8$	ἢ 2
	$\frac{3}{8}$	ἢ	$\frac{3}{8} \times 8$	ἢ 3
	ἄθροισμα			21

Ἐπολλαπλασιάσαμεν τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς ἐπὶ 8, ἦτοι ἐπὶ τὸ ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον τῶν παρονομαστῶν, ὅτε τὰ ζητούμενα μέρη δὲν μεταβάλλονται. Ἐφαρμόζομεν τώρα τὸν κανόνα καὶ εὐρίσκομεν $\frac{105 \times 16}{21}$ ἢ 80, $\frac{105 \times 2}{21}$ ἢ 10, $\frac{105 \times 3}{21}$ ἢ 15.

4) **Πρόβλημα.** Νὰ μερισθῇ ὁ ἀριθμὸς 94 εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 2, $\frac{3}{4}$, 8.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω (ἐδ. 225) ἀρκεῖ νὰ μερίσωμεν τὸν 94 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀντιστρόφων αὐτῶν ἀριθμῶν, ἦτοι τῶν $\frac{1}{2}$, $\frac{4}{3}$, $\frac{1}{8}$.

Πρὸς τοῦτο πολλαπλασιάζομεν πρῶτον αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἐλαχ. κ. πολλ. τῶν παρονομαστῶν 24, ἵνα γίνωσιν ἀκέρατοι, ἦτοι

$\frac{1}{2} \times 24$	[ἢ	12
$\frac{4}{3} \times 24$	ἢ	32
$\frac{1}{8} \times 24$	ἢ	3
	ἄθροισμα	
		47

Ἐπειτα εφαρμόζοντες τὸν κανόνα εὐρίσκομεν τὰ μέρη 24, 64, 6.

Σημ. Ἐὰν μεταξὺ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν εἶναι μικτοὶ ἀριθμοὶ ἢ δεκαδικοί, τρέπομεν πρῶτον αὐτοὺς εἰς κλάσματα.

Προβλήματα ἑταιρείας.

228. Εἰς τὰ προβλήματα τοῦ μερισμοῦ εἰς μέρη ἀνάλογα ὑπάρχον-
ται καὶ τὰ προβλήματα τῆς ἑταιρείας, εἰς τὰ ὁποῖα ζητεῖται νὰ μοιρα-
σθῇ τὸ ἐκ μιᾶς ἐμπορικῆς ἐπιχειρήσεως κέρδος ἢ ζημία εἰς δύο ἢ πε-
ρισσοτέρους συνεταιρούς.

Πρόβλημα. Δύο ἄνθρωποι κατέθεσαν συγχρόνως διὰ μίαν ἐμπο-
ρικὴν τῶν ἐπιχειρήσιν τὰ ἐξῆς ποσά· ὁ πρῶτος 20000 δραχ. καὶ ὁ
δεύτερος 25000. Μετὰ τὴν διάλυσιν τῆς ἐμπορικῆς ἐπιχειρήσεως τῶν
εὔρον ὅτι ἐκέρδισαν 18000 δραχ. Ζητεῖται πόσον κέρδος πρέπει νὰ
λάβῃ ἕκαστος.

Δύσις. Τὰ κατατεθέντα κεφάλαια ὑπὸ τῶν δύο εἶναι 45000 δραχ-
μαί· ἔπειτα δὲ σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς·

Αἰ 45000 δραχ. ἐκέρδισαν	18000
ἢ 1 δραχ. ἐκέρδισε	18000
	45000

καὶ αἰ 20000 τοῦ α' ἐκέρδισαν	$\frac{18000 \times 20000}{45000}$ ἢ 800 0
-------------------------------	--

καὶ αἰ 25000 τοῦ β' ἐκέρδισαν	$\frac{18000 \times 25000}{45000}$ ἢ 10000
-------------------------------	--

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος βλέπομεν ὅτι, ὅταν τὰ κεφάλαια
εἶναι διάφορα καὶ μένωσι τὸν αὐτὸν χρόνον εἰς τὴν ἐπιχείρησιν, μερίζε-
ται τὸ κέρδος 18000 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν κεφαλαίων 20000 καὶ 25000.

Ἐὰν ὁμοῦς τὰ καταβαλλόμενα κεφάλαια εἶναι τὰ αὐτὰ καὶ μένουσιν
διαφόρους χρόνους εἰς τὴν ἐπιχείρησιν, τότε πρέπει νὰ μερίζεται τὸ
κέρδος ἀναλόγως τῶν χρόνων.

Πρόβλημα. Ἐμπορός τις ἤρχισεν ἐμπορικὴν τινὰ ἐπιχείρησιν μὲ
κεφάλαιον 3000 δραχμῶν· μετὰ 2 μῆνας προσέλαβε συνέταιρον μὲ κε-
φάλαιον 5000 δραχμῶν· μετὰ 3 μῆνας ἀπὸ τούτου προσέλαβον καὶ τρί-
τον μὲ κεφάλαιον 2000 δραχμῶν· μετὰ 7 μῆνας ἀπὸ τῆς προσλήψεως
τοῦ τρίτου διέλυσαν τὴν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν τῶν καὶ εὔρον ὅτι ἐκέρ-
δισαν 2650 δραχ. Ζητεῖται πόσον κέρδος πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος.

Δύσις. Ἐπειδὴ ἐλογαριάσθησαν μετὰ 7 μῆνας ἀπὸ τῆς προσλή-
ψεως τοῦ τρίτου, διὰ τοῦτο τοῦ τρίτου τὸ κεφάλαιον ἔμεινεν εἰς τὸ ἐμ-
πόριον 7 μῆνας, ἐπομένως τὸ τοῦ δευτέρου ἔμεινε 3 μῆνας περισσότε-
ρον αὐτοῦ, ἤτοι 10 μῆνας, καὶ τὸ τοῦ πρώτου 2 μῆνας περισσότερον
τοῦ δευτέρου, ἤτοι 12 μῆνας.

Ἀλλὰ τὸ κέρδος, τὸ ὁποῖον πρόκειται νὰ λάβῃ ὁ πρῶτος, κατα-

θέτων 3000 δρ. ἐπὶ 12 μῆνας, ἂν ἤθελε νὰ τὸ λάβῃ εἰς 1 μῆνα, ἔπρεπε νὰ καταθέσῃ 12 φορὰς περισσότερον, ἤτοι 3000×12 δρ. Ὁμοίως σκεπτόμενοι εὐρίσκομεν ὅτι ὁ δεύτερος ἔπρεπε νὰ καταθέσῃ ἐπὶ 1 μῆνα 5000×10 δρ. καὶ ὁ τρίτος 2000×7 δρ.

Ὡστε εἶναι τὸ αὐτὸ ὡς νὰ κατέθεσεν ὁ πρῶτος 3000×12 ἢ 36000 δραχμάς, ὁ δεύτερος 5000×10 ἢ 50000 καὶ ὁ τρίτος 2000×7 ἢ 14000 διὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ἤτοι δι' 1 μῆνα. Τὸ πρόβλημα λοιπὸν λύεται, καθὼς καὶ τὸ ἀνωτέρω, ἤτοι μερίζομεν τὸ κέρδος 2650 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 36000, 50000, 14000 ἢ τῶν 18, 25, 7 (ἴδε ἐδ. 227 παρατήρησιν) καὶ εὐρίσκομεν ὅτι ὁ πρῶτος θὰ λάβῃ κέρδος 954 δρ., ὁ δεύτερος 1325 καὶ ὁ τρίτος 371.

Ἡ ἀνωτέρω πράξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς·

	α'	$3000 \times 12 = 36000$	ἢ	18
2650 δρ.	2 μ.	β'		25
	3 μ.	γ'		7
		$2000 \times 7 = 14000$	ἢ	7
		ἄθροισμα		50

ὁ α' θὰ λάβῃ $\frac{2650 \times 18}{50}$, ἤτοι 954

ὁ β' » $\frac{2650 \times 25}{50}$, ἤτοι 1325

ὁ γ' » $\frac{2650 \times 7}{50}$, ἤτοι 371

ἄθροισμα 2650

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος βλέπομεν ὅτι, ὅταν καὶ τὰ κεφάλαια καὶ οἱ χρόνοι διαφέρωσι, μερίζεται τὸ κέρδος ἀναλόγως τῶν γινομένων, ἅτινα εὐρίσκομεν πολλαπλασιάζοντες τὸ κεφάλαιον ἐκάστου ἐπὶ τὸν χρόνον του.

Σημ. Οἱ χρόνοι πρέπει νὰ γίνωνται ἐκ τῆς ἰδίας μονάδος.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Τρεῖς ἐργάται διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργου τινὸς ἔλαβον 160 δραχμάς· ὁ μὲν πρῶτος εἰργάσθη 8 ἡμέρας, ὁ δεύτερος 7, ὁ δὲ τρίτος 5 (μὲ τὸ αὐτὸ ἡμερομίσθιον ὅλοι). Πόσας δραχμάς πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος ; (α' 64, β' 56, γ' 40).

2) Διὰ τὴν κατασκευὴν ἐνὸς γλυκύσματος πρέπει νὰ λάβωμεν 5 μέρη ἀλεύρου, 3 μέρη βουτύρου καὶ 2 μέρη ζαχαρώσ. Διὰ τὴν κατασκευὴν 4 ὀκάδων ἐκ τοῦ ἰδίου γλυκύσματος, πόσον πρέπει νὰ λάβωμεν ἑξ ἑκάστου εἴδους ; (2 ὀκ. ἄλ., $1\frac{1}{5}$ ὀκ. βουτ. καὶ $\frac{4}{5}$ ὀκ. ζακ.).

3) Δύο γυναῖκες ἔφραναν ἐκ τοῦ ἰδίου ὑφάσματος 60 πήγεις πρὸς

1,50 δρ. τὸν πῆχυν· ἡ μὲν πρώτη ὕφανεन ἐπὶ 8 ἡμέρας, ἡ δὲ δευτέρα ἐπὶ 7 (καὶ μὲ τὰς αὐτὰς ὥρας τὴν ἡμέραν). Πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ λάβῃ ἑκάστη ; (α' 48, β' 42).

4) Τρεῖς ἔμποροι κατέθεσαν ὁμοῦ 24000 δρ. διὰ μίαν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησίν των. Μετὰ τὴν διάλυσιν ταύτης εὔρον ὅτι ἐκέρδισαν 8000 δραχμὰς, ἐξ ὧν ὁ πρῶτος ἔλαβε τὸ τέταρτον, ὁ δεύτερος τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτῶν καὶ ὁ τρίτος τὸ ὑπόλοιπον. Πόσας δραχμὰς κατέθεσεν ἕκαστος ; (α' 6000, β' 9600, γ' 8400).

5) Τρεῖς ἄνθρωποι πρόκειται νὰ μεταφέρωσιν εἰς μίαν ἀπόστασιν 90 ὀκάδας ἐξ ἑνὸς πράγματος καὶ συνεφώνησαν νὰ μοιράσωσι τὸ βάρος τοῦτο εἰς τρία μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῶν ἡλικιῶν των· εἶναι δὲ ὁ μὲν 60 ἐτῶν, ὁ δὲ 40, ὁ δὲ 30. Πόσας ὀκάδας θὰ μεταφέρῃ ἕκαστος ; (α' 20, β' 30, γ' 40).

6) Δύο ἀμαξηλάται μετέφερον ἐμπορεύματα, ὁ μὲν 12 τόννους εἰς ἀπόστασιν 20 χιλιομέτρων, ὁ δὲ 15 τόννους εἰς ἀπόστασιν 9 χιλιομέτρων, καὶ ἔλαβον ὁμοῦ 300 δραχ. Πόσον πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος ; (α' 192, β' 108).

7) Δύο ποιμένες ἐνοικίασαν ἓν λειβάδιον ἀντὶ 430 δραχμῶν. Ὁ εἰς τούτων ἐβρόσκησεν ἓν αὐτῶ τὰ πρόβατά του ἐπὶ 2 μῆνας, ὁ δὲ ἄλλος ἐπὶ 5 ἑβδομάδας, ἀλλὰ τὰ πρόβατα τοῦ πρώτου ἦσαν τριπλάσια τῶν τοῦ δευτέρου. Πόσον πρέπει νὰ πληρώσῃ ἕκαστος ; (360 καὶ 70).

Σημ. Λαμβάνομεν οἰονδήποτε ἀριθμὸν προβάτων τοῦ δευτέρου, ἐπομένως ὁ ἀριθμὸς τῶν προβάτων τοῦ πρώτου θὰ εἶναι τριπλάσιος τούτου.

8) Τρεῖς ἐργάται ἔλαβον δρ. 177,50 διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργου τινός· καὶ ὁ μὲν πρῶτος εἰργάσθη 5 ἡμέρας ἐπὶ 10 ὥρας τὴν ἡμέραν, ὁ δεύτερος 7 ἡμ. ἐπὶ 8 ὥρας τὴν ἡμέραν, ὁ δὲ τρίτος 4 ἡμ. ἐπὶ 9 ὥρας. Πόσον πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος ; (α' 62,50· β' 70· γ' 45).

9) Δύο γυναῖκες ὑφαίνουν τὸ αὐτὸ ὕφασμα· ἐκ τούτων ἡ μὲν πρώτη ὑφαίνει 3 πῆχ. εἰς 12 ὥρας, ἡ δὲ δευτέρα 2 πῆχεις εἰς 10 ὥρας· μετὰ τινὰς ἡμέρας ὕφανεσαν ὁμοῦ 45 πῆχεις. Ἐὰν ἡ ἐργασία ἤρχιζε καὶ ἐτελείωνε συγχρόνως καθ' ἑκάστην ἡμέραν, πόσους πῆχεις ὕφανεσαν ἑκάστη ;

Λύσις. Εὐρίσκομεν πρῶτον πόσον ὑφαίνει ἑκάστη εἰς μίαν ὥραν. Ἡ πρώτη ὑφαίνει $\frac{3}{12}$ ἢ $\frac{1}{4}$ τοῦ πῆχεως, ἡ δὲ δευτέρα $\frac{2}{10}$ ἢ $\frac{1}{5}$ τοῦ πῆχ. Μερίζομεν τώρα τὸν ἀριθμὸν 45 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν $\frac{1}{4}$ καὶ $\frac{1}{5}$ ἢ τῶν 5 καὶ 4 (ἴδε παρατήρησιν ἐδαφίου 227) καὶ εὐρίσκομεν] ὅτι ἡ πρώτη ὑφαίνει 25 πῆχ. καὶ ἡ δευτέρα 20.

10) Δύο λάμπαι ἀνάπτονται καὶ σβύνονται συγχρόνως καθ' ἑσπέραν ἢ μία τούτων καίει 105 δράμια οἰνοπνεύματος εἰς 3 ὥρας, ἡ δὲ ἄλλη 108 δράμια εἰς $2\frac{2}{5}$ τῆς ὥρας. Ἐὰν ὁ φωτισμὸς αὐτῶν κοστίζῃ τὸν μῆνα 57,60 δρ., πόσον κοστίζει τὸν μῆνα ὁ φωτισμὸς ἐκάστης λάμπας;

Λύομεν τοῦτο ὅπως καὶ τὸ ἀνωτέρω καὶ εὐρίσκομεν 25,30 καὶ 32,40δρ.

11) Ἐμπορὸς τις ἤρχισεν ἐμπορικὴν τινα ἐπιχείρησιν μὲ κεφάλαιον 4000 δραχμῶν· μετὰ 20 ἡμέρας προσέλαβε συντάειρον μὲ κεφάλαιον 5000 δραχμῶν, μετὰ 2 δὲ μῆνας ἀπὸ τούτου προσέλαβον καὶ τρίτον μὲ κεφάλαιον 6000 δραχμῶν· μετὰ 7 μῆνας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐμπορικῆς ἐπιχειρήσεως λογαριασθέντες εὗρον ὅτι ἐκέρδισαν 5140 δρ. Ζητεῖται πόσον κέρδος πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος. (1680, 1900, 1560).

12) Διὰ τὴν οἰκοδομὴν μιᾶς οἰκίας ἐμίσθωσέ τις 10 ἐργάτας, μετὰ 10 ἡμέρας ἐμίσθωσεν ἄλλους 5 ἐργάτας, τὴν ἐπιούσαν ἡμέραν ἐμίσθωσεν ἄλλους 2 (μὲ τὸ αὐτὸ ἡμερομίσθιον ὅλους)· οὕτω δὲ ἐχειρίσθησαν 20 ἡμέραι ἀπ' ἀρχῆς διὰ νὰ οἰκοδομηθῇ ἡ οἰκία. Πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος τῶν ἐργατῶν, ἐὰν ὅλοι ὁμοῦ λάβωσι 2144 δραχμὰς;

(Ἐκαστος τῶν πρώτων 160 δρ., ἕκαστος τῶν δευτέρων 80 καὶ ἕκαστος τῶν τρίτων 72).

13) Τρεῖς ἔμποροι κατέθεσαν συγχρόνως διὰ μίαν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν τῶν τὰ ἐξῆς ποσά· ὁ πρῶτος 4000 δραχμὰς, ὁ δεύτερος 3000 καὶ ὁ τρίτος 5000· μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ ἐμπορίου τῶν ἔλαβεν ὁ πρῶτος ἐκ τοῦ κέρδους 800 δρ. Πόσον κέρδος ἔλαβεν ἕκαστος τῶν ἄλλων;

Δύσις. Αἱ 4000 δρ. τοῦ α' ἔφερον κέρδος 800

αἱ 3000 τοῦ β' » » χ

Εὐρίσκομεν 600. Ὅμοίως εὐρίσκομεν ὅτι αἱ 5000 τοῦ γ' ἔφερον κέρδος 1000 δρ.

14) Τρεῖς ἔμποροι κατέθεσαν συγχρόνως διὰ μίαν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν τῶν τὰ ἐξῆς ποσά· ὁ πρῶτος 4000 δραχμὰς, ὁ δεύτερος 6000 καὶ ὁ τρίτος 5000· μετὰ 1 ἔτος 3 μῆνας διέλυσαν τὸ ἐμπόριόν τῶν καὶ εὗρον ὅτι ἐκέρδισαν τὰ $\frac{2}{5}$ τῶν ὄσων κατέθεσαν καὶ οἱ τρεῖς ὁμοῦ.

Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισαν καὶ πόσον κέρδος πρέπει νὰ λάβῃ ἕκαστος;

(32%· α' 1600, β' 2400, γ' 2000).

15) Εἰς μίαν τράπεζαν ἔχει κατατεθῆ κεφάλαιόν τι πρὸς $5\frac{1}{2}\%$ · τὸ ὁποῖον καθ' ἑξαμηνίαν φέρει τόκον 1155 δρ. Τὸ κεφάλαιον τοῦτο πρόκειται νὰ μοιρασθῇ εἰς τρεῖς κληρονόμους ἀδελφὰς ἀναλόγως τῆς ἡλικίας τῶν· ἡ πρώτη εἶναι 28 ἐτῶν, ἡ δευτέρα 22 καὶ ἡ τρίτη 20.

Πόσον θὰ λάβη ἑκάστη ; (α' 16800, β' 13200, γ' 12000)

16) Εἰς μίαν συναναστροφὴν ἦσαν 40 ἄτομα, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά. Οἱ ἄνδρες ἦσαν διπλάσιοι τῶν γυναικῶν καὶ αἱ γυναῖκες τριπλάσιοι τῶν παιδίων. Πόσοι ἦσαν οἱ ἄνδρες, πόσαι αἱ γυναῖκες καὶ πόσα τὰ παιδιά ;

Δύσις. Ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι ἦτο 1 παιδίον, τότε αἱ γυναῖκες θὰ ἦσαν 3 καὶ οἱ ἄνδρες 6. Μεριζόμεν τώρα τὸν ἀριθμὸν 40 ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 1, 3 καὶ 6 καὶ εὐρίσκομεν ὅτι τὰ παιδιά ἦσαν 4, αἱ γυναῖκες 12 καὶ οἱ ἄνδρες 24.

17) Τρεῖς ἔμποροι ἐκέρδισαν ἐκ τοῦ ἐμπορίου τῶν 17900 δρ. Ἐκ τούτων ὁ πρῶτος θὰ λάβῃ 15% περισσότερον τοῦ δευτέρου, ὁ δὲ δεύτερος 20% περισσότερον τοῦ τρίτου. Πόσον θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

Δύσις. Ἐὰν ὁ γ' λάβῃ 100 δραχμὰς, ὁ β' θὰ λάβῃ 120 καὶ ὁ α' 138. Μεριζόμεν τώρα τὸν ἀριθμὸν 17900 ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν τούτων καὶ εὐρίσκομεν ὅτι ὁ γ' θὰ λάβῃ 5000, ὁ β' 6000 καὶ ὁ α' 6900.

18) Τρεῖς συνέταιροι ἐκέρδισαν ἐκ τοῦ ἐμπορίου τῶν 6000 δρ. Ὁ πρῶτος ἔχει καταθέσει τὰ $\frac{3}{8}$ τοῦ ὀλικοῦ κεφαλαίου τῶν, ὁ δεύτερος τὸ τρίτον αὐτοῦ καὶ ὁ τρίτος τὸ ὑπόλοιπον, τὸ ὅποιον ἦτο 7000 δρ. Ζητεῖται πόσον κατέθεσεν ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος καὶ πόσον κέρδος ἔλαβεν ἕκαστος.

Ἴδε λύσιν 23ου προβλήματος σελ. 106. Εὐρίσκομεν κεφ. 9000, 8000· κέρδος 2250, 2000, 1750.

19) Πατήρ τις διέταξεν ἐν τῇ διαθήκῃ του, ὅπως ἡ περιουσία του, συγκειμένη ἐκ 45800 δρ. διανεμηθῇ ὡς ἐξῆς· ὁ υἱὸς του νὰ λάβῃ τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ μεριδίου τῆς θυγατρὸς του, ἡ δὲ σύζυγός του νὰ λάβῃ τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ μεριδίου τοῦ υἱοῦ, ἀλλὰ πρὸ τοῦ μερισμοῦ πρέπει νὰ λάβῃ τὸ δημόσιον 10% φόρον. Ποῖα εἶναι τὰ μερίδιά των ;

Δύσις. Τὸ δημόσιον θὰ λάβῃ 4580, ἐπομένως οἱ κληρονόμοι θὰ λάβουν 45800—4580 ἢ 41220 δρ. Ἐὰν παραστήσωμεν τὸ μερίδιον τῆς θυγατρὸς διὰ τῆς μονάδος 1, τότε τὸ μερίδιον τοῦ υἱοῦ θὰ παρασταθῇ διὰ τοῦ κλάσματος $\frac{3}{4}$ καὶ τὸ μερίδιον τῆς συζύγου διὰ $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$ ἢ $\frac{2}{4}$. Μεριζόμεν τώρα τὸν ἀριθμὸν 41220 ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{4}$, ἢ τῶν 4, 3, 2, καὶ εὐρίσκομεν ὅτι ἡ θυγάτηρ θὰ λάβῃ 18320, ὁ υἱὸς 13740 καὶ ἡ σύζυγος 9160.

20) Μήτηρ τις ἐμοίρασε 20 μῆλα εἰς τὰ τρία τέκνα της· εἰς τὸ δεύτερον ἔδωκε τὰ $\frac{3}{5}$ τῶν ὄσων ἔδωκεν εἰς τὸ πρῶτον, εἰς δὲ τὸ τρίτον

ἔδωκε τὸ τέταρτον τῶν ὄσων ἔδωκεν εἰς τὰ δύο ἄλλα. Πόσα μῆλα ἔδωκεν εἰς ἕκαστον τέκνον ;

(10, 6, 4).

21) Μίαν ἄμπελον ἔσκαψαν εἰς 6 ἡμέρας 7 ἄνδρες καὶ 5 γυναῖκες καὶ ἔλαβον ὁμοῦ 570 δρ. Ἐκαστος τῶν ἀνδρῶν ἐλάμβανε διπλάσιον ἡμερομίσθιον ἐκάστης γυναικός. Πόσον ἦτο τὸ ἡμερομίσθιον ἐκάστου ἀνδρὸς καὶ πόσον ἐκάστης γυναικός ;

Δύσις. Εἰς μίαν ἡμέραν λαμβάνουν ὅλοι 570 : 6 ἢ 95 δρ. Ἐὰν υποθέσωμεν ὅτι ἐκάστη τῶν γυναικῶν λαμβάνει τὴν ἡμέραν 1 δραχμὴν, ὅτε ἕκαστος τῶν ἀνδρῶν θὰ λαμβάνῃ 2 δραχμάς, καὶ μερίσωμεν τὰς 95 δρ. εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν γινομένων 7×2 ἢ 14 καὶ 5×1 ἢ 5, θὰ εὐρωμεν ὅτι λαμβάνουν τὴν ἡμέραν

οἱ 7 ἄνδρες 70 δρ. καὶ ἐπομένως ὁ εἷς 10 δρ.

αἱ 5 γυναῖκ. 25 δρ. » » ἡ μία 5 δρ.

Περὶ ἀναμίξεως.

229. Ὅταν οἱ ἔμποροι ἔχωσι διαφόρους ποιότητας ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος, παραδ. χάριν καφέ, καὶ δὲν δύνανται νὰ πωλήσωσιν εὐκόλως ἐκάστην ποιότητα χωριστὰ (διότι οὔτε ἡ καλὴ ποιότης πωλεῖται εὐκόλως ὡς ἀκριβὴ οὔτε καὶ ἡ κακὴ ποιότης), ἀναγκάζονται ἐνίοτε νὰ ἀναμιγνύωσι τὰς ποιότητας ταύτας καὶ νὰ σχηματίζωσι μίγμα μετρίας ποιότητος καὶ μετρίας ἀξίας· οὕτω δὲ εὐκολύνουσι τὴν πώλησιν τοῦ πράγματος τούτου.

Τὰ προβλήματα τῆς ἀναμίξεως διακρίνονται κυρίως εἰς τὰ ἐξῆς δύο εἶδη.

Πρῶτον εἶδος.

230. Εἰς τὸ πρῶτον εἶδος δίδονται πρὸς ἀνάμειξιν αἱ ποσότητες δύο ἢ περισσοτέρων πραγμάτων, δυναμένων νὰ ἀναμιχθῶσι, καὶ ἡ τιμὴ τῆς μονάδος ἐκάστου αὐτῶν, ζητεῖται δὲ ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μίγματος.

Ἐστω, παραδ. χάριν, τὸ ἐξῆς πρόβλημα.

Ἀνέμιξέ τις σίτον τριῶν εἰδῶν ἐκ τοῦ πρώτου εἶδους ἔλαβεν 100 ὀκάδας, τοῦ ὁποίου τὴν ὀκᾶν πωλεῖ πρὸς 80 λεπτά, ἐκ τοῦ δευτέρου εἶδους ἔλαβε 200 ὀκ., τοῦ ὁποίου τὴν ὀκᾶν πωλεῖ πρὸς 75 λεπτά, καὶ ἐκ τοῦ τρίτου εἶδους ἔλαβε 500 ὀκ., τοῦ ὁποίου τὴν ὀκᾶν πωλεῖ πρὸς 72 λεπτά. Ζητεῖται πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὴν ὀκᾶν τοῦ μίγματος, διὰ νὰ λάβῃ τὰ αὐτὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἐλάμβανεν, ἂν ἐπώλει ἕκαστον εἶδος χωριστὰ.

Δύσις. Ἄν ἐπώλει ἕκαστον εἶδος χωριστὰ, θὰ ἐλάμβανεν, ἀπὸ τὸ πρῶτον εἶδος 100×80 ἢ 8000 λεπτά, ἀπὸ τὸ δεύτερον 200×75 ἢ 15000 λεπτά, καὶ ἀπὸ τὸ τρίτον 500×72 ἢ 36000 λ. Ὡστε θὰ

ἐλάμβανεν ἐν ὄλῳ 8000 + 15000 + 36000 ἢ 59000 λεπτά· τόσα λοιπὸν λεπτά πρέπει νὰ λάβῃ καὶ ἀπὸ τὸ μίγμα, τὸ ὁποῖον εἶναι 100 + 200 + 500 ἢ 800 ὀκάδες, ἐπομένως πρέπει νὰ πωλήσῃ τὴν ὀκᾶν 59000 : 800, ἥτοι $73\frac{3}{4}$ τοῦ λεπτοῦ.

$$\begin{array}{r} \text{Διάταξις τῆς πράξεως} \\ 100 \times 80 = 8000 \\ 200 \times 75 = 15000 \\ 500 \times 72 = 36000 \\ \hline 800 \qquad 59000 \end{array}$$

59000 : 800, ἥτοι $73\frac{3}{4}$ τοῦ λεπτοῦ.

Δεύτερον εἶδος.

231. Εἰς τὸ δεύτερον εἶδος δίδονται αἱ τιμαὶ τῆς μονάδος δύο πραγμάτων καὶ ζητεῖται πόσον θὰ λάβωμεν ἀπὸ ἕκαστον εἶδος, διὰ νὰ σχηματίσωμεν μίγμα ὠρισμένης ποσότητος, τοῦ ὁποῖου ἡ τιμὴ τῆς μονάδος νὰ εἶναι ἐπίσης ὠρισμένη, κειμένη δὲ μεταξὺ τῶν τιμῶν τῆς μονάδος τῶν δοθέντων πραγμάτων.

Ἐστω, παραδ. χάριν, τὸ ἐξῆς πρόβλημα.

Ἔχει τις δύο εἶδη ἀλεύρου· τοῦ πρώτου εἶδους τὴν ὀκᾶν πωλεῖ πρὸς 90 λεπτά, τοῦ δὲ δευτέρου πρὸς 80. Πόσας ὀκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ ἕκαστον εἶδος, διὰ νὰ σχηματίσῃ μίγμα 1200 ὀκάδων, τοῦ ὁποῖου τὴν ὀκᾶν νὰ πωλῇ πρὸς 83 λ. καὶ νὰ λάβῃ τὰ αὐτὰ χρήματα ;

Λύσις. Ἡ ὀκᾶ τοῦ πρώτου εἶδους πωλεῖται χωριστὰ 90 λεπτά, εἰς τὸ μίγμα ὅμως εὐρισκομένη θὰ πωλῆται 83 λεπτά, ἐπομένως θὰ χάνῃ 7 λεπτά. Ἡ ὀκᾶ τοῦ δευτέρου εἶδους πωλεῖται χωριστὰ 80 λ., εἰς τὸ μίγμα ὅμως θὰ πωλῆται 83 λεπτά, ἐπομένως θὰ κερδίξῃ 3 λ.

Ἐὰν λοιπὸν λάβῃ ἀπὸ τὸ πρῶτον εἶδος 3 ὀκάδας (ἥτοι ὅσα λεπτά κερδίζει ἀπὸ μίαν ὀκᾶν τοῦ δευτέρου), θὰ χάσῃ εἰς τὸ μίγμα 7×3 , ἥτοι 21 λ. Ἐὰν δὲ λάβῃ ἀπὸ τὸ δεύτερον εἶδος 7 ὀκάδας (ἥτοι ὅσα λεπτά χάνει ἀπὸ μίαν ὀκᾶν τοῦ πρώτου), θὰ κερδίσῃ εἰς τὸ μίγμα 3×7 , ἥτοι πάλιν 21 λεπτά.

Ὅστε οὔτε θὰ χάνῃ οὔτε θὰ κερδίξῃ εἰς τὸ μίγμα, ὅταν λαμβάνῃ ἀπὸ τὸ πρῶτον εἶδος 3 ὀκ. καὶ ἀπὸ τὸ δεύτερον εἶδος 7 ὀκ. Αὕτη λοιπὸν ἡ ἀναλογία πρέπει νὰ τηρῆται πρὸς σχηματισμὸν τοῦ μίγματος· ὅσας δηλ. φορὰς λαμβάνει ἀπὸ τὸ πρῶτον τὰς 3 ὀκάδας, τόσας φορὰς πρέπει νὰ λαμβάνῃ ἀπὸ τὸ δεύτερον τὰς 7 ὀκ. Διὰ τοῦτο μερίζομεν τὸν ἀριθμὸν 1200 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 7 καὶ εὐρίσκομεν ὅτι πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸ πρῶτον 360 ὀκ. καὶ ἀπὸ τὸ δεύτερον 840 ὀκ.

Ἡ ἀνωτέρω πράξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

	α' 90		3
μεριστέος 1200 δκ		83	
	β' 80		7
			10

$$\alpha' \frac{1200 \times 3}{10} \text{ ἢ } 360, \quad \beta' \frac{1200 \times 7}{10} \text{ ἢ } 840$$

Ἦτοι γράφομεν μεταξύ τῶν δύο δοθεισῶν τιμῶν τὴν τιμὴν τοῦ μίγματος καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ τῆς τιμῆς τοῦ α' εἴδους γράφομεν τὴν διαφορὰν τῆς τιμῆς τοῦ μίγματος καὶ τῆς τιμῆς τοῦ β' εἴδους, πρὸς δὲ τὰ δεξιὰ τῆς τιμῆς τοῦ β' εἴδους γράφομεν τὴν διαφορὰν τῆς τιμῆς τοῦ μίγματος καὶ τῆς τιμῆς τοῦ α' εἴδους. Κατόπιν μερίζομεν τὸν μεριστέον ἀριθμὸν ἀναλόγως τῶν διαφορῶν τούτων.

Ἐστὼ προσέτι καὶ τὸ ἔξῃς πρόβλημα.

Οἰνοπώλης τις ἔχει δύο εἶδη οἴνου· τοῦ πρώτου εἴδους ἡ δκᾶ κοστίζει 55 λεπτά, τοῦ δὲ δευτέρου 43. Πόσας δκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ ἕκαστον εἶδος, διὰ νὰ γεμίσῃ βαρέλιον 300 δκάδων, τοῦ ὁποίου ἡ δκᾶ νὰ κοστίζῃ 50 λεπτά ;

Διάταξις τῆς πράξεως.

	α' 55		7
μεριστέος 300 δκ.		50	
	β' 43		5
			12

$$\alpha' \frac{300 \times 7}{12} \text{ ἢ } 175 \text{ δκ.}, \quad \beta' \frac{300 \times 5}{12} \text{ ἢ } 125 \text{ δκ.}$$

232. Εἰς τὰ προβλήματα τῆς ἀναμίξεως ὑπάγονται καὶ τὰ προβλήματα τῶν μεταλλικῶν κράματων, τῶν παραγομένων ἐκ τῆς συγχωνεύσεως δύο ἢ περισσοτέρων μετάλλων, καὶ λύονται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. Εἶδομεν (ἐδ. 172) ὅτι **βαθμὸς καθαρότητος ἢ τίτλος** κράματος πολυτίμου μετάλλου (χρυσοῦ ἢ ἀργύρου) μετὰ μὴ πολυτίμου μετάλλου λέγεται τὸ ποσὸν τοῦ πολυτίμου μετάλλου, τὸ ὁποῖον περιέχεται εἰς μίαν μονάδα τοῦ κράματος.

Πρόβλημα. Χρυσοχόος τις συνεχώνευσε 30 δράμια ἀργύρου, τοῦ ὁποίου ὁ τίτλος ἢ βαθμὸς καθαρότητος εἶναι 0,920, μετὰ 10 δραμίων ἀργύρου, τοῦ ὁποίου ὁ τίτλος εἶναι 0,800. Ποῖος εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κράματος ;

Λύσις. Ἀφοῦ 1 δράμιον τοῦ πρώτου περιέχει καθαρὸν ἄργυρον τὰ 0,920 τοῦ δραμίου, τὰ 30 δράμια θὰ περιέχουν $0,920 \times 30$ ἢ 27,600 τοῦ δραμίου· ὁμοίως σκεπτόμενοι εὐρίσκομεν ὅτι τὰ 10 δράμια περιέχουν καθαρὸν ἄργυρον $0,800 \times 10$ ἢ 8 δράμια. Ὡστε τὰ 40 δράμια τοῦ κράματος περιέχουν καθαρὸν ἄργυρον $27,600 + 8$ ἢ 35,600

τοῦ δραμίου καὶ ἐπομένως τὸ 1 δράμιον περιέχει 35,600 : 40 ἢ 0,890. Τόσος λοιπὸν εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κράματος.

Διάταξις τῆς πράξεως. $30 \times 0,920 = 27,600$
 $10 \times 0,800 = 8,000$

40 35,600
 35,600 : 40 ἢ 0,890

Πρόβλημα. Ἐχει τις δύο τεμάχια χρυσοῦ τοῦ πρώτου ὁ τίτλος εἶναι 0,900, τοῦ δὲ δευτέρου 0,820. Πόσον πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ ἕκαστον εἶδος, διὰ νὰ σχηματίσῃ κράμα 32 δραμίων, τοῦ ὁποίου ὁ τίτλος νὰ εἶναι 0,850 ;

Λύσις. Ἀπὸ 1 δράμιον τοῦ πρώτου θὰ ἔχῃ εἰς τὸ κράμα περίσσευμα 0,900—0,850 ἢ 0,050 τοῦ δραμίου καθαροῦ χρυσοῦ. Ἀπὸ 1 δράμιον τοῦ δευτέρου θὰ ἔχῃ εἰς τὸ κράμα ἔλλειμμα 0,850—0,820 ἢ 0,030 τοῦ δραμίου καθαροῦ χρυσοῦ.

Ἐὰν λοιπὸν λάβῃ ἀπὸ τὸ πρῶτον εἶδος 0,030 τοῦ δραμίου, θὰ ἔχῃ εἰς τὸ κράμα περίσσευμα $0,050 \times 0,030$ τοῦ δραμίου καθαροῦ χρυσοῦ. Ἐὰν δὲ λάβῃ ἀπὸ τὸ δεύτερον 0,050 τοῦ δραμίου, θὰ ἔχῃ εἰς τὸ κράμα ἔλλειμμα $0,830 \times 0,050$ τοῦ δραμίου καθαροῦ χρυσοῦ, ἦτοι πάλιν τὸ αὐτὸ ποσόν. Ὡστε οὔτε περίσσευμα οὔτε ἔλλειμμα θὰ ἔχῃ εἰς τὸ κράμα, ὅταν λαμβάνῃ ἀπὸ τὸ πρῶτον 0,030 τοῦ δραμίου καὶ ἀπὸ τοῦ δευτέρου 0,050.

Μερίζομεν τώρα τὸν ἀριθμὸν 32 ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 0,030 καὶ 0,050 ἢ τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 5 (ἔδ. 227, παρατήρησις) καὶ εὐρίσκομεν ὅτι πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸ α' 12 δρᾶμ. καὶ ἀπὸ τὸ β' 20.

Διάταξις τῆς πράξεως.

	α' 0,900	0,030 ἢ 3	
μεριστέος 32		0,850	
	β' 0,820	0,050 ἢ 5	
		<hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/>	8

α' $\frac{32 \times 3}{8}$ ἢ 12, β' $\frac{32 \times 5}{8}$ ἢ 20.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἠγόρασέ τις 1400 δκ. οἴνου πρὸς 60 λεπτά τὴν δκᾶν καὶ 800 δκ. ἄλλου εἶδους πρὸς 70 λ. τὴν δκᾶν. Ἐὰν ἀναμίξῃ τὰ εἶδη ταῦτα μὲ 300 δκ. ὕδατος, πόσον τοῦ κοστίζει ἡ δκᾶ τοῦ κράματος ; (56 λ.)

2) Παντοπώλης τις ἀνέμιξε λίπος, τοῦ ὁποίου ἡ δκᾶ ἀξίζει 6 δραχμᾶς, μὲ τετραπλασίας δκάδας βουτύρου, τοῦ ὁποίου ἡ δκᾶ ἀξίζει 15 δραχμᾶς. Πόσον πρέπει νὰ πωλῇ τὴν δκᾶν τοῦ μίγματος, διὰ νὰ κερδίξῃ ἀπὸ ἑκάστην δκᾶν δρ. 2,40 ; (15,60)

Σημ. Λίπος δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ὁσονδήποτε, ἔστω 1 ὀκᾶν, ἐπομένως βούτυρον θὰ λάβωμεν 4 ὀκ.

3) Καφεπώλης τις ἀνέμιξεν 8 ὀκ. καφέ, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 80. 5,50, μὲ 2 ὀκ. σίτου, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 80 λ. Πόσον πρέπει νὰ πωλῇ τὴν ὀκᾶν τοῦ μίγματος, διὰ νὰ κερδίῃ 25% ἐπὶ τῆς ἀξίας του ; (5.70)

4) Ἔχει τις δύο εἶδη ἀλεύρου, τῶν ὁποίων ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 95 καὶ 80 λεπτά. Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν πρέπει νὰ ἀναμίξῃ τὰ εἶδη ταῦτα, ὥστε ἡ ὀκᾶ τοῦ μίγματος νὰ ἀξίῃ 84 λεπτά ; (νὰ λαμβάνῃ 4 ὀκ. ἀπὸ τὸ α' καὶ 11 ἀπὸ τὸ β')

5) Ἔχει τις σίτον καὶ κριθήν· τοῦ σίτου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 70 λεπτά, τῆς δὲ κριθῆς 50. Πόσας ὀκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ ἕκαστον εἶδος, διὰ νὰ σχηματίσῃ μίγμα 1000 ὀκ. καὶ ἀξίας 620 δραχμῶν ;

Λύσις. Ἡ ὀκᾶ τοῦ μίγματος ἀξίζει 620 : 1000 ἢ 62 λ. Λύομεν τώρα τὸ πρόβλημα, ὅπως καὶ τὰ ἐν τῷ ἐδαφίῳ 231, καὶ εὐρίσκομεν 600 ὀκ. καὶ 400 ὀκ.

6) Χρυσοχόος τις συνεχώνουσε 13 δράμια χρυσοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ τίτλος εἶναι 0,900, μετὰ 2 δραμίων χαλκοῦ. Πόσος εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κράματος ;

Λύσις. Τὰ 15 δράμια τοῦ κράματος περιέχουν καθαρὸν χρυσὸν $0,900 \times 13$ ἢ 11,700 τοῦ δραμίου, ἐπομένως ὁ τίτλος εἶναι $11,700 : 15$ ἢ 0,780.

7) Κόσμημά τι ἐκ χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ ἔχει βάρους 60 γραμμαρίων καὶ τίτλον 16 καρατίων. Πόσος χρυσοῦ καὶ πόσος χαλκοῦ ὑπάρχει ;

Λύσις. Χρυσὸς $60 \times \frac{16}{24}$ ἢ 40 γραμ. (ἴδε ἐδάφ. 172, σημ.) καὶ χαλκὸς 20 γρ.

8) Ἀνέμιξέ τις 120 ὀκ. βουτύρου, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 10 δραχμάς, μὲ 180 ὀκ. ἄλλου εἶδους, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 9 δραχμάς. Κατόπιν ἐπώλησε τὸ μίγμα πρὸς 11,75 δρ. τὴν ὀκᾶν. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισεν ;

Λύσις. Εὐρίσκομεν ὅτι ἡ ὀκᾶ τοῦ μίγματος ἀξίζει 9,40 δρ., ἐπομένως ἐκέρδισεν $11,75 - 9,40$ ἢ 2,35.

Ἐφ' οὗ εἰς τὰς 9,40 ἐκέρδισε 2,35
 » » 100 » γ

εὐρίσκομεν 25 %.

9) Ἠγόρασε τις δύο εἶδη ἐλαίου, ἦτοι 800 ὀκ. πρὸς 80. 2,40 τὴν ὀκᾶν καὶ 200 ὀκ. πρὸς 2,10 τὴν ὀκᾶν· ἐξώδευσε προσέτι διὰ τὴν μεταφορὰν αὐτοῦ 5 % ἐπὶ τῆς ἀξίας του. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὴν ὀκᾶν τοῦ μίγματος, διὰ νὰ κερδίσῃ ἕξ ὄλου τοῦ μίγματος 443 δραχμάς ;

Λύσις. Τὰ δύο εἶδη ἀξίζουν 2340 δρ. Ἐφ' οὗ εἰς τὰς 100 δρ. ἐξώ-

δευσε 5, εις τὰς 2340 εὐρίσκομεν ὅτι ἐξώδευσεν 117 δρ., ἐπομένως τὸ ἔλαιον κοστίζει $2340 + 117$ ἢ 2457 δρ. Ἐκ τῆς πωλήσεως πρέπει νὰ λάβῃ $2457 + 443$ ἢ 2900 δρ. καὶ ἐπομένως πρέπει νὰ πωλήσῃ τὴν ὀκᾶν $2900 : 1000$ ἢ 2,90 δρ.

10) Παντοπώλης τις ἔχει δύο εἶδη καφέ· ἐὰν λάβῃ ἐκ τοῦ πρώτου εἴδους 40 ὀκ., τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 5,20 δρ., πόσας ὀκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἐκ τοῦ δευτέρου εἴδους, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 4,70, διὰ νὰ κάμῃ μίγμα, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ νὰ ἀξίξῃ 4,90 :

Λύσις. Ἀπὸ μίαν ὀκᾶν τοῦ α' θὰ χάνῃ εἰς τὸ μίγμα 30 λ. καὶ ἀπὸ τὰς 40 ὀκ. θὰ χάνῃ 1200 λεπτά· ταῦτα πρέπει νὰ κερδίσῃ ἀπὸ τὸ β' εἶδος, διὰ νὰ μὴ προκύψῃ ζημία. Ἄλλ' ἀπὸ μίαν ὀκᾶν τοῦ β' εἴδους θὰ κερδίξῃ εἰς τὸ μίγμα 20 λεπτά, ὥστε διὰ νὰ κερδίσῃ τὰ 1200 λεπτά, πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸ β' τόσας ὀκάδας, ὅσας φορὰς ὁ 20 χωρεῖ εἰς τὸν 1200, ἦτοι $1200 : 20$ ἢ 60 ὀκάδας.

11) Ἐχει τις μίγμα 500 ὀκ. σίτου, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 70 λεπτά, καὶ 400 ὀκ. ἄλλου εἴδους, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 62 λ. Πόσῃν κριθῆν, τῆς ὁποίας ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 52 λεπτά, πρέπει νὰ ἀναμίξῃ εἰς τὸ μίγμα τοῦτο, διὰ νὰ ἀξίξῃ ἡ ὀκᾶ τοῦ νέου μίγματος 65 λεπτά :

Λύσις. Τὰ δύο εἶδη τοῦ σίτου ἀποτελοῦσι μίγμα 900 ὀκάδων, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει $66\frac{4}{9}$ τοῦ λεπτοῦ. Λύομεν τώρα τὸ πρόβλημα, ὅπως καὶ τὸ ἀνωτέρω, καὶ εὐρίσκομεν ὅτι πρέπει νὰ ἀναμίξῃ 100 ὀκ. κριθῆς.

12) Οἰνοπώλης τις ἔχει οἶνον, τοῦ ὁποίου τὴν ὀκᾶν πωλεῖ πρὸς 90 λεπτά· πόσον ὕδωρ πρέπει νὰ ρίψῃ εἰς 600 ὀκ. οἴνου, ὥστε νὰ πωλῇ τὴν ὀκᾶν πρὸς 80 λεπτά καὶ νὰ λάβῃ τὰ αὐτὰ χρήματα :

Λύσις. Ἀπὸ τὰς 600 ὀκ. οἴνου θὰ χάσῃ 600×10 ἢ 6000 λ. Ταῦτα πρέπει νὰ κερδίσῃ ἀπὸ τὸ ὕδωρ· ἀλλ' ἐπειδὴ ἀπὸ ἐκάστην ὀκᾶν τοῦ ὕδατος, εὐρίσκομένην ἐντὸς τοῦ οἴνου, θὰ κερδίξῃ 80 λεπτά, διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ρίψῃ $6000 : 80$ ἢ 75 ὀκ. ὕδατος.

13) Πόσος χαλκὸς πρέπει νὰ συγχωνευθῇ μετὰ 40 γραμ. χρυσοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ τίτλος εἶναι 0,900, διὰ νὰ σχηματισθῇ κράμα τίτλου 0,750 :
(8 γρ.)

14) Παντοπώλης τις ἀνέμιξε 10 ὀκ. καφέ, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει δρ. 5,60, μετὰ 30 ὀκ. ἄλλου εἴδους καὶ ἐσημάτισε μίγμα, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ ἀξίζει 5 δρ. Πόσον ἀξίζει ἡ ὀκᾶ τοῦ δευτέρου εἴδους :

Λύσις. Τὸ μίγμα ἀξίζει 5×40 ἢ 200 δραχμάς, τὸ δὲ α' εἶδος ἀξίζει $5,60 \times 10$ ἢ 56 δρ. Ὡστε τὸ β' εἶδος ἀξίζει $200 - 56$ ἢ 144 δρ. καὶ ἐπομένως ἡ ὀκᾶ ἀξίζει $144 : 30$, ἦτοι 4,80.

Περὶ μέσου ὄρου.

233. **Μέσος ὄρος** ὁμοειδῶν ἀριθμῶν (ἢ ἀφρημένων) λέγεται τὸ πληκτικόν τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ, ὅστις ἐκφράζει τὸ πλῆθος αὐτῶν.

Πρὸς εὑρεσιν τοῦ μέσου ὄρου ἔστωσαν τὰ ἐξῆς προβλήματα.

1) Ἐμπορός τις εἰσέπραξεν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας τὰ ἐξῆς ποσά· τὴν πρώτην ἡμέραν 600 δραχμᾶς, τὴν δευτέραν 475 καὶ τὴν τρίτην 554. Πόση εἶναι ἡ κατὰ μέσον ὄρον εἰσπραξις ἐκάστης ἡμέρας;

Δύσις. Διαιροῦμεν τὸ ἀθροῖσμα $600 + 475 + 554$ ἢ 1629 διὰ 3 (διότι τρεῖς εἶναι οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ) καὶ εὐρίσκομεν πληκτικόν 543 δρ.

Λυνατὸν ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς νὰ ἐπαναλαμβάνεται δύο ἢ περισσοτέρας φορὰς, ὡς φαίνεται κατωτέρω.

2) Γυνὴ τις ἠγόραζεν ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἀπὸ μίαν ὀκᾶν κάρβουνα τὴν ἡμέραν μὲ τὰς ἐξῆς τιμὰς· τὰς τρεῖς πρώτας ἡμέρας πρὸς 30 λεπτά τὴν ὀκᾶν, τὰς δὲ ὑπολοίπους πρὸς 35 λ. τὴν ὀκᾶν. Πόσον ἠγόρασε κατὰ μέσον ὄρον τὴν ὀκᾶν;

Δύσις. Διαιροῦντες τὸ ἀθροῖσμα $30 + 30 + 30 + 35 + 35$ ἢ 160 διὰ 5 εὐρίσκομεν ὅτι ἡ κατὰ μέσον ὄρον τιμὴ τῆς ὀκᾶς εἶναι 32 λεπτά.

Τὸ αὐτὸ θέλομεν εὑρεῖν, ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἠγόρασε 3 ὀκ. πρὸς 30 λ. τὴν ὀκᾶν καὶ 2 ὀκ. πρὸς 35 λ. Διότι εἶναι

$$30 \times 3 = 90$$

$$35 \times 2 = 70$$

$$\frac{5}{160} : 5 = 32 \lambda.$$

Τὸ πρόβλημα βλέπομεν ὅτι λύεται, ὅπως καὶ τὰ προβλήματα τοῦ πρώτου εἴδους τῆς ἀναμίξεως.

Προβλήματα πρὸς ἀσκησιν.

1) Μαθητὴς τις ἔλαβεν εἰς τὰ διάφορα μαθήματά του τοὺς ἐξῆς βαθμοὺς 6, 8, 5, 9, 5, 7, 4, 10. Ποῖος εἶναι ὁ μέσος γενικὸς βαθμὸς αὐτοῦ;

(6,75)

2) Ἐπλήρωσέ τις δι' ἐνοίκιον τῆς οἰκίας του τὸ α' ἔτος 75 δρ. τὸν ἔτιον β', τὸ δὲ β' ἔτος 90 δρ. Πόσον ἐπλήρωσε κατὰ μέσον ὄρον τὸν ἔτιον γ' ;

(82,50)

3) Διὰ τὴν οἰκοδομὴν μιᾶς οἰκίας προσελήφθησαν 5 ἐργάται πρὸς 10 δρ. τὴν ἡμέραν ἕκαστος, 10 ἐργάται πρὸς 8 δρ. καὶ 5 ἐργ. πρὸς 6 δρ. Πόσον εἶναι κατὰ μέσον ὄρον τὸ ἡμερομίσθιον ἐκάστου ; (8 δρ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄.

ΠΕΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΡΙΖΗΣ

234. **Τετράγωνον** ἀριθμοῦ τινος λέγεται τὸ γινόμενον αὐτοῦ διὰ τὸν ἑαυτὸν του. Παραδ. χάριν, τὸ τετράγωνον τοῦ 5 εἶναι 5×5 , ἢτοι ὁ 25, τὸ τετράγωνον τοῦ 60 εἶναι 60×60 , ἢτοι ὁ 3600 κτλ.

Τὰ τετράγωνα τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 εἶναι τὰ ἐξῆς· 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81.

Κ. Ε. Παπανικητοπούλου, Πρακτικ. Ἀριθμητικὴ ἐκδ. δ', 9/6/927

14

Τετραγωνική ρίζα ἀριθμοῦ τινος λέγεται ὁ ἀριθμὸς, τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνον ἰσοῦται μὲ τὸν δοθέντα ἀριθμὸν.

Παραδ. χάριν, ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 36 εἶναι ὁ 6· διότι τὸ τετράγωνον τοῦ 6 εἶναι ὁ 36. Τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν παριστῶμεν συμβολικῶς διὰ τοῦ συμβόλου $\sqrt{\quad}$, τὸ ὁποῖον λέγεται **ριζικόν**, ὑποκάτω δὲ αὐτοῦ γράφομεν τὸν ἀριθμὸν, τοῦ ὁποίου ζητοῦμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν, ἥτοι $\sqrt{36}=6$.

Ἐὰν ὁμως θέλωμεν νὰ εὑρωμεν τὴν τετραγ. ρίζαν τοῦ 50, βλέπομεν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀκέραιος ἀριθμὸς, τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνον νὰ εἶναι ἴσον μὲ τὸν 50· διότι τὸ τετράγωνον τοῦ 7 εἶναι ὁ 49, τὸ δὲ τετράγωνον τοῦ 8 εἶναι ὁ 64. Ὡστε ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 50 περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν 7 καὶ 8, ἥτοι εἶναι μεγαλύτερα τοῦ 7 καὶ μικροτέρα τοῦ 8. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ὡς τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 50 λαμβάνομεν τὸν μικρότερον τῶν δύο τούτων ἀριθμῶν, ἥτοι τὸν 7, καὶ λέγομεν ὅτι ἡ τετραγ. ρίζα τοῦ 50 εἶναι **7 κατὰ προσέγγισιν μονάδος**, δηλ. τὸ λάθος, τὸ ὁποῖον κάμνομεν λαμβάνοντες τὸν 7, εἶναι μικρότερον μιᾶς ἀκεραίας μονάδος. Ὡστε

Τετραγωνικὴ ρίζα ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν μονάδος λέγεται ὁ μεγαλύτερος ἀκέραιος ἀριθμὸς, τοῦ ὁποίου τὸ τετράγωνον χωρεῖ εἰς τὸν ἀριθμὸν τούτον.

Παραδ. χάριν, ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 70 εἶναι ὁ 8· διότι τὸ τετράγωνον τοῦ 8, ἥτοι ὁ 64, χωρεῖ εἰς τὸν 70, ἐνῶ τὸ τετράγωνον τοῦ 9, ἥτοι ὁ 81, δὲν χωρεῖ.

Ἐῤυρεσις τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ἀκεραίου ἀριθμοῦ.

235. Ἄν ὁ δοθεὶς ἀκέραιος ἀριθμὸς εἶναι μικρότερος τοῦ 100, ἡ τετραγωνικὴ ρίζα αὐτοῦ θὰ εἶναι μικροτέρα τοῦ 10 (διότι ἡ τετραγ. ρίζα τοῦ 100 εἶναι 10), ἥτοι θὰ εἶναι μονοψήφιος ἀριθμὸς, καὶ ἐπομένως εὐρίσκεται αὕτη εὐκόλως ἀπὸ μνήμης. Ἄν δὲ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 100, τότε πρὸς εῤυρεσιν τῆς τετραγωνικῆς ρίζης αὐτοῦ πράττομεν ὡς ἑξῆς.

Ἐστω, παραδ. χάριν, νὰ ἔξαχθῇ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ 390638. Χωρίζομεν αὐτὸν εἰς διψήφια τμήματα διὰ στιγμῶν ἀρχόμενοι ἀπὸ τὰ δεξιὰ, ἥτοι 39.06.38· τὸ τελευταῖον πρὸς τὰ ἀριστερὰ τμήματα δυνατὸν νὰ ἔχη καὶ ἓν μόνον ψηφίον. Ἐπειτα εὐρίσκομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ πρώτου πρὸς τὰ ἀριστερὰ τμήματος, ἥτοι τοῦ 39, ἥτις εἶναι 6 (κατὰ προσέγγισιν μονάδος), καὶ αὕτη εἶναι τὸ πρῶτον ψηφίον τῆς ζητουμένης ρίζης τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ, τὸ ὁποῖον γράφομεν πρὸς τὰ δεξιὰ αὐτοῦ χωρίζομένου διὰ γραμμῆς (ὄπως εἰς τὴν διαίρεσιν). Τὸ τετράγωνον τοῦ 6, ἥτοι τὸν 36, ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ πρώτου πρὸς τὰ ἀριστερὰ τμήματος, ἥτοι ἀπὸ τοῦ 39, καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ εὑρεθέντος ὑπολοίπου 3 καταβιβάζομεν τὸ ἐπόμενον διψήφιον τμήμα, ἥτοι τὸ 06 ὅτε σχηματίζεται ὁ ἀριθμὸς 306 (ἴδε κατωτέρω διάταξιν τῆς πράξεως).

Τοῦ ἀριθμοῦ τούτου χωρίζομεν διὰ στιγμῆς τὸ πρὸς τὰ δεξιὰ ψηφίον του, ἥτοι τὸ 6, τὸν δὲ ἄλλον πρὸς τὰ ἀριστερὰ του ἀριθμὸν, ἥτοι

τὸν 30, διαιροῦμεν διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ εὐρεθέντος πρώτου ψηφίου τῆς ρίζης, ἦτοι διὰ τοῦ 6×2 ἢ 12, τὸν ὅποιον γράφομεν ὑποκάτω τῆς ρίζης, τὸ δὲ πηλίκον 2 γράφομεν πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ 12· τὸν οὕτω σχηματισθέντα ἀριθμὸν 122 πολλαπλασιάζομεν μὲ αὐτὸ τὸ εὐρεθὲν πηλίκον 2, καὶ ἂν τὸ γινόμενον ἀφαιρῆται ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 306, γράφομεν τότε τὸ ψηφίον 2 ὡς δεύτερον ψηφίον τῆς ρίζης· εἰ δὲ μὴ, δοκιμάζομεν τὸ κατὰ μονάδα μικρότερον ψηφίον τοῦ 2 (ἕως ὅτου δηλ. ἡ ἀφαίρεσις νὰ εἶναι δυνατὴ). Ἐνταῦθα τὸ γινόμενον 122×2 ἢ 244 ἀφαιρεῖται ἀπὸ τοῦ 306 καὶ εὐρίσκεται ὑπόλοιπον 62, γράφομεν λοιπὸν τὸ 2 ὡς δεύτερον ψηφίον τῆς ρίζης, εἰς δὲ τὰ δεξιὰ τοῦ εὐρεθέντος ὑπολοίπου 62 καταβιβάζομεν καὶ τὸ ἐπόμενον διψήφιον τμήμα 38, ὅτε σχηματίζεται ὁ ἀριθμὸς 6238.

Τοῦ ἀριθμοῦ τούτου πάλιν χωρίζομεν τὸ πρὸς τὰ δεξιὰ ψηφίον του 8, τὸν δὲ ἄλλον ἀριθμὸν 623 διαιροῦμεν διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ εὐρεθέντος μέρους τῆς ρίζης, ἦτοι διὰ τοῦ 62×2 ἢ 124, καὶ τὸ πηλίκον 5 γράφομεν πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ 124· τὸν δὲ οὕτω σχηματισθέντα ἀριθμὸν 1245 πολλαπλασιάζομεν μὲ αὐτὸ τὸ εὐρεθὲν πηλίκον 5, καὶ ἂν τὸ γινόμενον ἀφαιρῆται ἀπὸ τοῦ 6238, γράφομεν τότε τὸ ψηφίον 5 ὡς τρίτον ψηφίον τῆς ρίζης· εἰ δὲ μὴ, δοκιμάζομεν τὸ κατὰ μονάδα μικρότερον ψηφίον τοῦ 5. Ἐνταῦθα ὁμως τὸ γινόμενον 1245×5 ἢ 6225 ἀφαιρεῖται ἀπὸ τοῦ 6238 καὶ εὐρίσκεται ὑπόλοιπον 13. Ὡστε ἡ τετραγ. ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ 390638 εἶναι 625 κατὰ προσέγγισιν μονάδος. Ἐὰν εὐρεθῇ ὑπόλοιπον μηδέν, τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς εἶναι τέλειον τετράγωνον.

Ἡ ἀνωτέρω πράξις διατάσσεται ὡς ἑξῆς·

$$\begin{array}{r|rr}
 39.06.38 & 625 & \\
 \hline
 36. & 122 & 1245 \\
 \hline
 30.6 & 2 & 5 \\
 \hline
 24.4 & 244 & 6225 \\
 \hline
 6.23.8 & & \\
 6.22.5 & & \\
 \hline
 13 & &
 \end{array}$$

Τὸν ἀνωτέρω τρόπον ἀκολουθοῦμεν διὰ τὴν ἔξαγωγὴν τῆς τετραγωνικῆς ρίζης καὶ οἰοῦνδήποτε ἄλλου ἀκεραίου ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ νὰ καταβιβάσωμεν ὅλα τὰ διψήφια τμήματα αὐτοῦ.

Σημ. Ἐὰν συμβῇ εἰς τινὰ τῶν διαιρέσεων νὰ μὴ χωρῆ εἰς τὸν διαιρετέον τὸ διπλάσιον μέρος τῆς εὐρεθείσης ρίζης, γράφομεν τότε μηδέν εἰς τὴν θέσιν τοῦ ζητουμένου ψηφίου τῆς ρίζης· ἔπειτα καταβιβάζομεν τὸ ἐπόμενον διψήφιον τμήμα καὶ ἔξακολουθοῦμεν τὴν πράξιν μας.

236. Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα μικτοῦ ἢ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν μονάδος εἶναι ἡ τετραγ. ρίζα τοῦ ἀκεραίου μέρους αὐτοῦ.

Παραδ. χάριν, ἡ τετρ. ρίζα τοῦ μικτοῦ ἀριθμοῦ $50\frac{3}{4}$ κατὰ προσέγγισιν

γισιν μονάδος εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 50, ἥτοι ὁ 7. Ἐπίσης ἡ τετρ. ρίζα τοῦ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ 18,376 κατὰ προσέγγισιν μονάδος εἶναι ἡ τετρ. ρίζα τοῦ ἀκεραίου 18, ἥτοι ὁ 4.

237. Διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν τετρ. ρίζαν ἀριθμοῦ τινος κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$ κτλ. τῆς ἀκεραίας μονάδος, πολλαπλασιάζομεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ τετράγωνον τοῦ παρονομαστοῦ καὶ ἐξάγομεν τὴν τετρ. ρίζαν τοῦ γινομένου κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος, κατόπιν δὲ διαιροῦμεν ταύτην διὰ τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ κλάσματος.

Παραδ. χάριν, διὰ νὰ εὐρωμεν τὴν τετρ. ρίζαν τοῦ 39 κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{10}$, πολλαπλασιάζομεν τὸν 39 ἐπὶ 100 καὶ τοῦ γινομένου 3900 εὐρίσκομεν τὴν τετρ. ρίζαν κατὰ προσέγγισιν μονάδος, ἣτις εἶναι 62· ταύτην διαιροῦμεν διὰ 10 καὶ εὐρίσκομεν 6,2. Αὕτη εἶναι ἡ τετρ. ρίζα τοῦ 39 κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{10}$ τῆς ἀκεραίας μονάδος.

Ἀσκήσεις.

Νὰ ἐξαχθῇ ἡ τετρ. ρίζα κατὰ προσέγγισιν μονάδος τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν 2436, 69270, 644824. (49, 263, 803).

Νὰ ἐξαχθῇ ἡ τετρ. ρίζα τοῦ δεκαδ. ἀριθμοῦ 45,72 κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{10}$ καὶ τοῦ δεκαδ. ἀριθμοῦ 783,5 κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{100}$ (6,7 καὶ 27,99)

Διάφορα προβλήματα.

1) Εἰς μίαν συναναστροφὴν ἦσαν 50 ἄτομα, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ· οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες ἦσαν ὁμοῦ 43, αἱ δὲ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ ἦσαν ὁμοῦ 22. Πόσοι ἦσαν οἱ ἄνδρες, πόσαι αἱ γυναῖκες καὶ πόσα τὰ παιδιὰ; (28, 15, 7).

2) Δύο ἐργάται διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργου τινὸς ἔλαβον ὁμοῦ 356 δραχμὰς· ὁ πρῶτος εἰργάσθη 20 ἡμέρας μὲ ἡμερομίσθιον κατὰ μίαν δραχμὴν περισσότερον τοῦ δευτέρου, ὁ δὲ δευτέρος εἰργάσθη 22 ἡμ. Πόσον εἶναι τὸ ἡμερομίσθιόν των; (9 καὶ 8 δρ.)

3) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε παρ' ἄλλου ἐμπόρου 60 πήχεις ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος πρὸς δρ. 4,50 τὸν πῆχυν· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐπλήρωσε τὸ ὑφασμα ἀμέσως, τοῦ ἐγένετο ἔκπτωσις, οὕτω δὲ ἐπλήρωσε δρ. 245,70. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐγένετο ἔκπτωσις; (9 %)

4) Ἦγόρασέ τις τρεῖς σάκκους ἀνθρώπων πρὸς δρ. 17,60 τὸν στατήρα καὶ ἔδωκε δρ. 58,30. Ὁ πρῶτος σάκκος περιεῖχε 48 δκ. 350 δράμια, ὁ δὲ δευτέρος 50 δκ. 150 δράμ. Πόσας δκάδας περιεῖχεν ὁ τρίτος σάκκος; (46 δκ. 200 δράμ.)

5) Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς, ὅστις διαιρούμενος διὰ 95 δίδει τὸ αὐτὸ πηλίκον, τὸ ὁποῖον δίδει καὶ ὁ 54128 διαιρούμενος διὰ 796; (6460)

6) Παις ἐρωτηθεὶς τὸ ἔτος 1921 περὶ τοῦ ἔτους τῆς γεννήσεώς του ἀπεκρίθη· ὅτε ἐγεννήθη, ὁ πατήρ μου ἦτο 57 ἐτῶν, τὸ δὲ γινόμενον

τῆς ἡλικίας μου καὶ τῆς τότε ἡλικίας τοῦ πατρὸς μου εἶναι 912. Ποῖον ἔτος ἐγεννήθη ; (τὸ 1905)

7) Πατὴρ καὶ υἱὸς ἀνέλαβον μίαν ἐργασίαν, ἀλλ' ὁ πατὴρ μὲ ἡμερομίσθιον 3 δραχμὰς περισσότερον τοῦ υἱοῦ· μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐργασίας ὁ μὲν πατὴρ ἔλαβεν 180 δραχ., ὁ δὲ υἱὸς 126. Πόσον ἦτο τὸ ἡμερομίσθιόν των ; (10 καὶ 7)

8) Χωρική τις ἔφερεν εἰς μίαν πόλιν αὐγά· ἐκ τούτων ἐπώλησεν εἰς τινα τὰ $\frac{2}{5}$ πρὸς 20 λεπτὰ ἕκαστον, τὰ $\frac{8}{9}$ τοῦ ὑπολοίπου ἐπώλησεν εἰς ἄλλον πρὸς 45 λεπτὰ τὸ ζεῦγος, τὰ δὲ ὑπόλοιπα 8 ἔσπασαν. Ζητεῖται πόσον ἔλαβεν ἀπὸ τὰ πωληθέντα αὐγά. (24 δρ.)

9) Φρουρὰ ἐκ 500 ἀνδρῶν ἔχει τροφὰς δι' ὠρισμένον χρόνον· ἐὰν προσέλθουν 100 ἄνδρες ἄνευ τροφῶν, πόσον πρέπει νὰ ἐλαττωθῇ τὸ ἀρχικὸν σιτηρέσιον, διὰ νὰ ἐπαρκέσουν αἱ τροφαὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ; (κατὰ τὸ $\frac{1}{6}$)

10) Οἰκόπεδόν τι, ἔχον μῆκος 30,70 πῆχ. καὶ πλάτος 25 πῆχεις, ἠγοράσθη ἀντὶ 4912 δραχμῶν· μετὰ 1 ἔτος 3 μ. ἐπωλήθη μὲ κέρδος 24%. Ζητεῖται πρὸς πόσον ἐπωλήθη ὁ τετραγ. πῆχυς. (8,32 δρ.)

11) Ἡγόρασέ τις 880 πορτοκάλια πρὸς 15 λεπτὰ τὰ δύο καὶ 720 πρὸς 20 λ. τὰ τρία· κατόπιν ἐπώλησεν αὐτὰ πρὸς 9 δραχ. τὰ ἑκατόν. Πόσον ἐκέρδισεν ; (30 δραχ.)

12) Ἀμαξηλάτης τις ἔλαβεν 165 δραχ. διὰ νὰ μεταφέρῃ ἀπὸ μιᾶς πόλεως εἰς ἄλλην 60 σάκκους ἀλεύρου, ἕκαστος τῶν ὁποίων εἶχε βάρος 55 ὀκάδας· συνεφώνησε δὲ πρὸς 10 λεπτὰ τὰς 100 ὀκάδας δι' ἕκαστον χιλιόμετρον. Πόση εἶναι ἡ μεταξὺ τῶν δύο πόλεων ἀπόστασις ; (50 χλμ.)

13) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασεν 25 πῆχεις ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος πρὸς 20 δρ. τὸν πῆχυν· κατόπιν ἐπώλησεν ἕξ αὐτοῦ $16\frac{3}{4}$ τοῦ πῆχεως πρὸς 24 δρ. τὸν πῆχυν, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἐπώλησε πρὸς 25 δρ. τὸν πῆχυν. Ζητεῖται πόσον τοῖς ἑκατόν ἐκέρδισεν. (21,65 %)

14) Εἰς ἓν ἐργοστάσιον ἐργάζονται 24 ἄνδρες καὶ 36 γυναῖκες καὶ λαμβάνουσιν εἰς τὸ τέλος ἐκάστης ἐβδομάδος 1728 δραχμὰς, δὲν ἐργάζονται ὅμως τὰς Κυριακάς. Ἄλλ' ὅσον λαμβάνουν ὅλοι οἱ ἄνδρες τὴν ἡμέραν, τόσον λαμβάνουν καὶ αἱ γυναῖκες. Ζητεῖται πόσον λαμβάνει ἕκαστος τῶν ἀνδρῶν τὴν ἡμέραν καὶ πόσον ἐκάστη τῶν γυναικῶν. (6 καὶ 4 δρ.)

15) Ἡγόρασέ τις δύο εἶδη σίτου· τὸ πρῶτον εἶδος πρὸς 75 λεπτὰ τὴν ὀκᾶν, τὸ δὲ δεύτερον εἶδος πρὸς 68 λεπτὰ τὴν ὀκᾶν. Πόσας ὀκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ ἕκαστον εἶδος, διὰ νὰ σχηματίσῃ μίγμα 1400 ὀκάδων, τὸ ὁποῖον νὰ πωλήσῃ πρὸς 77 λεπτὰ τὴν ὀκᾶν καὶ νὰ κερδίσῃ 10 % ;

Δύσις. Εὐρίσκομεν ὅτι ἡ ὀκᾶ τοῦ μίγματος κοστίζει 70 λ. Κατό-

πιν λύομεν τὸ πρόβλημα, ὅπως καὶ τὰ ἐν τῷ ἔδαφίῳ 231, καὶ εὐρίσκομεν ὅτι θὰ λάβῃ ἐκ τοῦ πρώτου 400 ὀκ. καὶ ἐκ τοῦ δευτέρου 1000.

16) Ἐμπορὸς τις εἶχε δύο εἶδη καφέ· τὸ πρῶτον εἶδος πωλεῖ πρὸς δρ. 6,60 τὴν ὀκᾶν καὶ κερδίζει 20 %, τὸ δὲ δεύτερον εἶδος πωλεῖ πρὸς 5,75 τὴν ὀκᾶν καὶ κερδίζει 15 %. Ἐὰν ἀναμίξῃ ἴσας ποσότητας ἐξ αὐτῶν, πόσον πρέπει νὰ πωλῇ τὴν ὀκᾶν διὰ νὰ κερδίσῃ 12% ; (5,88)

17) Ἐμπορὸς τις πτωχεύσας συνεβιβάσθη νὰ πληρώσῃ εἰς τοὺς τρεῖς δανειστάς του 40%, οὕτω δὲ ἐπλήρωσεν εἰς μὲν τὸν πρῶτον 12000 δραχμᾶς, εἰς δὲ τὸν δεύτερον 11200 δρ. καὶ εἰς τὸν τρίτον τὰ $\frac{4}{5}$ τῶν ὅσων ἐπλήρωσεν εἰς τὸν πρῶτον. Πόσον ὄφειλεν εἰς ἕκαστον ;

(30000, 28000, 24000)

18) Ἀτιμόπλοιοι, διανύον 12 μίλια τὴν ὥραν, ἀνεχώρησεν ἀπὸ μιᾶς πόλεως ἡμέραν Τετάρτην καὶ ὥραν 9ην μ.μ. διευθυνόμενον εἰς ἄλλην πόλιν. ἀπέχουσιν 654 μίλια. Ζητεῖται ποίαν ἡμέραν καὶ ποίαν ὥραν θὰ φθάσῃ.

(Σάββατον ὥραν 6 π. μ.)

19) Σιτέμπορὸς τις ἠγόρασεν 60000 ὀκ. κριθῆς πρὸς 60 λεπτὰ τὴν ὀκᾶν· κατόπιν ἐπώλησε τὰ $\frac{3}{5}$ αὐτῆς μὲ κέρδος 12,50%, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἐπώλησεν ἀντὶ 15600 δρ. Πόσον ἐκέρδισε ;

(3900 δρ.)

20) Ἠγόρασέ τις πορτοκάλια καὶ λεμόνια ἐν ὄλῳ 8000· ἀλλὰ τὰ λεμόνια ἦσαν 2800 περισσότερα τῶν πορτοκαλίων καὶ ἠγοράσθησαν πρὸς 3 δραχ. τὰ ἑκατόν, ἀλλὰ 5 λεμόνια ἀξίζουν ὅσον 2 πορτοκάλια. Ζητεῖται πόσον ἔδωκεν ἐν ὄλῳ.

(357 δραχ.)

21) Πατήρ τις ἀποθανὼν διέταξεν ἐν τῇ διαθήκῃ του, ὅπως ἡ περιουσία του μοιρασθῇ ἐξ ἴσου εἰς τὴν σύζυγόν του καὶ τὰ 6 τέκνα του· ἀλλ' ἡ σύζυγος καὶ ἐν τῶν τέκνων του ἀπέθανον πρὸ τοῦ μερισμοῦ τῆς περιουσίας, τούτου δ' ἕνεκα ἕκαστον τῶν ἄλλων τέκνων ἔλαβεν ἀκόμη 2936 δραχμᾶς. Πόση ἦτο ἡ περιουσία του ;

(51380)

22) Γραμματίον, λήγον τὸ ἔτος 1922 Ἀπριλίου 8, προεξωφλήθη πρὸς 6% ἀντὶ 4624 δραχμῶν καὶ ἐγένετο ὑφαίρεσις (ἔξωτ.) 176 δρ. Πότε προεξωφλήθη τὸ γραμματίον ;

(τὸ ἔτος 1921 Αὐγ. 28)

23) Γυνή τις ἠγόρασεν 7 πήχ. 5 ρούπ. ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος πρὸς 6 δρ. τὸν πήχυν καὶ 8 μανδήλια πρὸς δρ. 16,20 τὴν δωδεκάδα καὶ ἔδωκεν ἐν ἑκατοντάδραχμον. Πόσον ἔλαβεν ὑπόλοιπον ;

(43,45)

24) Δύο ἀνθρώποι ἠγόρασαν ὁμοῦ 430 ὀκ. ἐλαίου ἀντὶ 1118 δραχμῶν· ὁ εἷς τούτων ἔλαβε 50 ὀκ. περισσότερον τοῦ ἄλλου. Πόσον πρέπει νὰ πληρώσῃ ἕκαστος ;

(624 καὶ 494)

25) Διὰ νὰ ἀγοράσῃ ἔμπορὸς τις 7 πήχεις ἐξ ἑνὸς ὑφάσματος, δίδει δρ. 25,20. Πόσον θὰ δώσῃ διὰ τρία τεμάχια τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος, ἔχοντος ἑκάστου μῆκος 30 πήχ. 5 ρ. ;

(330,75)

26) Χρυσοχόος τις θέλει νὰ συγχωνεύσῃ 80 γραμμάρια χρυσοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ τίτλος εἶναι 0,750, μετὰ καθαροῦ χρυσοῦ, ὥστε νὰ σχημα-

τίση κρᾶμα, τοῦ ὁποίου ὁ τίτλος νὰ εἶναι 0,840. Πόσον καθαρὸν χρυσὸν πρέπει νὰ συγχωνεύσῃ ; (45 γρ.)

27) Πόσον καθαρὸν χρυσὸν πρέπει νὰ συγχωνεύσωμεν μετὰ 84 γραμμάρια χρυσοῦ τῶν 16 καρατίων, διὰ νὰ σχηματίσωμεν κρᾶμα 18 καρατίων ; (28 γρ.)

28) Ἐπώλησέ τις ἐν οἰκόπεδον ἀντὶ 8800 δρ. καὶ ἐκέρδισε τὰ $\frac{2}{9}$ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς του. Πόσον τὸ εἶχεν ἀγοράσει ; (7200)

29) Ἐμπορὸς τις ἐπώλησεν ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος $9\frac{5}{8}$ τοῦ πήχους ἀντὶ δρ. 65,45 καὶ ἐκέρδισεν ἀπὸ ἕκαστον πῆχυν 80 λεπτά. Πόσον τοῦ κοστίζει ὁ πῆχυς ; (6 δρ.)

30) Ἐξώδευσέ τις τὸ πέμπτον τῶν χρημάτων του διὰ νὰ ἀγοράσῃ ἐν οἰκόπεδον, καὶ τὰ $\frac{3}{7}$ αὐτῶν διὰ νὰ κτίσῃ ἐπ' αὐτοῦ οἰκίαν, παρετήρησε δὲ ὅτι διὰ τὴν οἰκίαν ἐξώδευσεν 9600 δραχ. περισσότερον τοῦ οἰκοπέδου. Ζητεῖται πόσον τοῦ ἐκόστισεν ἡ οἰκία. (26400)

31) Κατέθεσέ τις εἰς μίαν τράπεζαν τὴν 20ῆν Μαρτίου κεφάλαιόν τι πρὸς $4\frac{1}{2}\%$, τὴν δὲ 10ῆν Αὐγούστου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἔλαβε κεφάλαιον καὶ τόκους ὁμοῦ 3256 δραχ. Πόσον κεφάλαιον εἶχε καταθέσει ; (3200)

32) Πόσον ἄργυρον τίτλου 0,750 πρέπει νὰ ἀνταλλάξωμεν μετὰ 150 δρᾶμια ἀργύρου τίτλου 0,920 ; (184 δρᾶμια)

33) Ἐργάτης τις εἰς 4 ὥρας δύναται νὰ ἐκτελέσῃ ἔργον τι, ἄλλος δὲ ἐργάτης εἰς $2\frac{2}{3}$ τῆς ὥρας δύναται νὰ ἐκτελέσῃ τὰ $\frac{5}{9}$ αὐτοῦ. Ἐὰν ἐργασθῶσι μαζί, εἰς πόσας ὥρας θὰ τελειώσωσι τὸ ἔργον ; $\left(2\frac{2}{11} \text{ ὥρας} \right)$

34) Φρουρὰ ἐκ 1140 ἀνδρῶν εἶχε τροφὰς διὰ 40 ἡμέρας· ἀλλὰ μετὰ 16 ἡμέρας, γενομένης μάχης, ἐφονεύθησαν 152 ἄνδρες, αἱ δὲ ὑπάρχουσαι τροφαὶ τῶν ἠδὲξήθησαν κατὰ $\frac{1}{12}$ ἐκ τῶν τροφῶν τοῦ ὑποχωρήσαντος ἐχθροῦ. Ζητεῖται πόσας ἡμέρας θὰ διαρκέσωσιν αἱ τροφαὶ τῶν. (30)

35) Γραμματίον, λήγον τὸ ἔτος 1922 Φεβρουαρίου 15, προεξωφλήθη τὸ ἔτος 1921 Νοεμβρίου 25 πρὸς 6,50% καὶ ἐγένετο ὑφαίρεσις (ἔξωτ.) 52 δρ. Ποία ἦτο ἡ ὀνομαστικὴ του ἀξία ; (3600 δρ.)

36) Διὰ νὰ κατασκευάσῃ ἔμπορὸς τις 10 ἐνδυμασίας (ἴσας) ἕξ ἐνὸς ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ πλάτος εἶναι 1 πῆχ. 4 ρούπια, χρειάζεται 48 πῆχ. 6 ρ. Διὰ νὰ κατασκευάσῃ 14 ἐνδυμασίας ἕξ ἄλλου ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ πλάτος εἶναι 1 πῆχυς 6 ρούπια, πόσους πῆχους θὰ χρειασθῇ ; $\left(58\frac{1}{2} \text{ πῆχους} \right)$

37) Ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις γραμματίου προεξοφληθέντος 5 μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς του εἶναι δραχ. 10,25, ἢ δὲ ἐσωτερικὴ 10. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον προεξοφλήθη ;

Δύσις. Ἡ διαφορὰ 10,25— 10 ἢ 0,25 εἶναι ὁ τόκος τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαίρεσεως 10 ὥστε τὸ ἐπιτόκιον εἶναι 6 %.

38) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασεν ὕφασμά τι πρὸς δρ. 8,40 τὴν ὑάρδα, ἐδαπάνησε δὲ προσέτι διὰ μεταφορὰν αὐτοῦ 20 % . Πόσον πρέπει νὰ πωλῇ τὸν πῆχυν, διὰ νὰ κερδίσῃ 25 % ; (Ὁ ἐμπορικὸς πῆχυς εἶναι τὰ 0,7 τῆς ὑάρδας).

39) Ἐὰν συγχωνεύσωμεν 142 γραμ. χρυσοῦ μὲ 8 γρ. χαλκοῦ, θὰ ἔχωμεν χρᾶμα τίτλου 0,852. Ποῖος εἶναι ὁ τίτλος τοῦ χρυσοῦ ; (0,900)

40) Εἶχέ τις 8 στατηῆρας ἀνθράκων ἔξ αὐτῶν ἐπώλησεν εἰς τινα 2 στ. 20 ὀκ. 300 δράμια, εἰς ἄλλον δὲ ἐπώλησε τὰ $\frac{3}{5}$ τοῦ ὑπολοίπου.

Πόσον τοῦ ἔμειναν ;

(2 στ. 9 ὀκ. 120 δρ.)

41) Ἠγόρασέ τις δύο οἰκόπεδα· τὸ μὲν ἐν ἀντὶ 8600 δραχμῶν, τὸ δὲ ἄλλο ἀντὶ 12000· μετὰ 1 ἔτος 4 μῆνας ἐπώλησε τὸ α' μὲ κέρδος 9%, τὸ δὲ β' μὲ ζημίαν 3%. Ἐὰν κατέθετε τὰ χρήματά του εἰς μίαν Τράπεζαν πρὸς $4\frac{1}{2}$ %, θὰ ἦτο ἐπικερδέστερον ;

(ἐκ τῆς Τραπεζῆς θὰ εἶχε περιπλέον κέρδος 684 δρ.)

42) Ἠγόρασέ τις οἰκόπεδον, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος εἶναι 90 μέτρα καὶ τὸ πλάτος 80 μ., πρὸς 5 δρ. τὸ τετρ. μέτρον κατόπιν ἐπώλησεν αὐτὸ πρὸς δρ. 3,50 τὸν τετραγ. τεκτονικὸν πῆχυν. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισεν ;

(24,44%)

43) Διὰ νὰ ἀγοράσῃ τις 10 στ. 20 ὀκ. 200 δρᾶμ. ἔξ ἐνὸς πράγμα-τος, δίδει δρ. 184,20. Πόσον θὰ δώσῃ διὰ $3\frac{2}{5}$ τοῦ στατηῆρος ; (59,84)

44) Ἐρωτηθεὶς τις περὶ τῆς ἡλικίας του ἀπεκρίθη· μετὰ 4 ἔτη ἀπὸ τοῦ γάμου μου ἀπέκτησα θυγατέρα, ἣτις εἶναι τῶρα 19 ἐτῶν· ἢ δὲ σύζυγός μου, ἣτις ἦτο μικροτέρα ἔμοῦ κατὰ 16 ἔτη, ἀπέθανε πρὸ δύο ἐτῶν ζήσασα μετ' ἔμοῦ τόσα ἔτη, ὅση ἦτο ἡ ἡλικία αὐτῆς, καθ' ἣν μὲ ἐνυμφεύθη. Ποία εἶναι ἡ ἡλικία του ;

(60 ἐτῶν)

45) Ὑπάλληλός τις ἔχει μηνιαῖον εἰσόδημα 576 δραχμᾶς· ἐκ τούτων τὰ $\frac{7}{9}$ εἶναι ἡ μισθοδοσία του, τὸ δὲ ὑπόλοιπον εἶναι ὁ τόκος κεφαλαίου, τοκισθέντος πρὸς 10%. Πόση εἶναι ἡ μισθοδοσία του καὶ πόσον τὸ τοκισθὲν κεφάλαιον ;

(448 καὶ 15360)

46) Ἐχει τις δύο εἶδη καφέ· ἐὰν λάβῃ ἐκ τοῦ α' 60 ὀκάδας, τοῦ ὁποίου ἢ ὀκᾶ ἀξίζει δρ. 6,40, πῶσας ὀκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἐκ τοῦ β' εἶδους, τοῦ ὁποίου ἢ ὀκᾶ ἀξίζει δρ. 5,20, διὰ νὰ κάμῃ μίγμα, τὸ ὁποῖον νὰ πωλήσῃ πρὸς 6,90 τὴν ὀκᾶν καὶ νὰ κερδίσῃ 64 δραχμᾶς ; (20 ὀκ.)

47) Ἐργοστασιάρχης τις ἐπώλησεν ἐμπόρευμά τι μὲ κέρδος 12%

ὁ δὲ ἔμπορος, ἀφοῦ ἐξώδευσε 5^ο/_ο διὰ τὴν μεταφορὰν του, μετεπώλησεν αὐτὸ πρὸς δρ. 12,50 τὸ μέτρον κερδίσας 25^ο/_ο. Πόσον ἐκόστιζε τὸ μέτρον εἰς τὸν ἐργοστασιάρχην ; (8,50)

48) Ἐμπορὸς τις ἐσημάτισε μίγμα 460 ὀκάδων ἐκ δύο εἰδῶν ἀλεύρου, τῶν ὁποίων ἡ ὀκά ἐκόστιζεν 80 καὶ 60 λεπτά, ἀλλ' ἀπὸ τὸ δεύτερον εἶδος ἔλαβε τετραπλασίας ὀκάδας· κατόπιν ἐπώλησε τὸ μίγμα καὶ ἐκέρδισε δρ. 29,44. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισεν ; (10^ο/_ο)

49) Ἔργον τι προϋπελογίσθη νὰ ἐκτελεσθῇ ἀντὶ 25000 δραχμῶν· ἐὰν δύναται τις νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἐκτέλεσιν τούτου ἀντὶ 22800 δραχμῶν, πόσον τοῖς ἑκατὸν ἔκπτωσιν πρέπει νὰ προσφέρῃ ἐπὶ τῆς προϋπολογισθείσης τιμῆς, διὰ νὰ κερδίσῃ 1400 δραχμάς ; (3,2^ο/_ο)

50) Ἐργάτης τις λαμβάνει ἡμερομίσθιον δρ. 9,80, ἀλλὰ δὲν ἐργάζεται τὰς Κυριακάς καὶ 18 ἡμέρας ἀκόμη τὸ ἔτος. Πόσον πρέπει νὰ ἐξοδεύῃ τὴν ἡμέραν, διὰ νὰ τοῦ μείνουν εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους 555 δραχμαί ; (6,40)

Σημ. Τὸ ἔτος λαμβάνεται μὲ 365 ἡμ.

51) Ἐμπορὸς τις κατέθεσε διὰ μίαν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν 4000 δραχμάς, μετὰ τινα δὲ χρόνον προσέλαβε συνεταιρον, ὅστις κατέθεσε 5000 δραχμάς. Μετὰ ἓν ἔτος ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐμπορίου λογαριασθέντες εὗρον ὅτι ἐκέρδισαν 1760 δραχμάς· ἐκ τοῦ κέρδους τούτου ὁ πρῶτος ἔλαβεν 960 δρ. Ζητεῖται μετὰ πόσον χρόνον ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐμπορίου προσελήφθη ὁ δεύτερος. (μετὰ 4 μῆνας)

52) Ἐχει τις τοκίσει εἰς τρία πρόσωπα 3300 δρ. ἐν ὄλῳ καὶ μὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτόκιον. Ἀπὸ τὸν α' λαμβάνει τόκον 40 δραχ. εἰς 6 μῆνας, ἀπὸ τὸν β' 100 δραχ. εἰς 10 μῆνας καὶ ἀπὸ τὸν τρίτον 64 δρ. εἰς 1 ἔτος. Ποῖα εἶναι τὰ τοκισθέντα κεφάλαια καὶ πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐτοκίσθησαν ;

Λύσις. Εὐρίσκομεν πρῶτον τοὺς τόκους αὐτῶν εἰς 1 μῆνα καὶ κατόπιν μερίζομεν τὸν ἀριθμὸν 33000 ἀναλόγως τῶν τόκων τούτων, οὕτω δὲ εὐρίσκομεν ὅτι τὰ κεφάλαια εἶναι 1000, 1500 καὶ 800 δραχμαί, τὸ δὲ ἐπιτόκιον εἶναι 8^ο/_ο.

53) Τρεῖς ἔμποροι κατέθεσαν ὁμοῦ διὰ μίαν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν των 19000 δραχμάς· τοῦ α' τὸ κεφάλαιον ἔμεινεν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν 10 μῆνας, τοῦ β' 8 καὶ τοῦ γ' 12. Μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ ἐμπορίου των ἔλαβον κέρδος ὁ α' 2400, ὁ β' 1440 καὶ ὁ γ' 1800. Πόσον κεφάλαιον εἶχε καταθέσει ἕκαστος ;

(Λύοντες τοῦτο, ὅπως τὸ ἀνωτέρω, εὐρίσκομεν 8000, 6000, 5000)

54) Τρεῖς ἔμποροι συνεταιρισθέντες ἔκαμον μίαν ἐμπορικὴν ἐπιχείρησιν, ἐκ τῆς ὁποίας ἐκέρδισαν 3000 δραχμάς· μετὰ τὴν διάλυσιν ταύτης ἔλαβον κεφάλαιον καὶ κέρδος ὁ μὲν α' 6000 δραχμάς, ὁ β' 7200, ὁ δὲ γ' 4800. Ζητεῖται πόσον κεφάλαιον εἶχε καταθέσει ἕκαστος. (5000, 6000, 4000)

55) Ὑπάλληλός τις ἐξώδευεν ἐκ τῆς μηνιαίας μισθοδοσίας του τὰ

$\frac{13}{15}$ αὐτῆς καὶ μετὰ 2 ἔτη 3 μῆνας εἶχεν οἰκονομήσει 2592 δρ. Πόση ἦτο ἡ μηνιαία μισθοδοσία του ; (720)

56) Παντοπώλης τις ἠγόρασε 280 ὀκάδας ἐλαίου καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐκρατήσε διὰ τὴν οἰκογένειάν του 15 ὀκ. 150 δράμα, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἐπώλησεν εἰς ἄλλον ἀντὶ δρ. 846,80. Πρὸς πόσον ἐπώλησε τὴν ὀκᾶν ; (3,20)

57) Ἀνθρωπὸς τις ἀπέθανε τὸ ἔτος 1915 Ἰουνίου 5 καὶ ὥραν 7 π. μ. 10 λ. καὶ ἔζησε 45 ἔτη 2 μῆν. 7 ἡμ. 8 ὥρ. 20 λ. Πότε ἐγεννήθη ; (τῷ 1870 Μαρτίου 25 καὶ ὥραν 10 μ. μ. 50 λ.)

58) Εἰς ἕκαστον στρατιώτην ἑνὸς συντάγματος ἐδίδετο ἄρτος 1 ὀκ. 380 δρᾶμ. διὰ 3 ἡμέρας καὶ ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἐμοιράσθησαν 11492 ὀκάδες, ἀλλὰ 80 στρατιῶται ἀπουσίαζον ἐπὶ 4 ἡμέρας. Ἐκ πόσων στρατιωτῶν ἀποτελεῖτο τὸ σύνταγμα ; (ἐκ 1800)

59) Ἐδανείσθη τις κεφάλαιόν τι πρὸς 12 % διὰ 7 μῆνας, ἀλλὰ μετὰ τὴν συμφωνίαν νὰ πληρώσῃ τὸν τόκον ἀφοῦ λοιπὸν ἐκρατήθη ὁ τόκος ἐκ τοῦ κεφαλαίου, ἔλαβε τὸ ὑπόλοιπον, τὸ ὁποῖον ἦτο 1302 δρ. Ζητεῖται πόσον κεφάλαιον ἐδανείσθη καὶ πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐδανείσθη πραγματικῶς. (1400, 12,90 %)

60) Ἀποθανὼν τις διέταξεν ἐν τῇ διαθήκῃ του, ὅπως ἡ περιουσία του διανεμηθῇ ὡς ἑξῆς· ἡ θυγάτηρ του νὰ λάβῃ τὰ $\frac{5}{8}$ αὐτῆς, ὁ υἱὸς του τὸ τέταρτον, τὸ δὲ ὑπόλοιπον νὰ κρατηθῇ εἰς μίαν τράπεζαν πρὸς 4,50 % καὶ ὁ ἐτήσιος τόκος αὐτοῦ, ὅστις εἶναι 225 δραχμαί, νὰ διανεμηθῇ εἰς πτωχὰς οἰκογενεῖας τῆς πατρίδος του. Πόση ἦτο ἡ περιουσία του καὶ πόσον θὰ λάβῃ ἡ θυγάτηρ καὶ ὁ υἱὸς ; (40000, 25000, 10000)

61) Νὰ μερισθῶσι 30000 δρ. εἰς τρεῖς κληρονόμους οὕτως, ὥστε τὸ μερίδιον τοῦ α' νὰ εἶναι πρὸς τὸ τοῦ β' ὡς ὁ 2 πρὸς τὸν 3, τὸ δὲ μερίδιον τοῦ β' νὰ εἶναι πρὸς τὸ τοῦ γ' ὡς ὁ 3 πρὸς τὸν 5.

Δύσεις. Μερίζομεν τὸν ἀριθμὸν 30000 ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 2, 3, 5 καὶ εὐρίσκομεν 6000, 9000, 15000.

62) Παντοπώλης τις ἠγόρασεν 60 ὀκ. καφέ· ἐξ αὐτοῦ ἐπώλησε τὰ $\frac{3}{5}$ πρὸς δρ. 4,80 τὴν ὀκᾶν, κατόπιν ἐλογάριασεν ὅτι τὸ ὑπόλοιπον τοῦ κοστίζει δρ. 3,30 ἡ ὀκᾶ. Ζητεῖται πόσον ἠγόρασε τὴν ὀκᾶν τοῦ καφέ ; (4,20)

63) Δύο ἔμποροι ἐκέρδισαν ἐκ τοῦ ἐμπορίου των 4990 δραχμάς· ἐκ τούτων ὁ πρῶτος ἔλαβε τριπλασίας τοῦ δευτέρου καὶ 30 δρ. ἀκόμη. Πόσον ἔλαβεν ἕκαστος ; (α' 3750, β' 1240)

64) Μία οἰκογένεια ἀποτελεῖται ἐκ τεσσάρων ἀτόμων (τοῦ πατρὸς, τῆς μητρὸς, τοῦ υἱοῦ καὶ τῆς θυγατρὸς)· αἱ ἡλικίαι καὶ τῶν τεσσάρων ἀποτελοῦσιν ὁμοῦ 123 ἔτη. Ὁ πατὴρ ἔχει διπλασίαν ἡλικίαν τῶν δύο τέκνων του, ἡ μήτηρ εἶναι τὰ $\frac{7}{9}$ τῆς ἡλικίας τοῦ πατρὸς, ἡ δὲ θυγάτηρ εἶναι τὰ $\frac{4}{5}$ τῆς ἡλικίας τοῦ υἱοῦ. Ποία εἶναι ἡ ἡλικία ἑκάστου ἀτόμου ; (54, 42, 15, 12)

65) Μὲ δρ. 3,40 ἠγόρασε τις πορτοκάλια καὶ λεμόνια ἐν ὄλῳ 25· ἀλλὰ τὰ πορτοκάλια ἠγόρασε πρὸς 15 λεπτά ἕκαστον, τὰ δὲ λεμόνια πρὸς 10. Πόσα πορτοκάλια καὶ πόσα λεμόνια ἠγόρασε ;

Δύσις. Ἐὰν ἦσαν ὅλα πορτοκάλια, θὰ ἔδιδεν 25×15 ἢ 375 λεπτά, ἀλλ' ἔδωκε 340 λ., ἦτοι 35 ὀλιγώτερον· ἢ διαφορά αὕτη προέρχεται ἀπὸ τὰ λεμόνια, ἐπειδὴ δὲ ἕκαστον λεμόνιον ἠγοράσθη 5 λ. ὀλιγώτερον ἑκάστου πορτοκαλίου, ἔπεται ὅτι ἦσαν τόσα λεμόνια, ὅσας φορὰς ὁ 5 χωρεῖ εἰς τὸν 35, ἦτοι 7, ἐπομένως τὰ πορτοκάλια ἦσαν 18.

66) Χωρική τις ἐπώλησε 83 αὐγά καὶ ἔλαβε δρ. 13,50· ἐκ τούτων ἄλλα μὲν ἐπώλησε πρὸς 18 λεπτά ἕκαστον, ἄλλα δὲ πρὸς 15 λ. Πόσα ἐπώλησε πρὸς 18 καὶ πόσα πρὸς 15 ;

(35 καὶ 48)

67) Ἐδάνεισέ τις κεφάλαιον τι καὶ μετὰ 9 μῆνας ἔλαβε διὰ κεφάλαιον καὶ τόκον ὁμοῦ 946 δρ. Ἐὰν ὁμοῦ ἐδάνειζε τὸ κεφάλαιον τοῦτο ἐπὶ 1 ἔτος 3 μῆν., θὰ ἐλάμβανε κεφάλαιον καὶ τόκον ὁμοῦ 990 δρ. Ζητεῖται πόσον εἶναι τὸ δανεισθὲν κεφάλαιον καὶ πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐδανείσθη.

Δύσις. Ἡ διαφορά 990—946 ἢ 44 δρ. εἶναι ὁ τόκος τοῦ ζητουμένου κεφαλαίου ἐπὶ 15—9 ἢ 6 μ. Ὡστε εἰς 1 μ. φέρει τόκον $\frac{44}{6}$ καὶ εἰς 9 μῆνας $\frac{44 \times 9}{6}$ ἢ 66 δρ. Τὸ κεφάλαιον λοιπὸν εἶναι 946—66 ἢ 880, τὸ δὲ ἐπιτόκιον εὐρίσκεται ὅτι εἶναι 10 %.

68) Τρεῖς ἔμποροι συνεταιρισθέντες κατέθεσαν ὁ μὲν πρῶτος 4680 δραχμάς, ὁ δεύτερος 7800 διὰ 9 μῆνας, ὁ δὲ τρίτος ποσὸν τι διὰ 8 μῆνας· μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ ἐμπορίου τῶν ἔλαβεν ἕκαστος τὸ αὐτὸ κέρδος. Ζητεῖται πόσον χρόνον ἔμεινε τὸ κεφάλαιον τοῦ πρώτου εἰς τὸ ἐμπόριον καὶ πόσον κατέθεσεν ὁ τρίτος.

Δύσις. Διὰ νὰ λάβωσι τὸ αὐτὸ κέρδος, συμπεραίνομεν ὅτι τὰ γινόμενα τῶν κεφαλαίων τῶν ἐπὶ τοὺς χρόνους εἶναι ἴσα. Ἀλλὰ τὸ δεύτερον γινόμενον εἶναι 7800×9 ἢ 70200 (τόσον εἶναι καὶ τὰ ἄλλα)· ὥστε τὸ κεφάλαιον τοῦ πρώτου ἔμεινεν εἰς τὸ ἐμπόριον $70200 : 4680$ ἢ 15 μῆνας, ὁ δὲ τρίτος κατέθεσεν $70200 : 8$ ἢ 8775 δρ.

69) Ἐμπορός τις ἠγόρασεν ἐμπορεύματα ἀξίας 12000 δραχμῶν, ἐπλήρωσε διὰ δὲ προμήθειαν $\frac{1}{2}$ %, καὶ διὰ ναῦλον κτλ. μέχρις ἀποθηκείσεως αὐτῶν 600 δρ. Ζητεῖται πόσον τοῖς ἑκατὸν ηἰξήθη ἢ ἀξία τῆς ἀγορᾶς τῶν ἐμπορευμάτων.

(κατὰ 5,50 %)

70) Ἐτόκισέ τις εἰς τινα τὰ $\frac{2}{5}$ τῶν χρημάτων του πρὸς 8 %, τὸ δὲ ὑπόλοιπον εἰς ἄλλον μὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτόκιον καὶ λαμβάνει ἐκ τοῦ δευτέρου ἐτήσιον τόκον 224 δρ. περισσότερον τοῦ πρώτου. Ποῖα εἶναι τὰ τοκισθέντα χρήματα ;

(5600 καὶ 8400)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.

Σκοπὸς καὶ χρησιμότης τῆς λογιστικῆς.

Ἡ λογιστικὴ εἶναι ἐπιστήμη, ἣτις διδάσκει νὰ καταχωρίζωμεν μεθοδικῶς τὰς διαφόρους πράξεις μιᾶς ἐπιχειρήσεως οὕτως, ὥστε νὰ γνωρίζωμεν εἰς οἰανδήποτε στιγμήν τὴν πραγματικὴν κατάστασιν αὐτῆς.

Ἡ λογιστικὴ παρουσιάζει δι' ἀριθμῶν τὴν οἰκονομικὴν κατάστασιν τοῦ ἐπιχειρηματίου. Δεικνύει εἰς αὐτὸν εἰς οἰανδήποτε στιγμήν τὴν θέσιν τῆς ἐπιχειρήσεώς του, τὴν κατάστασιν, εἰς ἣν εὐρίσκειται μετὰ τῶν προσώπων, μεθ' ὧν συναλλάσσεται, δηλαδὴ τί ὀφείλει καὶ τί ἔχει λαμβάνειν, τὰ ἐν τῷ ταμείῳ του μετρητὰ, τὴν ποσότητα καὶ τὴν ἀξίαν τῶν ἐν τῇ ἀποθήκῃ του εὐρισκομένων ἐμπορευμάτων, τὰς εἰσπράξεις καὶ τὰς πληρωμάς, ἃς ἔχει νὰ ἐνεργήσῃ, τὰς λήξεις τῶν γραμματίων κλπ.

Ἐν περιλήψει ἡ λογιστικὴ ὀφείλει νὰ ἐκπληροῖ τρεῖς σκοπούς.

1ον) Νὰ διατηρῆ ἴχνη τῶν γενομένων παρὰ μιᾶς ἐπιχειρήσεως πράξεων εἰς τρόπον, ὥστε ν' ἀνευρίσκωμεν ταύτας εὐκόλως.

2ον) Νὰ παρουσιάσῃ εἰς οἰανδήποτε στιγμήν τὴν θέσιν τοῦ ἐμποροῦ ὡς πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν (μετρητὰ, ἐμπορεύματα, γραμ. εἰσπρακτέα, τίτλοι κλπ.) καὶ ὡς πρὸς τοὺς τρίτους (πελάται, προμηθευταί, τραπεζῖται κλπ).

3ον) Νὰ ἐξακριβώνῃ εἰς οἰανδήποτε στιγμήν τ' ἀποτελέσματα τῆς ἐπιχειρήσεως, δηλαδὴ τί ἐκέρδισεν ἢ τί ἐζημίωσεν εἰς μίαν ὀρισμένην χρονικὴν περίοδον, συνήθως ἐνὸς ἔτους ἢ ἕξ μηνῶν.

Ἡ λογιστικὴ εἶναι χρήσιμος καὶ ἀπαραίτητος εἰς τὸν ἔμπορον, διότι μετὰ τὰ ἀποτελέσματα, τὰ ὅποια θὰ ἐξαγάγῃ, θὰ ὑποδείξῃ εἰς αὐτὸν τὰ ἀνάλογα μέτρα, τὰ ὅποια ὀφείλει νὰ λάβῃ διὰ νὰ περιορίσῃ ἢ ἀντιθέτως νὰ ἐξαπλώσῃ τὸν κύκλον τῶν ἐργασιῶν του.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Λογαριασμὸς (Μερίξ) λέγεται ὁ πίναξ τῶν ἐνεργουμένων πράξεων ὑπὸ ἐνὸς ἢ πλείονων προσώπων. Διακρίνομεν τοὺς λογαριασμοὺς διὰ τῶν ἐπικεφαλίδων ἢ τίτλων. Ὁ τίτλος ἐνὸς λ)σμοῦ εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ προσώπου, μεθ' οὗ ἐκτελοῦνται αἱ πράξεις μέσῳ τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἐπιχειρήσεως· οὕτως ὁ λ)σμὸς «ΤΖΑΚΑΣ καὶ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ» ἢ «ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΑΝΑΚΙΔΗ» παρουσιάζουν ἀμοιβαίως τὰς γινομένας πράξεις μεθ' ἐκάστου προσώπου ἢ εταιρείας. Οἱ ἐπ' ὀνόματι διαφόρων πελατῶν, προμηθευτῶν, τραπεζιτῶν κλπ. ἀνοιγόμενοι λ)σμοὶ ὀνομάζονται **προσωπικοὶ λ)σμοί**.

Ὑπάρχουν ὁμως καὶ ἕτεροι πράξεις, ἐνεργοῦμεναι ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐμποροῦ καὶ τῶν ὑπαλλήλων του. Οὕτως ὁ ἔμπορος ἐμπιστεύεται τὰ μετρητά του, τὰ ἐμπορεύματά του, τὰ γραμματία του κλπ. εἰς εἰδικοὺς ὑπαλλήλους, οἵτινες διαθέτουσι ταῦτα συμφώνως ταῖς ὁδηγίαις του καὶ κατὰ συνέπειαν ἀνοίγει ὁ ἔμπορος δι' ἕκαστον ὑπάλληλόν του ἓνα λογαριασμόν, ἵνα ἐλέγῃ τὴν κίνησιν τῶν ἐμπιστευθεισῶν ἀξιῶν.

Ὁ λ)σμός τοῦ Ταμείου π. χ., ἔνθα καταχωρίζονται αἱ εἰσαγωγαὶ καὶ ἐξαγωγαὶ τῶν νομισμάτων, ὀφείλει κανονικῶς νὰ φέρῃ τὸ ὄνομα τοῦ Ταμίου. Ἐπειδὴ ὁμοῦς ὁ ὑπάλληλος δύναται ν' ἀντικατασταθῇ ἀπὸ μιᾶς στιγμῆς εἰς ἄλλην, διὰ τοῦτο ἐπεκράτησεν ἡ συνήθεια νὰ τιτλοφορῶσι τοῦτον διὰ τῆς λέξεως « **Ταμεζόν** » ἀντὶ τοῦ Ταμίου. Τὴν αὐτὴν ἐξήγησιν δίδομεν καὶ διὰ τὸν λ)σμόν « **Ἐμπορεύματα** » ἢ « **Ἀποθήκη** » ἀντὶ τοῦ ἀποθηκαρίου κλπ.

Οἱ λ)σμοὶ οὗτοι λέγονται λ)σμοὶ ἀπρόσωποι, καίτοι κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἀποψίν μας ἀντιπροσωπεύουσι τὰ πρόσωπα, εἰς ἃ ὁ ἔμπορος ἐμπιστεύεται τὰς διαφόρους ἀξίας του.

Διὰ τὰς εἰς τοῦ λ)σμοῦ. Ὑποθέσωμεν ὅτι κρατοῦμεν τὰ βιβλία τοῦ οἴκου ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΡΑΝΑΚΙΔΗ, ἐμπόρων ὑφασμάτων, καὶ ἔχομεν ν' ἀνοίξωμεν τὸν λ)σμόν τῶν κ. κ. Τζάκα καὶ Δελαγραμμάτικα, πελατῶν τοῦ ἐν λόγῳ οἴκου, οἵτινες ἐνεργοῦσι τὰς ἀκολουθούσας πράξεις.

Τῆ 27 Ἰανουαρίου. Οἱ κ. κ. Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας ἀγοράζουσι παρὰ τῶν κ. κ. Ἀδελφῶν Τρανακίδη διάφορα ὑφάσματα ἀξίας Δρχ. 3.000.

Τῆ 1η Φεβρουαρίου. Οἱ κ. κ. Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας ἐπιστρέφουσιν ὑφάσματα ἀξίας Δρχ. 50, μὴ ὄντα σύμφωνα μὲ τὴν παραγγελίαν τῶν.

Τῆ 20 Φεβρουαρίου. Οἱ κ. κ. Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας ἐμέτρησαν εἰς τοὺς κ. κ. Ἀδελφούς Τρανακίδη ἔναντι τοῦ λ)σμοῦ τῶν Δρχ. 1.950.

Τῆ 25 Φεβρουαρίου. Οἱ κ. κ. Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας ἠγόρασαν παρὰ τῶν κ. κ. Ἀδελφῶν Τρανακίδη ἐμπορεύματα ἀξίας 5.000.

Τῆ 28 Φεβρουαρίου. Οἱ κ. κ. Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας ἐμέτρησαν εἰς τοὺς κ. κ. Ἀδελφούς Τρανακίδη ἔναντι λ)σμοῦ Δρχ. 4.000.

Ἴνα γνωρίσωμεν ποίου ποσοῦ θὰ εἶναι ὀφειλέται οἱ κ. κ. Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας εἰς τοὺς κ. κ. Ἀδελφούς Τρανακίδη τῆ 28 Φεβρουαρίου, θὰ πράξωμεν ὡς ἐξῆς :

Χωρίζομεν τὸν λ)σμόν εἰς δύο μέρη· καὶ εἰς μὲν τὸ ἀριστερὸν μέρος, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται **Δουῦναι** ἢ **Χορέωσις**, καταχωρίζομεν τὰ διάφορα ποσά, τὰ ὁποῖα λαμβάνει ὁ τιτλοῦχος τοῦ λ)σμοῦ καὶ ἐπομένως ὀφείλει τὸ ἀντίτιμον αὐτῶν. Ἐκαστον ποσὸν πρέπει νὰ συνοδεύηται ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας καὶ ὑπὸ συντόμου καὶ σαφοῦς αἰτιολογικῆς ἐκθέσεως ἐκάστης πράξεως. Εἰς τὸ δεξιὸν μέρος, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται

Λαβεῖν ἢ Πίστωσις, καταχωρίζομεν τὰ διάφορα ποσά, τὰ ὁποῖα καταθέτει ὁ τιλοῦχος τοῦ λ)σμοῦ καὶ ἐπομένως ὀφείλεται εἰς αὐτὸν τὸ ἀντίτιμον· ἕκαστον πάλιν ποσὸν πρέπει νὰ συνοδεύηται ὑπὸ τῆς ἡμερομηνίας καὶ συντόμου αἰτιολογικῆς ἐκθέσεως.

ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ἡμερομ.	Δεπτομέρεια	Ποσά	Ἡμερομ.	Δεπτομέρεια	Ποσά		
Ἰανουαρ.	27	Ἀξία ὑφασμάτων.	3.000	Φεβρουαρ.	1	Ἐπιστρ. ὑφάσμ.	50
Φεβρουαρ.	25	»	5.000	»	20	Μετρητὰ	1.950
				»	28	»	4.000
			8.000				6.000

Ἡ διαφορὰ τῶν δύο τούτων ἄθροισμάτων λέγεται **ὑπόλοιπον** τοῦ λ)σμοῦ. Ὡστε οἱ κ. κ. Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας

ὀφείλουσι Δοῦναι δρ. 8.000
δικαιοῦνται Λαβεῖν » 6.000
Ἐπόλοιπον 2.000

ἐπομένως τῇ 28 Φεβρουαρίου ὀφείλουσι Δοῦναι ὑπόλοιπον Δρ. 2.000

Ἐὰν τὸ ἄθροισμα τῆς χρεώσεως εἶναι μεγαλύτερον, ὀνομάζεται **ὑπόλοιπον χρεωστικόν**, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει **πιστωτικόν**.

Παρατήρησις. Τὰς λέξεις **Δοῦναι** καὶ **Λαβεῖν** εὐρίσκομεν πάντοτε εἰς τὰς ἐπικεφαλίδας τῶν λ)σμῶν. Πολλάκις ἀντικαθιστῶμεν αὐτάς διὰ τῶν ὄρων **Εἰσπράξεις** καὶ **Πληρωμαὶ ἢ Εἰσαγωγή** καὶ **Ἐξαγωγή**, ὅταν πρόκειται περὶ λ)σμῶν ἀντικειμένων, π. χ. μετρητῶν, ἐμπορευμάτων κ.λ.π.

Ἔτερον παράδειγμα. Ἐὰν ἀντὶ τοῦ λ)σμοῦ ἐνὸς πελάτου ἀνοίξωμεν ἓνα λ)σμὸν διὰ τὸν ὑπάλληλόν μας, π. χ. δι' ἐκεῖνον, εἰς ὃν ἐνεπιστεῦθημεν τὴν φύλαξιν τῶν ἐμπορευμάτων, ὁ τρόπος ἐνεργείας εἶναι ὁ αὐτὸς μὲ τὸν ὡς ἀνωτέρω ἐξεθέσαμεν.

Ἐποθέσωμεν τὰς ἀκολουθίους πράξεις, εἰς ἃς θέλομεν ἀναγνωρίσει καὶ τὴν κίνησιν μεταξὺ τῆς ἀποθήκης τοῦ οἴκου Ἀδελφῶν Τρανακίδη καὶ τῶν κ. κ. Τζάκα καὶ Δελαγραμμάτικα.

Τῇ 15 Ἰανουαρίου. Ἡ ἀποθήκη παρέλαβε παρὰ διαφόρων προμηθευτῶν ἐμπορεύματα ἀξίας Δρ. 50.000.

Τῇ 20 Ἰανουαρίου. Παρέδωκεν εἰς τὸν κ. Γεωργιάδην ἐπὶ πιστώσει ἐμπορεύματα ἀξίας Δρ. 10.000.

Τῇ 28 Ἰανουαρίου. Ἐπωλήσαμεν εἰς τοὺς κ. κ. Τζάκαν καὶ Δελαγραμμάτικαν ἐπὶ πιστώσει ἐμπορεύματα ἀξίας Δρχ. 3.000.

Τῇ 1 Φεβρουαρίου. Ἐπεστράφησαν παρὰ τῶν κ. κ. Τζάκα καὶ Δελαγραμμάτικα ἐμπορεύματα ἀξίας Δρχ. 50.

Τῇ 10 Φεβρουαρίου. Ἠγοράσθησαν παρὰ τοῦ κ. Α. Ἀλιπράντη καὶ Υἱῶν ἐμπορεύματα ἀξίας Δρ. 15.000.

Τῆ 20 Φεβρουαρίου. Ἐπωλήθησαν εἰς τοὺς κ. κ. Τζάκαν καὶ Δελαγραμμάτικαν ἐπὶ πιστώσει ἔμπορεύματα ἀξίας Δραχ. 5.000.

Ἡ κατάστασις τοῦ λ)σμοῦ τῆς ἀποθήκης θὰ παρουσιασθῆ μετ' ἐν χρεωστικὸν ὑπόλοιπον ἐκ δραχ. 47.000, τὸ ὁποῖον δι' ἰσχυρὰ ὅτι ὁ ἀποθηκάρχιος εἶναι ὀφειλέτης εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ποσοῦ δραχ. 47.000 εἰς ἔμπορεύματα. Ἐκ τῶν ὑστέρων παρατηροῦμεν ὅτι οὐσιαστικῶς τὸ ποσὸν τοῦτο δὲν παρουσιάζει τὴν ἀκριβῆ θέσιν τῆς ἐπιχειρήσεως· εἰς ἕτερον ὁμως κεφάλαιον θὰ ἐξετάσωμεν τὸν τρόπον, δι' οὗ θὰ φθάσωμεν εἰς τὰ ὀριστικὰ ἀποτελέσματα.

Παρατήρησις. Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ αὐτὴ πρᾶξις, π. χ. ἡ τῆς 28 Ἰανουαρίου (ἀγορὰ παρὸ Τζάκα καὶ Δελαγραμμάτικα ἔμπορευμάτων ἀξίας δραχ. 3.000) ὑφίσταται διπλῆν ἐγγραφὴν, μίαν εἰς χρέος τοῦ λ)σμοῦ «Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας» καὶ ἑτέραν εἰς πίστιν τοῦ λ)σμοῦ τῆς ἀποθήκης. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μετ' τὴν πρᾶξιν τῆς 20 Φεβρουαρίου, τὸ ἀντίστροφον ὁμως διὰ τὴν πρᾶξιν τῆς 1ης Φεβρουαρίου, ἐνθα πιστοῦνται οἱ κ. κ. Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας καὶ χρεοῦται ἡ ἀποθήκη.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνομεν ὅτι, διὰ νὰ διακρίνωμεν τὴν χρέωσιν τῆς πιστώσεως, ὀφείλομεν νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψει μας τὰ ἀκόλουθα.

Ἔστι λαμβάνει ΧΡΕΟΥΤΑΙ, ὅστις δίδει ΠΙΣΤΟΥΤΑΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ.

Τὰ διάφορα συστήματα λογιστικῆς.

Ὁ Νόμος ὑποχρεώνει ἕκαστον ἔμπορον νὰ τηρῆ τρία βιβλία. Τὸ **ἡμερολόγιον**, τὸ βιβλίον ἀπογραφῶν καὶ τὸ βιβλίον ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν. Τὸ βιβλίον ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν δὲν εἶναι βιβλίον λογιστικόν. Ἐπίσης τὸ βιβλίον ἀπογραφῶν δὲν εἶναι εἰμὴ βιβλίον, ἐνθα ἀντιγράφονται τὰ τελικὰ ἀποτελέσματα τῶν λογιστικῶν πράξεων. Ὡστε τὸ κύριον βιβλίον, ἐφ' οὗ καταχωρίζομεν τὰς διαφόρους πράξεις μιᾶς ἐπιχειρήσεως, εἶναι τὸ **ἡμερολόγιον**. Ἐπειδὴ ὁ Νόμος ὀρίζει νὰ κρατῶμεν τὸ βιβλίον τοῦ ἡμερολογίου, χωρὶς ὁμως καὶ νὰ καθορίζη σαφῶς τὸν τύπον, ὃν ὀφείλομεν ν' ἀκολουθῶμεν, ὡς ἐκ τούτου ἀρκετὸν εἶναι νὰ καταχωρίζομεν ὑπὸ οἰονδήποτε τύπον τὰς πράξεις μιᾶς ἐπιχειρήσεως, ἀρκεῖ μόνον ἢ καταχώρισις νὰ γίνηται μεθοδικῶς καὶ κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν ἀνευ κενῶν, συμπληρωμάτων καὶ ἀποξέσεων.

1ον) Ἀπλογραφικὴ λογιστικὴ.

Κατὰ τὴν μέθοδον ταύτην ἕκαστη πρᾶξις καταχωρίζεται ἀπλῶς εἰς τὸν λ)σμὸν τοῦ προσώπου, μετ' οὗ ὁ ἔμπορος συναλλάσσεται (ἀγοραστής, πωλητής, τραπεζίτης)· π. χ., ἐὰν οὗτος παρέδωκεν εἰς τοὺς κ. κ. Τζάκαν καὶ Δελαγραμμάτικαν τῆ 28 Ἰανουαρίου ἔμπορεύματα ἀξίας Δραχ. 3.000, θὰ καταχωρίσωμεν ἀπλῶς εἰς τὸ ἡμερολόγιόν μας ὅτι οἱ κ. κ. Τζάκας καὶ Δελαγραμμάτικας μᾶς ὀφείλουσι Δραχ. 3.000.

Ἡ διατύπωσις τῆς πράξεως θὰ γίνη ὡς ἀκολούθως.

28 Ἰανουαρίου ΤΖΑΚΑΣ καὶ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ Δοῦναι Δραχ. 3.000.

Τὸ ποσὸν δὲ τοῦτο μεταφέρομεν εἰς χρέος τοῦ λ)σμοῦ τῶν κ. κ.

Τζάκα και Δελαγραμμάτικα, ὃν θ' ἀνοίξωμεν εἰς εἰδικὸν βιβλίον ὀνομαζόμενον **καθολικόν**. Ὅταν οἱ κ. κ. Τζάκας και Δελαγραμμάτικας μᾶς μετρήσουν ἔναντι τοῦ λ)σμοῦ τῶν τήν 28 Φεβρουαρίου Δοχ. 1.950, θὰ διατυπώσωμεν τὴν πράξιν ἐν τῷ ἡμερολογίῳ ὡς ἀκολούθως.

28 Φεβρουαρίου Τζάκας και Δελαγραμμάτικας Λαβεῖν δοχ. 1.950.

Τὸ ποσὸν δὲ τοῦτο φέρομεν εἰς πίστιν τοῦ λ)σμοῦ τῶν κ. κ. Τζάκα και Δελαγραμμάτικα. Ἐν περιλήψει, ἵνα καθορίσωμεν τὴν φύσιν τῆς ἔγγραφῆς ἐν τῷ ἡμερολογίῳ, πρέπει νὰ θέτωμεν τὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα.

Ἐὰν ὁ μεθ' οὗ συναλλασσόμεθα λαμβάνη, ὀφείλει ΔΟΥΝΑΙ.

Ἐὰν ὁ μεθ' οὗ συναλλασσόμεθα δίδη, ὀφείλει ΛΑΒΕΙΝ.

Ἡ λογιστικὴ αὕτη εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ὑπὸ τοῦ Νόμου καθοριζομένην, ὅστις ἀπαιτεῖ, ἵνα ἅπασαι αἱ πράξεις (ἔσωτερικαὶ και ἔξωτερικαὶ) καταχωρίζονται εἰς τὰ βιβλία, ἐνῶ ὡς ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει, δὲν ἀναφέρονται εἰμὴ αἱ ἔξωτερικαὶ πράξεις. Ὅταν ὁ ἔμπορος δίδη εἰς τοὺς κ.κ. Τζάκαν και Δελαγραμμάτικαν ἔμπορεύματα ἀξίας Δοχ. 3.000, κυρίως δύο πρόσωπα ἐνδιαφέρονται.

1ον) Οἱ Τζάκας και Δελαγραμμάτικας, οἵτινες λαμβάνουσιν ἔμπορεύματα ἀξίας Δοχ. 3.000. (Ἡ ἔγγραφὴ αὕτη δὲν καταχωρίζεται εἰς τὴν ἀπλογραφικὴν λογιστικὴν).

2ον) Ὁ ἔμπορος οὗτινος τὰ ἔμπορεύματα ἠλαττώθησαν κατὰ Δοχ. 3.000. (Ἡ ἔγγραφὴ αὕτη δὲν καταχωρίζεται εἰς τὴν ἀπλογραφικὴν λογιστικὴν).

Οὕτω κατὰ τὴν ἀπλογραφικὴν μέθοδον αἱ κινητοποιήσεις τῶν μετρητῶν, τῶν ἔμπορευμάτων, τῶν γραμματίων εἰσπρακτέων κλπ. δὲν καταχωρίζονται. Ὡς ἐκ τούτου ὁ ἔλεγχος καθίσταται δυσχερῆς και δύναμεθα εὐκόλως νὰ ὑποπέσωμεν εἰς λάθη.

2ον) Διπλογραφικὸν σύστημα.

Τὸ διπλογραφικὸν σύστημα καταργεῖ τὰς δυσχερείας ταύτας.

Ἐκάστη ἐνεργουμένη πράξις ἐξετάζεται ὑπὸ δύο ἀπόψεις: 1ον) μετὰ τοῦ προσώπου μεθ' οὗ συναλλάσσεται ὁ ἔμπορος, και 2ον) μετ' αὐτοῦ τοῦ ἰδίου ἐμπορίου. Ἐὰν ὁ ἔμπορος παραδίδη εἰς τοὺς κ.κ. Τζάκαν και Δελαγραμμάτικαν ἔμπορεύματα ἀξίας Δοχ. 3.000, θὰ χρεώσῃ αὐτοὺς μὲ τὸ ποσὸν τοῦτο, ὅπερ τῷ ὀφείλουσι, θὰ πιστωθῇ δ' ἀφ' ἑτέρου ὁ ἴδιος μὲ Δοχ. 3.000, αἵτινες ἀντιπροσωπεύουσι τὴν ἀξίαν τοῦ χορηγηθέντος ἐπὶ πιστώσει ἔμπορεύματος. Ὅστε δὲν θὰ εἴπωμεν πλέον ὅτι

«οἱ Τζάκας και Δελαγραμμάτικας ὀφείλουσι 3.000»,

ἀλλὰ θὰ προσθέσωμεν ὅτι τὰς ὀφείλουσιν εἰς τὸν παρ' οὗ ἔλαβον τὰ ἔμπορεύματα ἀποθηκάριον, δηλαδὴ εἰς τὰ «**ἔμπορεύματα**», και θὰ εἴπωμεν.

Ὁφείλουσιν οἱ Τζάκας και Δελαγραμμάτικας εἰς Ἐμπορεύματα Δοχ. 3.000.

Ὅπως εἰς ὅλας τὰς πράξεις ὑπάρχει τις, ὅστις λαμβάνει, και ἕτερος ὅστις δίδει, οὕτω και ἐνταῦθα· θὰ χρεώσωμεν λοιπὸν τοὺς Τζάκαν και Δελαγραμμάτικαν και θὰ πιστώσωμεν τὰ Ἐμπορεύματα.

Παράδειγμα. Τὸ ἀκόλουθον παράδειγμα δεικνύει τὴν διαφορὰν μεταξὺ τῶν δύο συστημάτων καὶ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ διπλογραφικοῦ ἀπὸ ἀπόψεως ἐλέγχου καὶ πληροφοριῶν. Ὑποθέσωμεν ὅτι εἷς ἔμπορος ἐνήργησε τὰς ἀκολουθοῦσας πράξεις.

- | | |
|--|-------------|
| 1) Εἰσέπραξε παρὰ τῆς Τραπεζῆς Ἀθηνῶν | Δρχ. 12.000 |
| 2) Ἠγόρασεν ἐπὶ πιστώσει ἔμπορ. παρὰ τοῦ Α ἀξίας | » 5.000 |
| 3) Ἐπώλησεν εἰς τὸν Β ἐπὶ πιστώσει ἔμπορ. ἀξίας | » 2.000 |
| 4) Ἐμέτηρσεν εἰς τὸν Γ | » 7.000 |
| 5) Ἐπλήρωσεν εἰς τὸν Α ἔναντι λ)σμοῦ του | » 2.000 |

Ἀπλογραφικὸν σύστημα. Συμφώνως πρὸς τὸν ὡς ἄνω προεκτεθέντα κανόνα, διὰ νὰ καταχωρίσωμεν μίαν πράξιν ἐν τῷ ἀπλογραφικῷ ἡμερολογίῳ, θὰ θέσωμεν τὸ ἐρώτημα. Ὁ μεθ' οὗ συναλλασσόμεθα ἔλαβεν ἢ ἔδωκεν; Οὕτως εἰς τὴν πρώτην πράξιν ἡ Τράπεζα Ἀθηνῶν ἔδωκεν. Ὡστε θὰ θέσωμεν τὸ ὄνομά της εἰς τὸ Λαβεῖν. Ἐνεργοῦντες καὶ τὰς ἑπομένας πράξεις θὰ ἔχωμεν ἐν τῷ ἡμερολογίῳ τὰς ἑπομένας ἐγγραφάς.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΛΑΒΕΙΝ	Τράπεζα Ἀθηνῶν	Δρχ. 12.000
2	Α	» 5.000
3	Β	» 2.000
4	Γ	» 7.000
5	Α	» 2.000
		<u>» 28.000</u>

Μετὰ τὰς ἐγγραφὰς τοῦ ἡμερολογίου θὰ χρεώσωμεν καὶ θὰ πιστώσωμεν τοὺς σχετικοὺς λ)σμοὺς ἐν τῷ καθολικῷ.

ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ

Δ	Τράπεζα Ἀθηνῶν	Λ	Δ	Α	Λ
	12.000		2.000	5.000	
Δ	Β	Λ	Δ	Γ	Λ
	2.000		7.000		

Τὰς ἐγγραφὰς ταύτας τοῦ καθολικοῦ συγκεντροῦμεν εἰς ἓνα πίνακα ὀνομαζόμενον **ἰσοζύγιον**.

ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΟΣΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΔΟΥΝΑΙ	ΛΑΒΕΙΝ	Χρεωστικ.	Πιστωτικ.
<i>Τράπεζα Ἀθηνῶν</i>		12.000		12.000
<i>A ...</i>	2.000	5.000		3 000
<i>B ...</i>	2.000		2.000	
<i>Γ ...</i>	7.000		7.000	
ΟΛΙΚΟΝ	11.000	17.000	9.000	15.000
ΣΥΝΟΛΟΝ	28.000			

Παρατηροῦμεν ὅτι τὰ τέσσαρα ἀθροίσματα τοῦ ἰσοζυγίου οὐδεμίαν δίδουσι θετικότητα, ἐὰν αἱ σχετικαὶ ἐγγραφαὶ κατεχωρίσθησαν ἐν τάξει. Πάντως ὅμως τὸ ἀθροίσμα τοῦ ἡμερολογίου πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνον μὲ τὸ ἀθροίσμα τοῦ συνόλου τῶν δύο πρώτων στηλῶν τοῦ ἰσοζυγίου. Ἐὰν ὅμως ἐκ παραδρομῆς κατεχωρίσαμεν μίαν ἐγγραφὴν εἰς πίστιν ἐνὸς λ)σμοῦ, ἀντὶ νὰ χρεώσωμεν αὐτόν, βεβαίως τὸ ἰσοζύγιον δὲν θὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὸ λάθος. Ὑπὸ ἄλλην ἄποψιν τὸ καθολικὸν μᾶς δεικνύει ὅτι ὁ ἔμπορος ὀφείλει εἰς τὴν Τράπεζαν Ἀθηνῶν δρ. 12.000, εἰς τὸν A... Δρχ. 3.000 καὶ ὅτι ἀφ' ἐτέρου τῶ ὀφείλονται παρὰ τοῦ B... Δρχ. 2.000 καὶ τοῦ Γ... Δρχ. 7.000· ἀλλ' ὁ ἔμπορος ἔδωσε καὶ ἔλαβε χρήματα, παρέδωσε καὶ παρέλαβεν ἔμπορεύματα. Ὁ Ταμίας καὶ ὁ Ἀποθηκάριος εἶναι ὑπεύθυνοι διὰ τὰ χρήματα καὶ τὰ ἔμπορεύματα, ἅτινα ὁ ἔμπορος τοῖς ἐνεπιστεύθη. Τίποτε δὲν δεικνύει εἰς τὰ βιβλία ποία εἶναι ἡ θέσις τῆς ἐπιχειρήσεως. Δύνανται ὡς ἐκ τούτου νὰ δημιουργηθῶσι πολλαὶ ἀνωμαλίας καὶ λάθη σημαντικὰ εἰς τὰ ποσά, χωρὶς νὰ εἶναι εὐκολοὶ ἢ διόρθωσις. Ἄπαντα τὰ κενὰ ταῦτα πληροῖ τὸ διπλογραφικὸν σύστημα.

Διπλογραφικὸν σύστημα. Διὰ νὰ συντάξωμεν τὸ ἡμερολόγιον, θὰ θέσωμεν διπλᾶ ἐρωτήματα δι' ἐκάστην προᾶξιν.

1ον) Ἔλαβον παρὰ τῆς Τραπέζης Ἀθηνῶν Δρχ. 12.000.

ΠΟΙΟΣ ΕΛΑΒΕΝ; Ὁ ἔμπορος, ἀντιπροσωπευόμενος ὑπὸ τοῦ Ταμίου, οὗτινος ὁ σχετικὸς λ)σμὸς τιτλοφορεῖται ΤΑΜΕΙΟΝ.

ΠΟΙΟΣ ΕΛΩΚΕΝ; Ἀληπήσαμεν ἤδη εἰς τὴν ἐρώτησιν ταύτην εἰς τὸ ἀπλογραφικὸν σύστημα ἐγγράψαντες ΛΑΒΕΙΝ, Τράπεζα Ἀθηνῶν.

Κατὰ λογιστικὴν συνήθειαν οὐδέποτε ἐν τῶ ἡμερολογίῳ ἀναφέρομεν τὰς λέξεις Δοῦναι καὶ Λαβεῖν, ἀλλ' ἀντ' αὐτῶν κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου προηγεῖται τοῦ χρεωτικοῦ λ)σμοῦ ἢ λέξις ΑΠΟ, τοῦ δὲ πιστωτικοῦ ἢ λέξις ΕΙΣ. Τὰ χρεωστικὰ ποσὰ πάντοτε καταχωρίζονται ἐν τῶ ἡμερολογίῳ εἰς τὴν ἀριστερὰν στήλην, τὰ δὲ πιστωτικὰ εἰς τὴν δεξιάν,

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

1	ἀπὸ <i>TAMEION</i> εἰς <i>ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΑΘΗΝΩΝ</i>	Δοχ.	12,000.—	12,000.—
2	ἀπὸ <i>ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</i> εἰς <i>A....</i>	»	5,000.—	5,000.—
3	ἀπὸ <i>B....</i> εἰς <i>ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</i>	»	2,000.—	2,000.—
4	ἀπὸ <i>Γ....</i> εἰς <i>TAMEION</i>	»	7,000.—	7,000.—
5	ἀπὸ <i>A....</i> εἰς <i>TAMEION</i>	»	2,000.—	2,000.—
	Σύνολον	Δοχ.	28,000.—	28,000.—

Ἐν τῷ ἡμερολογίῳ ἔχομεν ἤδη ἕξ λ)σμούς, ἕξ ὧν οἱ τέσσαρες περιλαμβάνονται εἰς τὸ ἀπλογραφικὸν σύστημα. Οἱ ἕτεροι δύο εἶναι νέοι (*TAMEION*, *ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ*). Θὰ χρεώσωμεν ἤδη καὶ θὰ πιστώσωμεν ἐν τῷ καθολικῷ τοὺς ἕξ λ)σμούς συμφώνως ταῖς ὁδηγίαις τοῦ ἡμερολογίου.

ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ

<i>ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ</i>		<i>A</i>	
12,000.—		2,000.—	5,000.—
	<i>B</i>		<i>Γ</i>
2,000.—		7,000.—	
	<i>ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</i>		<i>TAMEION</i>
5,000.—	2,000.—	12,000.—	7,000.—
			2,000.—
			9,000.—

Παρατηροῦμεν ὅτι τίποτε δὲν ἠλλάξεν εἰς ὅ,τι ἐγένετο κατὰ τὸ ἀπλογραφικὸν σύστημα σχετικῶς μὲ τοὺς διαφόρους πελάτας. Ἐν τούτοις ὅμως ἔχομεν δύο νέους λ)σμούς διὰ τὰς πράξεις τοῦ Ταμείου καὶ τῶν Ἐμπορευμάτων. Κατὰ τὸ ἀπλογραφικὸν σύστημα δὲν καταχωρίζονται εἰμὴ μόνον οἱ ἐξωτερικοὶ λ)σμοί, ἐνῶ κατὰ τὸ διπλογραφικὸν προστίθεται καὶ ἡ κίνησις τῶν ἐσωτερικῶν λ)σμῶν.

Τὰς ἀνωτέρω πράξεις συγκεντροῦμεν εἰς τὸ ἰσοζύγιον ὡς ἀκολούθως.

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Ν

Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι	Π Ο Σ Α		Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Α	
	Χρεωστικ.	Πιστωτικ.	Χρεωστικ.	Πιστωτικ.
<i>Τράπεζα Ἀθηνῶν</i>		12.000.—		12 000.—
<i>A...</i>	2.000.—	5.000.—		3.000.—
<i>B...</i>	2.000.—		2.000.—	
<i>Γ...</i>	7.000.—		7.000.—	
<i>Ἐμπορεύματα</i>	5.000.—	2.000.—	3.000.—	
<i>Ταμείον</i>	15.000.—	9.000.—	3.000.—	
* Ἀθροισμα	28.000.—	28.000	15.000.—	15.000.—

Τὸ ἰσοζύγιον μᾶς δεικνύει τέσσαρα ἄθροίσματα ὅμοια. Αἱ δύο πρῶται στήλαι δίδουσι Δρχ. 28.000, διότι ἐκάστη προᾶξις, καταχωρηθεῖσα αὐτοχρόνως εἰς τὴν χρέωσιν ἐνὸς λ)σμοῦ καὶ εἰς τὴν πίστωσιν τοῦ ἐτέρου, θὰ μᾶς δώσῃ τὸ αὐτὸ πιστωτικὸν καὶ χρεωστικὸν σύνολον. Ἐπειδὴ δὲ τὰ πᾶσα μετεφέρθησαν ἐκ τοῦ ἡμερολογίου εἰς τὸ καθολικόν, τὸ ἄθροισμα τῶν στηλῶν τοῦ ἡμερολογίου θὰ εἶναι σύμφωνον μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων στηλῶν τοῦ ἰσοζυγίου. Ἴδου ὁ πρῶτος ἔλεγχος, ὅστις μᾶς βεβαίωι ὅτι οὐδὲν ποσὸν κατὰ τὴν μεταφορὰν ἐκ τοῦ ἡμερολογίου εἰς τὸ καθολικὸν παρελείφθη οὔτε μετεφέρθη εἰς χρέωσιν ἀντὶ τῆς πιστώσεως.

Εὐρίσκομεν ὅτι τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ταμείου εἶναι χρεωστικὸν μὲ Δρχ. 3.000, τὸ ὅτιον σημαίνει ὅτι ὁ Ταμίας ὀφείλει Δρχ. 3.000 εἰς τὸν ἔμπορον, ἐφ' ὅσον εἰσῆγαγε Δρχ. 12.000 καὶ ἐξῆγαγε Δρχ. 9.000 Ἐπίσης βλέπομεν ὅτι ἡ ἀποθήκη ἔχει ἔμπορεύματα ἀξίας Δρχ. 3.000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

Λογιστικὰ βιβλία.

Γενικῶς ἐκάστη κατηγορία πράξεων χρησιμοποιεῖ εἰδικὸν βιβλίον, τὸ ὁποῖον συνήθως τηρεῖται ὑπὸ τοῦ εἰδικοῦ πρὸς τοῦτο ὑπαλλήλου π. χ. αἱ εἰσπράξεις καὶ αἱ πληρωμαὶ ἀπαιτοῦσιν εἰδικὸν βιβλίον **Ταμείου**, ἡ κίνησις τῶν ἔμπορευμάτων ἰδιαίτερον βιβλίον εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς αὐτῶν, αἱ εἰς ἔμπορικὰ γραμματίαι ὑποχρεώσεις τῶν πελατῶν καταχωρίζονται εἰς ἄλλο βιβλίον, τὸ τῆς εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς γραμματιῶν εἰσπρακτέων, κλπ.

Ἐπίσης καὶ ἄλλα βιβλία δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσι καὶ διὰ λ)σμοὺς ἐτέρων κατηγοριῶν. Διὰ τὰς πράξεις, αἵτινες ἔχουσι μικρὰν κίνησιν, χρησιμοποιοῦμεν εἰδικὸν βιβλίον τῶν διαφορῶν πράξεων. Τοῦτο βεβαίως δὲν μᾶς ἐμποδίζει ν' ἀνοίξωμεν εἰδικὸν βιβλίον δι' ἓνα λ)σμόν, ὅταν θὰ ἴδωμεν ὅτι οὗτος ἔχει ἐνδιαφέρουσαν κίνησιν.

Εἰς τὸ τέλος ἐκάστης ἡμέρας μεταφέρονται εἰς τὸ ἡμερολόγιον αἱ ἔγγραφαί, αἵτινες κατεχωρίσθησαν εἰς τὰ βοηθητικὰ βιβλία. Ὡς εἶδομεν, ἐκ τοῦ **ἡμερολογίου** μεταφέρομεν τὰ ποσὰ εἰς τὸ **καθολικόν**, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου συντάσσομεν τὸ **ἰσοζύγιον**. Ἐκαστον ἔτος

μετὰ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἐγγραφῶν τῶν πράξεων τῆς ἀπογραφῆς ἐξακριβοῦμεν τὴν κατάστασιν τῆς ἐπιχειρήσεως, ἧς αἱ σχετικαὶ λεπτομέρειαι ἐκτίθενται ἐπὶ ἰδιαίτερου πίνακος, ὀνομαζομένου **ἰσολογισμοῦ**. Αὕτη εἶναι ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἡ λειτουργία μιᾶς λογιστικῆς ἐπιχειρήσεως.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Τὸ ἡμερολόγιον εἶναι βιβλίον, ἐν τῷ ὁποίῳ ὁ ἔμπορος ὀφείλει κατὰ τὸν Νόμον νὰ καταχωρίζῃ ἡμέρα τῇ ἡμέρα καὶ μίαν πρὸς μίαν ἀπάσας τὰς πράξεις τῆς ἐπιχειρήσεώς του.

Ἄρθρον. Ἐκάστη πράξις ἢ σύνολον πράξεων ἀντιπροσωπεύεται ἐν τῷ ἡμερολογίῳ δι' εἰδικῆς ἐγγραφῆς, ἣτις ὀνομάζεται **ἄρθρον** καὶ ἣτις κατὰ τὸ διπλογραφικὸν σύστημα περιλαμβάνει τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα.

1ον) Τὴν ἡμερομηνίαν τῆς πράξεως, ἣν παραθέτομεν μεταξὺ δύο γραμμῶν ὀριζοντίων καὶ ἣτις χωρίζει δύο ἄρθρα.

2ον) Εἰς τὴν ἐπομένην γραμμὴν ἀριστερᾷ τὸ ὄνομα τοῦ λ)σμοῦ, ὅστις θὰ χρεωθῇ.

3ον) Εἰς τὴν τρίτην γραμμὴν δεξιᾷ τὸ ὄνομα τοῦ λ)σμοῦ, ὅστις θὰ πιστωθῇ.

4ον) Εἰς τὴν τετάρτην καὶ ἐν ἀνάγκῃ εἰς τὴν ἐπομένην τὴν ἐπεξήγησιν.

Τὰ ὀνόματα τῶν λ)σμῶν γράφομεν διὰ χονδρῶν χαρακτήρων (συνήθως στρογγύλων). Εἰς τὰς δύο στήλας τῶν ποσῶν, εἰς μὲν τὴν πρὸς τὰ ἀριστερὰ γράφομεν τὰ χρεωστικὰ ποσά, εἰς δὲ τὴν πρὸς τὰ δεξιὰ τὰ πιστωτικά. Τὰ ποσὰ πρέπει νὰ γράφονται εἰς τὴν αὐτὴν γραμμὴν μὲ τὸν χρεωστικὸν ἢ πιστωτικὸν λ)σμόν. Εἰς ἐκάστην σελίδα τοῦ ἡμερολογίου ἀριστερᾷ ὑπάρχουσι δύο μικραὶ στήλαι. Αὗται προορίζονται διὰ νὰ ἀναφέρωμεν τὴν ἀντίστοιχον σελίδα τοῦ καθολικοῦ κατὰ τὴν μεταφορὰν τῆς πράξεως. Ἐκαστον ἄρθρον δύναται νὰ περιλάβῃ καὶ περισσοτέρους τῶν δύο λ)σμῶν. Τὸ τοιοῦτον ἄρθρον λέγεται **σύνθετον** ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ περιλαμβάνον δύο λ)σμούς, τὸ ὁποῖον λέγεται **ἀπλοῦν**.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Τῇ 7 Ἀπριλίου ἐμετρήσαμεν εἰς τὴν Τράπεζαν Ἀθηνῶν Δρχ. 5.000 καὶ Δρχ. 3.000.

Τῇ 8 Ἀπριλίου ἐπώλησαμεν ἐπὶ πιστώσει εἰς τὸν Α ... ἐμπορεύματα ἀξίας Δρχ. 500 καὶ εἰς τὸν Β ... ἐμπορεύματα ἀξίας Δρχ. 1.700.

Τῇ 9 Ἀπριλίου ἐνεργοῦμεν τὰς ἀκολούθους εἰσπράξεις α') παρὰ τοῦ Ε ... Δρχ. 1.000, β') τοῦ Ζ ... Δρχ. 1.500 καὶ γ') τοῦ Η ... Δρχ. 300.

Τῇ 11 Ἀπριλίου ἀγοράζομεν ἐμπορεύματα ἀξίας Δρχ. 2.000 καὶ πρὸς διακανονισμόν δίδομεν

Α') γραμμάτιον Νο 5 λήξ. 25 Μαΐου καὶ

Β') ἐπιταγὴν μας ἐπὶ τῆς Τραπέζης Ἀθηνῶν.

Παρατήρησις. 1) Ποῖος ἔδωσε; Τὸ Ταμεῖον. Ποῖος ἔλαβεν; Ἡ Τράπεζα Ἀθηνῶν.

2) Ποῖος ἔδωκεν; Ἡ ἀποθήκη. Ποῖος ἔλαβεν; Ὁ Α καὶ ὁ Β.

3) Ποῖος ἔδωκεν; Ὁ Ε, ὁ Ζ καὶ ὁ Η. Ποῖος ἔλαβε; Τὸ Ταμεῖον.

4) Ποῖος ἔδωσε; Τὰ γραμμάτια εἰσπρακτέα καὶ ἡ Τράπεζα Ἀθηνῶν. Ποῖος ἔλαβε; Τὰ ἐμπορεύματα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

		<u>7</u>		
9	8	από Τράπεζαν Ἀθηνῶν εἰς Ταμείον	8.000—	8.000—
		μετρητά μας Δρχ. 5.000.— > > > 3.000.—		
		<u>8</u>		
5		από Α...	500—	
6	2	> Β... εἰς Ἐμπορεύματα ἰσοτ. τιμολογίων μας	1.700—	2.200—
		<u>9</u>		
8	3	από Ταμείον	2.800—	
	4	εἰς Ε...		1.000—
	7	> Ζ... > Η... ἐμβάσματά των		1.500— 300—
		<u>11</u>		
2		από Ἐμπορεύματα ἀξία τιμῆς Χ	2.000—	
	1	εἰς Γραμ. Εἰσπρακτέα No 5 λήξ. 25 Παῖτου		1.500—
	9	εἰς Τράπεζαν Ἀθηνῶν ἐπιταγὴ μας No 18		500—
		Εἰς μεταφορὰν	15.000—	15.000—

Ἐπισημῶς τοῦ ἡμερολογίου. Εἰς τὸ κάτω μέρος ἐκάστης σελίδος τοῦ ἡμερολογίου ἀθροίζομεν τὰ ποσὰ τῆς χρεώσεως καὶ τῆς πιστώσεως. Εἰς τὴν αὐτὴν σειρὰν τοῦ ἀθροίσματος προηγείται ἡ λέξις **Εἰς μεταφορὰν**. Τὰ ἀθροίσματα τῆς χρεώσεως καὶ τῆς πιστώσεως ὀφείλουσι νὰ εἶναι ὅμοια. Ἐν ἐναντία περιπτώσει πρέπει ν' ἀνατρεξώμεν καὶ εὐρωμεν τοὺς λόγους, δι' οὓς ὑφίσταται ἡ διαφορά, καὶ προβῶμεν εἰς τὴν δέουσαν διόρθωσιν, ἄλλως, ἐὰν γίνῃ ἡ μεταφορὰ εἰς τὸ καθολικόν, θὰ ὑποπέσωμεν βραδύτερον εἰς ἐρεύνας ἐπιπόνους. Ἐὰν τὰ ποσὰ εἶναι ἐν τάξει, τὰ μεταφέρομεν εἰς τὴν ἑτέραν σελίδα, θέτοντες εἰς τὴν αὐτὴν σειρὰν τὴν λέξιν **Ἐκ μεταφορᾶς**.

ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ

Τὸ καθολικόν εἶναι βιβλίον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου αἱ πράξεις ταξινομοῦνται κατὰ λησμούς. Λέγεται δὲ καθολικόν, διότι δέχεται τὰς καθόλου πράξεις μιᾶς ἐπιχειρήσεως. Τὸ καθολικόν δὲν εἶναι ὑποχρεωτικόν ὑπὸ τοῦ Νόμου, εἶναι ὅμως ἀπαραίτητον διὰ πάντα ἔμπορον. Ἐντὸς

αὐτοῦ θὰ ἀναζητήσωμεν ἀπάσας τὰς πληροφορίες, ὧν ἔχει ἀνάγκη ὁ ἔμπορος, διότι θὰ εὔρη ταύτας ταχέως καὶ ἀκριβῶς. Μεγάλη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια πρέπει νὰ δίδεται διὰ τὴν κανονικὴν τήρησιν τοῦ καθολικοῦ, αἱ δὲ πράξεις πρέπει νὰ καταχωρίζωνται τοῦλάχιστον τὴν ἐπομένην. Ἐκαστος λ)σμός καταλαμβάνει δύο σελίδας. Ἡ πρὸς τὰ ἀριστερὰ σελὶς δέχεται τὰ χρεωστικὰ ποσά, καὶ ἡ πρὸς τὰ δεξιὰ τὰ πιστωτικά. Εἰς τὴν ἐπικεφαλίδα θέτομεν τὸν τίτλον τοῦ λ)σμοῦ. Ἐκάστη σελὶς διαιρεῖται εἰς 7 στήλας ὡς ἐξῆς.

- ΣΕΛΙΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ
- 1) Μήν.
 - 2) Ἡμερομηνία
 - 3) Ἡ λέξις ΕἰΣ ἀκολουθουμένη ὑπὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ πιστωτικοῦ λ)σμοῦ.
 - 4) Ἐπεξηγήσεις.
 - 5) Ὁ ἀριθμὸς τοῦ ἀρθρου (δύναται νὰ παραλειφθῆ).
 - 6) Τὰ μερικὰ ποσὰ καὶ
 - 7) Τὰ ὅλικα ποσά.

ΣΕΛΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Ἡ αὐτὴ διάταξις μετὰ τὴν διαφορὰν, ὅτι εἰς τὴν 3 στήλῃν ἀντὶ τοῦ ΕἰΣ θ' ἀναφέρωμεν τὴν λέξιν ΑΠΟ μετὰ τὸν ἀντίστοιχον λ)σμόν τῆς χρεώσεως.

Παράδειγμα. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

8		62	12 Ἀπριλίου		1.000.—	
	5	ἀπὸ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΝ εἰς ΤΑΜΕΙΟΝ ἔμβασμά του			1.000.—	
		63	13 Ἀπριλίου			
9		ἀπὸ ΓΡΑΜ. ΕἰΣΠΡΑΚΤΕΑ εἰς ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΝ			1.500.—	
	8	ἀποδ. ληξ. 15 6 21 Δρχ. 800.— » » 15 7 21 » 700.—			1.500.—	

Εἰς τὸ καθολικὸν ὁ λ)σμός τοῦ Ἀλιπράντη θὰ παρουσιάζηται ὡς ἀκολουθῶς.

ΔΟΥΝΑΙ		ἈΛΙΠΡΑΝΤΗΣ		
Ἀπριλίου	12	Εἰς Ταμεῖον	Ἐμβάσματά του	62 1.000.—
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ			ΛΑΒΕΙΝ	
Ἀπριλίου	13	Ἀπὸ Γραμ. Εἰσπρ.	ἀποδ. του λ. 15 6 » » » 15 7	63 800 700 1.500

ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ

Τὸ ἰσοζύγιον εἶναι ὁ πίναξ, ὅστις συγκεντροῖ τὰ ἀθροίσματα τῶν λ)σμῶν ἑνὸς καθολικοῦ, ἵνα ἐξακριβῶνῃ τὴν συμφωνίαν μεταξὺ τοῦ καθολικοῦ τούτου καὶ τοῦ ἡμερολογίου.

Τὸ σύνολον τοῦ ἀθροίσματος τῆς στήλης τῆς χρεώσεως ὀφείλει νὰ εἶναι σύμφωνον μὲ τὸ σύνολον τοῦ ἀθροίσματος τῆς στήλης τῆς πιστώσεως. Τὰ ὑπόλοιπα τῶν λ)σμῶν δίδουσι τὴν κατάστασιν αὐτῶν, τὸ δὲ σύνολον τῶν ὑπολοίπων δίδει τὴν γενικὴν κατάστασιν τῆς ἐπιχειρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

Διαιρέσεις καὶ ταξινόμησις τῶν λ)σμῶν.

Οἱ λ)σμοὶ δύνανται νὰ διαιρεθῶσιν εἰς τέσσαρας κατηγορίας.

1ον) Εἰς τοὺς λ)σμούς, οἵτινες ἀντιπροσωπεύουσι τὸν ἴδιον ἐπιχειρηματίαν. Οὗτοι εἶναι οἱ λ)σμοὶ τοῦ **κεφαλαίου**.

2ον) Εἰς τοὺς λ)σμούς, τοὺς ἀντιπροσωπεύοντας τοὺς ὑπαλλήλους, οἵτινες εἶναι ὑπεύθυνοι διὰ τὴν φύλαξιν τῶν ἀξιών. Οἷτοι εἶναι οἱ λ)σμοὶ **ἀξιών**.

3ον) Εἰς τοὺς λ)σμούς τῶν προσώπων, μεθ' ὧν συναλλάσσεται ὁ ἔμπορος. Οὗτοι εἶναι οἱ λ)σμοὶ **τρίτων** καὶ

4ον) Εἰς τοὺς λ)σμούς, εἰς οὓς καταχωρίζομεν τὰς ζημίας καὶ τὰ κέρδη τῆς ἐπιχειρήσεως. Οὗτοι εἶναι οἱ λ)σμοὶ **ὑποτελεσμάτων**.

1ον) Λογαριασμοὶ κεφαλαίου.

Ἡ κατηγορία αὕτη δὲν ἀντιπροσωπεύει μόνον τὸν λ)σμὸν τοῦ **κεφαλαίου**, ὅστις ἐκπροσωπεῖ τὸν ἐπιχειρηματίαν. Κατὰ τὴν ἴδρυσιν μιᾶς ἐπιχειρήσεως ὁ ἐπιχειρηματίας ἐμπιστεύεται εἰς τοὺς ὑπαλλήλους τοῦ τὰ ποσά, τὰ ὁποῖα καθιέρωσε διὰ τὴν ἐπιχείρησίν του, δηλαδή τὴν συνεισφορὰν του. Ὑποθέσωμεν ὅτι εἰς κεφαλαιοῦχος κατὰ τὴν ἴδρυσιν τῆς ἐπιχειρήσεώς του παρέδωκεν εἰς τὸν Ταμίαν του εἰς μετροητὰ τὸ ποσὸν Δρχ. 100.000. Διὰ τὴν προᾶξιν ταύτην θὰ θέσωμεν τὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα,

Ποῖος ἔλαβεν ; Ὁ ταμίης ἢ ταμεῖον.

Ποῖος ἔδωκεν ; Ὁ κεφαλαιοῦχος ἢ κεφάλαιον.

ᾧ ὡστε τὸ ἄρθρον τοῦ ἀνοίγματος θὰ διατυπωθῆ ὡς ἀκολούθως.

Ταμεῖον

Δρχ. 100.000—

Εἰς Κεφάλαιον

ἀρχικὴ κατάθεσις

Δρχ. 100.000

Ἐντὶ μετροητῶν ὁ κεφαλαιοῦχος δύναται νὰ καταθέσῃ τὰ κεφάλαιά του εἰς ἑτέρας ἀξίας, π. χ. εἰς ἐμπορεύματα, γραμμάτια, τίτλους, ἀκίνητα κλπ.

Γενικῶς παρατηροῦμεν ὅτι ὁ λ)σμὸς τοῦ κεφαλαίου πάντοτε πιστοῦται. Δύνανται ὅμως πολλάκις καὶ νὰ χρεωθῆ, ἐὰν ὁ ἔμπορος εἰσφέρῃ εἰς τὴν ἐπιχείρησίν του ἀξίαν παθητικὴν, δηλαδή ἐν χρέος.

Ὑποθέσωμεν ὅτι εἰς ἔμπορος ἰδρύει μίαν ἐπιχείρησιν μὲ Δρχ. 40.000 εἰς μετροητὰ, Δρχ. 30.000 εἰς ἐμπορεύματα, ἐξ ὧν αἱ 5.000 ὀφείλονται εἰς διαφόρους προμηθευτάς. Εἶναι προφανές ὅτι ἐν τῷ ἡμερολογίῳ τὸ σχετικὸν ἄρθρον τοῦ ἀνοίγματος ὀφείλει ν' ἀναφέρῃ ἐν κεφάλαιον Δρχ. $40.000 + 30.000 - 5.000 = 65.000$.

Εἰς τὸ ἡμερολόγιον θὰ διατυπώσωμεν τὰ ἀκόλουθα ἄρθρα.

<i>Ταμείον</i>	<i>Δεχ.</i>	40.000	
<i>*Εμπορεύματα</i>	»	30.000	
<i>Εἰς Κεφάλαιον</i>	»		70.000
<hr/> <i>Κεφάλαιον</i>	<i>Δεχ.</i>	5.000	
<i>Εἰς Προμηθευτὰς</i>	»		5.000

Δυνάμεθα ὅμως τὰ δύο ἀνωτέρω ἄρθρα νὰ τὰ συμπτύξωμεν εἰς ἓν ὡς ἑξῆς.

<i>Ταμείον</i>	<i>Δεχ.</i>	40.000	
<i>*Εμπορεύματα</i>	»	30.000	
<i>Εἰς Κεφάλαιον</i>	»		65.000
» <i>Προμηθευτὰς</i>	»		5.000

Γενικῶς εἰς τὸν λ)σμὸν τοῦ κεφαλαίου δὲν ἐνεργοῦμεν καμμίαν ἐγγραφὴν, εἰμὴ μόνον εἰς τὸ τέλος τῆς χρήσεως, ἔνθα μεταφέρομεν τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς, ἥτοι τὰ κέρδη ἢ τὰς ζημίας. Τὰ κέρδη μεταφέρονται εἰς πίστιν τοῦ κεφαλαίου, αἱ δὲ ζημιαὶ εἰς χρέος αὐτοῦ. Τὸ κεφάλαιον ὄθεν αὐξάνεται ἢ ἐλαττοῦται εἰς τὸ τέλος ἐκάστης χρήσεως ἀναλόγως τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς.

2ον) Λογαριασμοὶ ἀξιών.

Ὡς ἀρχικῶς εἶδομεν, εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστης ἐπιχειρήσεως χρεοῦνται οἱ λ)σμοὶ οἱ ἀποτελοῦντες τὸ κεφάλαιον. Οὗτοι εἶναι οἱ λ)σμοὶ ἀξιών (ἀκίνητα, μετρητά, ἐμπορεύματα κλπ.)

Οἱ λ)σμοὶ οὗτοι διαιροῦνται εἰς τρεῖς κατηγορίας.

1ον) Εἰς ἀξίας ἀκινητοποιηθείσας.

2ον) Εἰς ἀξίας διαθεσίμους καὶ

3ον) Εἰς ἀξίας προσωρινῶς μὴ διαθεσίμους.

1ον) **Ἀξίας ἀκινητοποιηθεῖσαι.** Ταύτας ὁ ἔμπορος δὲν δύναται νὰ ἐκποιήσῃ χωρὶς νὰ προσκόψῃ εἰς τὴν πρόδοον τῆς ἐπιχειρήσεώς του, διότι καίτοι εἶναι κάτοχος αὐτῶν, ἔν τούτοις δὲν δύναται νὰ τὰς διαθέσῃ π. χ. ὁ ἔμπορος ἐνοικιάζει μίαν ἀποθήκην καὶ καταθέτει ὡς ἐγγύησιν εἰς τὸν ἰδιοκτῆτην Δρχ. 2.000, αἵτινες ἀντιπροσωπεύουσιν 6 μηνῶν ἐνοίκια· τὸ ποσὸν τοῦτο τῶν Δρχ. 2.000 ἀνήκει μὲν εἰς τὸν ἔμπορον, θὰ τῷ ἐπιστραφῇ ὅμως, ὅταν θὰ παύσῃ νὰ εἶναι ἐνοικιαστής. Ἐὰν θέλῃ νὰ διαθέσῃ τὰ χρήματα ταῦτα, πρότερον ὀφείλει νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ἀποθήκην καὶ συνεπῶς νὰ σταματήσῃ τὴν ἐπιχείρησίν του. Ἡ ἀξία αὕτη λέγεται ἀκινητοποιηθεῖσα (ἐνοίκιον προπληρωθὲν). Οἱ αὐτοὶ λόγοι ἰσχύουσι διὰ μίαν ἐπίπλωσιν, διὰ μίαν ἐγκατάστασιν κλπ.

2ον) **Ἀξίας διαθεσίμοι.** Ταύτας δυνάμεθα νὰ μετατρέψωμεν εἰς οἰανδήποτε στιγμὴν εἰς μετρητά. Αἱ ἀξίαὶ αὗται εἶναι τὰ μετρητά, τὰ ἐμπορεύματα, τὰ γραμμᾶτια εἰσπρακτέα, οἱ τίτλοι, τὰ ἀκίνητα κλπ.,

ἦτοι ἀξίαι πραγματοποιήσιμοι, δηλαδή διαθέσιμοι εἴτε μετὰ κέρδους εἴτε μετὰ ζημίας εἴτε πολλάκις ἄνευ οὐδεμιᾶς διαφορᾶς.

3ον) **Ἀξίαι προσωρινῶς μὴ διαθέσιμοι.** Αὗται εἶναι ἀξίαι ἀκίνητοποιηθεῖσαι, ἀλλὰ διὰ μίαν βραχείαν χρονικὴν περίοδον. Ἡ χρησιμοποίησις τῶν λ)σμῶν τούτων εἰς τὸ ἔμπόριον εἶναι σπανία. Οἱ ἔμποροι ἀνοίγουσι τοὺς λ)σμοὺς τούτους, ὅταν ἐνεργῶσι πράξεις κερδοσκοπικὰς ἢ συμμετοχικὰς, δι' ἃς διαθέτουσι διὰ μίαν χρονικὴν περίοδον ὠρισμένα κεφάλαια (ἔμπορεύματα, τίτλους κλπ.). Εἶναι προφανές ὅτι κατὰ τὴν χρονικὴν περίοδον, καθ' ἣν ὁ ἔμπορος ἔχει διάθεσιμα πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον κεφάλαια, δὲν δύναται νὰ διαθέσῃ ταῦτα ἀλλοχού.

Οἱ λ)σμοὶ ἀξιῶν, οἰοιδήποτε καὶ ἂν εἶναι, χρεοῦνται μὲ ὅσα εἰσέρχονται καὶ πιστοῦνται μὲ ὅσα ἐξέρχονται. Τὰ ὑπόλοιπα πάντοτε εἶναι χρεωστικά, ἐφ' ὅσον δὲν ἐξέρχονται περισσότερα ἀφ' ὅσα εἰσῆλθον· τὰ ὑπόλοιπα ταῦτα ἀντιπροσωπεύουσι τὰς μενούσας ἀξίας.

3ον) Λογαριασμοὶ τρίτων.

Οὔτοι εἶναι οἱ λ)σμοὶ τῶν προσώπων, μεθ' ὧν ὁ ἔμπορος εὐρίσκειται εἰς σχέσεις ἐμπορικὰς (πελάται, προμηθευταί, ἀνταποκριταὶ κλπ.). Ἐπίσης εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην δυνάμεθα νὰ κατατάξωμεν καὶ τὸν λ)σμὸν **γραμμᾶτια πληρωτέα**, ὃν κακῶς πολλοὶ κατατάσσουσιν εἰς τὰς διαθέσιμους ἀξίας, καθόσον ἐν τῇ πραγματικότητι ὁ λ)σμὸς οὗτος παρουσιάζει ἅπαντα τὰ ἀνώνυμα χρέη τοῦ ἔμπορου.

Ὑποθέσωμεν ὅτι εἷς ἔμπορος ὀφείλει εἰς τὸν Α... προμηθευτῆν του Δρχ. 1.000 διὰ τὴν ἀξίαν διαφορῶν ἔμπορευμάτων ἀγορασθέντων παρ' αὐτοῦ.

Ποῖος ἔλαβεν; Η ΑΠΟΘΗΚΗ.

Ποῖος ἔδωκεν; Ο Α...

Τὸ ἄρθρον ὅθεν θὰ διατυπωθῆ ὡς ἀκολούθως.

ΑΠΟΘΗΚΗ

Δρχ. 1.000

Εἰς Α...

Δρχ. 1.000.

εἰς δὲ τὸ καθολικὸν ὁ λ)σμὸς τοῦ Α... θὰ παρουσιάζηται ὡς ἐξῆς.

Δ.

Α...

Δ.

1.000.

ἦτοι ὁ Α... θὰ εἶναι πιστωμένος μὲ Δρχ. 1.000.

Ἐὰν ὁ Α... πρὸς κάλυψιν τοῦ λαβεῖν του ἐκδώσῃ ἐπὶ τοῦ ἔμπορου συν)κὴν 3 μηνῶν, ὁ λ)σμὸς τοῦ Α... θὰ χρεωθῆ πρὸς ἐξόφλησιν, θὰ πιστωθῆ δὲ ὁ λ)σμὸς «γραμμᾶτια πληρωτέα» ὥστε θὰ διατυπώσωμεν τὸ ἀκόλουθον ἄρθρον.

Α...

Δρχ. 1.000.—

ΕἰΣ ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ

Δρχ. 1000.—

εἰς δὲ τὸ καθολικὸν ὁ λ)σμὸς τοῦ Α... θὰ παρουσιάζηται ὡς ἀκολούθως

Δ.

Α...

Δ.

Δρχ.

1.000.—

1.000.—

Εἰς τοὺς λ)σμοὺς τρίτων ἀνάγεται καὶ ὁ λ)σμὸς τῶν **ἐπισφαλῶν**

χρεωστών, ὅστις περιληπτικῶς ἀντιπροσωπεύει τοὺς ἀναξιοχρέους πελάτας.

4ον) Λογαριασμοὶ ἀποτελεσμάτων.

Ἐκάστην φορὰν, καθ' ἣν διακρίνομεν κέρδη ἢ ζημίας εἰς μίαν ἐπιχείρησιν, καταχωρίζομεν τὸ σχετικὸν ποσὸν εἰς ἓνα εἰδικὸν λ)σμόν, ὅστις ὀνομάζεται «**λογαριασμὸς ἀποτελεσμάτων**» ἢ συνήθως «**ζημίαι καὶ κέρδη**». Πολλάκις συνηθίζουσι νὰ τιτλοφορῶσιν ἀντιστρόφως τὸν λ)σμόν τοῦτον, ἥτοι «**κέρδη καὶ ζημίαι**»· τοῦτο ὅμως δὲν εἶναι ὀρθόν, διότι αὐτὴ αὐτὴ ἡ διάταξις τοῦ λ)σμοῦ ὀδηγεῖ ὅπως τὰς ζημίας καταχωρίζωμεν εἰς τὸ Δοῦναι καὶ τὰ κέρδη εἰς τὸ Λαβεῖν.

Ἴδου ὑπόδειγμα λ)σμοῦ ἀποτελεσμάτων.

Δ.	Ζημίαι	Κέρδη	Λ.
	Καταχώρισις Ζημιῶν	Καταχώρισις Κερδῶν	

Ὁ λ)σμός «**ζημίαι καὶ κέρδη**» συνήθως ὑποδιαιρεῖται εἰς διαφόρους ἄλλους λ)σμοὺς, ὧν ὁ σπουδαιότερος εἶναι ὁ λ)σμός «**Γενικὰ ἔξοδα**». Εἰς τὸν λ)σμόν τοῦτον καταχωρίζομεν τὰ ἀναγκαιοῦντα ἔξοδα διὰ τὴν συντήρησιν καὶ ἀνάπτυξιν πάσης ἐπιχειρήσεως. Ἄνευ τῶν ἔξόδων τούτων δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὐδοκιμήσῃ οὐδεμία ἐπιχείρησις. Τὰ ἔξοδα ταῦτα εἶναι τὰ **ἐνοίκια, οἱ μισθοί, τὰ ἡμερομίσθια, αἱ διαφημίσεις, ὁ φωτισμός, τὰ γραφικὰ ἔξοδα, τὰ ταχυδρομικὰ** κλπ. Πάντοτε σχεδὸν ἐνεργοῦμεν τὴν ἀκόλουθον ἔγγραφην.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Δοχ.

Εἰς ΤΑΜΕΙΟΝ

Δοχ.

Εἰς τὴν αὐτὴν κατηγορίαν ὑπάγονται καὶ οἱ λ)σμοί :

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Χρεούμενος διὰ τῶν εἰς διαφόρους πελάτας παραχωρουμένων ἐκπτώσεων καὶ πιστούμενος διὰ τῶν παρὰ τῶν προμηθευτῶν παραχωρουμένων ἡμῖν.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. Χρεούμενος μὲ τὰς ἐκάστοτε ἀναλήψεις τοῦ ἐμπόρου.

ΤΟΚΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ κλ. Χρεούμενοι μὲ τοὺς παραχωρουμένους εἰς διαφόρους τόκους καὶ προμηθείας καὶ πιστούμενοι μὲ τοὺς παραχωρουμένους ἡμῖν.

Τὰ ὑπόλοιπα τῶν λ)σμῶν τούτων εἰς τὸ τέλος τῆς χρήσεως μεταφέρονται εἰς τὸν λ)σμόν **ζημίαι καὶ κέρδη**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

Ἐπογραφὴ καὶ ἰσολογισμός.

Ὁρισμός. Ἡ ἔπογραφὴ εἶναι τὸ σύνολον τῶν πράξεων, αἵτινες ἔχουσι σκοπὸν νὰ παρουσιάσωσιν εἰς ὠρισμένας χρονικὰς περιόδους (ἑνὸς ἔτους ἢ ἕξ μηνῶν) τὴν ἀκριβῆ κατάστασιν μιᾶς ἐπιχειρήσεως καὶ προσδιορίζωσι τὰ ἀποτελέσματα τῆς χρήσεως, ἥτοι τὸ κέρδος ἢ τὴν

ζημίαν. Τὴν εἰησίαν κατάστασιν ἐκάστης ἐπιχειρήσεως ζητεῖ καὶ ὁ Νόμος. Αὕτη ἐκτίθεται ἐπὶ ἑνὸς πίνακος διηρημένου εἰς δύο μέρη· εἰς **ἐνεργητικὸν** καὶ εἰς **παθητικόν**. Ὁ πίναξ οὗτος ὀνομάζεται **ἰσολογισμὸς**.

Γενικῶς ὑπάρχουσι δύο εἴδη ἀπογραφῶν· ἡ ἐσωτερικὴ ἀπογραφὴ καὶ ἡ ἐξωτερικὴ ἀπογραφὴ.

1ον) Ἐσωτερικὴ ἀπογραφὴ.

Ἐσωτερικὴ ἀπογραφὴ λέγεται ἡ λεπτομερὴς καταγραφὴ πασῶν τῶν ἐν τῇ ἐπιχειρήσει ἀξιῶν, ἥτοι

TAMEION. Ἡ καταμέτρησις τῶν ἐν τῷ ταμείῳ μετροτηῶν καὶ ἡ ἐξακριβωσις, ἐὰν ὑφίσταται καμμία ταμιακὴ διαφορὰ.

ΑΠΟΘΗΚΗ. Ἡ λεπτομερὴς καταγραφὴ τῶν ἐν ἀποθήκῃ εὐρισκομένων ἐμπορευμάτων εἰς τὴν ἀρχικὴν αὐτῶν ἀξίαν καὶ οὐχὶ εἰς τὴν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἀπογραφῆς ἀξίαν αὐτῶν.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ. Καταμέτρησις τῶν ἐν τῷ χαρτοφυλακίῳ εὐρισκομένων γραμματίων εἰσπρακτέων.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΚΛΠ. Λεπτομερὴς καταγραφὴ τῶν διαφορῶν ἐπίπλων καὶ σκευῶν κλπ.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ. Σύνταξις πίνακος τῶν ἐν κυκλοφορίᾳ γραμματίων.

2ον) Ἐξωτερικὴ ἀπογραφὴ.

Μετὰ τὴν καταγραφὴν πασῶν τῶν ἀξιῶν θέλομεν ἐνεργήσει ἐν τῷ ἡμερολογίῳ τὰς σχετικὰς ἐγγραφὰς πρὸς ἐξαγωγήν τῶν ὀριστικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς χρήσεως. Προτοῦ ὅμως ἐνεργήσωμεν οἰανδήποτε ἐγγραφὴν, ὀφείλομεν νὰ συντάξωμεν τὸ προσωρινὸν ἰσοζύγιον. Μετὰ τὴν σύνταξιν τοῦ προσωρινοῦ ἰσοζυγίου θέλομεν ἐνεργήσει τὰς ἀναλόγους **ἀποσθέσεις** τῶν ἀκίνητοποιηθεισῶν ἀξιῶν (ἐπίπλων, σκευῶν, ἐγκαταστάσεων, μηχανημάτων κλπ.). Ἐποσθέσεις δὲ λέγεται ἡ λογιστικὴ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας ἐπιβαρύνομεν πολλὰς χρήσεις μὲ μίαν δαπάνην, ἢ ὁποία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καταλογισθῇ εἰς μίαν καὶ μόνην χρῆσιν.

Ἐποσθέσεις ἀκίνητοποιηθεισῶν ἀξιῶν. Εἶναι προφανές ὅτι τὸ χρεωστικὸν ὑπόλοιπον ἐκάστης ἀκίνητοποιηθείσης ἀξίας δὲν εἶναι σύμφωνον μὲ τὴν πραγματικότητα, ἐφ' ὅσον ἡ ἀξία ἑνὸς ἀντικειμένου ἐλαττοῦται καθ' ἕκαστον ἔτος προοδευτικῶς. Πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς ἀνωμαλίας ταύτης ἀνοίγομεν εἰδικὸν λ)σμὸν «**ἀποθεματικῶν ἀποσθέσεων**», εἰς ὃν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἀπογραφῆς μεταφέρομεν ἐκ τοῦ λ)σμοῦ «ζημίαι καὶ κέρδη» ἀνάλογα ποσά.

Ὑποθέσωμεν ὅτι ἡγοράσαμεν ἐν ἐπιπλῶν ἀξίας Δρχ. 1.000· θὰ ἐνεργήσωμεν τὴν ἀκόλουθον ἐγγραφὴν.

Ἐπιπλα

Δρχ. 1.000.—

Εἰς ταμείον

Δρχ. 1.000.—

καὶ ἐν τῷ καθολικῷ :

ΕΠΙΠΛΑ

1.000.—

Ἐὰν ἐκτιμήσωμεν τὴν διάρκειαν τοῦ ἐπίπλου τούτου διὰ μίαν δεκαετίαν, θὰ κατανείμωμεν τὴν ἀξίαν αὐτοῦ εἰς 10 μερίδια, ἕκαστον δὲ ἔτος θέλομεν ἀποσβύνει ἓν μερίδιον, ἤτοι Δρχ. 100.

Εἰς τὸ τέλος ὄθεν τοῦ ἔτους θὰ ἐνεργήσωμεν τὴν ἀκόλουθον ἐγγραφὴν.

Ζημίαι καὶ κέρδη	Δρχ. 100.—
Εἰς ἀποθεμ. ἀποσβέσεων	Δρχ. 100.—
καὶ ἐν τῷ καθολικῷ :	

Ἀποθεματικὸν ἀποδέδωον

1ον ἔτος Δρχ.	100
2ον >	> 100
3ον >	> 100 κτλ.

κατὰ τὸ δέκατον δὲ ἔτος παύομεν τὴν ἀπόσβεισιν καὶ ἐνεργοῦμεν τὴν ἀκόλουθον ἐγγραφὴν πρὸς ἐξίσωσιν τοῦ λ)σμοῦ **ἐπίπλα**, ὅστις θὰ εἶναι χρεωστικὸς μὲ Δρχ. 1.000, καὶ τοῦ λ)σμοῦ **ἀποθεματικῶν ἀποσβέσεων**, ὅστις θὰ εἶναι πιστωτικὸς μὲ Δρχ. 1.000.

Ἀποθεματικὸν ἀποσβέσεων Δρχ. 1000.—

Εἰς ἐπιπλα Δρχ. 1.000.—

Πολλοὶ, ἀντὶ ν' ἀνοίγωσιν εἰδικὸν λ)σμὸν διὰ τὰς ἀποσβέσεις, ἐκπίπτουσι καθ' ἕκαστον ἔτος ἐκ τῶν ἀποσβέσεων ἀξιών τὸ ἀνάλογον ποσόν. Τὸ τοιοῦτον δὲν εἶναι ὀρθόν, καθ' ὅσον δύνανται νὰ προκύψωσι πολλαὶ ἀνωμαλίαι καὶ παραπλανήσεις. Πολλάκις εἰς τὰς μεγάλας ἐπιχειρήσεις δι' ἓνα ἕκαστον ἀποσβεστέον λ)σμὸν σχηματίζουσι καὶ ἀντίστοιχον λ)σμὸν ἀποθεματικῶν ἀποσβέσεων, ὡς λ. χ. Ἀποθ. ἀποσβ. ἐπίπλων, ἐξόδων ἐγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ.λ.π. Οἱ λ)σμοὶ οὗτοι λειτουργοῦσιν, ὡς ἀνωτέρω ἐξεθέσαμεν.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κέρδη. Γενικῶς τὰ διάφορα κέρδη τῆς ἐπιχειρήσεως συγκεντροῦνται εἰς τὸν λ)σμὸν ἀποτελεσμάτων ἢ ζημιῶν καὶ κερδῶν δι' ἐνὸς ἄρθρου κλειόντος τοὺς οἰκείους λ)σμούς. Ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ ἐξαχθὲν ἐκ τῶν πωλήσεων τῆς ἀποθήκης κέρδος ἀνέρχεται εἰς Δρχ. 10.000, ὁ λ)σμὸς **πρωλήξει** παρουσιάζει πιστωτικὸν ὑπόλοιπον Δρχ. 100 καὶ ὁ λ)σμὸς μεσιτειῶν Δρχ. 50. Θὰ ἐνεργήσωμεν τὴν ἀκόλουθον ἐγγραφὴν.

Ἐμπορεύματα	Δρχ. 10.000.—
Μικτὸν κέρδος ἐμπορ.	
Προμήθειαι	> 100.—
Μεταφορὰ πρὸς ἐξίσωσιν	
Μεσιτεῖαι	> 50.—
Μεταφορὰ κ.λ.π.	

Εἰς Ζημίας καὶ κέρδη Δρχ. 10.150.—

Ζημίαι. Κατὰ τὸν ἀνωτέρω τρόπον ἀπίσαι τὰς ζημίας συγκεντροῦμεν εἰς ἓν ἄρθρον. Ὑποθέσωμεν ὅτι οἱ ἀκόλουθοι λ)σμοὶ παρου-

σιάζουσι τὰ κάτωθι χρεωστικά υπόλοιπα. Γενικά ἔξοδα Δρχ. 4.000,
Προσωπικά ἔξοδα Δρχ. 2.500, Τόκοι Δρχ. 200.

Θὰ ἐνεργήσωμεν τὴν ἀκόλουθον ἐγγραφὴν.

<i>Ζημίαι καὶ κέρδη</i>	Δρχ. 6.700.—		
<i>Εἰς Γενικά ἔξοδα</i>		Δρχ.	4.000.—
» <i>Προσωπικά ἔξοδα</i>		»	2.500.—
» <i>Τόκους</i>		»	200.—

ΜΙΚΤΟΝ ΚΕΡΔΟΣ

Ὁ λ)σμός Ἐμπορεύματα κατὰ τὸ τέλος τῆς χρήσεως θὰ παρουσιασθῆ χρεωστικός ἢ πιστωτικός, χωρὶς νὰ δεικνύη τὸ προκῦψαν κέρδος. Πρὸς ἔξαγωγὴν τοῦ κέρδους ὀφείλομεν νὰ ἐνεργήσωμεν διαφόρους ἀριθμητικὰς πράξεις. Ὑποθέσωμεν ὅτι κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς χρήσεως ἢ ἀποθήκη εἶχεν ἔμπορεύματα ἀξίας Δρχ. 5.000, αἱ δὲ ἀγοραὶ καθ' ὄλον τὸ ἔτος ἀνῆλθον εἰς Δρχ. 12.000. Αἱ πωλήσεις ἀνῆλθον εἰς Δρχ. 19.000. Ὁ λογαριασμός Ἐμπορεύματα θὰ παρουσιάζεται ὡς ἀκολούθως.

Ἐμπορεύματα.

Μένοντα Δρχ. 5.000.—	Πωλήσεις Δρχ. 19.000.—
Ἀγοραὶ » 12.000.—	

Ἀφ' ἐτέρου ἢ ἀπογραφή τῆς ἀποθήκης παρουσίασε κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους μένοντα ἔμπορεύματα ἀξίας Δρχ. 8.000. Δὲν εἶναι δύσκολον ὅθεν νὰ προσδιορίσωμεν τὸ προκῦψαν κέρδος.

$$19.000 + 8.000 - 17.000 = 10.000.$$

Πωλήσεις Μένοντα Εἰσαχθέντα Μικτὸν κέρδος

Εἰς τὸ ἡμερολόγιον θὰ ἐνεργήσωμεν τὴν ἀκόλουθον ἐγγραφὴν.

<i>Ἐμπορεύματα</i>	Δρχ. 10.000.		
<i>Εἰς Ζημίας καὶ Κέρδη</i>		Δρχ.	10.000.—

Ὁ δὲ λογαριασμός ἔμπορεύματα θὰ παρουσιάζεται ὡς ἀκολούθως:

Ἐμπορεύματα

Μένοντα Δρχ. 5.000.—	Πωλήσεις Δρχ. 10.000.—
Ἀγοραὶ » 12.000.—	Μένοντα » 8.000.—
Μικτὸν κέρδος » 10.000.—	
» <u>27.000.—</u>	
Εἰς νέον 8.000.—	<u>27.000.—</u>

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τὰ ὀριστικά ἀποτελέσματα ἐξάγονται ἐκ τῆς διαφορᾶς τοῦ λ)σμοῦ ζημίαι καὶ κέρδη, ἀφοῦ πρότερον συγκεντρώσωμεν ἅπαντα τὰ υπόλοιπα τῶν διαφόρων λ)σμῶν ἀποτελεσμάτων.

Ζημίαι καὶ Κέρδη.

Γενικά ἔξοδα Δρχ. 4.000.—	Μικτὸν κέρδος Δρχ. 10.000.—
Προσωπικόν » 2.500.—	Προμήθειαι » 100.—
Τόκοι » 200.—	Μεσιτεῖαι » 50.—
» <u>6.700.—</u>	
Διάφορα κέρδη » 3.450.—	
» <u>10.150.—</u>	» <u>10.150.—</u>

Τὸ ὅλικόν τῶν ζημιῶν ἀνῆλθεν εἰς Δρχ. 6.700 καὶ τῶν κερδῶν εἰς Δρχ. 10.150, ἤτοι προέκυψε διαφορὰ ἐπὶ πλεόν Δρχ. 3.450.

Γενικῶς ὁ ἔμπορος τὸ καθαρόν κέρδος τῆς ἐπιχειρήσεως τοῦ τῷ ἀφίνει πρὸς ἀΐξισιν τῶν κεφαλαίων του. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην θὰ ἐνεργήσωμεν τὴν ἀκόλουθον ἐγγραφὴν.

Ζημίαι καὶ Κέρδη Δρχ. 3.450.—
Εἰς Κεφάλαιον Δρχ. 3.450.—

Ἐὰν τυχόν προκύψῃ κατὰ τὴν χρῆσιν ζημία, θὰ γίνῃ ἡ ἀντίστροφος ἐγγραφὴ:

Κεφάλαιον Δρχ. — — —
Εἰς ζημίας καὶ κέρδη Δρχ. — — —

Μετὰ τὰς ἐγγραφὰς τῆς ἀπογραφῆς, ἃς θὰ ἐνεργήσωμεν εἰς τὸ ἡμερολόγιον καὶ τὸ καθολικόν, θὰ συγκεντρώσωμεν ἅπαντα τὰ ὑπόλοιπα εἰς ἓν ὀριστικὸν ἰσοζύγιον, ἐξ οὗ θέλομεν ἐξαγάγει τὸν *ἰσολογισμόν*.

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ἴσολογισμὸς εἶναι εἷς πίναξ διηρημένος εἰς δύο μέρη, εἰς **ἐνεργητικόν** καὶ εἰς **παθητικόν**. Οὗτος δεικνύει τὴν οικονομικὴν κατάστασιν τῆς ἐπιχειρήσεως. Ἴδου ἓν ὑπόδειγμα ἰσολογισμοῦ.

Ἴσολογισμὸς τῆς 31 Δεκεμβρίου 1922

Ἀξίαι ἀκίνητοποιηθεῖσαι		Κεφάλαιον	Δρχ. 61 400
Ἐξοδα ἐγκαταστ.	Δρχ. 10.000		
Ἐνοίκ. προπληρ.	> 2.000	Δογαριασμοὶ τάξεως	
Ἐπιπλα	> 5.000	Ἀποθεματικόν	> 5.000
Ἀξίαι διαθέσιμοι		Ἀποσβέσεις	> 2.000
Ταμείον	> 7.000	Ἐξοδα πληρωτέα	> 800
Τράπεζα	> 3.000	Δογαριασμοὶ τρίτων	
Ἐμπορεύματα	> 40.000	Γραμ. πληρωτέα	> 9.000
Γραμ. εἰσπρακτέα	> 6.000	Πιστωταὶ	> 15.000
Ἀξίαι μὴ διαθέσιμοι			
Συμμετοχικὰ ἔμπορ.	> 8.000		
Δογαριασμοὶ τρίτων			
Χρεῶσται	> 10.000		
Ἐπισφ. χρεῶσται	> 2.000		
Δογαριασμοὶ τάξεως			
Γεν. Ἐξοδα προπληρωθ.	> 200		
Δρχ. 93.200		Δρχ. 93.200	

ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

Τὸ βιβλίον ἀπογραφῶν εἶναι ὑποχρεωτικόν ὑπὸ τοῦ Νόμου. Εἰς τὸ βιβλίον τοῦτο καταχωρίζομεν τὸν ἰσολογισμόν μὲ ἀπάσας ἀναλυτικῶς

τὰς λεπτομερείας τῆς ἀπογραφῆς, ἥτοι θέλομεν ἀναφέρει ἀναλυτικῶς τὰ ἔμπορεύματα, τὰ γραμμάτια εἰσπρακτέα, τὰ μετρητά, τὰ ἐν κυκλοφορίᾳ γραμμάτια κλπ.

ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ἵνα κλείσωμεν τοὺς λ)σμούς τοῦ καθολικοῦ ἔξισοῦμεν τούτους, δηλαδή ἐγγράφομεν εἰς τὸ ἀσθενέστερον μέρος αὐτῶν τὰ ὑπόλοιπα, ὅποτε τὰ ποσὰ τοῦ δοῦναι καὶ τοῦ λαβεῖν γίνονται ἴσα. Κάτωθεν τῶν ἀθροισμάτων θέτομεν διπλὴν γραμμὴν, μεταφέρομεν δὲ εἰς νέον τὴν ἔξιωσιν, ἵνα ἀνανεωθῇ καὶ πάλιν ὁ λ)σμός.

Τ Ε Λ Ο Σ

Ἀριθ. { Πρωτ. 12,306
Διεκπ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 16 Ἀπριλίου 1921



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρὸς

τὸν κ. Κ. Ξ. Παπανικητόπουλον

Συγγραφέα διδακτικῶν βιβλίων

Ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι' ἡμετέρας πράξεως, τῇ
ἑξάντος μηνὸς ἐκδοθείσης καὶ τῇ 8ῃ ἱσταμένου δημοσιευ-
τῆς ὑπ' ἀριθ. 21 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως,
πρὸς κρίσιν ὑποβληθὲν ὑμέτερον βιβλίον ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡ-
ΧΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,
καὶ τῶν ἀνωτέρων Παρθεναγωγείων.

Ὁ Ὑπουργὸς
Κ. ΠΟΥΛΓΕΝΗΣ

Π. ΖΑ

Κ. Ξ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ἔμπολικῶς συνταγ-
ῆς) Ἑλληνικὰ σχολεῖα, τὰ Ἀστικά καὶ τὰ Ἀνώτερα Παρθε-
ναγωγεία τὸ ἔτος 1921. Ἐκδοσις Πέμπτη.

